V VETALYX

Rapport de validation usability kits & recommandations panels

快速过敏检测套件使用验证报告及面板推荐方案

Tests rapides IgE allergie chien et chat — retour terrain + spécification panels 6 lignes

犬猫IgE快速检测 — 实地反馈与六线面板规范

DATE / 日期
28 mai 2026 · 2026年5月28日

AUTEURS / 作者
JCH · Vasco · Clio · Jade · Dobby

DESTINATAIRE / 接收方
DIXUN

STATUT / 状态
v1 confidentiel · 保密v1版本

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Un essai d'utilisabilité mené à la clinique vétérinaire Simon (Liège) confirme que les kits sont bien acceptés en pratique quotidienne et perçus comme pertinents. Toutefois, deux points de friction majeurs ont été identifiés : **la composition allergénique des panels ne correspond pas aux attentes des vétérinaires européens**, et **la documentation des performances du kit (dossier DIXUN) est jugée insuffisante** pour justifier les décisions cliniques.

Ces retours terrain corroborent et renforcent les recommandations issues de la revue scientifique : priorité aux allergènes européens à forte prévalence, lignes mixtes par famille, et validation KOL indispensable avant toute démarche commerciale à grande échelle.

1

Validation terrain — Essai d'utilisabilité (Clinique Simon, Liège)

1.1 Configuration de la clinique

L'essai a été conduit à la **clinique vétérinaire du Dr Simon à Liège** (Belgique), composée de 3 vétérinaires et 2 assistants, spécialisée chiens, chats et chevaux.

Cette clinique a été choisie en raison de la **qualité des relations personnelles avec la directrice**, permettant de réaliser les tests sans financement — les kits ont été fournis en don.

1.2 Protocole de l'essai

Kits utilisés : Panels inhalants (ISC) et alimentaires (FSC) chien et chat.

Usage : 2 vétérinaires sur 3 ont utilisé les kits à un rythme de 2–3 animaux/jour (le 3e est exclusivement dédié aux urgences).

Objectifs : retour qualitatif sur l'utilisabilité en pratique quotidienne et perception du produit — non constitution d'une cohorte statistique.

1.3 Résultats — Utilisabilité

> Résultats **très positifs** — aucune remarque négative.

Seul point d'amélioration : la pipette de prélèvement, petite et transparente, est difficile à manipuler avec des gants. Aucune demande de lecteur automatique.

1.4 Résultats — Perception clinique

15 % de résultats positifs — sans valeur statistique (animaux testés sans suspicion d'allergie avérée).

> **Préoccupation principale :** risque de faux positifs entraînant des frais complémentaires (envoi en laboratoire). Les vétérinaires demandent une meilleure documentation des performances. **Les dossiers DIXUN actuels sont jugés insuffisants.**

1.5 Composition allergénique — Point de friction majeur

> *La composition du panel allergénique n'est pas à la hauteur des attentes et de la pratique journalière.*

Les vétérinaires attendent des **allergènes européens à forte prévalence**. Si la composition ne répond pas à cette demande de base, la difficulté commerciale sera significative.

1.6 Traitement et revendications d'utilisation

Le test est **uniquement à valeur indicative** — pas un outil diagnostique.

- **Allergie alimentaire :** régime d'éviction.
- **Allergènes environnementaux :** traitement prophylactique ou de fond, incluant oméga-3.

2 Spécification des panels recommandés

> **Recommandation stratégique centrale**
> La question n'est plus de savoir si les kits sont utilisables — ils le sont. La question est de savoir si leur composition allergénique est adaptée au marché européen. C'est là que se joue le succès commercial. La recommandation est d'**analyser la faisabilité d'adapter la gamme actuelle**, en priorité pour les panels inhalants, avant toute démarche commerciale à grande échelle.

Conclusions convergentes (vétérinaires terrain + experts ULiège + revue IA) : 1–2 lignes supplémentaires nécessaires ; lignes mixtes par famille ; allergènes à prévalence européenne ; outil de dépistage uniquement.

2.1 Décision centrale

Les tests rapides doivent utiliser des **lignes mixtes par familles allergéniques**. Priorité P0 : test environnemental/dermatologique. Panels alimentaires en P2.

2.2 Règles d'interprétation

- Lignes mixtes recommandées pour acariens, pollens et moisissures.
- Résultat positif à interpréter dans le contexte clinique complet.
- Immunothérapie spécifique : panel laboratoire plus détaillé requis après le test rapide.
- IgE alimentaires seules ne diagnostiquent pas une allergie alimentaire.

2.3 Panels chien

Chien — IgE respiratoire / aéroallergènes

#	Nom affiché	Composition recommandée	Rationale
1	House dust mites	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	Groupe le plus robuste en dermatite atopique canine.
2	Storage mites	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	Fréquent en environnement domestique ; utile en screening EU.
3	Grass pollen mix	*Phleum* + *Lolium* + *Dactylis* + *Festuca* + *Poa*	Graminées très pertinentes en Europe.
4	Weed pollen mix	*Artemisia* + *Ambrosia* + *Plantago* + *Parietaria*	*Parietaria* prioritaire Sud/Méditerranée.
5	Tree pollen mix	*Betula* + *Alnus* + *Corylus* + *Quercus* + *Fraxinus*	Arbres européens ; option olive/cyprès au Sud.
6	Mould mix	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	Pertinence variable ; utile en ligne groupée.

Chien — IgE dermique / dermatite allergique

#	Nom affiché	Composition recommandée	Rationale
1	Flea allergy	*Ctenocephalides felis* / flea saliva	Cause majeure ; ligne prioritaire.
2	House dust mites	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	Fort rendement pour dermatite atopique canine.
3	Storage mites	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	Complète HDM ; utile en Europe.
4	Malassezia	*Malassezia pachydermatis*	Sensibilisation possible chez chiens atopiques.
5	Atopic pollen mix	Grass mix + *Artemisia/Plantago/Parietaria*	Pollens cutanéo-atopiques les plus actionnables.
6	Mould mix	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	Complément environnemental.

Chien — IgE alimentaire

#	Allergène	Composition	Rationale
1	Beef	Protéines de bœuf / BSA	Source fréquemment rapportée chez le chien.
2	Dairy	Protéines de lait de vache	Allergène fréquent ; exposition courante.
3	Chicken	Protéines de poulet	Ingrédient très exposé dans les régimes canins.
4	Wheat/cereal	Blé +/- céréales	Utile pour orienter l'éviction.
5	Egg	Protéines de blanc d'œuf	Source alimentaire courante.
6	Soy	Protéines de soja	Pertinence moyenne ; utile si ligne disponible.

2.4 Panels chat

Chat — IgE respiratoire / aéroallergènes

#	Nom affiché	Composition recommandée	Rationale
1	House dust mites	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	Fréquents dans réactions IgE félines ; interpréter avec prudence.
2	Storage mites	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	Complément intérieur/alimentation sèche.
3	Grass pollen mix	*Phleum* + *Lolium* + *Dactylis* + *Poa*	Couverture pollens de base en Europe.
4	Regional tree/weed mix	*Betula*/*Alnus* ou olive/*Parietaria* selon zone	À adapter géographiquement.
5	Mould mix	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	Utile en screening respiratoire.
6	Indoor insects	Cockroach +/- insect mix	Intérieur urbain ; support non diagnostique.

Chat — IgE dermique

#	Nom affiché	Composition recommandée	Rationale
1	Flea allergy	*Ctenocephalides felis* / flea saliva	Priorité clinique féline.
2	House dust mites	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	Pertinent dans FASS.
3	Storage mites	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	Couverture intérieur/alimentation sèche.
4	Regional pollen mix	Graminées + weed/tree régional	Aide si saisonnalité compatible.
5	Mould mix	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	Complément environnemental prudent.
6	Biting insects	Moustique/insect bite mix ; sinon cockroach	Utile si disponible.

Chat — IgE alimentaire

#	Allergène	Composition	Rationale
1	Beef	Protéines de bœuf	Source fréquemment rapportée.
2	Fish	Poisson blanc + saumon/thon	Important chez le chat.

#	Allergène	Composition	Rationale
3	Chicken	Protéines de poulet	Exposition alimentaire très fréquente.
4	Dairy	Protéines de lait de vache	Interprétable seulement en support.
5	Egg	Protéines d'œuf	Pertinent mais non diagnostique seul.
6	Wheat / soy	Blé + soja groupés	Compromis si seulement 6 lignes.

2.5 Claims recommandés

Claim autorisé : Test rapide de sensibilisation IgE à des groupes d'allergènes fréquents, destiné à appuyer l'orientation clinique par le vétérinaire.

Claims à éviter : diagnostic alimentaire rapide · détecte les intolérances · identifie la cause de l'allergie · remplace le régime d'éviction · remplace le diagnostic vétérinaire.

3 Recommandations et prochaines étapes

3.1 Actions fournisseur DIXUN

- Confirmer la faisabilité technique de **lignes mixtes standardisées** par famille allergénique.
- Fournir validation chien/chat séparée avec matrice positive/négative et reproductibilité par ligne.
- Clarifier la nature des extraits (natifs/recombinants/mixtes) et fournir les contrôles qualité lot à lot.
- Prévoir une **option régionale** Nord/Ouest Europe et Méditerranée pour les pollens.
- **Fournir une documentation de performances adéquate** (sensibilité/spécificité) — le dossier actuel est insuffisant.

3.2 Validation KOL

Une validation par des leaders d'opinion est **impérativement nécessaire**. Deux KOLs identifiés, leurs départements sont ouverts à une rencontre pour définir protocole, calendrier et budget.

3.3 Protocole d'étude clinique

Contrainte : prélèvements sanguins coûteux ; protocole >150 animaux. **Piste DBS** (dried blood spot) sur papier buvard à explorer — prouvée chez l'humain, pas encore chez l'animal. Fragilité des IgE = contrainte de conservation majeure.

3.4 Plan d'action

Priorité	Action	Responsable
P0	Documentation performances DIXUN (sensibilité/spécificité)	Vasco + DIXUN
P0	Adapter composition allergénique aux prévalences européennes	Clio + DIXUN
P1	Organiser rencontres avec les 2 KOLs identifiés	JCH + Vasco
P1	Définir protocole étude clinique (>150 animaux, faisabilité DBS)	Vasco + Clio
P2	Explorer gamme régionale européenne (Nord/Méditerranée)	Clio + DIXUN
P2	Améliorer ergonomie pipette (taille, visibilité sous gants)	JCH + DIXUN