

ACT-11302 Calculo Actuarial III

Sesion 15 - Agregacion de Riesgos - Parte 3/4

Juan Carlos Martinez-Ovando

Departamento Academico de Actuaria y Seguros



Objetivo de la sesion

- Estudiar y comprender el uso de aproximaciones asintoticas para estimar la distribucion del monto agregado de siniestros $F_S(s)$ de un periodo de operacion dado.

4. Aproximacion analitica

- La aproximacion analitica para $F_{S_t}(s)$ descansa en el Teorema Central de Limite (TCL), argumentando que la composicion del portafolio, J_t , es relativamente grande.
- **Supone** que la media y varianza de S_t , $\mu_{S_t} = \mathbb{E}(S_t)$ y $\sigma_{S_t}^2 = \text{var}(S_t)$ son conocidas.
- En la practica, ambos parametros son estimados puntualmente de alguna forma.

De acuerdo a lo anterior, **teóricamente** se sigue que cuando $J_t \rightarrow \infty$, la distribución del **monto agregado de siniestros** puede aproximarse como:

$$\begin{aligned} F_{S_t}(s) &= \mathbb{P}(S_t \leq s) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{S_t - \mu_{S_t}}{\sigma_{S_t}} \leq \frac{s - \mu_{S_t}}{\sigma_{S_t}}\right) \\ &\approx \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{s - \mu_{S_t}}{\sigma_{S_t}}\right) \\ &\approx N(S_t | \mu_{S_t}, \sigma_{S_t}^2), \end{aligned}$$

donde Z es una variable aleatoria con,

$$Z \sim N(z | 0, 1).$$

Como anticipamos, **en la practica** los parametros μ_{S_t} y σ_{S_t} son desconocidos, pero se estiman puntualmente como

$$\begin{aligned}\mu_{S_t} &= J_t \hat{\mu}_{X_t} \\ \sigma_{S_t} &= J_t \hat{\sigma}_{X_t},\end{aligned}$$

donde $\hat{\mu}_{X_t}$ y $\hat{\sigma}_{X_t}$ son los estimadores puntuales de la **severidad individual media** y de la **desviacion estandar de la severidad individual**, respectivamente. Asi, se sigue

$$\begin{aligned}F_{S_t}(s) &\approx \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{s - \hat{\mu}_{S_t}}{\hat{\sigma}_{S_t}}\right) \\ &\approx N\left(S_t | \hat{\mu}_{S_t}, \hat{\sigma}_{S_t}^2\right).\end{aligned}$$

Comentarios

- El resultado anterior presupone que las severidades individuales, $(X_{tj})_{j=1}^{J_t}$, son iid.
- El resultado asintotico anterior tambien es valido solo en el caso que

$$\text{var}(X_t) < \infty,$$

(o equivalentemente, sujeto a $\mathbb{E}(X_t^2)$ sea finito).

- La condicion anterior se cumple solo en el caso en el que las severidades individuales sean de *riesgo moderado*, i.e. que no exista prevalencia de riesgos individuales grandes.
- Desde un punto de vista probabilistico, se sigue cuando el la distribucion del reclamo individual no sea de colas pesada (i.e. que no exhiba valores extremos).

Comentarios

- La aproximación basada en el TCL resulta ser eficiente para aproximar $F_{S_t}(s)$ en la región concentrada en μ_{S_t} (*monto agregado de riesgo esperado*).
- **Sin embargo**, esta aproximación puede ser imprecisa cuando deseemos estudiar alguna región extrema (generalmente la derecha) de la distribución $F_{S_t}(s)$.

En tal circunstancia, es recomendable invocar a una aproximación asintótica ad-hoc, como veremos a continuación.

4.1. Aproximacion analitica modificada por sesgo

Previniedo que el monto agregado de siniestros, S_t , pueda exhibir sesgos en su distribucion, debido principalmente a que tiene soporte en la recta real positiva, pero tambien a sesgos en:

- la distribucion de los reclamos individuales
- distribucion del numero de reclamos a traves de θ ,

se ha desarrollado una aproximacion analitica alternativa a la del TCL.

Esta aproximacion descansa en la distribucion **gamma trasladada** con tres parametros, dada por

$$F_{S_t}(s) \approx Ga(s - s_{0t} | \alpha_t, \beta_t), \quad (1)$$

donde

- s_{0t} es un parametro de traslacion,
- α_t es un parametro de forma,
- β_t es un parametro de escala.

El kernel de la distribucion gamma en cuestion es de la forma

$$Ga(s - s_{0t} | \alpha_t, \beta_t) \propto (s - s_{0t})^{\alpha_t - 1} \exp\{-\beta_t(s - s_{0t})\} \mathbb{I}_{[s_{0t}, \infty)}(s).$$

- Noten que el parametro s_{0t} no solo desplaza la distribucion, sino que modifica el soporte de la misma.

Comentarios

- Al igual que la aproximación basada en el TCL, esta aproximación presupone que los parámetros $(s_{0t}, \alpha_t, \beta_t)$ son conocidos.
- En la práctica, estos parámetros deben estimarse puntualmente. La aproximación, en este caso, descansará en el **metodo de momentos (MM)**.

4.2. Calibración por el método de momentos

El MM consiste en elegir los valores específicos de los parámetros de una distribución de tal forma que los primeros momentos teóricos de la distribución sean iguales a los primeros momentos muestrales de los datos.

- En nuestro caso, deseamos que los primeros tres momentos teóricos coincidan con los primeros tres momentos muestrales de la *distribución gamma trasladada*.

Los primeros tres momentos teóricos de esta distribución son:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{F_{S_t}}(S_t) &= s_{0t} + \frac{\alpha_t}{\beta_t} \\ \text{var}_{F_{S_t}}(S_t) &= \frac{\alpha_t}{\beta_t^2} \\ \text{sesgo}_{F_{S_t}}(S_t) &= \frac{2}{\alpha_t^{1/2}}.\end{aligned}$$

Considerando que

$$\begin{aligned}\widehat{\mu}_{S_t} &= \widehat{\mathbb{E}(S_t)} \\ \widehat{\sigma}_{S_t} &= \widehat{\text{var}(S_t)}^{1/2} \\ \widehat{\gamma}_{S_t} &= \widehat{\text{sesgo}(S_t)},\end{aligned}$$

son los estimadores muestrales puntuales de los tres momentos, planteamos el sistema de ecuaciones del MM:

$$\widehat{\mu}_{S_t} = s_{0t} + \frac{\alpha_t}{\beta_t} \quad (2)$$

$$\widehat{\sigma}_{S_t} = \frac{\alpha_t}{\beta_t^2} \quad (3)$$

$$\widehat{\gamma}_{S_t} = \frac{2}{\alpha_t^{1/2}}. \quad (4)$$

Resolviendo las ecuaciones (2)-(4), identificamos estimadores puntuales del MM de los tres parámetros, como:

$$\begin{aligned}\hat{\alpha}_t &= \frac{4}{\hat{\gamma}_{S_t}}, \\ \hat{\beta}_t &= \frac{2}{\hat{\gamma}_{S_t} \hat{\sigma}_{S_t}}, \\ \hat{s}_{t0} &= \hat{\mu}_{S_t} - 2 \frac{\hat{\sigma}_{S_t}}{\hat{\gamma}_{S_t}}.\end{aligned}$$

Es decir, tenemos que

$$F_{S_t}(s) \approx Ga\left(s - \hat{s}_{0t} | \hat{\alpha}_t, \hat{\beta}_t\right).$$

Comentarios

- Esta aproximacion es valida solo en el caso en que $\text{sesgo}(S_t) > 0$.
- En el caso limite cuando $\text{sesgo}(S_t) \rightarrow 0$ se tiene que la aproximacion gamma trasladada converge a la aproximacion normal inducida por el TCL.

El ultimo punto es un ejercicio de TAREA para entregarse.

4.3. Aproximacion analitica modificada por sesgo

Consideremos una aproximacion adicional a $F_S(s)$ basada en el ajuste a los primeros tres momentos de su distribucion.

La nueva aproximacion hace referencia a la distribucion normal potencia.

Considerando que los parametros teoricos $\mathbb{E}_{F_{S_t}}(S_t)$, $\text{var}_{F_{S_t}}(S_t)$ y $\text{sesgo}_{F_{S_t}}(S_t)$ son conocidos, tenemos

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_t - \mathbb{E}(S_t)}{\text{sd}(S_t)} \leq s + \frac{\text{sesgo}(S_t)}{6}(s^2 - 1)\right) \approx N(s|0, 1).$$

Comentarios

- Al igual que con la aproximación gamma trasladada, partimos del supuesto que $\mathbb{E}(S_t)$, $\text{var}(S_t)$ y $\text{sesgo}(S_t)$ son conocidos (con $\text{sesgo}(S_t) > 0$).
- **En la practica**, estos tres parametros tienen que estimarse.

Considerando que

$$\begin{aligned}\widehat{\mu}_{S_t} &= \widehat{\mathbb{E}(S_t)} \\ \widehat{\sigma}_{S_t} &= \widehat{\text{var}(S_t)}^{1/2} \\ \widehat{\gamma}_{S_t} &= \widehat{\text{sesgo}(S_t)},\end{aligned}$$

son los estimadores muestrales puntuales de los tres momentos, tenemos el siguiente resultado.

La tercera aproximacion asintotica es de la forma:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\frac{S_t - \hat{\mu}_{S_t}}{\hat{\sigma}_{S_t}} \leq s\right) &\approx N\left(\left(\frac{9}{\hat{\gamma}_{S_t}^2} + \frac{6s}{\hat{\gamma}_{S_t}} + 1\right)^{1/2} - \frac{3}{\hat{\gamma}_{S_t}} \mid 0, 1\right) \\ &= N\left(\underbrace{\left(\frac{9}{\hat{\gamma}_{S_t}^2} + \frac{6s}{\hat{\gamma}_{S_t}} + 1\right)^{1/2} - \frac{3}{\hat{\gamma}_{S_t}}}_{\text{argumento}} \mid \underbrace{0, 1}_{\text{parametros}}\right), \end{aligned}$$

para cualquier valor de $s \geq 1$.

Comentario

- La tercera aproximacion asintitica es particularmente valida cuando para valores $s \geq 1$.
- En casos donde $s < 1$ (poco empleados), la aproximacion asintotica TCL o basada en la distribucion gamma trasladada seran mejores.

Comentarios de la sesion

- Hemos estudiado tres aproximaciones asintoticas de la distribucion de montos agregados $F_{S_t}(s)$.
- Las tres aproximaciones descansan en el supuesto que los montos individuales tienen momentos finitos:
 - Para TCL suponemos que $\mathbb{E}(X_t^2) < \infty$.
 - Para gamma trasladada y modificada por sesgo suponemos que $\mathbb{E}(X_t^3) < \infty$.
- De esta forma, TCL es valida en el caso donde la distribucion de los montos individuales de siniestros *no es de colas pesadas*.
- Sin embargo, gamma trasladada y modificada por sesgo son dos aproximacion que pueden emplearse en casos donde la distribucion de los montos individuales si es de *valores extremos*.

Temas siguientes

- Recursiones en le modelo de riesgo colectivo (Recursion de De Pril y Panjer)

Table of Contents