

1 = 210

Σ הנקראים α ו β , i , $(i) \alpha \beta = \text{סכום המקסימי של } i$ יציקים

$$\text{OPT}_2(i) = \text{OPT}_1(i-1)$$

$\text{opt2}(i) = \max(\text{opt2}(i-1), \text{opt1}(i-1))$, -5 pts

$$\text{OPT}_2(i) = 0, \quad \text{OPT}_1(i) = p_i \quad \in \{2\}$$

• $\max \{OPT_1(n), OPT_2(n)\}$ מציג את הערך

סבוליות: מכילים כיום אחת על הסדרה 2^n $\cdot O(n)$

מחשבות: כפי שצא ו מחשבות אלה אכילת המלך בנות

ג'י' הא"ס ר = נוכח ו' : ה"ס ר'ם הא"ס ק'ו'ס ר = הא"ס ר' = נוכח

מכיוון שאלם כותבים בשמאל-הימני : לא יכלו לכתוב את השם

על פי חוקי נ"ב את

לוח'ם בל'ם בל'ם -

כח'ס : 0.82 = 1.17 = 1.17 = 1.17

בנה - לנח שחלש ארצו בן נח א

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad \text{for } |x| < 1$$
[illegible]
$$P_T(K+1) = \frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^K P_T(k)$$

הנהגות אלו יבוצעו על ידי הוועדה המייעצת, תוך שיתוף פעולה עם הרשות המפקחת.

[illegible]
$$0 \leq \varphi T_1(\nu) - \mu = \int_{\mathbb{R}^n} (\varphi(x) - b) d\nu(x), \quad \varphi T_2(\nu) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\nu(x)$$

• $\sigma_{T_L} = 5 - 2.45 \cdot 10^5 \text{ K} \cdot \text{Å}$ и $\sigma_{T_e} = 1.0 \cdot 10^5 \text{ Å} \cdot \text{K}$

ו'ס' הנחת הא"ל צוק' $\phi T_1(z)$ הוא אכן הפסג = נכון וכו'

האבות וזלמן קים סבס מקסמלי 88 וזלמן 88 ית' האב' ר

[illegible]

האחרון של הסדרה a_{k+1}

סאגל = 1

לסתכל על סדרת הנקודות.

נאמר $OPT_1(i)$, $OPT_2(i)$ כך ש $OPT_1(i)$ = סכום המקסימלי של הנקודות עם האיבר i , $OPT_2(i)$ = סכום המקסימלי של הנקודות בלי האיבר i

$$OPT_1(i) = OPT_2(i-1) + p_i$$

$$OPT_2(i) = OPT_1(i-1)$$

כך ש $OPT_1(1) = p_1$, $OPT_2(1) = 0$

כסולל מחזירים $\{OPT_1(n), OPT_2(n)\}$ אטא.

סבירות: מוכיחים שיש אחת על הסדרה p_i (ח.ס. נכונות: כפי שכל i מחשיבים את הסכום הכסול ביותר מ' האיבר הנכחו: הסכום הכסול ביותר עם האיבר = נכוח'. מכיון שאם כותבים בשאלה i האיבר i בפרטיות אז אין איש קשרים את i אינחנו לא נשתנה את $i-1$.
לפיכך האיבר i -

כסם: עבור i - $OPT_1(i) = OPT_2(i-1)$

הנחה - נניח שהאיבר i נכח עם איבר $i-1$ א

כעכ - נוכח שהאיבר i נכח עם איבר $i-1$ אטא, ומכאן שכל איבר i

נכון דם איבר i כיוון עכור לאיבר $i-1$ $OPT_1(i)$ ו $OPT_2(i)$ שיה

לסכום המקסימלי של הנקודות, לניח שכל i ש $OPT_1(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

המקסימלי שמסתים i ו $i-1$ לא כולל איבר $i-1$ $OPT_2(i)$ = סכום הנקודות

מקרה 2 (א) וְאֵת, מ, נִלְמַד קִיָּם סָבִיב שְׁמוֹתֵיכֶם בְּהִיא, וְכִי אֵת
 סָבִיב שֶׁל וְאֵת, מ, נִלְמַד בְּזֶה מִדְּבַר מְהֵרָה וְאֵת
 הַאֲבִיבִים בְּהִיא אֲבִיבִים שֶׁעַם אֲבִיבִים קָטָנִים מְהֵרָה וְאֵת אֲבִיבִים
 בְּזֶה בְּהִיא אֲבִיבִים שֶׁעַם, וְאֵת, נִלְמַד בְּזֶה בְּזֶה
 הַאֲבִיבִים, וְאֵת אֲבִיבִים שֶׁעַם בְּזֶה בְּזֶה בְּזֶה בְּזֶה
 שֶׁעַם אֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים
 שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים
 קִיבִלְנוּ שֶׁל הַאֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים
 גְּדִילֵי סִתְרֵיכֶם מְהֵרָה בְּזֶה בְּזֶה בְּזֶה בְּזֶה
 וְכִי שֶׁהַאֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים שֶׁעַם וְאֵת אֲבִיבִים
 נִלְמַד.

שאל 2

(א) נניח כשליש מהאלמנטים לא מוצאין ביום, כלומר, הכול מקבלים

חול אינו קשיר או שיש בו ממצאים נכריק את שני האובייקט.

נניח כשליש מהאלמנטים שהם חול אינו קשיר זה אומר שיש לפחות צומת


אחד של אנשים להביא להם. אם מסתכלים בחתך שהוא כל המלך בצד

1 ו 2 בצד השני, מכיון שלא נחננו קשת בחתך זה אומר שישו לא

נמצאת בסתירה לפניה שישל הא קשיר

נניח כשליש מקבלים ממצאים, נניח בלי הטלת בקלניות

ממצא שקיבלנו הוא



אם נסתכל על החתך

נניח שקודם נחננו 1, ואחר כך נחננו צוקבצם לחתך

1, נחננו 2, אבל זה לא מתקיים בסתירה פאלאטותם שאי אפשר

לבחור סתירות מאותו חתך.

(כ). ללית כמל. לה ש-ם שיקלנו הוא איננו על כורש מ'נ'אום.
כאלמר קימת קסת ש שמשל שלם הוא ותר קלן מ ששוא/
למבאות כול. נסיונול על דחק שבוא כולל את ש ואת ש
שפי האשטורטם חייבים לבחור את ש ו'ע'ן מ'א'צ'ום לסתירה
סהמק רב בצד לא יתכן שתקיים

10 4 5 8 9 12 13 25

$$I = 2.1 \times 10^3$$

Lovers & Friends 2015-2016

לדבר $OPT_2(i)$, $OPT_2(i)$ בק $OPT_1(i)$ = סכום המקסימלי
 של הנקודות x = $OPT_2(i)$, i = סכום המקסימלי של הנקודות
 בק i

$$OPT_1(i) = OPT_2(i-1) + p_i$$

$$OPT_2(i) = OPT_1(i-1).$$

$$\text{opt}_2(i) = 0, \quad \text{opt}_1(i) = p_i \quad \text{c.p.p.}$$
$$\max \{OPT_1(n), OPT_2(n)\} \text{ סימני } \delta \text{ ו } \epsilon$$

מבוליות: חובבים בוס אחת על הסדרה לבן (ח.ס.)
נבונות: כפר שלם ו מחשיבים את אבוס הפסול מיות
גלי האוור הנכחי: הספר מיות צמ הא'ר = גור
מכיון שאם כותבים בשאלה ו לא יכלים ל פתור את 40 אינ
אם פותרים את ו אלחנו לא פתרנו את 1-2.
ולוח בלינדלר -

מס' : 0607 n=1 = זגל לזוג

הנחה - לניח שהל' אר' י' ב' נכון ע' א' נ' ק' ס' א'

83 - ציור סטילס אדום לבן וצהוב

נכון φ שלוקח K כעוצר (אז φ הוא $\text{OPT}_1(i)$ ו- $\text{OPT}_2(i)$ הוא

הקטבים המקסימליים α_{k+1} של $\text{OPT}_1(k+1)$ ושל $\text{OPT}_2(k+1)$ הם $\alpha_{k+1} \neq \beta_{k+1}$.

$\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$

$\mu_1 \leq \mu_2$ - יוקם את $Z = (\mu_1 + \mu_2)/2$, אם כן $\mu_1 \leq Z \leq \mu_2$

$\gamma(j) \text{ OPT}_2$

$$OPT_4 = 5 - 2 = 3$$

180' = נחת הארץ זקוקה לזמן רב
היום סביר מוקדם מדי

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2$

עבד הא'בר

...אק+1 ...