
7.1 Tasa KL(q||p) por flujo
1.1b Mahalanobis (AUC frente al control)
R cliffs delta
7.1m Tasa (mediana, nats)
2.4 Fisher-Rao al k-ésimo posterior benigno
1.1 Mahalanobis (mediana)
1.4 Tipicidad radial bilateral
R posterior mahalanobis median
R sliced wasserstein
5.1 kNN al benigno (z blanqueado)
1.2 Log-densidad de mezcla benigna (K=8)
2.4m Fisher-Rao (mediana)
1.3 Mahalanobis relativa al prior
6.2 kNN en el espacio decodificado
R energy distance
R cov logdet
R mahalanobis median robust mcd
6.1m Log-magnificación (mediana)
5.1m kNN: fracción > p95 del control
R mahalanobis p95
6.1 Log-magnificación del decodificador
7.2 Log-volumen del posterior
R silhouette mean
8.1 LID relativa al benigno
3.2 MMD² analítico entre posteriores agregados
R neighborhood purity median
11.1 Inconsistencia Kumar-Poole
R mmd2 rbf
R bhattacharyya mean term
4.1 Rango efectivo de la familia
10.3 Sonda lineal sobre (μ, log σ²)
R mean posterior variance sum
4.2 Distancia afín-invariante entre covarianzas
R bhattacharyya total
10.1a Silhouette del grupo (z blanqueado)
R bhattacharyya cov term
10.1b Silhouette del grupo (Fisher-Rao)
R log density benign median
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
ρ de Spearman combinado (8 semillas) entre el descriptor y el AUC de detección
Primario
Secundario
Exploratorio
Ya en el repo (phase3)
relleno = p < 0,05 (Holm en secundarios)
ρ en los 6 grupos attempted (validación)