Propiedades de separación inducidas por cocientes compactos

Juan Carlos Monter Cortés

Universidad de Guadalajara

Introducción y motivación

El objetivo de este cartel es estudiar propiedades de separación en la categoría de marcos a través de sus cocientes compactos.

La topología sin puntos permite formular propiedades topológicas directamente en términos de los elementos de un marco.

Preliminares

Un **marco** es un retículo completo A que satisface

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee \{a \wedge s : s \in S\}.$$

Notación. Escribimos Frm para la categoría de marcos y $\mathrm{pt}\, A$ para el espacio de puntos de A.

Idea principal

Esta caja resaltada puede utilizarse para una construcción, un esquema o el resultado central del póster.

$$\mathrm{Top} \xrightarrow{\ \mathcal{O}\ } \mathrm{Frm}$$

Ejemplos

Aquí puedes incorporar ejemplos, contraejemplos y cálculos de núcleos.

$$u_a(x) = a \vee x.$$

Resultados principales

Proposición (espacio reservado). Sustituye este enunciado por uno de tus resultados.

Observación. Este texto rojo sirve para destacar una consecuencia o una traducción importante.

Esquema de la demostración

Puedes presentar aquí los pasos esenciales del argumento y las igualdades más relevantes.

$$A \xrightarrow{f} B, \qquad f_* : B \longrightarrow A.$$

Diagrama de implicaciones

Este bloque de fondo gris resulta útil para diagramas y comparaciones.

$$\text{Propiedad A} \implies \text{Propiedad B}$$

Conclusiones

Resume aquí las contribuciones del trabajo y las preguntas que permanecen abiertas.

Referencias

[1] P. T. Johnstone, *Stone Spaces*, Cambridge University Press, 1982.

[2] J. Picado y A. Pultr, *Frames and Locales: Topology without Points*, Springer, 2012.

[3] J. Picado y A. Pultr, *Separation in Point-Free Topology*, Springer, 2021.