

Marcos apilados y fuertemente apilados

MITAC 2026, BUAP

21 de agosto de 2026

Juan Carlos Monter Cortés
Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi

Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Contenido

La noción espacial

La noción en marcos

Punto de partida

**TOPOLOGY
PROCEEDINGS**

Volume 30, No.2, 2006

Pages 585-625

**AN ORDINAL INDEXED HIERARCHY OF
SEPARATION PROPERTIES**

R. A. SEXTON AND H. SIMMONS

ABSTRACT. We refine and stratify the standard separation properties to produce a descending hierarchy between T_3 and T_1 . The interpolated properties are related to the patch properties and the Vietoris modifications of the parent space.

R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), 585–625.

Derivadas y núcleos espacialmente inducidos

Sea S un espacio topológico y $E \subseteq S$.

Derivada

$$\partial_E: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S$$

es una **derivada** si es:

- monótono,
- desinflacionario,
- preserva uniones.

Si además

$$\partial_E^2 = \partial_E,$$

es una **derivada idempotente**.

Complemento dual

$$[E]: \mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}S$$

es:

- monótono,
- inflacionario,
- preserva intersecciones.

Si ∂_E es idempotente, entonces

$$[E]^2 = [E],$$

y $[E]$ es un **núcleo espacialmente inducido**

☺ ¡Muchas gracias! ☺