

# Notities TMI

Tom Sydney Kerckhove

Started: 21 februari 2014  
Compiled: 22 februari 2014

# Inhoudsopgave

<b>I</b>	<b>Computergestuurd ontwerp van curven en oppervlakten</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Combinaties van punten . . . . .	4
1.1.1	Affiene combinatie . . . . .	4
1.1.2	Lineaire combinatie . . . . .	4
1.1.3	Convexe combinatie . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Bézier-curven</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Splinecurven</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Modellering van oppervlakten</b>	<b>8</b>
<b>II</b>	<b>Algoritmen voor discrete meetkundige problemen</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Inleiding</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Algoritmen voor eenvoudige meetkundige problemen</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Berekenen van de convex omhullende</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Het dichtste puntenpaar en het verste puntenpaar</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Het Voronoi-diagram van een puntenverzameling</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Nabijheidsproblemen</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Berekenen van het Voronoi-diagram</b>	<b>16</b>

---

## Toepassingen van Meetkunde in de Inforamtica

# NOTITIES

---

AANVULLENDE NOTITIES EN NUTTIGE ACHTERGROND

STARTED: 21 FEBRUARI 2014  
COMPILED: 22 FEBRUARI 2014

TOM SYDNEY KERCKHOVE

## Deel I

# Computergestuurd ontwerp van curven en oppervlakten

# Hoofdstuk 1

## Inleiding

### 1.1 Combinaties van punten

Punten kunnen niet bij elkaar opgeteld worden, en niet gescaleerd worden omdat er geen oorsprong is en geen assenstelsel in een affiene ruimte. Het verschil van twee punten is wel gedefinieerd, namelijk als een vector. Bovendien is de som van een punt en een vector ook gedefinieerd.

#### 1.1.1 Affiene combinatie

Een affiene combinatie van punten is een lineaire combinatie van punten waarvan de gewichten sommeren tot 1.

Zij  $p_1, \dots, p_n$   $n$  punten en  $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$ .

*Te Bewijzen*

Er bestaan  $v_i$  zodat volgende bewering geldt.

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i = p_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i \vec{v}_i$$

*Bewijs.* We zullen dit bewijzen door de  $v_i$  te construeren.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i &= \left(1 - \sum_{i=2}^n \alpha_i\right) p_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i p_i = p_1 - \sum_{i=2}^n \alpha_i p_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i p_i \\ &= p_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i (p_i - p_1) \end{aligned}$$

We weten dat  $p_i - p_1$  een vector is. Sterker nog, het zijn de  $v_i$ . □

#### 1.1.2 Lineaire combinatie

In 1.1.1 is nu eenvoudig te zien dat een lineaire combinatie van punten niet bepaald is. Opdat de combinatie te herschrijven zou vallen als de sum van een punt en een aantal vectoren moeten de gewichten van de lineaire combinatie sommeren tot 1.

### 1.1.3 Convexe combinatie

*Te Bewijzen*

Een convexe combinatie van punten behoort tot de convexe omhullende van deze punten.

*Bewijs.* Bewijs door inductie op het aantal punten ( $n$ ).

Voor  $n = 1$  is de convexe omhullende enkel dat punt en elke convexe combinatie van een punt is dat punt.

Veronderstel dat de bewering geldt voor een bepaalde  $n = k$ . We bewijzen nu daaruit volgt dat de bewering geldt voor  $n = k + 1$ .

Zij  $x$  de convexe combinatie van de punten  $p_1, \dots, p_k, p_{k+1}$ .

$$x = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i p_i$$

Als  $\alpha_{k+1} = 1$  geldt dan is de bewering triviaal. In wat volgt gaan we ervan uit dat  $\alpha_{k+1} \neq 1$  geldt. We weten nu dat volgende bewering geldt, omdat het om een convexe combinatie gaat.

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i = S \rightarrow 0 \leq S \leq 1$$

Beschouw nu een punt  $y$  dat als volgt gedefinieerd is met  $\beta_i = \frac{\alpha_i}{S}$ .

$$y = \sum_{i=1}^k \beta_i p_i$$

We sommeren nu de  $\beta_i$  om te zien dat  $y$  ook een convexe combinatie is.

$$\sum_{i=1}^k \beta_i = \sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{S} = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^k \alpha_i = \frac{\sum_{i=1}^k \alpha_i}{\sum_{i=1}^k \alpha_i} = 1$$

Volgens de inductiehypothese ligt  $y$  in de convexe omhullende van  $p_1, \dots, p_k$ .  $y$  ligt dus zeker in de convexe omhullende van  $p_1, \dots, p_k, p_{k+1}$ . Nu geldt het volgende over  $x$  met  $1 - S = \alpha_{k+1}$ .

$$x = Sy + (1 - S)p_{k+1}$$

Dit is opnieuw een convexe combinatie, van twee punten binnen de convexe omhullende.  $x$  behoort dus tot de convexe omhullende van  $p_1, \dots, p_k, p_{k+1}$ .  $\square$

## Hoofdstuk 2

# Bézier-curven

## Hoofdstuk 3

# Splinecurven



## Hoofdstuk 4

# Modellering van oppervlakten

## Deel II

# Algoritmen voor discrete meetkundige problemen

## Hoofdstuk 5

### Inleiding

## Hoofdstuk 6

# Algoritmen voor eenvoudige meetkundige problemen

## Hoofdstuk 7

# Berekenen van de convex omhullende

## Hoofdstuk 8

# Het dichtste puntenpaar en het verste puntenpaar

## Hoofdstuk 9

# Het Voronoi-diagram van een puntenverzameling

## Hoofdstuk 10

# Nabijheidsproblemen



## Hoofdstuk 11

# Berekenen van het Voronoi-diagram