

Guia Completo de Plantas Medicinais

Babosa · Boldo · Melissa · Erva-cidreira · Hortelã · Alecrim · Camomila ·
Capim-limão · Espinheira-santa · Calêndula · Gengibre · Manjerição ·
Tanchagem · Vinagreira

O que é, para que serve, como preparar, dose, contraindicações, cultivo,
curiosidades e muito mais sobre 14 plantas medicinais, com indicações
baseadas no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (ANVISA)

Material didático para o Minicurso de RAG multimodal

Não substitui a orientação de médicos, farmacêuticos e outros profissionais de
saúde

Sumário

Parte I — Plantas medicinais: conceitos, uso seguro e preparo

Parte II — As 14 plantas

Capítulo 1 — Babosa (*Aloe vera*)

Capítulo 2 — Boldo-brasileiro (*Plectranthus barbatus*)

Capítulo 3 — Melissa ou erva-cidreira (*Melissa officinalis*)

Capítulo 4 — Erva-cidreira-brasileira ou lípia (*Lippia alba*)

Capítulo 5 — Hortelã (*Mentha* spp.)

Capítulo 6 — Alecrim (*Salvia rosmarinus*)

Capítulo 7 — Camomila (*Matricaria chamomilla*)

Capítulo 8 — Capim-limão ou capim-santo (*Cymbopogon citratus*)

Capítulo 9 — Espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia*)

Capítulo 10 — Calêndula (*Calendula officinalis*)

Capítulo 11 — Gengibre (*Zingiber officinale*)

Capítulo 12 — Manjerição (*Ocimum basilicum*)

Capítulo 13 — Tanchagem (*Plantago major*)

Capítulo 14 — Vinagreira ou hibisco (*Hibiscus sabdariffa*)

Parte III — Tabelas-resumo e chave de identificação visual

Referências

Parte I — Plantas medicinais: conceitos, uso seguro e preparo

Sobre este guia

Este guia reúne informações completas sobre as 14 plantas medicinais do projeto de identificação por imagem: babosa, boldo-brasileiro, melissa, erva-cidreira-brasileira (lípia), hortelã, alecrim, camomila, capim-limão (capim-santo), espinheira-santa, calêndula, gengibre, manjerição, tanchagem e vinagreira (hibisco).

Para cada planta são apresentados: ficha de identificação, nomes populares, origem e história, como reconhecer a planta, plantas parecidas e confusões comuns, composição química, para que serve (indicações oficiais e usos populares), como preparar e usar, dose, contraindicações, efeitos adversos, interações com medicamentos, cultivo em casa, colheita e secagem, usos na cozinha, curiosidades e perguntas frequentes.

Fonte das indicações e doses: para 12 das 14 plantas, as indicações, formas de preparo, doses, advertências e contraindicações seguem as monografias oficiais do *Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, 2ª edição*, publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O manjerição e a vinagreira não têm monografia nesse Formulário; para elas, o guia descreve os usos tradicionais e as evidências científicas disponíveis, indicando claramente que não há recomendação oficial da ANVISA.

Aviso importante: este guia é um material educativo, preparado para estudo e para testes de sistemas de inteligência artificial. Ele não substitui a consulta a médicos, farmacêuticos ou outros profissionais de saúde. Plantas medicinais podem causar efeitos adversos, interagir com medicamentos e ser contraindicadas para gestantes, lactantes, crianças e pessoas com certas doenças. Antes de usar qualquer planta com finalidade terapêutica, procure orientação profissional. Em caso de sintomas persistentes ou graves, procure atendimento médico.

O que são plantas medicinais e fitoterápicos

Planta medicinal: espécie vegetal, cultivada ou não, usada com finalidade terapêutica, ou seja, para prevenir, aliviar ou tratar sintomas e doenças.

Droga vegetal: planta medicinal, ou suas partes, que contém as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, depois de colhida, estabilizada e seca. Pode estar inteira, rasurada (cortada em pedaços), triturada ou em pó. É o que se usa para preparar chás.

Fitoterapia: tratamento baseado no uso de plantas medicinais e de seus derivados, sem o uso de substâncias ativas isoladas.

Fitoterápico: produto obtido exclusivamente de matérias-primas ativas vegetais. No Brasil, a ANVISA classifica os fitoterápicos industrializados em medicamentos fitoterápicos, cuja segurança e eficácia são comprovadas por estudos clínicos, e produtos tradicionais fitoterápicos, cuja segurança e efetividade se baseiam no uso tradicional documentado.

Preparação extemporânea: preparação feita na hora do uso, como os chás (infusos e decoctos), que deve ser consumida logo após o preparo.

Princípio ativo ou marcador: substância ou grupo de substâncias da planta responsáveis, total ou parcialmente, pelo efeito terapêutico, como o mentol da hortelã-pimenta e o citral do capim-limão.

Plantas medicinais no Sistema Único de Saúde (SUS)

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC): aprovada em 2006, incluiu as plantas medicinais e a fitoterapia entre as práticas oferecidas pelo SUS.

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF): também de 2006, tem o objetivo de garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promover o uso sustentável da biodiversidade brasileira e desenvolver a cadeia produtiva e a indústria nacional.

RENISUS: a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, publicada pelo Ministério da Saúde em 2009, lista 71 espécies com potencial para gerar produtos de interesse ao SUS e orienta as pesquisas nessa área. Várias plantas deste guia fazem parte da lista.

Farmácias Vivas: modelo criado no Ceará pelo professor Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, que integra o cultivo de plantas medicinais com identificação botânica garantida, a preparação de fitoterápicos e a orientação da população. Foi incorporado ao SUS em 2010.

Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira: documento oficial da ANVISA com monografias de plantas medicinais que trazem as fórmulas, o modo de preparo, as indicações, as advertências e o modo de usar de cada preparação. A 2ª edição reúne 85 monografias.

Formas de preparo

Infusão (chá abafado): preparação que consiste em verter água fervente sobre a droga vegetal e, em seguida, tampar ou abafar o recipiente por um tempo determinado, geralmente de 5 a 10 minutos. É indicada para partes delicadas, como folhas, flores e inflorescências, e para plantas com substâncias voláteis (óleos essenciais), como camomila, melissa, hortelã, capim-limão e alecrim.

Decocção (cozimento): preparação que consiste em ferver a droga vegetal em água potável por um tempo determinado. É indicada para partes duras, como cascas, raízes, rizomas, caules, sementes e folhas coriáceas, como o rizoma do gengibre e as folhas de espinaheira-santa.

Maceração: processo em que a planta fresca ou seca, cortada ou triturada, fica em contato com um líquido (água, álcool ou óleo) por um tempo determinado, sem aquecimento, em recipiente protegido da luz.

Tintura: preparação alcoólica obtida da droga vegetal seca, geralmente na proporção de 1 parte de planta para 5 ou 10 partes de líquido. Por conter álcool, é contraindicada para gestantes, lactantes, crianças, alcoolistas e diabéticos.

Alcoolatura: preparação alcoólica obtida por maceração a frio da planta fresca em álcool etílico, geralmente na proporção de 20 a 30 g de planta fresca para 100 mL de álcool a 80%.

Compressa: aplicação de um pano limpo ou gaze embebidos em um chá (morno, frio ou levemente aquecido) sobre a pele, como no uso da calêndula e da camomila em pequenas lesões e inflamações de pele.

Bochecho e gargarejo: uso do chá para lavar a boca (bochecho) ou a garganta (gargarejo), sem engolir, como no uso da tanchagem, da calêndula e da camomila para inflamações da boca e da garganta.

Inalação (vaporização): inspiração do vapor de um chá quente, como a inalação de camomila no alívio de sintomas do resfriado comum. Cuidado com queimaduras; não é recomendada para crianças pequenas.

Gel e creme: formas de uso na pele, como o gel de babosa e o creme de calêndula.

Como preparar um chá corretamente

Quantidade: as doses oficiais são dadas em gramas (g) de planta para cerca de 150 mL de água, o volume aproximado de uma xícara de chá. Medidas caseiras, como colheres, variam muito de planta para planta; para maior segurança, use uma balança de cozinha e respeite a dose indicada para cada planta.

Planta seca ou fresca: as monografias oficiais, em geral, se referem à planta seca. A planta fresca contém muita água e, por isso, é usada em maior quantidade; as doses deste guia se referem à planta seca, salvo indicação contrária.

Recipiente: use recipientes de vidro, louça, porcelana ou aço inoxidável. Evite recipientes de alumínio e de plástico.

Passo a passo da infusão: (1) ferva a água; (2) desligue o fogo; (3) coloque a planta em uma xícara ou bule e despeje a água quente; (4) tampe e deixe abafado pelo tempo indicado (geralmente 5 a 10 minutos); (5) coe e tome em seguida.

Passo a passo da decocção: (1) coloque a planta na água fria; (2) leve ao fogo e deixe ferver pelo tempo indicado; (3) desligue, tampe e deixe descansar alguns minutos; (4) coe e tome em seguida.

Consumo: o chá deve ser preparado na hora e consumido logo após o preparo. Não guarde chá de um dia para o outro. Em geral, não se deve adoçar chás medicinais, pois o açúcar pode interferir no efeito e mascarar o sabor da planta.

Tempo de uso: o uso deve ser por tempo limitado. Se os sintomas persistirem pelo prazo indicado na monografia (em geral uma a duas semanas), um médico deve ser consultado.

Uso seguro: natural não significa inofensivo

Mito do natural: muitas pessoas acreditam que, por ser natural, uma planta não faz mal. Isso é falso. Plantas contêm substâncias químicas ativas que podem causar intoxicações, alergias, lesões no fígado e nos rins, abortos e interações perigosas com medicamentos.

Identificação correta: o primeiro passo para o uso seguro é ter certeza de qual planta está sendo usada. Nomes populares enganam: o nome erva-cidreira é usado para pelo menos três plantas diferentes (melissa, lípia e capim-limão), e o nome boldo é usado tanto para o boldo-brasileiro (*Plectranthus barbatus*) quanto para o boldo-do-chile (*Peumus boldus*). Na dúvida, use o nome científico.

Adulteração: plantas vendidas secas, em feiras ou pela internet, podem ser trocadas por outras espécies parecidas. Um caso conhecido é a espinheira-santa, frequentemente substituída pela falsa-espinheira-santa (*Sorocea bonplandii*). Prefira produtos com procedência e identificação garantidas.

Grupos que exigem mais cuidado: gestantes, lactantes, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas (do coração, fígado ou rins), pessoas que vão passar por cirurgia e pessoas que usam medicamentos contínuos, especialmente anticoagulantes, anti-hipertensivos, antidiabéticos, sedativos e antidepressivos. A maioria das monografias oficiais contraindica o uso na gestação e na lactação por falta de dados de segurança.

Interações com medicamentos: plantas podem aumentar ou diminuir o efeito de medicamentos. Sempre informe ao médico e ao farmacêutico quais plantas e chás você usa.

Dose e duração: não use doses maiores que as recomendadas nem por mais tempo que o indicado. Mais chá não significa mais efeito; significa mais risco.

Local de colheita: não colha plantas à beira de estradas, em terrenos contaminados, próximas a esgoto ou em locais onde foram aplicados agrotóxicos.

Reações adversas: se surgir qualquer efeito indesejado (alergia, coceira, náuseas, tontura, palpitações, diarreia), suspenda o uso e procure um serviço de saúde.

Quando procurar um médico

Sinais de alerta: procure atendimento médico em caso de febre alta ou persistente, dor intensa, sangramento, falta de ar, dor no peito, vômitos persistentes, fezes escuras ou com sangue, pele ou olhos amarelados, perda de peso sem explicação, sintomas que duram mais de uma a duas semanas ou que pioram apesar do uso da planta.

Plantas não substituem tratamento: plantas medicinais podem ajudar a aliviar sintomas leves, mas não substituem medicamentos prescritos. Nunca interrompa um tratamento médico para usar plantas sem orientação profissional.

Colheita, secagem e armazenamento

Quando colher: as folhas e partes aéreas geralmente são colhidas pela manhã, depois que o orvalho secou e antes do sol forte, e de preferência no início da floração, quando o teor de substâncias ativas costuma ser maior. As flores são colhidas quando estão bem abertas. Raízes e rizomas são colhidos quando a planta está madura.

Como secar: espalhe a planta em camada fina sobre papel ou tela, em local sombreado, seco e bem ventilado, protegida do sol direto, da poeira e de animais. Quando não há recomendação específica, o Formulário da ANVISA indica secagem da planta fresca em estufa de ar circulante a 45 °C por três dias. A planta está seca quando as folhas ficam quebradiças.

Como armazenar: guarde a planta seca em potes de vidro escuro ou em embalagens bem fechadas, em local fresco, seco e protegido da luz, com etiqueta indicando o nome da planta e a data. Descarte plantas com mofo, cheiro alterado ou presença de insetos. Plantas aromáticas perdem óleo essencial com o tempo; o ideal é usá-las em até um ano.

Glossário de termos

Ansiolítico: que alivia a ansiedade. **Antiespasmódico:** que alivia espasmos e cólicas da musculatura lisa (intestino, útero). **Antidispéptico:** que alivia a dispepsia. **Antisséptico:** que combate microrganismos na superfície da pele ou mucosas. **Carminativo (antiflatulento):** que reduz gases intestinais. **Cicatrizante:** que ajuda na cicatrização de feridas.

Cinetose: enjoo causado por movimento, em viagens de carro, barco ou avião. **Dismenorreia:** cólica menstrual. **Dispepsia:** má digestão, com sintomas como sensação de estômago cheio, azia, queimação, náuseas e arrotos. **Flatulência:** excesso de gases intestinais. **Orofaringe:** região da garganta atrás da boca.

Sedativo leve: que acalma e pode facilitar o sono. **Óleo essencial:** mistura de substâncias voláteis e aromáticas responsáveis pelo cheiro da planta. **Quimiotipo:** variedade de uma mesma espécie que produz óleo essencial com composição química diferente. **Rizoma:** caule subterrâneo, geralmente horizontal, como o do gengibre. **Hipersensibilidade:** alergia.

Parte II — As 14 plantas

Tudo sobre cada planta: identificação, usos, preparo, cuidados, cultivo e curiosidades

Capítulo 1 — Babosa (*Aloe vera*)

Babosa: ficha de identificação

Nome popular: babosa. Outros nomes: aloé, aloe-vera, erva-babosa, caraguatá.

Nome científico: *Aloe vera* (L.) Burm.f. Sinônimo: *Aloe barbadensis* Mill.

Família: Asphodelaceae (antigamente incluída em Liliaceae ou Aloaceae).

Parte usada: o gel incolor do interior das folhas (uso externo).

Para que serve (ANVISA): como cicatrizante nos casos de ferimentos leves e desordens inflamatórias da pele, incluindo queimaduras de 1º e 2º grau, escoriações e abrasões.

Forma de uso: uso externo, na pele. **Monografia oficial:** sim, no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira.

Babosa: origem e história

Origem da babosa: provavelmente nativa da Península Arábica. Hoje é cultivada em regiões tropicais e subtropicais do mundo todo e se adaptou muito bem ao clima brasileiro.

História da babosa: é usada há milhares de anos. Há registros do uso de plantas do gênero *Aloe* em textos da Mesopotâmia e do Egito antigo, e o médico grego Dioscórides a descreveu no século I como remédio para feridas. Hoje é uma das plantas mais usadas na indústria de cosméticos.

Babosa: como reconhecer

Hábito da babosa: erva perene, suculenta, sem caule aparente (acaule) ou com caule muito curto, formando uma roseta de folhas que pode chegar a 60 a 100 cm de altura. Produz muitos brotos laterais (filhotes) na base.

Folhas da babosa: grossas, carnosas e cheias de gel, lanceoladas (em forma de lança), com 30 a 60 cm de comprimento, verde-acinzentadas, com margens cheias de pequenos dentes espinhosos. Folhas jovens podem ter manchas esbranquiçadas.

Flores da babosa: tubulares, amarelas, penduradas ao longo de uma haste floral que sai do centro da roseta e pode passar de 1 metro de altura.

Interior da folha da babosa: ao cortar a folha, vê-se a casca verde, uma camada fina que libera um líquido amarelado e amargo (o exsudato ou látex, rico em aloína) e, no centro, o gel transparente e viscoso, que é a parte usada na pele.

Babosa: plantas parecidas e confusões

Outras espécies de Aloe: existem centenas de espécies do gênero *Aloe*, como a *Aloe arborescens*, também chamada de babosa. Elas têm composição diferente.

Agave e sisal: as agaves (como o sisal) também formam rosetas de folhas grossas e espinhosas, mas suas folhas são duras e fibrosas, sem gel, e têm um espinho forte na ponta. Algumas agaves têm seiva irritante para a pele.

Babosa: composição química

Gel da babosa: formado por cerca de 99% de água, polissacarídeos (como a acemanana, responsáveis pela textura viscosa e pelo efeito hidratante), além de vitaminas, enzimas, aminoácidos e minerais.

Exsudato (látex) da babosa: líquido amarelo e amargo que fica logo abaixo da casca, rico em derivados antracênicos (antraquinonas, como a aloína), substâncias laxantes e irritantes.

Babosa: para que serve

Indicação oficial da babosa (ANVISA): como cicatrizante nos casos de ferimentos leves, desordens inflamatórias na pele, incluindo queimaduras de 1º e 2º grau, escoriações e abrasões.

Usos populares da babosa: alívio de queimaduras de sol, hidratação da pele e dos cabelos e cuidados com picadas de insetos. O uso do gel na pele é o único com recomendação oficial.

Babosa pode ser ingerida? A babosa não tem indicação oficial de uso interno. O látex amarelo é um laxante forte e irritante, e o consumo pode causar cólicas, diarreia e perda de potássio. A ANVISA não reconhece a segurança do consumo de babosa e não autoriza seu uso em alimentos. Em 2016, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classificou o extrato da folha inteira de *Aloe vera* como possivelmente cancerígeno para humanos (grupo 2B), com base em estudos em animais.

Babosa: como preparar e usar

Gel de babosa (ANVISA): fórmula com 10 a 70 g de gel mucilaginoso incolor de babosa incorporado a gel base suficiente para 100 g.

Como obter o gel da babosa: lavar as folhas frescas com água e solução de hipoclorito de sódio a 1,5%, remover as camadas exteriores da folha e usar apenas o gel translúcido e incolor do interior. Deve-se tomar cuidado para não rasgar a casca verde, que pode contaminar o gel com o exsudato amarelado, rico em derivados antracênicos. O gel fresco pode ser usado puro ou incorporado ao gel base.

Modo de usar a babosa (ANVISA): uso externo. Aplicar o gel nas áreas afetadas, de uma a três vezes ao dia.

Dica prática: antes de cortar, deixe a folha em pé por alguns minutos para escorrer o látex amarelo. Use o gel somente sobre pele íntegra ou ferimentos leves e superficiais.

Babosa: contraindicações e cuidados

Uso da babosa (ANVISA): uso adulto. Contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação e a plantas da mesma família, durante a gestação, a lactação e para menores de 18 anos, devido à falta de dados adequados que comprovem a segurança nessas situações.

Efeitos adversos da babosa: houve relatos de dermatite de contato e de sensação de dor tipo queimação na pele lesionada, causados pela contaminação do gel com derivados antracênicos. Também foram relatados dermatite de contato disseminada e urticária bolhosa. Os compostos antraquinônicos podem ser tóxicos quando ingeridos em altas doses.

Cuidados com a babosa: não utilizar em doses acima das recomendadas; em caso de efeitos adversos, suspender o uso e consultar um médico. Ferimentos profundos, queimaduras extensas ou infeccionadas precisam de atendimento médico.

Babosa: cultivo em casa

Clima e luz: a babosa gosta de sol pleno ou meia-sombra clara e de calor; não tolera geada.

Solo e rega: solo arenoso e bem drenado. Regue pouco, apenas quando a terra estiver seca, pois o excesso de água apodrece as raízes.

Propagação da babosa: pelos brotos laterais (filhotes) que nascem ao redor da planta-mãe, que podem ser separados e plantados em outro vaso.

Colheita: retire as folhas maduras de baixo, cortando rente ao caule, a partir de plantas com pelo menos dois anos.

Babosa: curiosidades e perguntas frequentes

Curiosidade: o nome *vera* significa "verdadeira" em latim. A babosa faz um tipo de fotossíntese (metabolismo CAM) em que os poros das folhas se abrem à noite, o que reduz a perda de água e explica sua resistência à seca.

Babosa serve para queimadura? Segundo a ANVISA, o gel de babosa é indicado como cicatrizante em queimaduras de 1º e 2º grau, escoriações e ferimentos leves. Queimaduras extensas, profundas ou em rosto, mãos e genitais exigem atendimento médico.

Babosa faz crescer cabelo? Esse é um uso popular e cosmético, sem comprovação científica de que faça o cabelo crescer.

Capítulo 2 — Boldo-brasileiro (*Plectranthus barbatus*)

Boldo-brasileiro: ficha de identificação

Nome popular: boldo-brasileiro. Outros nomes: boldo, boldo-nacional, boldo-africano, falso-boldo, boldo-de-jardim.

Nome científico: *Plectranthus barbatus* Andrews. Sinônimo: *Coleus barbatus* (Andrews) Benth.

Família: Lamiaceae (a mesma da hortelã, do alecrim, do manjerição e da melissa).

Parte usada: folhas.

Para que serve (ANVISA): auxiliar no alívio dos sintomas dispépticos (má digestão).

Forma de uso: chá por infusão (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Boldo-brasileiro: origem e história

Origem do boldo-brasileiro: nativo da África tropical e da Índia. Foi trazido ao Brasil provavelmente no período colonial e se tornou uma das plantas medicinais mais cultivadas nos quintais brasileiros.

Boldo-brasileiro e boldo-do-chile: apesar do nome, o boldo-brasileiro não é parente do verdadeiro boldo, o boldo-do-chile (*Peumus boldus*, família Monimiaceae), uma árvore nativa do Chile cujas folhas secas são vendidas em saquinhos de chá. Os dois recebem o nome boldo por terem sabor amargo e uso popular semelhante, para problemas digestivos.

Boldo-brasileiro: como reconhecer

Hábito do boldo-brasileiro: subarbusto aromático, perene, de 1 a 1,5 m de altura, bem ramificado.

Caule do boldo-brasileiro: quadrangular (com quatro lados), típico da família Lamiaceae, verde, carnoso e coberto de pelos.

Folhas do boldo-brasileiro: opostas (duas por nó), simples, grossas, carnosas, ovadas, com margem denteada e superfície aveludada, coberta de pelos macios. Quando amassadas, liberam cheiro forte, e o sabor é muito amargo.

Flores do boldo-brasileiro: azul-arroxeadas, reunidas em inflorescências alongadas no alto dos ramos.

Boldo-brasileiro: plantas parecidas e confusões

Boldo-miúdo: o *Plectranthus ornatus*, também chamado de boldo-miúdo ou boldo-rasteiro, é uma planta menor, de folhas pequenas e rasteira, usada popularmente para os mesmos fins, mas sem monografia oficial.

Boldo-do-chile: as folhas do boldo-do-chile são duras, ásperas e vendidas secas; a planta é uma árvore e não é cultivada nos quintais brasileiros.

Hortelã-graúda: o *Plectranthus amboinicus* (hortelã-graúda, malvarisco) também tem folhas grossas e aveludadas, mas elas são mais arredondadas, com cheiro forte de orégano, e não amargas.

Boldo-brasileiro: composição química

Substâncias do boldo-brasileiro: diterpenos, como a barbatulina, óleo essencial e compostos fenólicos. As raízes da espécie contêm forskolina, substância estudada pela ação sobre o metabolismo celular.

Boldo-brasileiro: para que serve

Indicação oficial do boldo-brasileiro (ANVISA): auxiliar no alívio dos sintomas dispépticos, ou seja, de má digestão, como sensação de estômago cheio, desconforto após refeições pesadas e náuseas leves.

Usos populares do boldo-brasileiro: é muito usado para "mal-estar do fígado", ressaca e após refeições gordurosas. O único uso com recomendação oficial é o alívio da dispepsia.

Boldo-brasileiro: como preparar e usar

Chá de boldo-brasileiro (ANVISA, fórmula 1): 1 a 3 g de folhas secas para 150 mL de água. Preparar por infusão durante 20 minutos.

Modo de usar o chá de boldo-brasileiro: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, de duas a três vezes ao dia.

Alcoolatura de boldo-brasileiro (fórmula 2): 20 g de folhas frescas em álcool etílico a 80% suficiente para 100 mL, em maceração por 20 dias; tomar 3 a 10 mL diluídos em 50 mL de água, três vezes ao dia.

Tintura (fórmula 3): 20 g de folhas em álcool a 70% suficiente para 100 mL; tomar 2,5 mL diluídos em 75 mL de água, três vezes ao dia.

Duração do uso do boldo-brasileiro: o uso contínuo não deve ultrapassar 30 dias; o tratamento pode ser repetido, se necessário, após intervalo de 7 dias.

Boldo-brasileiro: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar boldo-brasileiro (ANVISA): uso adulto. Não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, menores de 18 anos, hipertensos, portadores de obstrução das vias biliares, portadores de doença renal policística ou de hepatite. Contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação. As preparações com álcool são especialmente contraindicadas para gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos.

Interações do boldo-brasileiro: não utilizar junto com metronidazol ou dissulfiram, medicamentos depressores do sistema nervoso central, anti-hipertensivos, digoxina, antiarrítmicos e moduladores da tireoide. Estudos em animais indicam possível interação com barbitúricos. Por sua ação antiácida, pode reduzir a absorção de medicamentos que dependem do pH do estômago.

Efeitos adversos do boldo-brasileiro: doses acima das recomendadas, ou uso por tempo maior que o recomendado, podem causar irritação gástrica e desconforto gastrointestinal. Há relatos de dermatite de contato.

Boldo-brasileiro: cultivo em casa

Cultivo do boldo-brasileiro: muito fácil. Prefere sol pleno ou meia-sombra, solo fértil e bem drenado e regas regulares. Não tolera geada.

Propagação do boldo-brasileiro: por estacas de ramos, que enraízam facilmente em água ou diretamente na terra.

Boldo-brasileiro: curiosidades e perguntas frequentes

Por que o boldo é tão amargo? O sabor amargo vem de substâncias como os diterpenos. Na tradição popular, o sabor amargo é associado a plantas "boas para a digestão".

Chá de boldo cura ressaca? Não há indicação oficial para ressaca. A ANVISA indica o boldo-brasileiro apenas como auxiliar no alívio de sintomas de má digestão. Ressaca é consequência do consumo de álcool, e o boldo não acelera a eliminação do álcool pelo corpo.

Grávida pode tomar chá de boldo? Não. O boldo-brasileiro é contraindicado na gestação e na lactação.

Capítulo 3 — Melissa ou erva-cidreira (*Melissa officinalis*)

Melissa: ficha de identificação

Nome popular: melissa. Outros nomes: erva-cidreira, erva-cidreira-verdadeira, cidreira, citronela-menor.

Nome científico: *Melissa officinalis* L.

Família: Lamiaceae.

Parte usada: folhas.

Para que serve (ANVISA): auxiliar no alívio da ansiedade e da insônia leves; auxiliar no tratamento sintomático de queixas gastrointestinais leves, como distensão abdominal e flatulência.

Forma de uso: chá por infusão, tintura, extrato fluido ou cápsula (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Melissa: origem e história

Origem da melissa: nativa da região do Mediterrâneo e da Ásia ocidental. É cultivada no Brasil principalmente nas regiões Sul e Sudeste, onde o clima é mais ameno.

História da melissa: o nome vem do grego *mélissa*, que significa abelha, porque suas flores atraem muitas abelhas. É usada como calmante na Europa desde a Idade Média e foi ingrediente da água-de-melissa, preparada por monges carmelitas no século XVII.

Melissa: como reconhecer

Hábito da melissa: erva perene, de 30 a 80 cm de altura, formando touceiras.

Caule da melissa: quadrangular, ramificado, levemente piloso.

Folhas da melissa: opostas, simples, ovadas a cordiformes (em forma de coração), com margem crenada (dentes arredondados), superfície rugosa, verde-clara e macia. Ao serem amassadas, liberam um cheiro agradável de limão.

Flores da melissa: pequenas, brancas, amareladas ou levemente rosadas, reunidas nas axilas das folhas da parte superior dos ramos.

Melissa: plantas parecidas e confusões

As três ervas-cidreiras: no Brasil, o nome erva-cidreira é usado para três plantas diferentes, todas com cheiro de limão: a melissa (*Melissa officinalis*), uma erva baixa de folhas largas e macias; a erva-cidreira-brasileira ou lípia (*Lippia alba*), um arbusto de ramos longos e finos; e o capim-limão (*Cymbopogon citratus*), um capim de folhas longas e estreitas. As três têm monografias diferentes, com doses e cuidados diferentes.

Melissa e hortelã: as folhas da melissa lembram as da hortelã, mas o cheiro é de limão, e não de menta.

Melissa: composição química

Substâncias da melissa: óleo essencial rico em citral (geranial e neral) e citronelal, responsáveis pelo cheiro de limão; ácido rosmarínico e outros compostos fenólicos; flavonoides e triterpenos.

Melissa: para que serve

Indicações oficiais da melissa (ANVISA): como auxiliar no alívio da ansiedade e insônia leves; como auxiliar no tratamento sintomático de queixas gastrointestinais leves, tais como distensão abdominal e flatulência.

Usos populares da melissa: calmante, para nervosismo, dificuldade para dormir, cólicas e má digestão. Na medicina popular também é usada em herpes labial, na forma de creme, uso sem monografia no

Formulário brasileiro.

Melissa: como preparar e usar

Chá de melissa (ANVISA, fórmula 1): 1,5 a 4,5 g de folhas secas e rasuradas para 150 mL de água. Preparar por infusão durante 5 a 10 minutos.

Modo de usar o chá de melissa: tomar 150 mL do infuso até três vezes ao dia.

Outras formas de melissa: tintura (20 g de folha em álcool a 45 a 53% suficiente para 100 mL): tomar 2 a 6 mL diluídos em 50 mL de água, de uma a três vezes ao dia. Extrato fluido: tomar 2 a 4 mL diluídos em 50 mL de água, até três vezes ao dia. Cápsula com extrato seco: uma cápsula até três vezes ao dia.

Melissa: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar melissa (ANVISA): o chá e as cápsulas são para uso adulto e pediátrico acima de 12 anos; a tintura e o extrato fluido, só para adultos. Contraindicado durante a gestação, a lactação e para menores de 12 anos. Não deve ser usado nos casos de hipotireoidismo e deve ser usado com cuidado por pessoas com pressão baixa. É contraindicado em pessoas com glaucoma e hiperplasia benigna de próstata.

Cuidados com a melissa: pode comprometer a capacidade de dirigir e operar máquinas. Pode aumentar o efeito de medicamentos hipnóticos (como pentobarbital e hexobarbital). Se os sintomas persistirem por mais de duas semanas ou houver piora, um médico deve ser consultado.

Melissa: cultivo em casa

Cultivo da melissa: prefere clima ameno, meia-sombra, solo fértil e úmido, sem encharcar. Em regiões muito quentes, sofre com o sol forte da tarde.

Propagação da melissa: por sementes, divisão de touceiras ou estacas. Cortes frequentes estimulam a brotação de novas folhas.

Melissa: curiosidades e perguntas frequentes

Curiosidade: a melissa é uma planta melífera, muito procurada pelas abelhas, e apicultores antigos esfregavam suas folhas nas colmeias para atrair enxames.

Chá de melissa dá sono? A melissa é indicada pela ANVISA como auxiliar no alívio da insônia leve e da ansiedade leve. Por isso, quem toma não deve dirigir nem operar máquinas.

Criança pode tomar chá de melissa? Segundo a ANVISA, o chá de melissa é contraindicado para menores de 12 anos.

Capítulo 4 — Erva-cidreira-brasileira ou lípia (*Lippia alba*)

Erva-cidreira-brasileira: ficha de identificação

Nome popular: erva-cidreira-brasileira. Outros nomes: erva-cidreira, erva-cidreira-de-arbusto, lípia, falsa-melissa, cidreira-de-arbusto.

Nome científico: *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson.

Família: Verbenaceae.

Parte usada: folhas e flores.

Para que serve (ANVISA): auxiliar no alívio da ansiedade leve; como antiespasmódico; e como antidiarréico.

Forma de uso: chá por infusão (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Erva-cidreira-brasileira: origem e história

Origem da erva-cidreira-brasileira: nativa das Américas, com ampla ocorrência no Brasil, do Norte ao Sul. É uma das plantas mais presentes nos quintais e nas Farmácias Vivas do Nordeste.

Estudos brasileiros: o professor Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, estudou a espécie e descreveu diferentes quimiotipos, o que ajudou a explicar por que plantas chamadas de erva-cidreira podem ter cheiros e efeitos diferentes.

Erva-cidreira-brasileira: como reconhecer

Hábito da erva-cidreira-brasileira: arbusto aromático de 1 a 2 m de altura, com muitos ramos longos, finos, esbranquiçados e arqueados, que muitas vezes se curvam até o chão e enraízam ao tocar a terra.

Folhas da erva-cidreira-brasileira: opostas (às vezes três por nó), simples, ovadas a elípticas, com margem serrada, superfície áspera e com pelos. O cheiro, ao amassar, lembra limão, mas pode variar conforme o quimiotipo.

Flores da erva-cidreira-brasileira: pequenas, lilás ou rosadas, com centro amarelo, reunidas em pequenas inflorescências arredondadas nas axilas das folhas.

Erva-cidreira-brasileira: plantas parecidas e confusões

Erva-cidreira-brasileira x melissa: a melissa é uma erva baixa, de folhas mais largas, macias e rugosas; a lípia é um arbusto com ramos longos e folhas ásperas.

Alecrim-pimenta: a *Lippia sidoides* (alecrim-pimenta), do mesmo gênero, tem cheiro forte e picante, rico em timol, e é usada como antisséptico, com indicações diferentes.

Erva-cidreira-brasileira: composição química

Quimiotipos da erva-cidreira-brasileira: a composição do óleo essencial varia muito. Há quimiotipos ricos em citral (cheiro de limão), em carvona (cheiro parecido com o de hortelã) e em linalol (cheiro floral). Por isso, duas plantas de lípia podem ter cheiros bem diferentes. Também contém flavonoides e compostos fenólicos.

Erva-cidreira-brasileira: para que serve

Indicações oficiais da erva-cidreira-brasileira (ANVISA): como auxiliar no alívio da ansiedade leve; como antiespasmódico, para cólicas; e como antidiarréico, para má digestão.

Usos populares da erva-cidreira-brasileira: calmante, para cólicas, gases, má digestão e dor de cabeça.

Erva-cidreira-brasileira: como preparar e usar

Chá de erva-cidreira-brasileira (ANVISA): 0,4 a 0,6 g de folhas e flores para 150 mL de água. Preparar por infusão durante 5 minutos.

Modo de usar o chá de erva-cidreira-brasileira: tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, de duas a três vezes ao dia.

Atenção à dose: a dose oficial da lípia é bem menor que a da melissa (0,4 a 0,6 g, contra 1,5 a 4,5 g). Por isso, é importante saber qual das ervas-cidreiras está sendo usada.

Erva-cidreira-brasileira: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar erva-cidreira-brasileira (ANVISA): uso adulto. Contraindicado durante a gestação, a lactação e para menores de 18 anos, e para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação. Deve ser usado com cautela por pessoas com pressão baixa e evitado por pessoas com gastrite e úlcera gastroduodenal.

Interações da erva-cidreira-brasileira: pode potencializar o efeito de medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso central. O uso junto com paracetamol pode aumentar a toxicidade desse medicamento, porque ambos usam a mesma via de metabolização no fígado (citocromo P450).

Efeitos adversos da erva-cidreira-brasileira: doses acima das recomendadas podem causar irritação gástrica, bradicardia (coração lento) e queda da pressão arterial. O uso habitual, especialmente dos quimiotipos ricos em citral, pode estar relacionado a prostatite benigna e à redução do desempenho sexual masculino, devido à atividade hormonal do citral.

Erva-cidreira-brasileira: cultivo em casa

Cultivo da erva-cidreira-brasileira: muito rústica e fácil de cultivar. Prefere sol pleno, tolera diferentes tipos de solo e cresce rápido.

Propagação da erva-cidreira-brasileira: por estacas dos ramos, que enraízam com facilidade. Podas regulares mantêm a planta compacta.

Erva-cidreira-brasileira: perguntas frequentes

A erva-cidreira do meu quintal é qual? Se for um arbusto de ramos longos e finos, provavelmente é a lípia (*Lippia alba*). Se for uma erva baixa e de folhas macias, provavelmente é a melissa. Se for um capim, é o capim-limão.

Posso tomar chá de erva-cidreira todos os dias? Use apenas nas doses indicadas e por tempo limitado. O uso habitual da lípia rica em citral está associado a efeitos na próstata e no desempenho sexual masculino.

Capítulo 5 — Hortelã (*Mentha* spp.)

Hortelã: ficha de identificação

Nome popular: hortelã. Principais tipos: hortelã-comum ou hortelã-da-horta (*Mentha spicata*), hortelã-pimenta (*Mentha × piperita*) e hortelã-rasteira ou hortelã-de-folha-miúda (*Mentha × villosa*). Outros nomes: menta, hortelã-verde.

Nome científico: gênero *Mentha* L. A monografia oficial da ANVISA é da hortelã-pimenta, *Mentha × piperita* L. (folha).

Família: Lamiaceae.

Parte usada: folhas.

Para que serve (ANVISA, hortelã-pimenta): auxiliar no alívio de sintomas dispépticos, como flatulência (gases).

Forma de uso: chá por infusão ou tintura (uso oral). **Monografia oficial:** sim, para a hortelã-pimenta.

Hortelã: origem e história

Origem da hortelã: as espécies de *Mentha* são nativas da Europa, da Ásia e da África. A hortelã-pimenta é um híbrido natural entre a hortelã-d'água (*Mentha aquatica*) e a hortelã-comum (*Mentha spicata*), e por isso quase não produz sementes férteis.

História da hortelã: o nome do gênero vem da ninfa Minthe, da mitologia grega, que teria sido transformada em planta. A hortelã é usada desde a Antiguidade como aromatizante e para problemas digestivos.

Hortelã: como reconhecer

Hábito da hortelã: erva perene, de 30 a 80 cm, que se espalha rapidamente por caules subterrâneos e rasteiros (estolões), formando grandes touceiras.

Caule da hortelã: quadrangular, verde ou arroxeado.

Folhas da hortelã: opostas, simples, lanceoladas a ovadas, com margem serrada, aromáticas. A hortelã-comum tem folhas verde-claras e cheiro fresco adocicado (carvona); a hortelã-pimenta tem folhas verde-escuras, às vezes com nervuras arroxeadas, e cheiro forte e refrescante (mentol).

Flores da hortelã: pequenas, lilás, rosadas ou brancas, reunidas em espigas na ponta dos ramos.

Hortelã: plantas parecidas e confusões

Hortelã x poejo: o poejo (*Mentha pulegium*) é uma hortelã rasteira de folhas pequenas, rica em pulegona, substância tóxica para o fígado; seu óleo essencial pode causar intoxicações graves e é abortivo.

Hortelã x melissa: a melissa tem folhas parecidas, mas o cheiro é de limão.

Hortelã x hortelã-graúda: a hortelã-graúda (*Plectranthus amboinicus*) tem folhas grossas, carnosas e aveludadas, com cheiro de orégano, e não pertence ao gênero *Mentha*.

Hortelã: composição química

Substâncias da hortelã: óleo essencial, cuja composição depende da espécie. Na hortelã-pimenta predominam o mentol e a mentona; na hortelã-comum predomina a carvona. Também contém flavonoides e ácido rosmarínico.

Por que a hortelã "gela" a boca? O mentol ativa um receptor das células nervosas (TRPM8) que normalmente detecta o frio. Por isso, causa sensação de frescor sem baixar a temperatura.

Hortelã: para que serve

Indicação oficial da hortelã-pimenta (ANVISA): como auxiliar no alívio de sintomas dispépticos, tal como flatulência.

Usos populares da hortelã: má digestão, gases, cólicas, náuseas e mau hálito. A hortelã-rasteira (*Mentha × villosa*) é usada popularmente contra vermes e amebas, uso que não consta na monografia da hortelã-pimenta.

Hortelã: como preparar e usar

Chá de hortelã-pimenta para adultos (ANVISA, fórmula 1): 1,5 a 3 g de folhas secas e rasuradas para 100 a 150 mL de água. Preparar por infusão durante 5 a 10 minutos. Tomar o infuso três vezes ao dia.

Chá de hortelã-pimenta para crianças acima de 4 anos (fórmula 2): 1 a 2 g de folhas para 100 a 150 mL de água, por infusão. Tomar três vezes ao dia.

Tintura de hortelã-pimenta (fórmulas 3 e 4): 20 g de folha em álcool a 45% ou 70% suficiente para 100 mL; tomar 2 a 3 mL diluídos em 50 mL de água, três vezes ao dia (uso adulto).

Hortelã: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar hortelã-pimenta (ANVISA): contraindicado durante a gestação e a lactação, para pessoas com alergia a menta ou mentol, portadores de cálculos biliares, obstrução dos ductos biliares, danos hepáticos graves e litíase urinária (cálculo renal). Não é recomendado para menores de 4 anos. A tintura é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos.

Hortelã e refluxo: pessoas com refluxo gastroesofágico devem evitar a hortelã-pimenta, pois ela pode piorar a azia e irritar o esôfago e o estômago.

Interações da hortelã-pimenta: pode potencializar medicamentos repositores de estrogênio; pode inibir o metabolismo de medicamentos como nifedipino e ciclosporina e aumentar a concentração de felodipino; pode aumentar o efeito de bloqueadores de canal de cálcio e de outros anti-hipertensivos; pode reduzir a absorção de ferro.

Efeitos adversos da hortelã-pimenta: náuseas, vômitos, dor abdominal e ardência na região anal; em pessoas sensíveis, irritabilidade e insônia. Há estudos indicando diminuição da produção de leite materno. Em altas doses, pode estar relacionada a lesões no fígado e nos rins. Se os sintomas persistirem por duas semanas, um médico deve ser consultado.

Hortelã: cultivo em casa

Cultivo da hortelã: prefere meia-sombra, solo fértil e sempre úmido. É muito invasiva, por isso é melhor plantá-la em vasos ou canteiros separados.

Propagação da hortelã: por pedaços de caules e estolões com raízes. A hortelã-pimenta não é propagada por sementes.

Hortelã: usos na cozinha e curiosidades

Hortelã na cozinha: ingrediente do quibe, do tabule, de molhos, de sucos (como limonada com hortelã), de doces e de drinks como o mojito.

Hortelã: perguntas frequentes. Chá de hortelã é bom para gases? A ANVISA indica a hortelã-pimenta como auxiliar no alívio de sintomas de má digestão, como flatulência. Quem tem refluxo deve evitar.

Capítulo 6 — Alecrim (*Salvia rosmarinus*)

Alecrim: ficha de identificação

Nome popular: alecrim. Outros nomes: alecrim-de-jardim, alecrim-de-cheiro, rosmarinho.

Nome científico: *Salvia rosmarinus* Spenn. Sinônimo: *Rosmarinus officinalis* L., nome usado no Formulário da ANVISA. Em 2017, estudos de DNA levaram à transferência do alecrim para o gênero *Salvia*.

Família: Lamiaceae.

Parte usada: folhas.

Para que serve (ANVISA): auxiliar no alívio de sintomas dispépticos e nas desordens espasmódicas leves do trato gastrointestinal.

Forma de uso: chá por infusão, tintura ou extrato fluido (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Alecrim: origem e história

Origem do alecrim: nativo da região do Mar Mediterrâneo, onde cresce em encostas secas perto do litoral.

História do alecrim: o nome latino *ros marinus* significa "orvalho do mar". Na Grécia antiga, estudantes usavam coroas de alecrim acreditando que ajudavam a memória, e a planta se tornou símbolo de lembrança e fidelidade.

Alecrim: como reconhecer

Hábito do alecrim: arbusto perene, lenhoso, muito ramificado, de 50 cm a 1,5 m de altura, com cheiro forte e resinoso.

Folhas do alecrim: opostas, sésseis (sem pecíolo), lineares, estreitas como agulhas, com 1 a 4 cm, coriáceas (duras), com a margem enrolada para baixo. São verde-escuras e brilhantes em cima e esbranquiçadas e pilosas embaixo.

Flores do alecrim: pequenas, azul-claras, lilás ou brancas, com dois lábios, nas axilas das folhas.

Alecrim: plantas parecidas e confusões

Alecrim-do-campo: o *Baccharis dracunculifolia*, arbusto nativo do Brasil também chamado de alecrim-do-campo, é a planta usada pelas abelhas para produzir a própolis verde. Não é parente do alecrim de cozinha.

Alecrim-pimenta: a *Lippia sidoides*, do Nordeste, tem cheiro forte e picante e outros usos.

Alecrim x lavanda: a lavanda tem folhas parecidas, porém mais acinzentadas e macias, e flores roxas em espigas longas.

Alecrim: composição química

Substâncias do alecrim: óleo essencial rico em 1,8-cineol, cânfora e alfa-pineno; ácidos fenólicos, como o ácido rosmarínico; e diterpenos fenólicos, como o ácido carnósico e o carnosol, potentes antioxidantes usados até pela indústria de alimentos para conservar óleos e carnes.

Alecrim: para que serve

Indicações oficiais do alecrim (ANVISA): auxiliar no alívio de sintomas dispépticos; auxiliar nas desordens espasmódicas leves do trato gastrointestinal (cólicas leves).

Usos populares do alecrim: estimulante, para cansaço, memória, má circulação, dores musculares (em uso externo) e cuidados com os cabelos. Esses usos não constam na monografia oficial.

Alecrim: como preparar e usar

Chá de alecrim (ANVISA, fórmula 1): 1 a 2 g de folhas secas e rasuradas para 150 a 250 mL de água. Preparar por infusão.

Modo de usar o chá de alecrim: tomar de 150 a 250 mL do infuso, 15 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia, entre as refeições.

Tintura de alecrim (fórmula 2): 10 a 20 g de folhas em álcool a 70% suficiente para 100 mL; tomar de 3 a 8,5 mL diluídos em 50 mL de água, ao dia. **Extrato fluido (fórmula 3):** tomar de 2 a 4 mL diluídos em 50 mL de água, ao dia.

Alecrim: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar alecrim (ANVISA): o chá é para uso adulto e pediátrico acima de 12 anos; a tintura e o extrato fluido, só para adultos. Contraindicado para menores de 12 anos, gestantes e lactantes e para pessoas com hipersensibilidade aos componentes.

Cuidados com o alecrim: pessoas com obstrução dos ductos biliares ou outras disfunções biliares, colangite ou doenças do fígado precisam de supervisão médica para o uso oral. Deve ser usado com cautela por hipertensos, diabéticos e portadores de adenomas prostáticos. Pode reduzir o limiar convulsivo em pessoas com epilepsia. Pode alterar o sono se usado à noite.

Efeitos adversos do alecrim: pode desencadear dermatite e episódios de asma. Se os sintomas persistirem após duas semanas de uso oral, um médico deve ser consultado.

Alecrim: cultivo em casa

Cultivo do alecrim: sol pleno, solo arenoso, seco e bem drenado. Regue pouco: o excesso de água é a principal causa de morte do alecrim em vasos.

Propagação do alecrim: por estacas de ramos semilenhosos. Por sementes, a germinação é lenta e irregular.

Alecrim: usos na cozinha e curiosidades

Alecrim na cozinha: tempero clássico de carnes assadas (cordeiro, frango, porco), batatas, pães (como a focaccia), azeites aromatizados e molhos.

Alecrim melhora a memória? Esse é um uso tradicional antigo, estudado em pesquisas preliminares, mas não é uma indicação oficial da ANVISA.

Capítulo 7 — Camomila (*Matricaria chamomilla*)

Camomila: ficha de identificação

Nome popular: camomila. Outros nomes: camomila-alemã, camomila-comum, maçanilha, matricária.

Nome científico: *Matricaria chamomilla* L. Sinônimos: *Matricaria recutita* L. e *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert.

Família: Asteraceae (a mesma da margarida e do girassol).

Parte usada: inflorescências (os capítulos florais) secas.

Para que serve (ANVISA): queixas gastrointestinais leves (distensão abdominal e espasmos leves), sintomas do resfriado comum (por inalação), afecções leves da pele, lesões e inflamações leves da boca e da garganta e afecções da pele e mucosa das regiões anal e genital.

Forma de uso: chá (uso oral), inalação, compressas, bochechos e gargarejos. **Monografia oficial:** sim.

Camomila: origem e história

Origem da camomila: nativa da Europa e da Ásia ocidental. No Brasil, é cultivada principalmente no Paraná, em regiões de clima ameno.

História da camomila: o nome vem do grego *chamaimelon*, "maçã do chão", pelo cheiro que lembra maçã. É uma das plantas medicinais mais antigas e populares do mundo, usada desde o Egito e a Grécia antigos.

Camomila: como reconhecer

Hábito da camomila: erva anual, delicada, de 20 a 60 cm, muito ramificada e aromática.

Folhas da camomila: alternas, finamente divididas (duas a três vezes pinatissectas), com segmentos estreitos, quase como fios.

Flores da camomila: capítulos pequenos, de 1,5 a 2,5 cm, parecidos com pequenas margaridas: flores brancas na borda (liguladas), que se curvam para baixo com a maturidade, e flores amarelas no centro, formando um miolo em forma de cone.

Como diferenciar a camomila verdadeira: cortando o capítulo ao meio, o receptáculo (a base do miolo amarelo) da camomila verdadeira é oco. Nas falsas camomilas, ele é cheio.

Camomila: plantas parecidas e confusões

Camomila-romana: a *Chamaemelum nobile*, também chamada de camomila, é outra espécie, perene e rasteira, com receptáculo cheio.

Falsas camomilas: plantas como *Anthemis* e *Tripleurospermum* têm flores muito parecidas, mas não têm o receptáculo oco nem o mesmo aroma.

Camomila: composição química

Substâncias da camomila: óleo essencial de cor azul, que contém camazuleno (formado a partir da matricina durante a destilação) e alfa-bisabolol, com ação anti-inflamatória; flavonoides, como a apigenina, associada ao efeito calmante; e cumarinas e mucilagens.

Camomila: para que serve

Indicações oficiais da camomila (ANVISA): fórmula 1 (chá): auxiliar no tratamento sintomático de queixas gastrointestinais leves, como distensão abdominal e espasmos leves. Fórmula 2 (inalação e compressas): auxiliar no alívio de sintomas do resfriado comum e de afecções leves da pele, como queimaduras solares, feridas superficiais e furúnculos. Fórmula 3 (bochechos): lesões leves e inflamações da boca e da orofaringe. Fórmula 4 (irrigação): afecções da pele e mucosa das regiões anal e genital, desde que situações graves tenham sido descartadas por um médico.

Usos populares da camomila: calmante suave, para ajudar a dormir, cólicas de bebês, cólicas menstruais e irritação nos olhos (compressas).

Camomila: como preparar e usar

Chá de camomila (ANVISA, fórmula 1): 0,5 a 4 g de inflorescências secas para 150 mL de água, por infusão durante 5 a 10 minutos.

Dose do chá de camomila por idade: crianças de 6 meses a 2 anos: infuso preparado com 0,5 a 1 g, de duas a quatro vezes ao dia. De 2 a 6 anos: 1 a 1,5 g, de duas a quatro vezes ao dia. De 6 a 12 anos: 1,5 a 3 g, de duas a quatro vezes ao dia. Adultos e maiores de 12 anos: 1,5 a 4 g, de três a quatro vezes ao dia.

Inalação de camomila para resfriado (fórmula 2): infuso de 2 a 10 g em 100 mL de água. Crianças de 6 a 12 anos: inalar o vapor do infuso preparado com 2 a 5 g, até duas vezes ao dia. Adultos e maiores de 12 anos: 3 a 10 g, diversas vezes ao dia.

Camomila na pele (fórmula 2): adultos e maiores de 12 anos: embeber algodão no infuso de 3 a 10 g em 100 mL e limpar ou cobrir a área afetada, diversas vezes ao dia.

Bochechos de camomila (fórmula 3): infuso de 1 a 5 g em 100 mL; adultos e maiores de 12 anos: bochechos ou gargarejos três vezes ao dia. **Irrigação (fórmula 4):** infuso de 4,5 a 5 g em 1.000 mL, para irrigar as lesões diversas vezes ao dia (maiores de 12 anos).

Camomila: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar camomila (ANVISA): pessoas com alergia aos componentes ou a plantas da família Asteraceae (como margarida, arnica, crisântemo e ambrosia). O uso oral é contraindicado para crianças menores de 6 meses, e a inalação não é recomendada para menores de 6 anos. O uso na boca e na pele é recomendado só para maiores de 12 anos, e o uso na pele é contraindicado em lesões profundas ou extensas.

Alergias à camomila: foram relatadas reações alérgicas graves (falta de ar, inchaço, choque anafilático) após contato das mucosas com preparações de camomila, além de dermatite de contato.

Interações da camomila: não usar junto com anticoagulantes, pois pode potencializar o efeito. O efeito pode diminuir com anti-inflamatórios não esteroidais. Foram relatadas interações em pacientes transplantados renais que tomaram altas doses por longos períodos.

Camomila na gestação e amamentação: segundo o Formulário, o uso externo durante a gestação e a lactação é permitido; se aplicada nos mamilos, a região deve ser higienizada antes de amamentar. Se os sintomas persistirem ou piorarem por mais de uma semana, um médico deve ser consultado.

Camomila: cultivo em casa

Cultivo da camomila: prefere clima ameno, sol pleno e solo leve e bem drenado. Semeia-se no outono ou inverno, espalhando as sementes, que são muito pequenas, sobre a terra sem enterrá-las.

Colheita da camomila: os capítulos são colhidos quando as flores brancas estão abertas e na horizontal, e depois secos à sombra.

Camomila: perguntas frequentes

Bebê pode tomar chá de camomila? Segundo a ANVISA, o chá de camomila é contraindicado para menores de 6 meses. De 6 meses a 2 anos, a dose é o infuso preparado com 0,5 a 1 g, de duas a quatro vezes ao dia. Converse sempre com o pediatra antes de dar chás a bebês.

Chá de camomila acalma? O uso como calmante suave é popular e estudado, mas as indicações oficiais da camomila no Formulário são para queixas digestivas leves, resfriado, pele e boca.

Capítulo 8 — Capim-limão ou capim-santo (*Cymbopogon citratus*)

Capim-limão: ficha de identificação

Nome popular: capim-limão. Outros nomes: capim-santo, capim-cidreira, capim-cidrô, erva-cidreira, capim-cheiroso, capim-de-cheiro.

Nome científico: *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf.

Família: Poaceae (a família dos capins, do milho e do arroz).

Parte usada: folhas secas.

Para que serve (ANVISA): como antiespasmódico, auxiliar no alívio de cólica menstrual leve e cólicas intestinais leves; como auxiliar no alívio da ansiedade e da insônia leves.

Forma de uso: chá por infusão (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Capim-limão: origem e história

Origem do capim-limão: nativo do Sul e do Sudeste da Ásia, provavelmente da Índia e do Sri Lanka. Foi trazido ao Brasil no período colonial e hoje é encontrado em quase todos os quintais do país.

Capim-limão no mundo: é ingrediente essencial da culinária tailandesa, vietnamita e indonésia e fonte de óleo essencial rico em citral para as indústrias de perfumes, cosméticos e alimentos.

Capim-limão: como reconhecer

Hábito do capim-limão: erva perene que forma grandes touceiras, com 1 a 2 m de altura.

Folhas do capim-limão: longas (até 1 m), estreitas (1 a 2 cm de largura), lineares, verde-claras a azuladas, com nervuras paralelas, típicas das monocotiledôneas. As bordas são ásperas e cortantes. A base das folhas forma bainhas que se sobrepõem, parecendo um talo esbranquiçado. Ao amassar ou cortar, liberam forte cheiro de limão.

Flores do capim-limão: raramente floresce em cultivo no Brasil.

Capim-limão: plantas parecidas e confusões

Capim-limão x citronela: a citronela (*Cymbopogon nardus* e *Cymbopogon winterianus*) é do mesmo gênero e muito parecida, mas tem cheiro mais forte, de repelente. É usada para repelir mosquitos e não deve ser usada para chás.

Capim-limão x erva-cidreira: em muitas regiões, o capim-limão também é chamado de erva-cidreira, o que causa confusão com a melissa e com a lípia.

Capim-limão: composição química

Substâncias do capim-limão: óleo essencial rico em citral, a mistura de geranial e neral responsável pelo cheiro de limão, além de mirceno. Também contém flavonoides e compostos fenólicos.

Capim-limão: para que serve

Indicações oficiais do capim-limão (ANVISA): como antiespasmódico, auxiliar no alívio de sintomas decorrentes da dismenorreia leve (cólica menstrual leve) e cólicas intestinais leves; como auxiliar no alívio da ansiedade e insônia leves.

Usos populares do capim-limão: calmante, para gripes, febre, dor de barriga e gases.

Capim-limão: como preparar e usar

Chá de capim-limão (ANVISA): 1 a 3 g de folhas secas para 150 mL de água. Preparar por infusão durante 5 a 10 minutos.

Modo de usar o chá de capim-limão: tomar 150 mL do infuso, 5 minutos após o preparo, três a quatro vezes ao dia.

Dica prática: corte as folhas em pedaços pequenos antes do preparo, para liberar melhor o óleo essencial, e mantenha o recipiente tampado para não perder o aroma.

Capim-limão: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar capim-limão (ANVISA): uso adulto. Contraindicado durante a gestação, a lactação e para menores de 18 anos, e para pessoas com hipersensibilidade aos componentes. Não deve ser utilizado por pessoas com afecções cardíacas, renais ou hepáticas, ou portadoras de doenças crônicas.

Interações do capim-limão: não associar a medicamentos depressores do sistema nervoso central, como calmantes e soníferos.

Efeitos adversos do capim-limão: em doses elevadas pode causar síncope (desmaio) e sedação. O uso habitual pode estar relacionado a hiperplasia prostática benigna.

Capim-limão: cultivo em casa

Cultivo do capim-limão: muito rústico. Prefere sol pleno, clima quente, solo fértil e regas regulares. Também é usado para conter a erosão do solo.

Propagação do capim-limão: pela divisão das touceiras, separando mudas com raízes. Cuidado ao manusear: as folhas cortam a pele.

Capim-limão: usos na cozinha e perguntas frequentes

Capim-limão na cozinha: usado em chás gelados, sucos, caldos, peixes, frutos do mar, pratos com leite de coco e sobremesas.

Capim-limão ajuda a dormir? Segundo a ANVISA, é indicado como auxiliar no alívio da ansiedade e da insônia leves. Não deve ser combinado com medicamentos para dormir.

Capítulo 9 — Espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia*)

Espinheira-santa: ficha de identificação

Nome popular: espinheira-santa. Outros nomes: cancorosa, cancerosa, espinheira-divina, maiteno.

Nome científico: *Monteverdia ilicifolia* (Mart. ex Reissek) Biral. Sinônimo mais conhecido: *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek.

Família: Celastraceae.

Parte usada: folhas secas.

Para que serve (ANVISA): auxiliar no alívio de sintomas digestivos, incluindo azia e dispepsia.

Forma de uso: chá por decocção ou infusão e cápsulas (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Espinheira-santa: origem e história

Origem da espinheira-santa: nativa do Sul do Brasil e de países vizinhos (Paraguai, Uruguai e Argentina), em matas de araucária e na Mata Atlântica. É uma planta genuinamente brasileira.

Estudos brasileiros: a espinheira-santa foi uma das plantas estudadas no Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos (CEME) do governo federal, nos anos 1980, com estudos coordenados pelo professor Elisaldo Carlini, que avaliaram seu efeito protetor sobre o estômago.

Conservação: por ser muito coletada na natureza, a espécie sofre com o extrativismo. O cultivo é a forma mais sustentável de obtenção.

Espinheira-santa: como reconhecer

Hábito da espinheira-santa: arbusto ou pequena árvore, de 2 a 5 m de altura, muito ramificada.

Folhas da espinheira-santa: alternas, simples, coriáceas (duras como couro), elípticas a oblongas, verde-escuras e brilhantes, com margem provida de dentes terminados em pequenos espinhos, semelhantes às folhas do azevinho. O nome *ilicifolia* significa justamente "folha de *Ilex*" (azevinho). As folhas não soltam látex quando quebradas.

Flores e frutos da espinheira-santa: flores pequenas, amarelo-esverdeadas, reunidas nas axilas das folhas. O fruto é uma cápsula vermelho-alaranjada que se abre e mostra sementes envoltas por um arilo branco.

Espinheira-santa: plantas parecidas e adulterações

Falsa-espinheira-santa: a principal adulteração é a *Sorocea bonplandii* (família Moraceae), com folhas também serrilhadas e espinhosas. A diferença mais simples é que, ao quebrar a folha fresca da falsa-espinheira-santa, sai um látex branco; a espinheira-santa verdadeira não tem látex.

Outras espécies: *Monteverdia aquifolia* (*Maytenus aquifolia*), muito parecida e também usada, e *Zollernia ilicifolia* (família Fabaceae) também são vendidas como espinheira-santa.

Espinheira-santa: composição química

Substâncias da espinheira-santa: taninos, flavonoides e triterpenos (como a friedelina), associados à proteção da mucosa do estômago e à redução da acidez.

Espinheira-santa: para que serve

Indicação oficial da espinheira-santa (ANVISA): como auxiliar no alívio de sintomas digestivos, incluindo azia e dispepsia (má digestão).

Usos populares da espinheira-santa: gastrite e úlceras no estômago. Gastrite e úlcera devem ser diagnosticadas e acompanhadas por um médico.

Espinheira-santa: como preparar e usar

Chá de espinheira-santa por decocção (ANVISA, fórmula 1): 1 a 2 g de folhas secas e rasuradas para 150 mL de água. Ferver por 5 minutos e deixar em contato com a água por mais 15 minutos. Tomar 150 mL do decocto duas horas após o almoço e à noite, podendo chegar a quatro vezes ao dia.

Chá de espinheira-santa por infusão (fórmula 2): 3 g de folhas secas e trituradas para 150 mL de água. Tomar logo após o preparo, três a quatro vezes ao dia.

Cápsulas de espinheira-santa (fórmula 3): extrato seco correspondente à fórmula 2; tomar três a quatro cápsulas ao dia.

Duração do uso da espinheira-santa: o uso contínuo não deve ultrapassar seis meses; o tratamento pode ser repetido, se necessário, após intervalo de 30 dias.

Espinheira-santa: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar espinheira-santa (ANVISA): uso adulto. Contraindicado para menores de 18 anos, durante a gestação e a lactação, porque reduz a produção de leite materno e pode provocar contrações uterinas. Contraindicado para pessoas com alergia a plantas da família Celastraceae.

Interações da espinheira-santa: deve ser evitada por pessoas que usam muitos medicamentos. Pode interagir com esteroides anabolizantes, metotrexato, amiodarona e cetoconazol, por possível dano ao fígado, e com imunossupressores, por efeito antagônico.

Efeitos adversos da espinheira-santa: boca seca, alteração do paladar, náuseas, dor no estômago e aumento do volume de urina. Em doses excessivas, por conter taninos, pode irritar o estômago e o intestino, causando vômitos, cólicas e diarreia.

Espinheira-santa: cultivo em casa

Cultivo da espinheira-santa: prefere clima ameno a frio, meia-sombra (sobretudo quando jovem) e solo rico em matéria orgânica. Cresce devagar.

Propagação da espinheira-santa: principalmente por sementes; também por estacas, com enraizamento mais difícil.

Espinheira-santa: perguntas frequentes

Espinheira-santa cura gastrite? A ANVISA indica a espinheira-santa como auxiliar no alívio de sintomas digestivos, como azia e má digestão. Gastrite e úlcera precisam de diagnóstico e tratamento médico.

Como saber se a espinheira-santa é verdadeira? Quebre uma folha fresca: se sair látex branco, é a falsa-espinheira-santa (*Sorocea bonplandii*). Na planta seca, a identificação exige análise especializada; por isso, prefira produtos com procedência garantida.

Capítulo 10 — Calêndula (*Calendula officinalis*)

Calêndula: ficha de identificação

Nome popular: calêndula. Outros nomes: malmequer, malmequer-dos-jardins, maravilha-dos-jardins.

Nome científico: *Calendula officinalis* L.

Família: Asteraceae.

Parte usada: flores (capítulos florais).

Para que serve (ANVISA): auxiliar no tratamento de inflamações da mucosa oral e da orofaringe; auxiliar no tratamento de inflamações leves da pele (como queimadura solar) e de ferimentos de menor gravidade.

Forma de uso: uso externo: compressas, bochechos, gargarejos e cremes. **Monografia oficial:** sim.

Calêndula: origem e história

Origem da calêndula: provavelmente da região do Mediterrâneo. É cultivada há séculos em jardins europeus como planta ornamental e medicinal.

Nome da calêndula: vem do latim *calendae*, o primeiro dia de cada mês no calendário romano, porque em clima favorável a planta floresce quase o ano inteiro. As pétalas já foram usadas para colorir queijos e manteiga e como substituto barato do açafrão.

Calêndula: como reconhecer

Hábito da calêndula: erva anual, de 30 a 60 cm, ramificada, coberta de pelos glandulares que a deixam pegajosa e aromática.

Folhas da calêndula: alternas, simples, oblongas a espatuladas, sésseis (sem pecíolo), com margem inteira ou levemente denteada, verde-claras.

Flores da calêndula: capítulos grandes, de 4 a 7 cm, amarelos ou alaranjados intensos, simples ou dobrados. Abrem com o sol e fecham à noite ou em dias nublados.

Frutos da calêndula: aquênios curvos, em forma de gancho ou de meia-lua, com formatos variados na mesma planta.

Calêndula: plantas parecidas e confusões

Calêndula x cravo-de-defunto: as plantas do gênero *Tagetes* (cravo-de-defunto, tagetes) também são chamadas de *marigold* em inglês e têm flores amarelas e laranja, mas cheiro forte e desagradável e folhas finamente recortadas. Não devem ser usadas no lugar da calêndula.

Calêndula: composição química

Substâncias da calêndula: triterpenos (ésteres do faradiol), com ação anti-inflamatória; flavonoides; carotenoides, que dão a cor laranja; saponinas; e óleo essencial em pequena quantidade.

Calêndula: para que serve

Indicações oficiais da calêndula (ANVISA): o chá e a tintura são indicados como auxiliares no tratamento de inflamações da mucosa oral e da orofaringe; o chá e os cremes, como auxiliares no tratamento de inflamações leves da pele (como queimadura provocada pela radiação solar) e ferimentos de menor gravidade.

Usos populares da calêndula: assaduras, pele irritada, picadas de insetos, pequenos cortes e aftas.

Calêndula: como preparar e usar

Chá de calêndula (ANVISA, fórmula 1): 1 a 2 g de flores para 150 mL de água, por infusão. Devem ser usadas flores completamente abertas e destacadas do receptáculo.

Calêndula na pele: após a higienização, aplicar o infuso levemente aquecido em compressas, deixando de 30 a 60 minutos sobre o local afetado, de duas a quatro vezes ao dia.

Calêndula na boca e garganta: fazer bochechos ou gargarejos com o infuso de duas a quatro vezes ao dia. Com a tintura (20 g de flores em álcool a 70 a 90% suficiente para 100 mL): 2 mL diluídos em 100 mL de água, de duas a quatro vezes ao dia.

Creme de calêndula: o Formulário traz cremes com tintura ou extratos de calêndula (por exemplo, 2 a 10 mL de tintura em creme base suficiente para 100 g); aplicar uma fina camada na área afetada, duas a quatro vezes ao dia.

Calêndula: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar calêndula (ANVISA): uso adulto e pediátrico acima de 6 anos. Contraindicado para pessoas com alergia aos componentes ou a plantas da família Asteraceae, e durante a gestação e a lactação. O uso na pele é contraindicado para menores de 6 anos, e o uso na mucosa da boca, para menores de 12 anos. A tintura é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos.

Efeitos adversos da calêndula: em casos raros, dermatite de contato e outras sensibilizações da pele.

Quando procurar um médico: se os sintomas persistirem após uma semana de uso ou se houver sinais de infecção da pele, como pus, vermelhidão que se espalha, calor e febre.

Calêndula: cultivo em casa

Cultivo da calêndula: fácil. Prefere sol pleno, clima ameno e solo fértil e bem drenado. Semeia-se diretamente no canteiro ou em sementeira, de preferência no outono e no inverno em regiões quentes.

Colheita da calêndula: colher as flores totalmente abertas, em dias secos, e secá-las à sombra. Retirar as flores ajuda a planta a produzir novas.

Calêndula: usos na cozinha e curiosidades

Calêndula na cozinha: as pétalas são comestíveis e dão cor a saladas, arroz, sopas e doces.

Calêndula na horta: é muito usada como planta companheira em hortas orgânicas, porque atrai insetos benéficos, como abelhas e joaninhas.

Calêndula serve para assadura de bebê? O uso na pele é contraindicado para menores de 6 anos, segundo o Formulário da ANVISA. Consulte o pediatra.

Capítulo 11 — Gengibre (*Zingiber officinale*)

Gengibre: ficha de identificação

Nome popular: gengibre. Outros nomes: mangarataia, gengivre.

Nome científico: *Zingiber officinale* Roscoe.

Família: Zingiberaceae (a mesma do açafrão-da-terra e do cardamomo).

Parte usada: rizoma (caule subterrâneo, popularmente chamado de raiz).

Para que serve (ANVISA): auxiliar na prevenção e no alívio da cinetose (enjoo de movimento); auxiliar no tratamento de queixas gastrointestinais leves e como antidiarréico.

Forma de uso: chá por infusão ou decocção, alcoolatura, tintura e cápsulas (uso oral). **Monografia oficial:** sim.

Gengibre: origem e história

Origem do gengibre: Sudeste Asiático. É conhecido apenas cultivado, sem populações selvagens conhecidas.

História do gengibre: usado há milhares de anos na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica da Índia, foi uma das especiarias mais valiosas do comércio entre a Ásia e a Europa. Chegou ao Brasil no período colonial.

Gengibre no Brasil: o Brasil produz e exporta gengibre, com cultivo concentrado principalmente no Espírito Santo e no Paraná.

Gengibre: como reconhecer

Hábito do gengibre: erva perene, de 60 cm a 1,2 m de altura, com rizoma subterrâneo.

Rizoma do gengibre: horizontal, carnoso, ramificado em forma de dedos ou de mão, com casca fina bege-dourada e polpa amarelo-clara, fibrosa, de aroma forte e sabor picante.

Parte aérea do gengibre: falsos caules eretos, formados pelas bainhas das folhas enroladas. As folhas são alternas, em duas fileiras (dísticas), lanceoladas, estreitas, com nervuras paralelas, parecidas com as de um capim largo ou de uma pequena bananeira.

Flores do gengibre: raramente floresce em cultivo. As flores surgem em espigas que saem direto do rizoma, com brácteas verdes e flores amarelo-esverdeadas com lábio arroxeadado.

Gengibre: plantas parecidas e confusões

Gengibre x açafrão-da-terra: o açafrão-da-terra (*Curcuma longa*), da mesma família, também tem rizoma, mas a polpa é laranja-intensa.

Gengibre x colônia: a colônia (*Alpinia zerumbet*), também da mesma família, é uma planta alta e ornamental, de folhas grandes e flores em cachos pendentes, usada em chás com outras indicações.

Gengibre: composição química

Substâncias do gengibre: gingeróis, responsáveis pelo sabor picante do gengibre fresco, que se transformam em shogaóis, ainda mais picantes, quando o gengibre é seco ou aquecido; óleo essencial com zingibereno e outros sesquiterpenos.

Gengibre: para que serve

Indicações oficiais do gengibre (ANVISA): auxiliar na prevenção da cinetose (enjoo de movimento em viagens de carro, barco ou avião); auxiliar no tratamento sintomático de queixas gastrointestinais leves e como antidiarréico (má digestão).

Usos populares do gengibre: dor de garganta, gripes e resfriados, rouquidão, enjoos e má digestão. É muito usado com limão e mel.

Gengibre: como preparar e usar

Chá de gengibre para enjoo de viagem (ANVISA, fórmula 1): 0,5 a 2 g de rizoma seco e pulverizado em água, por infusão ou decocção durante 5 minutos. Tomar de duas a quatro vezes ao dia, 30 minutos antes da situação que pode causar náuseas.

Chá de gengibre para má digestão (fórmula 2): 0,3 a 3 g de rizoma seco e pulverizado em água, por infusão ou decocção durante 5 minutos. Tomar de três a quatro vezes ao dia.

Outras formas de gengibre: alcoolatura (20 g de rizoma em álcool a 80% suficiente para 100 mL, em maceração por 20 dias): tomar 3 mL diluídos em 75 mL de água, três vezes ao dia. Tintura (20 g em álcool a 40% suficiente para 100 mL): 1,5 a 5 mL diluídos em 50 mL de água, de uma a três vezes ao dia.

Cápsulas de gengibre para enjoo de viagem (fórmula 5): cápsulas com 250 a 750 mg de rizoma em pó. Adultos e maiores de 12 anos: 750 mg meia hora antes da viagem. Crianças de 6 a 12 anos: 250 ou 500 mg meia hora antes da viagem.

Gengibre: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar gengibre (ANVISA): os chás, a alcoolatura e a tintura são para uso adulto; as cápsulas, para adultos e crianças acima de 6 anos. Não recomendado para menores de 6 anos. Contraindicado para pessoas com cálculos biliares, irritação gástrica e hipertensão arterial, durante a gestação, a lactação e para menores de 18 anos (exceto a fórmula em cápsulas).

Gengibre e coagulação: não usar junto com anticoagulantes. O gengibre pode interferir na coagulação do sangue e não deve ser usado em altas doses antes de cirurgias.

Efeitos adversos do gengibre: dependendo da dose, irritação do estômago; em doses mais elevadas, cólicas digestivas, aumento da pressão arterial e tonturas. Doses muito elevadas podem causar arritmias e depressão do sistema nervoso central.

Gengibre: cultivo em casa

Cultivo do gengibre: prefere clima quente e úmido, meia-sombra e solo fofo, rico em matéria orgânica e bem drenado.

Propagação do gengibre: por pedaços do rizoma com gemas ("olhos"), plantados na primavera. Um pedaço comprado no mercado pode brotar. A colheita ocorre de 8 a 10 meses depois, quando as folhas amarelam.

Gengibre: usos na cozinha e perguntas frequentes

Gengibre na cozinha: tempero da culinária asiática, usado em peixes, carnes, molhos, conservas (como o gengibre em conserva do sushi), bolos, biscoitos, quentão, sucos e chás.

Grávida pode tomar chá de gengibre para enjoo? O Formulário da ANVISA contraindica o uso do gengibre na gestação. Gestantes com enjoo devem conversar com o médico que acompanha o pré-natal.

Gengibre emagrece? Não há indicação oficial do gengibre para emagrecimento.

Capítulo 12 — Manjerição (*Ocimum basilicum*)

Manjerição: ficha de identificação

Nome popular: manjerição. Outros nomes: basilicão, alfavaca (nome também usado para outras espécies de *Ocimum*), manjerição-de-folha-larga, basílico.

Nome científico: *Ocimum basilicum* L.

Família: Lamiaceae.

Parte usada: folhas e sumidades floridas.

Para que serve: principalmente planta culinária e aromática. Na medicina popular, é usado para má digestão, gases e como calmante leve.

Monografia oficial: não. O manjerição não tem monografia no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira; por isso, não há dose oficial para uso medicinal no Brasil.

Manjerição: origem e história

Origem do manjerição: regiões tropicais da Ásia e da África, com cultivo muito antigo na Índia.

História do manjerição: o nome *basilicum* vem do grego *basilikón*, "real" ou "digno de um rei". Chegou à Europa pelas rotas comerciais e se tornou símbolo da culinária italiana. No Brasil, é muito cultivado em hortas domésticas.

Manjerição: como reconhecer

Hábito do manjerição: erva anual ou perene de vida curta, de 30 a 60 cm, muito aromática.

Caule do manjerição: quadrangular, ramificado, verde ou arroxeado.

Folhas do manjerição: opostas, simples, ovadas, brilhantes, macias, de margem inteira ou levemente serrada, verde-vivas (ou roxas, no manjerição-roxo), com aroma doce e marcante ao serem tocadas.

Flores do manjerição: pequenas, brancas ou lilás, dispostas em anéis sobrepostos ao longo de espigas na ponta dos ramos.

Manjerição: plantas parecidas e confusões

Manjerição x alfavaca-cravo: a alfavaca-cravo (*Ocimum gratissimum*) é um arbusto maior, de folhas maiores e aveludadas, com cheiro forte de cravo, rico em eugenol.

Manjerição x tulsi: o manjerição-santo ou tulsi (*Ocimum tenuiflorum*), sagrado na Índia, tem folhas menores e aroma de cravo e pimenta.

Variedades de manjerição: existem muitas variedades: genovês (de folhas grandes, usado no pesto), de folha miúda, roxo, limão, canela e tailandês.

Manjerição: composição química

Substâncias do manjerição: óleo essencial com linalol, estragol (metilchavicol), eugenol e metil-eugenol, em proporções que variam conforme a variedade; ácido rosmarínico e flavonoides.

Estragol no manjerição: em estudos com animais, o estragol e o metil-eugenol em doses altas mostraram potencial genotóxico. Por isso, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomenda limitar a exposição a produtos medicinais concentrados ricos em estragol, especialmente em crianças, gestantes e lactantes. O uso culinário habitual das folhas não é considerado preocupante.

Manjerição: usos tradicionais e evidências

Usos tradicionais do manjerição: chá para má digestão, gases, falta de apetite, náuseas e como calmante leve; gargarejos para inflamações da garganta; e uso das folhas amassadas sobre picadas de insetos.

Evidências sobre o manjerição: estudos em laboratório e em animais mostraram atividades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória, mas os estudos clínicos em humanos ainda são limitados. Por isso, não há recomendação oficial da ANVISA para uso medicinal.

Como é usado popularmente: o chá costuma ser preparado por infusão das folhas por alguns minutos. Como não há dose oficial, o uso medicinal deve ser orientado por um profissional de saúde.

Manjerição: cuidados

Quem deve evitar o uso medicinal do manjerição: gestantes, lactantes e crianças pequenas devem evitar chás concentrados e o óleo essencial, por causa do estragol. O uso como tempero, nas quantidades habituais da culinária, é considerado seguro.

Óleo essencial de manjerição: não deve ser ingerido e deve ser diluído antes de ser aplicado na pele, pois pode causar irritação e alergia.

Manjerição: cultivo em casa

Cultivo do manjerição: gosta de sol pleno (pelo menos 4 a 6 horas por dia), calor, solo fértil e regas frequentes, sem encharcar. Não tolera frio.

Dica de cultivo do manjerição: retire as flores assim que aparecerem (desponte). Isso estimula a produção de folhas e prolonga a vida da planta.

Propagação do manjerição: por sementes ou por estacas, que enraízam facilmente em um copo com água.

Manjerição: usos na cozinha e curiosidades

Manjerição na cozinha: ingrediente principal do pesto genovês; usado em molhos de tomate, na pizza marguerita, em saladas (como a caprese), massas, sopas, sucos e drinques.

Dica culinária: adicione as folhas de manjerição no final do preparo ou use-as frescas, pois o calor prolongado faz o aroma se perder.

Manjerição espanta mosquitos? É um uso popular; o cheiro do manjerição pode ter algum efeito repelente, mas não substitui repelentes aprovados.

Capítulo 13 — Tanchagem (*Plantago major*)

Tanchagem: ficha de identificação

Nome popular: tanchagem. Outros nomes: tansagem, transagem, tanchás, plantagem, sete-nervos.

Nome científico: *Plantago major* L.

Família: Plantaginaceae.

Parte usada: folhas (e parte aérea, na tintura).

Para que serve (ANVISA): auxiliar no tratamento sintomático de afecções da cavidade oral, como anti-inflamatório e antisséptico.

Forma de uso: uso externo: bochechos, gargarejos e aplicação no local. **Monografia oficial:** sim.

Tanchagem: origem e história

Origem da tanchagem: nativa da Europa e da Ásia. Espalhou-se pelo mundo todo acompanhando os seres humanos e hoje é uma das plantas mais comuns em calçadas, gramados e terrenos.

História da tanchagem: povos indígenas da América do Norte a chamavam de "pegada do homem branco", porque ela aparecia por onde os colonizadores europeus passavam. É usada como planta medicinal desde a Antiguidade.

Tanchagem: como reconhecer

Hábito da tanchagem: erva perene, baixa, acaule, com folhas em roseta rente ao chão.

Folhas da tanchagem: largas, ovadas a elípticas, de 5 a 20 cm, com pecíolo longo e canaliculado, margem inteira ou levemente ondulada. A característica mais marcante são as 5 a 9 nervuras grossas e paralelas, que correm da base à ponta da folha em arco (daí o nome sete-nervos). Ao puxar a folha, as nervuras se soltam como fios.

Flores da tanchagem: minúsculas, esverdeadas a acastanhadas, reunidas em espigas longas e finas, sustentadas por hastes eretas que saem do centro da roseta.

Frutos da tanchagem: pequenas cápsulas que se abrem como uma tampa (pixídio), com sementes pequenas que ficam pegajosas quando molhadas.

Tanchagem: plantas parecidas e confusões

Tanchagem-menor: a *Plantago lanceolata* tem folhas estreitas e compridas, em forma de lança, e espigas curtas.

Tanchagem e psyllium: o psyllium, fibra usada como laxante, vem das sementes de outra espécie do mesmo gênero, a *Plantago ovata*.

Tanchagem: composição química

Substâncias da tanchagem: mucilagens, com ação suavizante; iridoides, como a aucubina; taninos, com ação adstringente; flavonoides; e alantoína, associada à regeneração dos tecidos.

Tanchagem: para que serve

Indicação oficial da tanchagem (ANVISA): auxiliar no tratamento sintomático decorrente de afecções da cavidade oral, como anti-inflamatório e antisséptico, por exemplo em inflamações de gengiva, aftas e dor de garganta.

Usos populares da tanchagem: feridas, picadas de insetos (folha amassada sobre a pele), inflamações de garganta e tosse.

Tanchagem: como preparar e usar

Chá de tanchagem (ANVISA, fórmula 1): 2 a 6 g de folhas para 150 mL de água, por infusão. Após a higienização, aplicar o infuso sobre o local afetado ou fazer bochechos e gargarejos.

Tintura de tanchagem (fórmula 2): 20 g de parte aérea em álcool a 45% suficiente para 100 mL; fazer bochechos ou gargarejos com 2 a 4 mL da tintura diluídos em 50 mL de água.

Atenção: não engolir a preparação após o bochecho ou o gargarejo.

Tanchagem: contraindicações e cuidados

Quem não deve usar tanchagem (ANVISA): uso adulto. Contraindicado durante a gestação, a lactação e para menores de 18 anos, e para pessoas com hipersensibilidade aos componentes. Não deve ser utilizado por pacientes com pressão arterial baixa e obstrução intestinal. A tintura é especialmente contraindicada para gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos.

Cuidados com a tanchagem: o pólen e a casca da semente podem causar reações alérgicas ou anafiláticas; nunca utilizar a casca da semente. Recomenda-se intervalo mínimo de 3 horas entre o uso da tanchagem e de outros medicamentos.

Tanchagem: cultivo em casa

Cultivo da tanchagem: muito fácil; cresce espontaneamente em quase qualquer solo, ao sol ou à meia-sombra, e tolera pisoteio.

Propagação da tanchagem: por sementes. Não colha tanchagem em calçadas, beiras de estradas ou locais poluídos; cultive em vaso ou canteiro limpo.

Tanchagem: curiosidades e perguntas frequentes

Tanchagem é comestível? As folhas jovens são consideradas uma planta alimentícia não convencional (PANC) e podem ser consumidas refogadas.

Tanchagem serve para dor de garganta? Segundo a ANVISA, a tanchagem é indicada em bochechos e gargarejos como anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral. Dor de garganta com febre alta, placas de pus ou dificuldade para engolir exige avaliação médica.

Capítulo 14 — Vinagreira ou hibisco (*Hibiscus sabdariffa*)

Vinagreira: ficha de identificação

Nome popular: vinagreira. Outros nomes: hibisco, chá-de-hibisco, caruru-azedo, quiabo-azedo, azedinha, rosela, groselha-da-américa.

Nome científico: *Hibiscus sabdariffa* L. (em algumas classificações recentes, transferida para o gênero *Sabdariffa*).

Família: Malvaceae (a mesma do quiabo e do algodão).

Parte usada: os cálices vermelhos (a parte carnosa que envolve o fruto) para chás; as folhas, na culinária.

Para que serve: bebida e alimento. Estudos clínicos indicam pequeno efeito de redução da pressão arterial.

Monografia oficial: não. A vinagreira não tem monografia no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira; por isso, não há dose oficial para uso medicinal no Brasil.

Vinagreira: origem e história

Origem da vinagreira: África tropical. Foi levada para a Ásia e para as Américas, inclusive para o Brasil, durante o período colonial, e se adaptou muito bem ao clima tropical.

Vinagreira no mundo: a bebida dos cálices é tradicional em vários países: *agua de jamaica* no México, *bissap* no Senegal, *karkadé* no Egito e no Sudão, e *sorrel* no Caribe, onde é bebida típica do Natal.

Vinagreira no Brasil: no Maranhão, as folhas são o ingrediente do tradicional arroz de cuxá, prato típico de São Luís. Em várias regiões, as folhas são consumidas refogadas, como verdura.

Vinagreira: como reconhecer

Hábito da vinagreira: planta anual ou bianual, arbustiva, de 1 a 2,5 m de altura, com caules avermelhados.

Folhas da vinagreira: alternas, com pecíolo longo e avermelhado. As folhas de baixo são inteiras e ovadas; as de cima são divididas em 3 a 5 lobos, como uma mão (palmatilobadas), com margem serrada. As folhas têm sabor azedo.

Flores da vinagreira: grandes, solitárias nas axilas das folhas, amarelo-claras ou creme com o centro vinho-escuro. Duram apenas um dia.

Cálices e frutos da vinagreira: depois que a flor cai, o cálice cresce, fica carnoso, vermelho-intenso e brilhante e envolve o fruto (uma cápsula com sementes). É esse cálice que é usado para o chá de hibisco.

Vinagreira: plantas parecidas e confusões

Vinagreira x hibisco ornamental: o hibisco dos jardins (*Hibiscus rosa-sinensis*), com grandes flores vermelhas, rosas ou amarelas, é outra espécie. O chá de hibisco não é feito das pétalas desse hibisco, e sim dos cálices da vinagreira.

Vinagreira x vinagreira-roxa: a *Hibiscus acetosella* (hibisco-cranberry), de folhas roxas, também é chamada de vinagreira em algumas regiões e é usada como verdura.

Vinagreira x azedinha: o nome azedinha também é usado para plantas totalmente diferentes, como a azedinha-de-folha-larga (*Rumex acetosa*).

Vinagreira: composição química

Substâncias da vinagreira: os cálices são ricos em antocianinas, pigmentos responsáveis pela cor vermelha intensa (principalmente derivados da delphinidina e da cianidina); ácidos orgânicos, como os ácidos hibíscico, cítrico e málico, que dão o sabor azedo; vitamina C; e polissacarídeos.

Vinagreira: usos e evidências

Vinagreira e pressão arterial: revisões sistemáticas de estudos clínicos indicam que o chá de hibisco pode causar uma pequena redução da pressão arterial em pessoas com pressão alta ou limítrofe. Esse efeito é modesto, e o chá não substitui os medicamentos anti-hipertensivos nem o acompanhamento médico.

Chá de hibisco emagrece? Não há comprovação científica consistente de que o chá de hibisco emagreça. O efeito diurético e a redução de líquido não correspondem a perda de gordura.

Usos tradicionais da vinagreira: bebida refrescante, diurética e digestiva; as folhas são usadas como verdura e os cálices em geleias, doces, xaropes e corantes naturais.

Como é preparado popularmente: os cálices secos são preparados por infusão em água quente por alguns minutos, e a bebida pode ser servida quente ou gelada. Como não há dose oficial, o uso com finalidade medicinal deve ser orientado por um profissional de saúde.

Vinagreira: cuidados

Quem deve evitar o chá de vinagreira: gestantes (há preocupação com possível efeito sobre o útero e sobre hormônios), lactantes e pessoas com pressão baixa.

Interações da vinagreira: pode somar efeito com medicamentos para pressão alta e diuréticos, levando a queda excessiva da pressão, e pode interferir no efeito de alguns medicamentos. Quem usa medicamentos contínuos, especialmente para pressão ou diabetes, deve conversar com o médico antes de tomar o chá com frequência.

Excesso de chá de vinagreira: o consumo em grandes quantidades pode irritar o estômago, por causa da acidez, e causar queda de pressão.

Vinagreira: cultivo em casa

Cultivo da vinagreira: planta tropical, gosta de sol pleno, calor e solo bem drenado. É sensível ao frio e à geada.

Propagação e colheita da vinagreira: por sementes, semeadas no início da estação chuvosa. A floração ocorre quando os dias ficam mais curtos, e os cálices são colhidos cerca de duas a três semanas depois da queda das flores, quando estão carnosos e bem vermelhos.

Vinagreira: usos na cozinha e curiosidades

Vinagreira na cozinha: chá quente ou gelado, sucos, geleias, xaropes, doces e drinques; folhas refogadas, no arroz de cuxá e em molhos.

Curiosidade: a cor do chá de hibisco muda com a acidez. Ao adicionar limão, ele fica mais vermelho-vivo; em meio menos ácido, fica arroxeado, porque as antocianinas mudam de cor conforme o pH.

Parte III — Tabelas-resumo e chave de identificação visual

Tabela 1 — Para que serve cada planta

Planta	Parte usada	Para que serve	Forma de uso	Monografia ANVISA
Babosa	Gel das folhas	Cicatrizante: ferimentos leves, queimaduras de 1º e 2º grau, escoriações	Gel na pele	Sim
Boldo-brasileiro	Folhas	Má digestão (dispepsia)	Chá (infusão 20 min)	Sim
Melissa	Folhas	Ansiedade e insônia leves; gases e distensão abdominal	Chá (infusão)	Sim
Erva-cidreira-brasileira	Folhas e flores	Ansiedade leve; cólicas; má digestão	Chá (infusão)	Sim
Hortelã-pimenta	Folhas	Má digestão, gases	Chá (infusão)	Sim
Alecrim	Folhas	Má digestão; cólicas leves	Chá (infusão)	Sim
Camomila	Inflorescências	Queixas digestivas leves; resfriado; pele; boca e garganta	Chá, inalação, compressa, bochecho	Sim
Capim-limão	Folhas	Cólica menstrual e intestinal leve; ansiedade e insônia leves	Chá (infusão)	Sim
Espinheira-santa	Folhas	Azia e má digestão	Chá (decoção ou infusão), cápsulas	Sim
Calêndula	Flores	Inflamações de boca, garganta e pele; ferimentos leves	Compressa, bochecho, creme	Sim
Gengibre	Rizoma	Enjoo de movimento; má digestão	Chá, cápsulas	Sim
Manjerição	Folhas	Uso culinário; uso popular digestivo	Tempero; chá popular	Não
Tanchagem	Folhas	Inflamações da boca (anti-inflamatório e antisséptico)	Bochecho, gargarejo	Sim
Vinagreira	Cálices	Bebida; pequena redução da pressão em estudos	Chá dos cálices	Não

Tabela 2 — Como preparar: quantidades e frequência (doses oficiais para adultos, ANVISA)

Planta	Quantidade (planta seca; gel na babosa)	Preparo	Frequência (adulto)
Boldo-brasileiro	1 a 3 g / 150 mL	Infusão, 20 min	150 mL, 2 a 3x ao dia; máximo 30 dias
Melissa	1,5 a 4,5 g / 150 mL	Infusão, 5 a 10 min	150 mL, até 3x ao dia
Erva-cidreira-brasileira	0,4 a 0,6 g / 150 mL	Infusão, 5 min	150 mL, 2 a 3x ao dia
Hortelã-pimenta	1,5 a 3 g / 100 a 150 mL	Infusão, 5 a 10 min	3x ao dia
Alecrim	1 a 2 g / 150 a 250 mL	Infusão	150 a 250 mL, 2 a 3x ao dia, entre as refeições
Camomila	1,5 a 4 g / 150 mL	Infusão, 5 a 10 min	3 a 4x ao dia
Capim-limão	1 a 3 g / 150 mL	Infusão, 5 a 10 min	150 mL, 3 a 4x ao dia
Espinheira-santa	1 a 2 g / 150 mL	Decocção 5 min + 15 min	150 mL, 2 a 4x ao dia; máximo 6 meses
Calêndula	1 a 2 g / 150 mL	Infusão	Compressas ou bochechos, 2 a 4x ao dia (uso externo)
Gengibre	0,3 a 3 g	Infusão ou decocção, 5 min	3 a 4x ao dia (má digestão)
Tanchagem	2 a 6 g / 150 mL	Infusão	Bochechos e gargarejos (não engolir)
Babosa	10 a 70 g de gel / 100 g	Gel	Na pele, 1 a 3x ao dia

Tabela 3 — Quem não deve usar: contraindicações, idade mínima e interações

Planta	Gestação e lactação	Idade mínima	Principais cuidados e interações
Babosa	Contraindicado	18 anos	Não ingerir; dermatite de contato
Boldo-brasileiro	Contraindicado	18 anos	Hipertensão, hepatite, obstrução biliar; anti-hipertensivos, digoxina, metronidazol
Melissa	Contraindicado	12 anos	Hipotireoidismo, glaucoma, próstata; sonolência (não dirigir)
Erva-cidreira-brasileira	Contraindicado	18 anos	Pressão baixa, gastrite, úlcera; sedativos, paracetamol
Hortelã-pimenta	Contraindicado	4 anos	Refluxo, cálculos biliares e renais; nifedipino, ciclosporina, ferro
Alecrim	Contraindicado	12 anos	Doenças biliares e hepáticas, epilepsia, hipertensão
Camomila	Uso externo permitido	6 meses (oral)	Alergia a Asteraceae; anticoagulantes
Capim-limão	Contraindicado	18 anos	Doenças cardíacas, renais, hepáticas; depressores do SNC
Espinheira-santa	Contraindicado (reduz o leite)	18 anos	Polimedicados; metotrexato, amiodarona, imunossupressores
Calêndula	Contraindicado	6 anos (pele)	Alergia a Asteraceae
Gengibre	Contraindicado	6 anos (cápsulas)	Cálculos biliares, gastrite, hipertensão; anticoagulantes; cirurgias
Tanchagem	Contraindicado	18 anos	Pressão baixa, obstrução intestinal; intervalo de 3 h de outros medicamentos
Manjerição (sem monografia)	Evitar uso medicinal	—	Estragol em óleo essencial e extratos concentrados
Vinagreira (sem monografia)	Evitar	—	Anti-hipertensivos e diuréticos; pressão baixa

Tabela 4 — Nomes populares que confundem

Nome popular	Pode ser...	Como diferenciar
Erva-cidreira	Melissa (<i>Melissa officinalis</i>), lípia (<i>Lippia alba</i>) ou capim-limão (<i>Cymbopogon citratus</i>)	Erva baixa de folhas macias; arbusto de ramos longos; capim de folhas longas
Boldo	Boldo-brasileiro (<i>Plectranthus barbatus</i>), boldo-miúdo (<i>P. ornatus</i>) ou boldo-do-chile (<i>Peumus boldus</i>)	Folhas grossas e aveludadas; folhas pequenas e rasteiras; árvore do Chile (folha seca e dura)
Hibisco	Vinagreira (<i>Hibiscus sabdariffa</i>) ou hibisco de jardim (<i>H. rosa-sinensis</i>)	Chá vem dos cálices vermelhos da vinagreira, não das pétalas do hibisco ornamental
Espinheira-santa	<i>Monteverdia ilicifolia</i> ou falsa-espinheira-santa (<i>Sorocea bonplandii</i>)	A falsa solta látex branco ao quebrar a folha
Camomila	Camomila-alemã (<i>Matricaria chamomilla</i>) ou falsas camomilas	Receptáculo oco na camomila verdadeira
Alecrim	Alecrim de cozinha (<i>Salvia rosmarinus</i>), alecrim-do-campo (<i>Baccharis dracunculifolia</i>) ou alecrim-pimenta (<i>Lippia sidoides</i>)	Folhas em agulha com cheiro resinoso; arbusto nativo; cheiro picante
Capim-limão	Capim-limão (<i>C. citratus</i>) ou citronela (<i>C. nardus</i> , <i>C. winterianus</i>)	Citronela tem cheiro de repelente e não é usada em chás

Chave de identificação visual das 14 plantas

Chave simplificada para reconhecer as plantas deste guia pela aparência: escolha, em cada passo, a alternativa que corresponde à planta observada. Em caso de dúvida, confirme a identificação com um especialista antes de usar a planta.

1a. Folhas longas, estreitas, com nervuras paralelas → **2**

1b. Folhas com nervura central e ramificações (ou nervuras curvas) → **3**

2a. Capim em touceira, folhas cortantes com cheiro de limão → **Capim-limão**

2b. Folhas em duas fileiras sobre falsos caules; rizoma picante em forma de mão → **Gengibre**

3a. Roseta de folhas muito grossas, suculentas, com gel e margem espinhosa → **Babosa**

3b. Roseta rente ao chão com folhas largas de 5 a 9 nervuras paralelas em arco e espigas finas → **Tanchagem**

3c. Folhas coriáceas, brilhantes, com dentes espinhosos (tipo azevinho); arbusto ou árvoreta → **Espinheira-santa**

3d. Folhas em agulha, duras, verde-escuras em cima e brancas embaixo, cheiro resinoso → **Alecrim**

3e. Folhas finamente recortadas, como fios; pequenas flores brancas com miolo amarelo em cone → **Camomila**

3f. Flores grandes amarelas ou laranja; planta pegajosa → **Calêndula**

3g. Arbusto de caules avermelhados, folhas superiores com 3 a 5 lobos, cálices vermelhos carnosos → **Vinagreira**

3h. Caule quadrangular e folhas opostas (família das hortelãs) → **4**

3i. Arbusto de ramos longos, finos e arqueados, folhas ásperas com cheiro de limão, flores lilás → **Erva-cidreira-brasileira (lípia)**

4a. Folhas grossas, carnosas, aveludadas, muito amargas → **Boldo-brasileiro**

4b. Folhas rugosas com margem de dentes arredondados e cheiro de limão → **Melissa**

4c. Folhas lisas e brilhantes com aroma doce; flores em anéis em espigas → **Manjerição**

4d. Folhas serradas com cheiro de menta; planta que se espalha por estolões → **Hortelã**

Referências

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira*. 2. ed. Brasília: ANVISA, 2021 (versão com as alterações da RDC nº 952 e 2ª errata). Fonte das indicações, fórmulas, doses, advertências e modos de usar das plantas com monografia.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos*. Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC)*. Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *RENISUS — Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS*. Brasília, 2009.
- LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. *Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas*. 2. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008.
- MATOS, F. J. A. *Farmácias vivas: sistema de utilização de plantas medicinais projetado para pequenas comunidades*. 4. ed. Fortaleza: Editora UFC, 2002.
- SIMÕES, C. M. O. et al. (org.). *Farmacognosia: do produto natural ao medicamento*. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Monografias da União Europeia sobre *Matricaria recutita*, *Melissa officinalis*, *Mentha × piperita*, *Rosmarinus officinalis*, *Calendula officinalis* e *Zingiber officinale*; e declaração pública sobre produtos medicinais contendo estragol.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *WHO monographs on selected medicinal plants*. Geneva: WHO, v. 1 a 4, 1999–2009.
- INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). *Some drugs and herbal products*. IARC Monographs, v. 108. Lyon: IARC, 2016 (avaliação do extrato da folha inteira de *Aloe vera*).
- SERBAN, C. et al. Effect of sour tea (*Hibiscus sabdariffa* L.) on arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Hypertension*, v. 33, n. 6, p. 1119-1127, 2015.
- DREW, B. T. et al. *Salvia* united: the greatest good for the greatest number. *Taxon*, v. 66, n. 1, p. 133-145, 2017 (transferência do alecrim para o gênero *Salvia*).
- iNATURALIST. Observações de plantas com fotos sob licenças abertas (CC0, CC BY, CC BY-NC), usadas no treinamento do modelo de identificação. Disponível em: <https://www.inaturalist.org>.