

# Tutorium: Diskrete Mathematik

Lineare Gleichungssysteme

# Steven Köhler

mathe@stevenkoehler.de

mathe.stevenkoehler.de

# Definition

---

Als lineare Gleichungssysteme bezeichnet man in der linearen Algebra Gleichungssysteme der folgenden Art:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

Das Gleichungssystem besteht dabei aus  $m$  Gleichungen mit  $n$  Unbekannten.

# Darstellungsformen I

---

Es existieren verschiedene Darstellungsformen für lineare Gleichungssysteme:

- die *explizite Form*;
- die *Matrixform*;
- die *Spaltenform* (oder auch *Vektorform*).

# Darstellungsformen II

---

## Die explizite Form

Bei dieser Form wird das Gleichungssystem als eine Menge von  $m$  separaten Gleichungen mit  $n$  Unbekannten angegeben.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

# Darstellungsformen III

---

## Die Matrixform

Bei dieser Form wird das Gleichungssystem als Produkt einer Koeffizientenmatrix  $A$ , einem Spaltenvektor  $x$  mit den Unbekannten sowie einem Lösungsvektor  $b$  angegeben.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Die Gleichung lässt sich auch in der folgenden kompakten Form schreiben:

$$Ax = b.$$

# Darstellungsformen IV

---

## Die Spaltenform

Bei dieser Form wird das Gleichungssystem als Summe der Produkte der Unbekannten mit den Spaltenvektoren der Matrix  $A$  sowie einem Lösungsvektor  $b$  angegeben:

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Verwendet man für die Spalten die Schreibweise  $a_i$ , so ergibt sich die folgende kompakte Schreibweise:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b.$$

# Gauß-Verfahren I

---

Das *Gauß-Verfahren* bietet eine einfache Möglichkeit, lineare Gleichungssysteme zu lösen. Es basiert auf der Matrixform des Gleichungssystems.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$



## Gauß-Verfahren II

---

Für die Lösung des Gleichungssystems  $Ax = b$  sind nur die Koeffizientenmatrix  $A$  sowie der Lösungsvektor  $b$  von Interesse.

Diese fasst man in der sogenannten *erweiterten Koeffizientenmatrix* zusammen:

$$\left[ A | b \right] = \left[ \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right].$$

## Gauß-Verfahren III

---

Das Gauß-Verfahren basiert auf der Grundidee, zunächst die erweiterte Koeffizientenmatrix durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform zu überführen und anschließend durch Rückwärtseinsetzen schrittweise die Lösung zu bestimmen.

**Wichtig:** Durch elementare Spaltenumformungen kann sehr leicht die Lösungsmenge des Gleichungssystems verändert werden. Aus diesem Grund sind diese beim Lösen linearer Gleichungssysteme mit dem Gauß(-Jordan)-Verfahren **verboten!**

## Gauß-Verfahren IV

---

### Aufgabe

Löse das folgende Gleichungssystem mit dem Gauß-Verfahren!

$$2x_1 + 4x_2 = 22$$

$$3x_1 - 2x_2 = -7$$

### Lösung

Zunächst wird die erweiterte Koeffizientenmatrix erstellt und schrittweise in Zeilenstufenform gebracht.

$$\left[ A|b \right] = \left[ \begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 22 \\ 3 & -2 & -7 \end{array} \right]$$

## Gauß-Verfahren V

---

Multiplikation der ersten Zeile mit  $\frac{1}{2}$  ergibt

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 11 \\ 3 & -2 & -7 \end{array} \right].$$

Anschließend wird durch Addition des  $(-3)$ -fachen der ersten Zeile zur zweiten die erste Spalte in die richtige Form gebracht:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 11 \\ 0 & -8 & -40 \end{array} \right].$$

Multiplikation der zweiten Zeile mit  $-\frac{1}{8}$  stellt die gewünschte Zeilenstufenform her:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 11 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right].$$

## Gauß-Verfahren VI

---

Zur Erinnerung: Die Darstellung durch die erweiterte Koeffizientenmatrix ist lediglich eine andere Schreibweise für das Gleichungssystem, das nach den Umformungen wie folgt lautet:

$$x_1 + 2x_2 = 11$$

$$x_2 = 5.$$

Nun löst man die Gleichungen von unten nach oben auf.  $x_2 = 5$  liegt bereits in der gewünschten Form vor. Setzt man  $x_2$  nun in die obere Gleichung ein, so ergibt sich

$$x_1 + 2 \cdot 5 = 11,$$

woraus sofort  $x_1 = 1$  folgt.

## Gauß-Verfahren VII

---

Die einzige Lösung des Gleichungssystems lautet also

$$x_1 = 1 \quad \text{und} \quad x_2 = 5.$$

Man kann dies leicht durch Einsetzen in die Ausgangsgleichungen überprüfen.

# Gauß-Jordan-Verfahren I

---

Beim Gauß-Jordan-Verfahren wird die Matrix in *reduzierte Zeilenstufenform* gebracht, d.h., außer den führenden Einsen enthält die Matrix  $A$  in der erweiterten Koeffizientenmatrix  $[A|b]$  nur Nullen.

Wir hatten beim Gauß-Verfahren die erweiterte Koeffizientenmatrix bereits in Zeilenstufenform gebracht.

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 11 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right].$$

## Gauß-Jordan-Verfahren II

---

Man muss also nur noch durch Addition des  $(-2)$ -fachen der zweiten Zeile zur ersten die zweite Spalte in die richtige Form bringen:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right].$$

Hier kann man nun die Lösungen für  $x_1$  und  $x_2$  ohne weiteres Rechnen direkt ablesen. Es folgt wie erwartet

$$x_1 = 1 \quad \text{und} \quad x_2 = 5.$$



# Anzahl der Lösungen I

---

Ein Gleichungssystem kann keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzen.

# Anzahl der Lösungen II

---

## Eine Lösung

Den Fall genau einer Lösung haben wir bereits bei unserem Beispiel gesehen.

Dieser Fall liegt immer genau dann vor, wenn in der erweiterten Koeffizientenmatrix  $[A|b]$  die Matrix  $A$  nach dem Überführen in Zeilenstufenform genauso viele vom Nullvektor verschiedene Zeilen besitzt wie das Gleichungssystem Variablen hat.

## Anzahl der Lösungen III

---

### Keine Lösung

Es ist möglich, dass ein Gleichungssystem keine Lösung besitzt.

Dies ist immer genau dann der Fall, wenn in der erweiterten Koeffizientenmatrix  $[A|b]$  (nach dem Überführen in Zeilenstufenform) eine Zeile der folgenden Art auftritt:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 0 & \dots & 0 & b \end{array} \right] \quad (\text{mit } b \neq 0).$$

## Anzahl der Lösungen IV

---

Dies würde bedeuten, dass

$$0x_1 + \dots + 0x_n = b \ (\neq 0)$$

gilt, was einen Widerspruch darstellt. Das Gleichungssystem kann folglich keine Lösung besitzen.

# Anzahl der Lösungen V

---

## Aufgabe 1

Bestätige, dass das folgende Gleichungssystem keine Lösung besitzt.

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 7$$

$$-2x_1 - x_2 - 5x_3 = -13$$

# Anzahl der Lösungen VI

---

## Unendlich viele Lösungen

Es ist zudem möglich, dass ein Gleichungssystem unendlich viele Lösungen besitzt.

Dieser Fall liegt immer genau dann vor, wenn in der erweiterten Koeffizientenmatrix  $[A|b]$  (nach dem Überführen in Zeilenstufenform) die Matrix  $A$  weniger vom Nullvektor verschiedene Zeilen besitzt als das Gleichungssystem Variablen hat.

Mit anderen Worten: Es gibt mehr Variablen als Gleichungen.

## Anzahl der Lösungen VII

---

### Aufgabe

Löse das folgende lineare Gleichungssystem.

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 = 22$$

$$3x_1 - 2x_2 - x_3 = -7$$

### Lösung

Auch in diesem Fall wird zunächst die erweiterte Koeffizientenmatrix erstellt und schrittweise in Zeilenstufenform gebracht.

$$\left[ A|b \right] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 22 \\ 3 & -2 & -1 & -7 \end{array} \right]$$

## Anzahl der Lösungen VIII

---

Multiplikation der ersten Zeile mit  $\frac{1}{2}$  ergibt

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 11 \\ 3 & -2 & -1 & -7 \end{array} \right].$$

Anschließend wird durch Addition des  $(-3)$ -fachen der ersten Zeile zur zweiten die erste Spalte in die richtige Form gebracht:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 11 \\ 0 & -8 & -\frac{5}{2} & -40 \end{array} \right].$$



## Anzahl der Lösungen IX

---

Multiplikation der zweiten Zeile mit  $-\frac{1}{8}$  stellt die gewünschte Zeilenstufenform her:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 11 \\ 0 & 1 & \frac{5}{16} & 5 \end{array} \right].$$

Die Spalten mit den führenden Einsen repräsentieren die *führenden Variablen*, die restlichen Spalten stellen die *freien Variablen* dar.

## Anzahl der Lösungen X

---

Um die Lösung zu erhalten, weist man den freien Variablen Parameter zu. In unserem Beispiel ist

$$x_3 = t \quad (t \in \mathbb{R})$$

die einzige freie Variable.

Die führenden Variablen rechnet man wie gewohnt durch Rückwärtseinsetzen aus. Für die zweite Zeile der Matrix ergibt sich somit

$$x_2 + \frac{5}{16} x_3 = 5$$
$$x_2 = 5 - \frac{5}{16} t \quad (t \in \mathbb{R}).$$

## Anzahl der Lösungen XI

---

Um  $x_1$  zu berechnen, setzt man nun  $x_2$  und  $x_3$  in die erste Zeile ein. Es folgt

$$x_1 + 2x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 11.$$

Umstellen nach  $x_1$  ergibt

$$\begin{aligned} x_1 &= 11 - 2 \cdot \left(5 - \frac{5}{16} t\right) - \frac{1}{2} t \\ &= 1 + \frac{1}{8} t \quad (t \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

## Anzahl der Lösungen XII

---

Als Gesamtlösung haben wir also Folgendes erhalten ( $t \in \mathbb{R}$ ):

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 + \frac{1}{8} t \\x_2 &= 5 - \frac{5}{16} t \\x_3 &= t\end{aligned}$$

## Anzahl der Lösungen XIII

---

Wir können die Lösung auch wie folgt darstellen:

$$\begin{aligned} x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 + \frac{1}{8}t \\ 5 - \frac{5}{16}t \\ t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{8}t \\ -\frac{5}{16}t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ -\frac{5}{16} \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Man nennt dies die *Parameterform der Lösung*.

# Aufgaben I

---

## Aufgabe 2

Bestimme die Lösungen der folgenden Gleichungssysteme.  
Gib die Lösungen ggf. in Parameterform an.

$$\begin{aligned} a) \quad 2x_1 - x_2 &= -1 \\ x_1 + 3x_2 &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad 5x_1 - x_2 &= -2 \\ 8x_1 - \frac{8}{5}x_2 &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad 2x_1 - x_2 &= 3 \\ -x_1 + \frac{1}{2}x_2 &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

## Aufgaben II

---

### Aufgabe 3

Wir gehen davon aus, dass die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems durch elementare Zeilenumformungen auf die folgende Zeilenstufenform gebracht wurde:

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right].$$

Bestimme die Lösung dieses Gleichungssystems. Gib die Lösung in Parameterdarstellung an und deute das Ergebnis geometrisch.

## Aufgaben III

---

### Aufgabe 4

Bestimme die Lösung des folgenden linearen Gleichungssystems. Gib die Lösung in Parameterform an.

$$-x_1 - 2x_2 - 3x_4 + x_6 = -2$$

$$-x_1 + 2x_3 - x_4 + 10x_5 - x_6 = -2$$

$$-x_1 + 2x_3 - x_4 + 11x_5 + x_6 = -1$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 + 5x_4 - 2x_5 + 5x_6 = 7$$



## Aufgaben IV

---

### Aufgabe 5

Bestimme mit Hilfe des Gauß- oder Gauß-Jordan-Verfahrens die Koordinatenform der Ebene, die durch die Punkte  $A = (1, 1, 2)$ ,  $B = (3, 4, -1)$  und  $C = (4, 3, 1)$  gegeben ist.

Überprüfe anschließend, ob der Punkt  $D = (1, 2, 3)$  in der durch  $A$ ,  $B$  und  $C$  beschriebenen Ebene liegt oder nicht.

# LGS & inverse Matrizen I

---

Hat ein lineares Gleichungssystem eine eindeutige Lösung, so lässt sich dieses auch mit Hilfe der Inversen der Koeffizientenmatrix  $A$  berechnen. Es gilt

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ \Rightarrow x &= A^{-1}b. \end{aligned}$$

# LGS & inverse Matrizen II

---

## Aufgabe V-6

Überprüfe dies anhand des Gleichungssystems aus Aufgabe V-2a.

$$2x_1 - x_2 = -1$$

$$x_1 + 3x_2 = 10$$