

Mathematik I für Studierende der Informatik (Diskrete Mathematik)

Thomas Andreae, Christoph Stephan

Wintersemester 2011/12

Blatt 5

A: Präsenzaufgaben am 17./18. November 2011

1. Es sei $A = \{a, b, c, d, e\}$. Wir betrachten die folgende Relation R auf A :

$$R = \{(a, b), (a, c), (a, d), (c, d), (c, e), (c, a), (c, c), (d, d), (e, e)\}.$$

- Veranschaulichen Sie R als (gerichteten) Graphen und erläutern Sie anhand dieses Graphen, dass R nicht reflexiv, nicht symmetrisch und auch nicht transitiv ist.
 - Ist R irreflexiv? Antisymmetrisch?
 - Welche weiteren Paare muss man zu R hinzufügen, damit eine transitive Relation entsteht?
 - Nun soll aus R eine Ordnungsrelation auf A entstehen. Machen Sie Vorschläge, wie das geschehen könnte, ohne R allzu sehr zu verändern.
2. Für A wie in Aufgabe 1 betrachten wir nun eine andere Relation auf A :

$$S = \{(a, b), (b, c), (d, e), (a, a), (b, b), (e, e)\}.$$

- Stellen Sie S als Graphen dar! Erreichen Sie durch Hinzunahme möglichst weniger Paare („Pfeile“), dass S zu einer Äquivalenzrelation \tilde{S} auf A wird.
 - Geben Sie die Äquivalenzklassen von \tilde{S} an!
3. a) Auf der Menge \mathbb{Z} sei eine Relation R erklärt durch $(x, y) \in R \Leftrightarrow xy \geq 0$. Ist R eine Äquivalenzrelation?
- b) Auf der Menge $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sei eine Relation S erklärt durch $(x, y) \in S \Leftrightarrow xy > 0$. Ist S eine Äquivalenzrelation?
- c) Falls bei a) oder b) eine Äquivalenzrelation vorliegt, so gebe man die zugehörigen Äquivalenzklassen an.

B: Hausaufgaben zum 24./25. November 2011

1. Es sei $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ und R sei die folgende Relation auf A :

$$R = \{(a, b), (b, c), (c, d), (b, e), (e, f)\}.$$

- Veranschaulichen Sie R als (gerichteten) Graphen und stellen Sie R als 0,1-Matrix dar.
 - Durch Hinzufügen von möglichst wenigen Paaren soll erreicht werden, dass aus R eine Ordnungsrelation R^+ auf A entsteht. Welche Paare muss man hinzufügen?
 - Stellen Sie R^+ durch ein Hasse-Diagramm dar.
 - Wie b), aber diesmal soll eine Äquivalenzrelation auf A entstehen. Geben Sie auch die Klassen dieser Äquivalenzrelation an.
2. Wie Aufgabe 1, jedoch diesmal für folgende Relation auf $A = \{a, b, c, d, e, f\}$:

$$R = \{(a, b), (b, d), (e, f)\}.$$

Hinweis: Beachten Sie, dass das Element c nach wie vor zu A gehört!

3. Es sei $A = \{a, b, c, d\}$. Man gebe – wenn möglich – eine Relation R mit $(a, b) \in R$ an, für die gilt:

- a) R ist reflexiv und symmetrisch, aber nicht transitiv.
- b) R ist reflexiv und transitiv, aber nicht symmetrisch.
- c) R ist symmetrisch und transitiv, aber nicht reflexiv.

Geben Sie R sowohl als Menge von Paaren als auch in der Form eines Graphen an. Geben Sie jeweils auch kurze Begründungen, die zeigen, dass R tatsächlich die geforderten Eigenschaften besitzt.

4. a) Auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ betrachten wir die folgende Relation R („Teilbarkeitsrelation“):

$$R = \{(n, m) : n, m \in A \text{ und } n \mid m\}.$$

Geben Sie die Elemente von R an und stellen Sie R sowohl durch einen Graphen als auch durch ein Hasse-Diagramm dar!

- b) Nun sei A die Potenzmenge der Menge $M = \{1, 2\}$, d.h., $A = \mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Auf der Menge A betrachten wir die folgende Relation R („Inklusion“):

$$R = \{(X, Y) : X, Y \in A \text{ und } X \subseteq Y\}.$$

Stellen Sie R sowohl durch einen Graphen als auch durch ein Hasse-Diagramm dar!

- c) Wie b) für $M = \{1, 2, 3\}$: Geben Sie zunächst die Menge $A = \mathcal{P}(M)$ an; stellen Sie diesmal R nur als Hasse-Diagramm (und nicht als Graphen) dar!