

# Depressive Symptom Inventory-Sucidiality Subscale ; DSI-SS

(한국판 자살사고 척도)

이 설문지는 다양한 질문들로 구성되어 있습니다. 반드시 각 질문에 해당하는 모든 항목을 읽고 질문에 답을 하십시오. **지난 2 주 동안**의 자신의 모습을 가장 잘 설명하는 항목을 골라 표시하시기 바랍니다. 만약 두 개 이상의 항목이 자신에게 적합하다고 생각되는 경우에는 더 큰 숫자의 항목을 고르십시오, 반드시 각 질문에 해당되는 모든 항목을 읽고 대답하시길 바랍니다.

Q1	지난 2주 동안..
0	나는 자살에 대한 생각을 하지 않는다.
1	나는 가끔씩 자살에 대한 생각을 한다.
2	나는 자주 자살에 대한 생각을 한다.
3	나는 항상 자살에 대한 생각을 한다.

Q2	지난 2주 동안..
0	나는 자살에 대한 생각을 하지 않는다.
1	나는 자살에 대한 생각을 하지만, 구체적인 계획을 세우지 않았다.
2	나는 자살에 대한 생각을 하고, 실현 가능한 방법을 생각하고 있다.
3	나는 자살에 대한 생각을 하고 있고, 확실한 방법을 생각해놓았다.

Q3	지난 2주 동안..
0	나는 자살 생각을 하지 않는다.
1	나는 자살 생각을 하지만 이런 생각들을 확실히 통제할 수 있다.
2	나는 자살 생각을 하고 있고, 이런 생각들을 약간 통제할 수 있다.
3	나는 자살 생각을 하고 있고, 이런 생각들을 거의 통제할 수 없다.

Q4	지난 2주 동안..
0	나는 자살 충동이 들지 않는다.
1	나는 가끔씩 자살 충동이 든다.
2	나는 자주 자살 충동이 든다.
3	나는 항상 자살 충동이 든다.