Care Creations™

Beauty Creations



Anasensyl™

Skin tolerance enhancer

Skin Care

본 파일은 번역본이므로 오역이 포함 되어있을 수 있습니다
원본이 필요하신 경우 문의 주시기 바랍니다-동양에프티-

BASF
We create chemistry

남성케어 마켓

남성 케어 마켓은 과거 몇년째 점차 증가하고 있고 있으며, 상당한 경제적 잠재력을 가진 시장 부문이 되었다.

현대인은 자신의 아름다움과 보살핌에 대한 권리를 주장하고 있으며, 다룰 수 있는 더 다양한 방법들을 허용하고 있다. 오늘날 남성들은 자신의 피부 특성에 맞는 제품을 고집한다.

남성의 피부는 여성의 피부보다 본래 더 단단하고 강하다.
그러나 남성의 피부는 많은 일상 스트레스, UV의 노출-외부활동간, 피부에 맞지 않은 화장품 사용 그리고 특히 면도를 할 때에 피부는 고통받는다.

면도를 할 때에는 각질층이 제거된다.
이것은 세포 재생을 촉진시키고, 따라서 비자연적인 방법으로 세포가 노출되게 한다. 더구나 이러한 면도 과정에서 (특히 계면활성제가 피부에 함께 젖어있는 상태에서의 면도) 표면의 지질들은 피부를 부드럽게 하는 용도인데 이 부분들이 쉽게 제거된다.
이 피부 지질들은 중요한 피부장벽의 기능으로써 역할을 한다. 이것은 수분 함량을 보존하는 역할을 한다.

그러므로 남성들이 특히 볼, 턱, 목과 같은 면도 부위에 피부 건조와 매우 민감한 피부에 대해 주로 불평하는 것은 놀라운 일이 아니다.

이 부분들은 과도하게 환경 스트레스에 의해 민감해져 있을 수 있고, 이러한 결과는 국소적이 피부 홍반을 일으킬 수 있고 나아가 찌르는 듯한 통증, 타는듯한 느낌, 가려운 느낌까지 일으킬 수 있다.
이러한 지표들을 이용하여 BASF는 일상스트레스로 부터 피부 저항성을 가지게 하는 타겟원료 엑티브 원료인 Anasensyl™을 개발했다.

Anasensyl™즉각적인 진정 활성을 넘어서 선제적인 활성을 가진다: Anasensyl™의 일일 어플리케이션으로 민감해진 피부 반응을 줄일 수 있습니다. Anasensyl™은 남성의 피부를 편안하게 하고 진정시켜주며, 주요 일상의 공격에 대한 내성을 향상시켜주거나, 단순히 잘 케어 받고 느낄 권리를 이행합니다.

정의/ 조성비

Anasensyl™ 은 시너지역할을 하는 진정 복합원료 입니다, 이것의 각 성분들은 특정한 염증성 지표들을 선별적으로 제어합니다: 식물에서 추출된 사포노사이드와 플라보노이드는 항염증에 대한 활성과 항부종에 대한 활성을 가지고, 미소순환계의 활성 그리고 전염증 신경 매개 물질들의 합성을 저해합니다. Xanthin와 Zinc salts는 세포 대사를 조절합니다.

Brief Overview: Anasensyl™ LS 9322



INCI: Mannitol (and) Ammonium Glycyrrhizate (and) Caffeine (and) Zinc Gluconate (and) Aesculus Hippocastanum Seed Extract

China registration: INCI name is listed in “Inventory of Existing Cosmetic Ingredient in China 2015” (IECIC 2015). CAS number is listed (or exempted) in “Inventory of Existing Chemical Substances in China 2013” (IECSC 2013).

Appearance: White powder with a weak characteristic odor.

Preservative: None

Recommended dosage: 1 %

Mode of incorporation: Anasensyl™ is incorporated into the aqueous phase of the cosmetic product at 70°C. Suitable pH 6 to 8.

Origin과 Anasensyl™의 활성

Components	Origin	Activity
Flavonoid	*Horse Chesnut* (*Aesculus hippocastanum L.*)	**Decongestive** and **local anti-inflammatory**
Saponoside	*Liquorice* (*Glycyrrhiza glabra*)	**Corticoid like effect** Strengthens the peripheral micro-vascular tonicity
Caffeine	Synthesis	**Inhibition** of **phosphodiesterases** of cyclic nucleotides
Zinc gluconate	Botanical	**Active oligo-element** for keratinocyte and fibroblast metabolism

피부 이점

Anasensyl™ 은 예민한 남성 피부에 전체적인 해결법을 줍니다:

- 일상생활 스트레스에 대한 진정효과

  (UV, 면도, 피부에 맞지 않는 케어제품….)
- 극도로 예민한 남성피부에 대한 장기 효과 확인 : 피부저항력 증가
- 항염 효과
- 보호 효과

효능

항염 효과 (*in vitro* test)


목표

UVB 조사에 의해 비교된 인각각질세포에 대한 Anasensyl™의 항염증 용량 입증
비교 항염증 제품인 아스피린

시험방법

사람의 각질세포를 Anasensyl ™ 또는 Aspirin ™의 농도를 포함한체로 배양함 (참고문헌) 그리고 UVB를 조사. 염증 물질들의 분비를 측정: LDH (Lactate DeHydrogenase), PGE2(ProstaGlandin E-2) 그리고 IL-1α (Inter-Leukin-1α).

결과



결론


Anasensyl ™은 UVB에 노출된 후 염증인자들을 상당히 감소시켰고, Aspirin ™의 활성과 유의하였다.

자극억제 효과 (*in vitro* test)


목표

Anasensyl™이 화장품에 사용되는 AHA(malic acid)나 SDS(Sodium dodecyl suphate) 같은 일반적으로 피부세포에 자극을 일으키는 물질들로부터의 자극을 보호함을 설명하기 위함

시험방법



결과



결과

시험 결과는 Malic acid와 SDS가 피부 염증을 일으키는 LDH 와 IL-1α의 분비 과정을 일으킨다고 보여진다.

0.1 % Anasensyl™ 은 malic acid 와 SDS가 일으키는 자극을 상당히 감소시켰다. 이것은 좋은 자극완화 활성 능력을 가지고있다.

민감성 피부에 대한 진정효과/ 캡사이신 자극 테스트 (clinical test)

목표

Anasensyl™의 홍반 완화 효과 및 진정효과를 설명하기 위함


시험방법


캡사이신에 대해서 민감한 10 명의 피험자에 시험 하였고, 이 캡사이신은 자극과 홍반을 일으킴. 첫번째, 피험자들은 아래 세가지 제품 중 한 가지를 턱에 바름

- Placebo Cream
- 1% 상업용제품 물질이 포함된 크림 (민감성 피부에 진정효과가 다는 소구를 하는 상업용 제품)
- 1% Anasensyl™ 크림 , 반대쪽 턱은 Control 로 이용

그리고 턱의 같은 부위에 캡사이신 제형을 처리한 30분 후

결과





결과

따끔한 느낌의 강도는 semi-quantitative scale로 측정, 홍반의 강도는 시각적 평가에 의해 평가되었습니다.

1 % Anasensyl™ 은 Placebo와 대조물질 대비 강한 자극완화 효과와 홍반 완화 효과를 가진다.

결과

Anasensyl™은 신경학적으로 염증 반응을 감소시킴. 진정효과는 최종 사용자가 느끼고, 인지할 것입니다.

면도 후 홍반 억제 효과
(clinical test)

목표

1% Anasensyl™ 이 포함된 밤 제형을 면도 후에 처리했을 때 남성 피험자들의 Placebo대비 붉은기 완화 효과에 대해 설명하기 위함


시험방법

시험은 얼굴 쪽 면도를 하고 나서 홍반과 자극이 있는 건강한 28명의 피험자들을 대상으로 실시함. 무작위 단일 제형을 매일 아침 면도 후에 2주간 시험. 한쪽은 면도 후 밤을 바른쪽 남은 턱에 Placebo처리.

1% Anasensyl™이 포함된 면도 후 밤제형을 처리. 1부터 9까지의 반정량적 척도에 따른 홍조 영역 및 강도에 대한 미용사의 시각적 주관적 평가:

- 첫 번째 면도 후 시술 전
- 7 일 및 14 일 시 술 후 : T0 = 제 품 적 용 전 면 도 후 5 분
- T15 = 제품 적용 후 15분

결과



결론

Anasensyl™ 1% 함유 애프터 쉐이브 밤은 면도 후 피부 홍조를 현저하게 감소시켰습니다. 이러한 효과는 제형 갯수에 따라 개선됩니다. Anasensyl™ 은 남성 피부에 좋은 홍조 방지 활성을 가지고 있습니다. 즉각적인 진정 활동 이상으로 Anasensyl™이 피부의 내성을 높이고 일상 스트레스에 대한 반응성을 감소시키는 능력을 입증했습니다.

Publisher
BASF Beauty Care Solutions France SAS
3, Rue de Seichamps - 54425 Pulnoy (France)
Email: bcs-europe@basf.com www.carecreations.basf.com

© BASF Beauty Care Solutions France SAS.
All rights reserved.
®/™ Registered trademark / trademark of BASF in several countries
Edition August 2016

Although all statements and information in this publication are believed to be accurate and reliable, they are presented gratis and for guidance only, and risks and liability for results obtained by use of the products or application of the suggestions described are assumed by the user. SELLER MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, BY FACT OR LAW, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Statements or suggestions concerning possible use of the products are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement and are not recommendations to infringe any patent. The user should not assume that toxicity data and safety measures are indicated or that other measures may not be required. The claims and supporting data provided in this publication have not been evaluated for compliance with any jurisdiction's regulatory requirements and the results reported may not be generally true under other conditions or in other matrices. Users must evaluate what claims and information are appropriate and comply with a jurisdiction's regulatory requirements. Recipient of this publication agrees to (1) indemnify and hold harmless each entity of the BASF organization for any and all regulatory action arising from recipient's use of any claims or information in this publication, including, but not limited to, use in advertising and finished product label claims, and (2) not present this publication as evidence of finished product claim substantiation to any regulatory authority.