
MCBM022-23 Introdução aos Processos Estocásticos professor.ufabc.edu.br/~jair.donadelli/estocastico

Jair Donadelli

2025-3

Programa

- Cadeias de Markov
- Processos de Poisson
- Martingais
- Movimento browniano




2 provas + substitutiva + exame

Não reprovo por falta com conceito C ou maior


RECOMENDAÇÃO: Álgebra Linear; Cálculo de Probabilidade




Processo Determinístico




Processo Estocástico ou Processo Aleatório



Processo Estocástico ou Processo Aleatório



Processo Estocástico ou Processo Aleatório





$$-n \le S_n \le n$$





TCL


Distribuição Normal Padrão N(0,1)












Page rank

Como o Google decide qual página deve aparecer primeiro quando você faz uma busca?

Um Exemplo de Web Simples



Grafo dirigido com 4 páginas: 1, 2, 3, 4

Matriz de Transição

$$P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- linha representa uma página atual
- coluna representa uma página destino.

$$P_{ij} = \text{Prob } i \to j$$

• A soma de cada linha é 1: matriz estocástica.



Transições em 2 passos: P^2

Significado de P^2

$$(P^2)_{ij} = \text{Prob } i \to \cdot \to j$$


• Cada entrada de P^2 representa a probabilidade de ir do estado i para o estado j em dois passos.

$$(P^2)_{ij} = \sum_k P_{ik} P_{kj}$$



Exemplo com a matriz P


$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



• Qual a probabilidade de ir do 1 para o 4 em dois passos?

Exemplo com a matriz P

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



- Qual a probabilidade de ir do 1 para o 4 em **dois** passos?
- Caminhos possíveis:
 - $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$: $1/2 \cdot 1/3 = 1/6$
 - $1 \to 3 \to 4$: $1/2 \cdot 1/2 = 1/4$
- Probabilidade $1/6 + 1/4 = 5/12 \approx 0.416667$

Em 2 passos

$$P^{2} = \begin{bmatrix} 0.416667 & 0 & 0.166667 & 0.416667 \\ 0.333333 & 0.333333 & 0.166667 & 0.166667 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 & 0 \\ 0.166667 & 0.25 & 0.416667 & 0.166667 \end{bmatrix}$$

Em 5 passos

$$P^{5} = \begin{bmatrix} 0.326389 & 0.263889 & 0.204861 & 0.204861 \\ 0.300926 & 0.270833 & 0.238426 & 0.189815 \\ 0.284722 & 0.260417 & 0.263889 & 0.190972 \\ 0.302083 & 0.211806 & 0.253472 & 0.232639 \end{bmatrix}$$

Em 10 passos

$$P^{10} = \begin{bmatrix} 0.306154 & 0.254340 & 0.235770 & 0.203736 \\ 0.304945 & 0.255056 & 0.237252 & 0.202747 \\ 0.304121 & 0.254835 & 0.238462 & 0.202582 \\ 0.304780 & 0.252363 & 0.238241 & 0.204616 \end{bmatrix}$$

Em 20 passos

$$P^{20} = \begin{bmatrix} 0.305087 & 0.254236 & 0.237285 & 0.203392 \\ 0.305085 & 0.254239 & 0.237288 & 0.203388 \\ 0.305083 & 0.254240 & 0.237290 & 0.203387 \\ 0.305083 & 0.254234 & 0.237291 & 0.203392 \end{bmatrix}$$

Em 50 passos

$$P^{50} = \begin{bmatrix} 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \end{bmatrix}$$


Em 51 passos

$$P^{51} = \begin{bmatrix} 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \end{bmatrix}$$

Em 52 passos

$$P^{52} = \begin{bmatrix} 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \\ 0.305085 & 0.254237 & 0.237288 & 0.203390 \end{bmatrix}$$

Distribuição Estacionária - Resultado



Frequência de visita a cada página após 10.000 passos.

Simulando o "robô" do Google

$$\boldsymbol{\pi}^{(0)} = \left[\pi_1^{(0)}, \pi_2^{(0)}, \pi_3^{(0)}, \pi_4^{(0)}\right], \quad \text{ com } \pi_j^{(0)} \in [0, 1], \quad \sum_i \pi_j^{(0)} = 1$$

- O robô começa na página *i* com probabilidade $\pi_i^{(0)}$.
- A cada passo, segue um link aleatório.
- Após muitos passos, a proporção de visitas a cada página se estabiliza $\pi^{(0)}, \pi^{(1)}, \ldots, \pi^{(n)} \xrightarrow[n \to \infty]{} \pi.$

Distribuição estacionária

$$\pi P = \pi \quad \text{com} \quad \sum \pi_i = 1$$



Álgebra Linear

 π tal que $\pi P = \pi$ é um problema de autovalor da matriz P.