


tcb@cnt@teorema.4.11

tcb@cnt@teorema.4.11

NOTAS DE AULA

ALGORITMOS PROBABILÍSTICOS



MCZA035-17 ALGORITMO PROBABILÍSTICOS (Q3 2026)

PROF.: JAIR DONADELLI

<http://professor.ufabc.edu.br/~jair.donadelli/alprob>

Sumário

1	Noções de probabilidade	5
1.1	Convenções notacionais	7
1.2	Probabilidade discreta	8
1.3	Probabilidade condicional	11
1.4	Um gerador de números aleatórios	22
2	Variáveis aleatórias discretas	27
2.1	Distribuição	28
2.2	Valor esperado de uma variável aleatória discreta	31
2.3	Propriedades da esperança	42
2.4	Variáveis contínuas, a Uniforme e simulação	48
3	Quicksort probabilístico	57
3.1	Dominação estocástica	59
3.2	Análise do <i>quicksort</i> probabilístico	65
3.3	Esperança condicional	68
3.4	Desigualdade de Markov	71
3.5	Desigualdade de Chebyshev	73
3.6	Exercícios	75
4	Desigualdade de Chernoff–Hoeffding	87
4.1	O método de Chernoff	87
4.2	Momentos e função geradora de momentos	88
4.3	Somas de variáveis aleatórias uniformes	90
4.4	A desigualdade de Hoeffding	92
4.5	Soma de variáveis aleatórias Bernoulli não identicamente distribuídas	95
4.6	Soma de variáveis aleatórias geométricas	100
4.7	Amplificação de probabilidade em algoritmos de Monte Carlo	101
4.8	<i>Quicksort</i>	103
4.9	Exercícios	106
4.10	<i>Skip list</i>	108
4.11	Exercícios	115

A	Sobre convergência de séries	117
A.1	Sequências e séries	117
B	Desigualdades	119
C	Resolução dos exercícios	121
	Referências Bibliográficas	135

Notação

1. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ denota o conjunto dos números naturais; $\mathbb{Z}$ denota o conjunto dos números inteiros e $\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, \dots\}$ os inteiros positivos; $\mathbb{R}$ denota o conjunto dos números reais.
2. “:=” tem o significado de “é definido igual a”.
3. O conjunto de todos os subconjuntos de B com cardinalidade k é denotado $\binom{B}{k}$.
O conjunto de todos os subconjuntos de B , ou seja, o *conjunto das partes* de B , é denotado por 2^B .
Se A e B são conjuntos então B^A é o *conjunto de todas as funções de A em B* .
 $\overline{A}$ para o *complemento* $\Omega \setminus A$.
4. $\ln$ é a função logaritmo natural, ou seja, logaritmo na base $e = 2,71\dots$. Em base a , usamos $\log_a$ e omitimos a no caso $a = 2$.
5. Usamos $\sum_{i \geq 1}$ com o mesmo significado de $\sum_{i=1}^{\infty}$ para séries.
Também, usamos $\bigcup_{i \geq 1}$ tanto quanto $\bigcup_{i=1}^{\infty}$ para operações sobre conjuntos.

Disclaimer

Estas notas podem conter erro, esteja atento e leia-as criticamente.

O objetivo destas notas é, além de apresentar o conteúdo das aulas, complementá-los. Não só, mas principalmente, muitas dos detalhes técnicos e dos cálculos de probabilidades são rascunhados em sala e detalhados aqui.

1

Noções de probabilidade

Intuitivamente, uma medida de probabilidade é uma forma quantitativa de expressar a chance de ocorrência de eventos associados a um experimento aleatório, cujos resultados não podem ser previamente determinados. A teoria da probabilidade é a área da matemática dedicada à modelagem e ao estudo rigoroso desses fenômenos sob condições de incerteza.

Uma medida de probabilidade $\mathbb{P}$ é definida sobre uma família $\mathcal{E}$ de subconjuntos de Ω , os eventos aleatórios, que deve satisfazer:

- (i) $\Omega \in \mathcal{E}$;
- (ii) se $A \in \mathcal{E}$ então $\overline{A} \in \mathcal{E}$;
- (iii) se $A_i \in \mathcal{E}$ para todo $i \geq 1$, então $\bigcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{E}$.

Uma família de subconjuntos que satisfaz essas propriedades é chamada de *σ -álgebra de subconjuntos de Ω* .

Um *espaço de probabilidade*, ou um modelo probabilístico, é uma terna $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ tal que Ω é um conjunto não vazio, chamado *espaço amostral*; $\mathcal{E}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de Ω ; e $\mathbb{P}: \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$ é uma *medida de probabilidade*, que atribui a cada evento aleatório um número real satisfazendo

Neste texto, usaremos os termos *espaço de probabilidade* e *modelo probabilístico* de maneira intercambiável, sem distinção.

Não-negatividade $\mathbb{P}(A) \geq 0$ para todo $A \in \mathcal{E}$.

Normalização $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Aditividade enumerável se $\{A_i \in \mathcal{E} : i \geq 1\}$ é um conjunto enumerável de eventos mutuamente exclusivos, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

O lado esquerdo dessa igualdade não depende de uma enumeração particular dos conjuntos A_i e o mesmo vale para o lado direito.

Proposição 1.1: Propriedades de $\mathbb{P}$

Para uma medida de probabilidade $\mathbb{P}$ sobre um espaço de eventos $\mathcal{E}$ do espaço amostral Ω valem as seguintes propriedades.

1. A probabilidade do *evento impossível* é

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

2. *Aditividade finita*: se $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{E}$ são eventos mutuamente exclusivos então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i). \quad (1.1)$$

3. *A probabilidade do complemento* é

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

para todo evento $A \in \mathcal{E}$.

4. *Monotonicidade*: se $A \subseteq B$, então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Também, $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$.

5. *Regra da adição*: Para quaisquer A, B

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

6. *Subaditividade*: Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são eventos, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i). \quad (1.2)$$

Demonstração. Fazendo $A_1 = \Omega$ e $A_i = \emptyset$ para todo $i \geq 2$ temos, pela aditividade enumerável, que

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots \cup \emptyset \cup \dots) = \mathbb{P}(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset)$$

portanto, pela não-negatividade, resta que $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Agora, definindo $A_i = \emptyset$ para todo $i > n$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \sum_{i>n} \mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

que é o resultado afirmado no item 2.

A probabilidade do complemento segue do item anterior e da normalização. Os detalhes ficam a cargo do leitor.

Para monotonicidade, consideremos A e B eventos tais que $A \subseteq B$. Usamos que B pode ser escrito como a união disjunta $A \cup (B \setminus A)$,

donde $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$ e como $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) \geq 0$ temos $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$. Notemos que, como consequência imediata, temos $\mathbb{P}(A) \leq 1$ para todo evento A .

Finalmente, a união $A \cup B$ pode ser escrita como duas uniões disjuntas $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ donde concluímos que

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B). \quad (1.3)$$

Agora, A pode ser escrito como a união disjunta $(A \setminus B) \cup (A \cap B)$ e, analogamente, $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, portanto $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B)$ assim como $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B)$. Isolando $\mathbb{P}(A \setminus B)$ e $\mathbb{P}(B \setminus A)$ nessas duas igualdades e substituindo na equação (1.3) prova a regra da adição. $\square$

1.1 Convenções notacionais

Sejam A uma descrição de um evento aleatório e A_Ω o subconjunto que o representa em $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$. Denotamos por $\mathbb{P}[A]$ a probabilidade do evento descrito por A , isto é, $\mathbb{P}[A] := \mathbb{P}(A_\Omega)$. Caso haja a necessidade de evidenciar o espaço amostral escreveremos

$$\mathbb{P}_\Omega[A] \quad \text{ou} \quad \mathbb{P}_{\omega \in \Omega}[\text{ocorre } A] \quad \text{ou} \quad \mathbb{P}_{\omega \in \Omega}[\omega \in A] \quad (1.4)$$

com o mesmo sentido, o de $\mathbb{P}(A_\Omega)$.

Por exemplo, no caso em que uma moeda equilibrada é lançada até sair coroa, o evento caracterizado por “o número de lançamentos é par” é definido em $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ por $A_\Omega := \{(c_1, \dots, c_i) : i \text{ é par}\}$ e $\mathbb{P}[\text{número par de lançamentos}]$ denota o mesmo que $\mathbb{P}(A_\Omega)$.

Quando Ω é finito e a menos que seja dada explicitamente outra medida, então a notação na equação (1.4) significa que estamos assumindo a medida de **probabilidade uniforme**: $\mathbb{P}(\omega) = 1/|\Omega|$ para todo $\omega \in \Omega$. Por exemplo, seja $p(x)$ um polinômio não nulo e Ω um conjunto finito de números. A probabilidade de que o sorteio de um elemento de Ω , todos com a mesma probabilidade de ocorrência, resulte numa raiz do polinômio é descrita por

$$\mathbb{P}_{x \in \Omega} [p(x) = 0]$$

que é a probabilidade do evento $R = \{\omega \in \Omega : p(\omega) = 0\}$.

Nos algoritmos assumiremos a possibilidade de se fazer escolhas aleatórias, ou seja, assumiremos que os algoritmos dispõem da instrução

$$a \xleftarrow{\mathbb{R}} \Omega$$

chamada de atribuição por uma **escolha aleatória uniforme** em Ω (finito), o que significa que a assume qualquer um dos elementos de

Ω com igual probabilidade, a saber $1 / |\Omega|$. Por exemplo, a partir de uma fonte de bits aleatórios, a instrução

$$a \stackrel{\mathcal{R}}{\leftarrow} \{0, 1\}$$

denota o fato de que a é uma variável do algoritmo e que após a execução da atribuição $\stackrel{\mathcal{R}}{\leftarrow}$ o valor da variável a é um elemento qualquer de $\{0, 1\}$ com probabilidade $1/2$.

<i>Notação</i>	<i>Eventos</i>	<i>Conjunto</i>
Ω	espaço amostral, evento certo	universo
$\emptyset$	evento impossível	vazio
$\{\omega\}$	evento elementar	conjunto unitário
A	evento	subconjunto
A	ocorre A	$\omega \in A$
$\overline{A}$	não ocorre A	$\omega \notin A$ (complemento)
$A \cap B$	ocorre A e B	$\omega \in A \cap B$ (intersecção)
$A \cup B$	ocorre A ou B	$\omega \in A \cup B$ (união)
$A \setminus B$	ocorre A e não ocorre B	$\omega \in A$ e $\omega \notin B$ (diferença)
$A \triangle B$	ocorre A ou B , não ambos	$\omega \in A \cup B$ e $\omega \notin A \cap B$ (diferença simétrica)
$A \subseteq B$	se ocorre A , então ocorre B	$\omega \in A \Rightarrow \omega \in B$ (inclusão)

Tabela 1.1: pequeno dicionário de termos da probabilidade.

1.2 Probabilidade discreta

Um *modelo probabilístico discreto*, ou *espaço de probabilidade discreto*, é um espaço $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ em que Ω é enumerável (finito ou infinito) e $\mathcal{E} = 2^\Omega$.

Nesse caso, todo experimento tem seu modelo probabilístico especificado quando estabelecemos

1. um espaço amostral enumerável Ω ;
2. uma função $p: \Omega \rightarrow [0, 1]$ tal que $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$, chamada *função massa de probabilidade*.

De fato, dado (Ω, p) como acima, podemos definir uma função $\mathbb{P}$ em 2^Ω tomando

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} p(\omega), \quad A \subseteq \Omega. \quad (1.5)$$

Essa soma está bem definida e $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ para todo $A \subseteq \Omega$. Claramente, $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = 1$. Além disso, se A_i para $i \geq 1$ são eventos mutuamente exclusivos, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Se A é conjunto, 2^A denota o conjunto das partes de A .

segue da convergência absoluta e da exclusão mútua. Portanto, $\mathbb{P}$ é uma medida de probabilidade sobre 2^Ω .

Assim, em um espaço de probabilidade discreto, a função massa de probabilidade determina completamente a medida de probabilidade.

Convencionamos a notação

$$\mathbb{P}(\omega) := \mathbb{P}(\{\omega\})$$

para os eventos elementares.

Exemplo 1.1: Moeda equilibrada

Uma moeda equilibrada é lançada repetidamente até sair coroa. No espaço amostral definimos a função massa de probabilidade

$$p((c_1, c_2, \dots, c_i)) = \begin{cases} 2^{-i} & \text{para } c_j = \text{Ca se } j < i \text{ e } c_i = \text{Co,} \\ 0 & \text{nos outros casos.} \end{cases}$$

Ω e p definem um modelo probabilístico discreto para o experimento.

MONTY HALL

Vejamos um modelo probabilístico para o problema de Monty Hall: o apresentador Monty Hall mostra três portas a um espectador que concorre ao prêmio escondido atrás das portas.

O protocolo é o seguinte: Monty Hall escolhe, ao acaso, uma das portas para esconder um carro; nas outras duas esconde um bode em cada. Na primeira etapa o concorrente escolhe uma porta ao acaso (que ainda não é aberta); em seguida Monty Hall abre uma das outras duas portas que o concorrente não escolheu, sabendo que ela esconde um bode e escolhendo ao acaso se houver mais de uma possibilidade. Com duas portas fechadas apenas e sabendo que o carro está atrás de uma delas, o apresentador oferece ao concorrente a oportunidade de trocar de porta. O concorrente tem que decidir se permanece com a porta que escolheu no início do jogo ou se muda para a outra porta que ainda está fechada. Feita a escolha, o apresentador abre a porta escolhida e o concorrente leva o prêmio escondido pela porta. Qual é a estratégia que maximiza a chance de ganhar o carro?

O experimento consiste das seguintes três etapas

1. o apresentador esconde o carro atrás de uma das portas escolhida com probabilidade $1/3$;
2. com probabilidade $1/3$, uma porta é escolhida pelo jogador;

Monty Hall é o nome do apresentador de um concurso televisivo que era exibido na década de 1970, nos Estados Unidos, chamado *Let's Make a Deal*.

3. o apresentador revela, dentre as duas que o jogador não escolheu, aquela que não esconde o carro. Se houver duas possibilidades então o apresentador escolhe uma delas com probabilidade $1/2$.

Um espaço amostral fica definido pelas ternas (e_1, e_2, e_3) em que e_i é a porta escolhida no passo i descrito acima e, se as portas estão numeradas por 1, 2 e 3, então definimos um modelo probabilístico discreto com Ω dado por

$$\{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (2, 2, 1), (2, 2, 3), (3, 3, 1), (3, 3, 2)\}.$$

e probabilidades de acordo com o diagrama de árvore mostrado na Figura 1.1 abaixo; um caminho seguido pelo jogador numa rodada do jogo corresponde a um caminho na árvore, a partir da raiz (o ponto mais alto) até uma folha (um dos pontos mais baixos). A primeira ramificação corresponde a escolha de porta para esconder o carro, as segundas ramificações correspondem a escolha do jogador e as terceiras ramificações correspondem a escolha de porta para abrir feita pelo apresentador. Os eventos que interessam, a saber “o joga-




Figura 1.1: diagrama de árvore de um modelo para Monty Hall.

dor vence trocando de porta” e “o jogador vence não trocando de porta”, são complementares e denotados por A e $\bar{A}$ respectivamente, de modo que $A = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}$ e $\bar{A}$ é dada pelas ternas restantes de Ω . O jogador ganha o carro trocando de porta com probabilidade

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}) = \frac{2}{3}$$

portanto, ganha sem trocar de porta com probabilidade $1 - 2/3 = 1/3$, que corresponde à probabilidade de ter escolhido a porta certa já na primeira oportunidade de escolha. Portanto, a melhor estratégia é trocar de porta quando é oferecida essa oportunidade pois isso dobra a probabilidade de ganhar o carro.

1.3 Probabilidade condicional

Em um espaço de probabilidade discreto definido por Ω e $\mathbb{P}$, a probabilidade de ocorrência do evento A condicionada à ocorrência o evento E , ou como dizemos a **probabilidade condicional** de A dado E , em que $\mathbb{P}(E) \neq 0$, é definida por

$$\mathbb{P}(A | E) := \frac{\mathbb{P}(A \cap E)}{\mathbb{P}(E)} \quad (1.6)$$

e $\mathbb{P}(A | E)$ é lido como a **probabilidade de A dado E** .

Por exemplo, se Ω é finito com medida de probabilidade uniforme e $E \neq \emptyset$ então

$$\mathbb{P}(A | E) = \frac{\mathbb{P}(A \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{|A \cap E|}{|E|} \quad (1.7)$$

Ideia importante

Considere um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ e um evento com probabilidade positiva $E \in \mathcal{E}$.

$\mathbb{P}_E(A) := \mathbb{P}(A | E)$ é uma medida de probabilidade para os eventos em $\mathcal{E}$ (i.e, satisfaz os axiomas de probabilidade).

Também, $(E, \{A \cap E : A \in \mathcal{E}\}, \mathbb{P}_E)$ é um espaço de probabilidade.

Regra do produto: A igualdade, que decorre da definição,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \cdot \mathbb{P}(B)$$

é consequência direta da definição de probabilidade condicional e é conhecida como **teorema da multiplicação** ou **regra do produto**.

Essa regra é facilmente estendida para calcular $\mathbb{P}(A \cap B \cap C)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B \cap C | A) \\ &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{Q}(B \cap C) \\ &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{Q}(B) \cdot \mathbb{Q}(C | B) \end{aligned}$$

onde $\mathbb{Q}$ é a medida $\mathbb{P}(\cdot | A)$. Mas

$$\mathbb{Q}(C | B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap C | A)}{\mathbb{P}(B | A)} = \frac{\frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(A)}}{\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}} = \mathbb{P}(C | A \cap B)$$

assim

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B | A) \cdot \mathbb{P}(C | A \cap B) \quad (1.8)$$

(identifique o uso dessa regra no modelo probabilístico para o problema de Monty Hall, página 9).

Um caso geral desse teorema é dado abaixo, cuja prova é exercício.

Teorema 1.1: Teorema da multiplicação

Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos de um modelo probabilístico.
Prove que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) &= \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \\ &\quad \mathbb{P}(A_3 \mid A_2 \cap A_1) \cdots \\ &\quad \mathbb{P}(A_n \mid A_{n-1} \cap A_{n-2} \cap \dots \cap A_1) \end{aligned} \quad (1.9)$$

sempre que as probabilidades condicionais estão definidas
(veja que é suficiente pedir que $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$).

A Lei da Probabilidade Total: Se E e A são eventos, com $0 < \mathbb{P}(E) < 1$, então o evento A ocorre se e somente se ocorre $(A \text{ e } E)$ ou $(A \text{ e } \bar{E})$, e esses eventos entre parênteses são disjuntos; mais que isso $\{A \cap E, A \cap \bar{E}\}$ é uma partição de A , portanto,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}((A \cap E) \cup (A \cap \bar{E})) \\ &= \mathbb{P}(A \cap E) + \mathbb{P}(A \cap \bar{E}) \end{aligned} \quad (1.10)$$

$$= \mathbb{P}(A \mid E) \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A \mid \bar{E}) \mathbb{P}(\bar{E}). \quad (1.11)$$

No problema de Monty Hall se o convidado fica com a porta que escolheu inicialmente, então a probabilidade de ganhar um carro é $1/3$, que é a probabilidade dele ter escolhido a porta certa logo de início. Agora, vamos supor que o convidado troca de porta. Nesse caso, denotamos por A o evento “ganha o carro” e por E o evento “a porta escolhida na primeira etapa esconde o carro”. Claramente, $\mathbb{P}(A \mid E) = 0$ e $\mathbb{P}(E) = 1/3$. Se a primeira escolha não era a correta então o convidado ganha o carro, ou seja, $\mathbb{P}(A \mid \bar{E}) = 1$. Com isso temos por (1.11)

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid E) \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A \mid \bar{E}) \mathbb{P}(\bar{E}) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

portanto, é melhor trocar de porta.

O caso geral dessa igualdade é conhecido como o teorema da probabilidade total. Segue da dedução acima e usando indução em n que se $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ é um conjunto de eventos que particionam o espaço amostral Ω com $\mathbb{P}(E_i) > 0$ para todo $i \geq 1$, então vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \mid E_i) \mathbb{P}(E_i) \quad (1.12)$$

para qualquer evento A . Deixamos a prova por conta do leitor do resultado abaixo considerando partições enumeráveis.

Teorema 1.2: Lei da probabilidade total

Seja $\{E_i: i \geq 1\}$ uma partição (enumerável) do espaço amostral Ω com $\mathbb{P}(E_i) > 0$ para todo i . Então

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A | E_i) \mathbb{P}(E_i) \quad (1.13)$$

para qualquer evento A .

Demonstração. Os conjuntos $A \cap E_i$ são disjuntos dois a dois e da união deles resulta A , logo a primeira igualdade em (1.13) segue de $\mathbb{P}$ ser medida de probabilidade. A segunda igualdade segue de $\mathbb{P}(A \cap E_i) = \mathbb{P}(A | E_i) \mathbb{P}(E_i)$ para todo i . $\square$

Exemplo 1.2

As seguradoras de automóveis classificam motoristas em *mais propensos a acidentes* e *menos propensos a acidentes*. Com isso estimam que os mais propensos são 30% da população e que esses se envolvem em acidente no período de um ano com probabilidade 0,4, enquanto que os menos propensos a acidentes se envolvem em acidente no período de um ano com probabilidade 0,2. Denotemos por A^+ o evento definido pelos motoristas mais propensos a acidentes. Então a probabilidade de um novo segurado se envolver em acidente em um ano é

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1) &= \mathbb{P}(A_1 | A^+) \mathbb{P}(A^+) + \mathbb{P}(A_1 | \overline{A^+}) \mathbb{P}(\overline{A^+}) \\ &= 0,4 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot 0,7 = 0,26 \end{aligned}$$

e se um novo segurado se envolve em acidente nesse prazo, a probabilidade dele ser propenso a acidentes é

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A^+ | A_1) &= \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A^+)}{\mathbb{P}(A_1)} = \frac{\mathbb{P}(A_1 | A^+) \mathbb{P}(A^+)}{\mathbb{P}(A_1)} \\ &= \frac{0,4 \cdot 0,3}{0,26} = \frac{6}{13}. \end{aligned}$$

Portanto, a probabilidade de ser propenso a acidente dado que se envolve em acidente em um ano é 0,46, aproximadamente. Dado que o motorista não se envolve em acidente em um ano, a probabilidade de ser propenso a acidente é $\mathbb{P}(A^+ | \overline{A_1}) \approx 0,24$. (Ross, 2010)

1.3.1 Independência de eventos

Se um dado é lançado duas vezes, então temos

$$\mathbb{P}[\text{a soma é } 7 \mid \text{o primeiro resultado é } 4] = \frac{1}{6} = \mathbb{P}[\text{a soma é } 7]$$

entretanto

$$\mathbb{P}[\text{a soma é } 12 \mid \text{o primeiro resultado é } 4] = 0 \neq \mathbb{P}[\text{a soma é } 12].$$

O condicionamento de ocorrência de um evento A à ocorrência de B pode afetar ou não a probabilidade de ocorrência de A .

Definição 1.1: Independência

Definimos que o evento A é independente do evento B se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$$

Notemos que se A é independente de B então B é independente de A de modo que dizemos A e B são *eventos independentes*.

É imediato da Definição 1.1 o seguinte fato.

Proposição 1.2

Todo evento A de um modelo probabilístico é independente do evento certo Ω e do evento impossível $\emptyset$. $\square$

Se os eventos têm probabilidade não nula então decorre da definição acima que a independência de A e B equivale a

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B).$$

Por exemplo, de

$$\mathbb{P}[\text{a soma é } 7 \mid \text{o primeiro resultado é } 4] = \mathbb{P}[\text{a soma é } 7]$$

temos que “a soma é 7” é um evento independente de “o primeiro resultado é 4” se o experimento é lançar um dado duas vezes.

Exemplo 1.3: 2 lançamentos de uma moeda

Considere

$$\Omega = \{ \text{CaCa}, \text{CaCo}, \text{CoCa}, \text{CoCo} \},$$

onde todos os resultados têm probabilidade $1/4$.

Considere os eventos

$$A = [\text{o primeiro lançamento é cara}] = \{ \text{CaCa}, \text{CaCo} \},$$

$$B = [\text{os dois lançamentos são iguais}] = [\text{CaCa}, \text{CoCo}].$$

Intuitivamente, pode parecer que os eventos são dependentes. De fato, saber que os dois lançamentos são iguais restringe os resultados possíveis a $\{\text{CaCa}, \text{CoCo}\}$. Assim, parece que essa informação deveria afetar a probabilidade de o primeiro lançamento ser cara. Entretanto,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}.$$

Além disso, $A \cap B = \{\text{CaCa}\}$, de modo que

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Portanto, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Logo, A e B são independentes.

Equivalentemente,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A).$$

Assim, embora a ocorrência de B elimine metade dos resultados possíveis, ela não altera a probabilidade de A . Esse exemplo ilustra que a independência não significa que dois eventos não tenham qualquer relação ou que a ocorrência de um não forneça nenhuma informação sobre o experimento. O que importa é se a ocorrência de um evento altera ou não a probabilidade do outro. Embora saber que os dois lançamentos são iguais forneça informação sobre os resultados possíveis, essa informação não altera a probabilidade de o primeiro lançamento ser cara.

Uma família enumerável de eventos $\mathcal{E} = \{E_n : n \in I\}$ é dita *mutuamente independente* se para todo subconjunto finito $J \subseteq I$ vale que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{\ell \in J} E_\ell\right) = \prod_{\ell \in J} \mathbb{P}(E_\ell). \quad (1.14)$$

Para $k \geq 2$ fixo, dizemos que a coleção $\mathcal{E}$ é *k-a-k independente* se todo subconjunto de índices $J \subseteq I$ com $|J| \leq k$ define uma subcoleção de eventos mutuamente independentes.

1.3.2 Teste de identidade polinomial

Nosso primeiro exemplo de um algoritmo aleatorizado é um teste de identidade entre polinômios: dados dois polinômios p e q sobre x ,

decidir de modo eficiente se eles são idênticos.

Há muitas questões a serem esclarecidas nessa formulação do problema: o que significam “eficiente”, “dado um polinômio” e “idênticos”? Por ora, deixemos de lado tais questões e vamos ver como decidir, se dado um polinômio f por uma “caixa preta”, da qual a função polinomial $p(x)$ pode ser avaliada em qualquer número x , o polinômio dado f é identicamente nulo. Um algoritmo que resolve esse problema também resolve o problema original, basta tomarmos $f(x) = p(x) - q(x)$.

Fato 1. Esse problema aparentemente simples pode ser generalizado para polinômios em várias variáveis. Um algoritmo determinístico eficiente para o caso multivariado tem consequências profundas em Teoria da Computação, especificamente, em Complexidade Computacional.

Um algoritmo para esse problema funciona do seguinte modo: dado $f(x)$ de grau no máximo d , escolhemos aleatoriamente $a \in \{1, 2, \dots, 4d\}$ e avaliamos $f(a)$; se $f(a) = 0$, então respondemos *sim*, caso contrário respondemos *não*. A resposta *sim* significa que $f(x)$ é o polinômio nulo e a resposta *não* significa que $f(x)$ não é o polinômio nulo. Esse algoritmo pode responder errado dependendo de f e da escolha aleatória a e devemos tentar garantir que a probabilidade de ocorrer o erro seja pequena.

Se o polinômio f é nulo então a resposta está sempre certa. Suponhamos que f não é nulo. Nesse caso, se a escolha aleatória a for uma raiz do polinômio então $f(a) = 0$ e a resposta *sim* dada pelo algoritmo está errada e se a escolha aleatória a não for uma raiz do polinômio então $f(a) \neq 0$ e a resposta a resposta *sim* dada pelo algoritmo está correta. Em resumo, uma resposta *não* dada pelo algoritmo está correta e uma resposta *sim* pode estar errada. O algoritmo descrito abaixo resume essa estratégia.

Algoritmo 1.1: Teste de identidade entre polinômios

Instância: d inteiro positivo e f polinômio de grau no máximo d .

Resposta: *não* se f não é nulo, senão *sim* com probabilidade de erro no máximo $1/4$.

- 1 $a \xleftarrow{R} \{1, 2, \dots, 4d\}$;
- 2 se $f(a) = 0$ então responda *sim*.
- 3 senão responda *não*.

Para determinar um limitante para a probabilidade do algoritmo responder errado, seja f um polinômio não nulo e de grau

no máximo d e consideremos o evento E formado pelas raízes de f que pertencem ao espaço amostral $\Omega = \{1, 2, \dots, 4d\}$. Então $|E| \leq \text{grau}(f) \leq d$ pois f tem no máximo $\text{grau}(f)$ raízes distintas pelo teorema fundamental da álgebra. O algoritmo erra se a escolha aleatória resulta num elemento de E , portanto,

$$\mathbb{P}[\text{erro}] \leq \frac{1}{4}.$$

Podemos fazer essa probabilidade arbitrariamente pequena ao custo de mais computação. Intuitivamente, como no caso dos lançamentos de moedas, imagine tal algoritmo sendo executado k vezes com a mesma entrada.

Basta uma rodada responder *não* para que a resposta definitiva seja *não*. Se todas as rodadas respondem *sim*, qual a probabilidade de todas estarem erradas?

$$\mathbb{P}[\text{erro em } k \text{ rodadas independentes}] \leq \left(\frac{1}{4}\right)^k.$$

Se $k = 10$ a probabilidade de erro é a probabilidade de 10 respostas *sim*, ou seja, no máximo $(1/4)^{10} < 10^{-6}$ (em metros é menos que o diâmetro do fio da teia de uma aranha), valor desprezível na prática.

Ideia importante

Assumimos que os sorteios realizados durante a execução de um algoritmo são independentes. Além disso, sorteios realizados em diferentes execuções do mesmo algoritmo são independentes entre si.

Algoritmos Monte Carlo Algoritmos aleatorizados com tempo de execução que depende somente da entrada e não dos sorteios e que podem responder errado, são conhecidos na literatura como algoritmos *Monte Carlo*. O teste de identidade polinomial é um algoritmo que pode errar, no entanto, somos capazes de delimitar a probabilidade de tal solução incorreta ocorrer.

Observamos uma propriedade útil de um algoritmo Monte Carlo: se o algoritmo for executado repetidamente com escolhas aleatórias independentes a cada vez, a probabilidade de falha pode se tornar arbitrariamente pequena, às custas do tempo de execução.

Observação 1 (erros de hardware). Para um base de comparação, sem a intenção de ser rigoroso, *hardware* apresentam falhas no processamento, transmissão e armazenamento de informação. Estudos da IBM realizados na década de 1990 indicaram que os efeitos de radiação cósmica podem produzir soft errors em memórias semicondutoras.

T. J. O’Gorman et. al. (1996). *Field testing for cosmic ray soft errors in semiconductor memories*. IBM J. Res. Dev., 40(1):41–50.

Uma estimativa frequentemente associada aos estudos da IBM é de aproximadamente um erro induzido por raios cósmicos para cada 256 MB de memória por mês. Essa taxa corresponde, aproximadamente, a $\approx 1,4 \times 10^{-15}$ por byte-segundo.

Schroeder, Pinheiro e Weber (2009), em um estudo de larga escala realizado em uma grande frota de servidores do Google, analisaram erros de DRAM durante aproximadamente 2,5 anos. Os autores encontraram taxas de erro muito superiores às previstas por estudos laboratoriais anteriores, da ordem de 25.000 a 70.000 erros por bilhão de horas de dispositivo por Mbit, além de observarem que os erros registrados eram predominantemente associados a falhas permanentes (*hard errors*), e não a *soft errors* causados por radiação¹.

Como ilustração da grande variabilidade das taxas de erro reportadas na literatura, taxas de 120 a 81.000 FIT por Mbit foram posteriormente compiladas em trabalhos sobre confiabilidade de hardware. Como 1 FIT corresponde a uma falha por 10^9 horas, essas taxas correspondem aproximadamente a um erro a cada 950 anos e a cada 1,4 anos, respectivamente, para cada Mbit de memória. Para uma máquina com 4 GiB de DRAM, essas taxas corresponderiam, respectivamente, a aproximadamente 3 e 2.000 erros por mês, supondo uma taxa constante e proporcional à quantidade de memória.

Nightingale et al. (2011), em um estudo da Microsoft envolvendo aproximadamente 950.000 computadores, encontraram uma probabilidade de aproximadamente $1/2700$ de uma primeira falha classificada como DRAM one-bit flip entre as máquinas com pelo menos cinco dias de tempo acumulado de CPU (TACT). Para máquinas com pelo menos 30 dias de TACT, essa probabilidade era de aproximadamente $1/1700$. Esses valores representam probabilidades de falha observada no sistema, e não uma taxa de erro por bit ou por unidade de tempo.

AMPLIFICAÇÃO

Para *problemas de decisão* — problemas computacionais para os quais a resposta para uma instância é “sim” ou “não”), — existem dois tipos de algoritmos Monte Carlo:

- com *erro unilateral* (*one-sided error*), se a probabilidade de errar for zero para pelo menos uma das respostas possíveis;
- com *erro bilateral* (*two-sided error*), se houver uma probabilidade não nula de ele errar tanto quando responde “sim” quanto quando responde “não”.

Para algoritmos Monte Carlo de erro unilateral, com probabilidade de erro $\leq \varepsilon$, para $\varepsilon \in (0, 1)$, podemos usar a estratégia de repetições

Bianca Schroeder et. al. (2009). *DRAM errors in the wild: A large-scale field study*. Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems, SIGMETRICS '09, pages 193–204.

¹ Assim, esses resultados não devem ser interpretados diretamente como uma taxa de erros induzidos por raios cósmicos.

Edmund B. Nightingale et. al. (2011). *Cycles, cells and platters: An empirical analysis of hardware failures on a million consumer PCs*. Proceedings of the Sixth Conference on Computer Systems, EuroSys '11, pages 343–356.

independentes para atingir um limiar $\delta \in (0, 1)$ para a probabilidade de erro.

Se A é um algoritmo Monte Carlo que erra apenas nas respostas “sim”, então em t rodadas do algoritmo com a mesma entrada o erro só se dá se todas as t respostas forem “sim”. A probabilidade de erro será no máximo δ para todo t tal que $\varepsilon^t \leq \delta$, portanto, para todo

$$t \geq \frac{\ln(1/\delta)}{\ln(1/\varepsilon)}.$$

Para A que erra apenas nas respostas “não” o resultado é análogo.

Proposição 1.3: Amplificação unilateral

Dados um limiar $\delta \in (0, 1)$ e um algoritmo Monte Carlo A de erro unilateral limitado por ε , com $\lceil \ln(1/\delta)/\ln(1/\varepsilon) \rceil$ ou mais repetições de A temos um algoritmo Monte Carlo de erro (unilateral) no máximo δ . $\square$

Assim, dado conhecido um algoritmo probabilístico A de erro unilateral ε , com $O(\ln(1/\delta))$ repetições baixamos o erro para $< \delta$.

No caso de erro bilateral nenhuma das duas respostas é definitiva, a estratégia é repetir o algoritmo t vezes e devolver a resposta de maior ocorrência.

Proposição 1.4: Amplificação bilateral

Seja $\varepsilon < 1/2$ fixo. Dados um limiar $\delta \in (0, 1)$ e um algoritmo Monte Carlo A de erro bilateral no máximo ε , um número $O(\ln(1/\delta))$ de repetições independentes de A fornece um algoritmo Monte Carlo de erro bilateral no máximo δ . A constante implícita depende de ε .

Demonstração. Se $\varepsilon = 0$, o próprio A já tem erro $0 \leq \delta$ e nada há a fazer. Suponha, então, $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$.

O algoritmo amplificado executa A independentemente $t = 2k + 1$ vezes e retorna a resposta majoritária, que é bem definida por ser t ímpar. Ao final da prova escolhemos k em função de δ e de ε .

Seja S o número dessas t execuções que produzem a resposta correta. Cada execução está correta com probabilidade $p \geq 1 - \varepsilon > \frac{1}{2}$, independentemente das demais, de modo que

$$\mathbb{P}[X = i] = \binom{t}{i} p^i (1 - p)^{t-i}$$

que é não crescente em p , e portanto basta tratar o pior caso $p = 1 - \varepsilon$; suporemos isso daqui em diante. Escrevendo

$$p = 1 - \varepsilon = \frac{1}{2} + q, \quad \text{onde } q := \frac{1}{2} - \varepsilon \in \left(0, \frac{1}{2}\right),$$

temos $1 - p = \frac{1}{2} - q = \varepsilon$ e

$$\mathbb{P}[S = i] = \binom{2k+1}{i} \left(\frac{1}{2} + q\right)^i \left(\frac{1}{2} - q\right)^{2k+1-i}.$$

Como t é ímpar, não há empates: o algoritmo amplificado erra exatamente quando a resposta correta é minoritária, isto é, quando $S \leq k$. Sua probabilidade de erro é, pois,

$$\mathbb{P}[S \leq k] = \sum_{i=0}^k \binom{2k+1}{i} \left(\frac{1}{2} + q\right)^i \left(\frac{1}{2} - q\right)^{2k+1-i}.$$

Estimamos os dois fatores separadamente. Para $i \leq k$ vale $2k+1-i \geq k+1$ e, como $\frac{1}{2} + q > \frac{1}{2} - q$, trocar um fator $\left(\frac{1}{2} - q\right)$ por $\left(\frac{1}{2} + q\right)$ só pode aumentar o produto; aplicando essa troca $k-i$ vezes,

$$\left(\frac{1}{2} + q\right)^i \left(\frac{1}{2} - q\right)^{2k+1-i} \leq \left(\frac{1}{2} + q\right)^k \left(\frac{1}{2} - q\right)^{k+1}.$$

Quanto aos coeficientes binomiais, a identidade

$$\binom{2k+1}{i} = \binom{2k+1}{2k+1-i}$$

estabelece uma bijeção entre os índices $0, \dots, k$ e os índices $k+1, \dots, 2k+1$ que preserva o valor do coeficiente. Como esses dois conjuntos particionam $\{0, 1, \dots, 2k+1\}$, cada um deles responde por metade da soma total, e o Teorema Binomial dá

$$\sum_{i=0}^k \binom{2k+1}{i} = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2k+1} \binom{2k+1}{i} = \frac{2^{2k+1}}{2} = 2^{2k}.$$

Combinando as duas estimativas e usando $\frac{1}{2} - q = \varepsilon$,

$$\mathbb{P}[S \leq k] \leq 2^{2k} \left(\frac{1}{2} + q\right)^k \left(\frac{1}{2} - q\right)^{k+1} = \varepsilon \left[4 \left(\frac{1}{2} + q\right) \left(\frac{1}{2} - q\right)\right]^k = \varepsilon (1 - 4q^2)^k \leq (1 - 4q^2)^k.$$

Escreva

$$\alpha := 1 - 4q^2 = 1 - 4\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right)^2.$$

De $0 < q < \frac{1}{2}$ segue $0 < \alpha < 1$, e o que provamos é que a probabilidade de o algoritmo amplificado produzir uma resposta incorreta é no máximo $\alpha^k = \alpha^{(t-1)/2}$. Essa cota é no máximo δ sempre que

$$k \geq \frac{\ln(1/\delta)}{\ln(1/\alpha)},$$

de modo que basta tomar

$$k = \left\lceil \frac{\ln(1/\delta)}{\ln(1/\alpha)} \right\rceil, \quad t = 2k + 1.$$

Sendo ε fixo, $\ln(1/\alpha)$ é uma constante positiva e, consequentemente, $t = O(\ln(1/\delta))$. $\square$

1.3.3 Continuidade de uma medida de probabilidade

Uma sequência qualquer $(A_n: n \geq 1)$ de eventos em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ é dita *monótona* se vale um dos casos

crescente: $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq A_{n+1} \subseteq \dots$ e definimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

decrecente: $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \dots$ e definimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Se $(A_n: n \geq 1)$ é uma sequência crescente, então o limite pode ser escrito como uma união de eventos disjuntos $A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus A_2) \cup \dots$ de modo que se tomamos $A_0 := \emptyset$ então

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \setminus A_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_{i-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

No caso em que $(A_n: n \geq 1)$ é decrescente tomamos os complementos e temos que $(\overline{A_n}: n \geq 1)$ é crescente, portanto,

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}\right) = \mathbb{P}\left(\overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n}\right) = \mathbb{P}\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right)$$

por outro lado

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\overline{A_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{P}(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$$

Em resumo, se $(A_n: n \geq 1)$, é uma sequência monótona de eventos então

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n). \quad (1.15)$$

A propriedade (1.15) é chamada de *continuidade da medida de probabilidade*.

Consideremos novamente o exemplo do lançamento de uma moeda equilibrada até sair coroa

$$\Omega = \{(Co), (Ca, Co), \dots, (Ca, Ca, \dots)\}$$

munido da função massa de probabilidade $p((c_1, c_2, \dots, c_n)) = 2^{-n}$ para a sequência que termina em coroa após n lançamentos.

Definimos o evento A_n definido por “não sai coroa até o n -ésimo lançamento”. Esse evento ocorre com probabilidade

$$1 - \mathbb{P}(\overline{A_n}) = 1 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^i = 1 - \frac{1/2 - (1/2)^{n+1}}{1/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Intuitivamente, “nunca sair coroa” tem probabilidade $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} = 0$. Essa passagem ao limite, $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$, é garantida pela continuidade.

A sequência $(A_n : n \geq 1)$ é monótona pois $A_n \supseteq A_{n-1}$ para todo $n > 1$, portanto,

$$\mathbb{P}(\text{Ca, Ca, } \dots) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 0.$$

Ideia importante

A interpretação correta desse fato é que “sair cara para sempre” é um resultado possível, mas tem probabilidade zero. Isso porque, nesse caso, o espaço amostral não é discreto: o resultado $(\text{Ca, Ca, } \dots)$ é um elemento do espaço amostral, mas o conjunto que contém apenas esse resultado tem probabilidade zero. Em contraste, se o espaço amostral é discreto e todo resultado elementar tem probabilidade positiva, então

$$\mathbb{P}(A) = 0 \Rightarrow A = \emptyset.$$

De fato, se $A \neq \emptyset$, existe algum resultado elementar $\omega \in A$ e, pela monotonicidade da probabilidade, $\mathbb{P}(A) \geq \mathbb{P}(\omega) > 0$. Nesse contexto, portanto, um evento de probabilidade zero é necessariamente impossível.

1.4 Um gerador de números aleatórios

Dada uma fonte que gera bits aleatórios de modo uniforme e independente, como projetar um algoritmo que recebe um inteiro positivo M e devolve uma escolha aleatória em $\{0, 1, \dots, M-1\}$?

Se M é uma potência de 2, digamos que $M = 2^k$, então a resposta é simples: basta sortearmos $k = \log M$ bits aleatórios $d_0, d_1, \dots, d_{k-1} \in \{0, 1\}$ que o resultado é o número $\sum_{i=0}^{k-1} d_i 2^i$ no domínio desejado com probabilidade $1/M$.

No caso em que M não é potência de 2, digamos que $2^{k-1} < M < 2^k$ (o que significa que precisamos de $k = \lceil \log M \rceil$ bits aleatórios), usamos o mesmo processo descrito no parágrafo anterior com a exceção de que se o resultado for maior ou igual a M , o processo é reiniciado e é repetido até que um número entre 0 e $M-1$ seja obtido.

Algoritmo 1.2: Gerador de números aleatórios**Instância:** inteiro positivo $M \geq 2$.**Resposta:** uma escolha uniforme em $\{0, 1, \dots, M-1\}$.

```

1 repita
2   para cada  $i \in \{0, \dots, \lceil \log M \rceil - 1\}$  faça  $d_i \xleftarrow{R} \{0, 1\}$ ;
3    $N \leftarrow \sum_i d_i 2^i$ ;
4 até que  $N < M$ ;
5 responda  $N$ .

```

O resultado das escolhas aleatórias na linha 2 do Algoritmo 1.2, digamos que seja a sequência $d_{k-1}d_{k-2}\dots d_0$, é um evento que tem probabilidade $\mathbb{P}^{(k)}(d_{k-1}d_{k-2}\dots d_0) = (1/2)^k$.

Essa sequência é a representação binária do número $\sum_{i=0}^{k-1} d_i 2^i$ que pertence ao conjunto $\{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$.

O ALGORITMO TERMINA?

Isto é, eventualmente a condição $N < M$ na linha 4 é satisfeita?

Fixamos uma instância M com

$$2^{k-1} < M \leq 2^k \quad \text{e} \quad k = \lceil \log M \rceil.$$

A probabilidade com que uma rodada do laço da linha 1 resulte em um inteiro N que pertença ao conjunto $\bar{A} = \{M, \dots, 2^k - 1\}$ é

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{2^k - M}{2^k} = 1 - \frac{M}{2^k} < 1 - \frac{2^{k-1}}{2^k} = \frac{1}{2},$$

pois $M > 2^{k-1}$.

Para todo $n \geq 1$,

A_n é o evento “o algoritmo leva mais que n rodadas para terminar”.

Tal evento ocorre se nas n primeiras tentativas do laço na linha 1 ocorre um sorteio em $\bar{A}$ e daí pra diante pode ocorrer qualquer um dos dois casos, A ou $\bar{A}$, logo, pela independência da ocorrência dos eventos $\bar{A}$ em cada rodada do laço

$$\mathbb{P}(A_n) = \left(1 - \frac{M}{2^k}\right)^n$$

portanto,

$$\mathbb{P}(A_n) < \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Os eventos A_n formam uma sequência decrescente $A_n \supset A_{n+1}$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} A_n$ é o evento “o algoritmo não termina”, cuja

probabilidade é, por continuidade (equação (1.15) na página 21),

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}[\text{o algoritmo não termina}] &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{M}{2^k}\right)^n \\
 &= 0.
 \end{aligned} \tag{1.16}$$

Consequentemente, $\mathbb{P}[\text{o algoritmo termina}] = 1$. O algoritmo termina *quase certamente*.

SE TERMINA, QUÃO RÁPIDO TERMINA?

A aleatoriedade influencia na duração das rodadas, isto é, no número de rodadas do laço da linha 1 necessárias para que ele termine.

O algoritmo não apenas termina quase certamente, como, de fato, termina em poucas rodadas com alta probabilidade. De $M > 2^{k-1}$ temos $\mathbb{P}(\bar{A}) < 1/2$, portanto, em n rodadas do laço todos os inteiros sorteados pertencem a $\bar{A}$ com probabilidade menor que 2^{-n} . A probabilidade de não terminar em, por exemplo, 4 rodadas é menor que 0,07, em 10 rodadas é menor que 0,00098.

SE O ALGORITMO TERMINA, RESPONDE CERTO?

Por exemplo, se $M = 7$ então $k = 3$. Com três bits $d_2d_1d_0$ temos as representações binárias dos naturais de 0 a 7. O laço da linha 1 gera qualquer um desses números com a mesma probabilidade, a saber $1/2^3 = 1/8$. Porém o algoritmo só termina se o sorteio for diferente de 7, isto é, não ocorre o evento $d_2d_1d_0 = 111$. Dado que esse evento não ocorre, qual a probabilidade do algoritmo responder 4?

Seja N a resposta do algoritmo. Usando probabilidade condicional $\mathbb{P}[N = 4 \mid N \neq 7] = (1/8) / (7/8) = 1/7$ e, de fato, o algoritmo escolhe qualquer número em $\{0, \dots, 6\}$ com probabilidade $1/7$.

No caso geral, definimos o evento $A = \{0, 1, \dots, M-1\}$ e para qualquer $t \in A$ a probabilidade da resposta N do algoritmo ser t dado que $N \in A$ é

$$\mathbb{P}_{N \in \mathbb{R}\{0, \dots, 2^k-1\}}[N = t \mid N \in A] = \frac{\mathbb{P}(\{t\} \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{(1/2)^k}{M/2^k} = \frac{1}{M}.$$

Portanto, se o algoritmo termina, ou seja, dado que o sorteio N satisfaça $N < M$, então ele responde com um número entre 0 e $M-1$ de modo uniforme.

Diferente do algoritmo para identidade polinomial, o Algoritmo 1.2 não responde errado. Em contrapartida, o tempo de execução depende dos sorteios.

Algoritmos Las Vegas O algoritmo gerador de números aleatórios sempre fornece a solução correta. A única variação de uma execução para outra é o seu tempo de execução. Chamamos esse tipo de algoritmo de *algoritmo Las Vegas*. Um algoritmo Las Vegas é, por definição, um algoritmo Monte Carlo com probabilidade de erro igual a o cujo tempo de execução é uma variável aleatória (nosso próximo tema). Em geral, deseja-se que esses algoritmos tenham tempo de execução esperado pequeno e que a probabilidade de uma execução demorar muito seja pequena.

Dizemos que um algoritmo Las Vegas é um algoritmo *Las Vegas eficiente* se, para qualquer entrada, seu *tempo de execução esperado*² for delimitado por uma função polinomial do tamanho da entrada.

² A esperança da variável aleatória para o tempo de execução

Dizemos que um algoritmo Monte Carlo é um algoritmo *Monte Carlo eficiente* se, para qualquer entrada, seu tempo de execução no pior caso for delimitado por uma função polinomial do tamanho da entrada.

Exercícios

Exercício 1. Há três urnas e em cada urna um par de bolas. Na primeira urna há um par de bolas brancas, na segunda um par de bolas pretas e na terceira um par com uma bola de cada cor. Uma urna é escolhida uniformemente e, sem olhar para o interior da urna, uma bola é escolhida uniformemente e retirada. A bola retirada é branca. Qual a probabilidade da bola que ficou sozinha na urna ser preta?

Exercício 2. Considere a seguinte proposta de algoritmo que recebe um inteiro positivo $M > 0$ e devolve um inteiro escolhido aleatoriamente em $\{0, 1, \dots, M - 1\}$:

Instância: inteiro positivo M .

Resposta: uma escolha aleatória em $\{0, 1, \dots, M - 1\}$.

- 1 seja k o número de bits de M ;
- 2 $(d_0, d_1, \dots, d_{k-1}) \xleftarrow{R} \{0, 1\}^k$;
- 3 $N \leftarrow \sum_i d_i 2^i$;
- 4 **responda** $N \bmod M$.

Prove que as respostas não são equiprováveis quando M não é potência de 2.

Exercício 3. Agora, considere o seguinte gerador de números aleatórios adaptado do anterior.

Instância: inteiros positivos M e t .

Resposta: uma escolha aleatória em $\{0, 1, \dots, M-1\}$.

- 1 seja k o número de bits de M ;
- 2 $(d_0, d_1, \dots, d_{k+t-1}) \stackrel{\mathcal{R}}{\leftarrow} \{0, 1\}^{k+t}$;
- 3 $N \leftarrow \sum_i d_i 2^i$;
- 4 **responda** $N \bmod M$.

No caso $t = 0$ a probabilidade da resposta não é uniforme (como vimos acima). Prove que

$$\sum_{n=0}^{M-1} \left| \mathbb{P}[N = n] - \frac{1}{M} \right| \leq \frac{1}{2^{t-1}}.$$

Isso mostra que, à medida que t cresce, a distribuição de $N \bmod M$ converge exponencialmente rápido para a distribuição uniforme em $\{0, \dots, M-1\}$, o que justifica usar valores modestos de t (por exemplo $t = O(\log(1/\delta))$) para obter uma amostragem “quase uniforme” com erro estatístico δ arbitrariamente pequeno.

Exercício 4. Prove que no seguinte algoritmo a probabilidade p_n do laço executar pelo menos n vezes, para todo $n \geq 2$, é maior que 0 e, mais que isso, essa probabilidade é maior que 0 no limite, ou seja, $\lim p_n > 0$ quando $n \rightarrow \infty$ (pode ser útil a desigualdade $1 - x \geq \exp(-2x)$ para $x \in [0, 1/2]$).

- 1 $j \leftarrow 0$;
- 2 **repita**
- 3 $j \leftarrow j + 1$;
- 4 **para cada** $i \in \{1, 2, \dots, j\}$ **faça** $d_i \stackrel{\mathcal{R}}{\leftarrow} \{0, 1\}$;
- 5 **até que** $d_i = 1$ para todo i .

2

Variáveis aleatórias discretas

As variáveis aleatórias são funções que descrevem grandezas observáveis em fenômenos aleatórios, como o tempo de execução de um algoritmo aleatorizado, o número de comparações realizadas por um procedimento de busca, ou o tamanho de uma estrutura de dados gerada aleatoriamente. No Algoritmo 1.2, o número de rodadas do laço é uma variável aleatória. Note que execuções diferentes do algoritmo, mesmo que com a entrada M fixa, a quantidade de rodadas do laço pode ser diferente.

Definição 2.1: Variável aleatória discreta

Se $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ é um espaço de probabilidade, então uma função

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

é uma *variável aleatória discreta* se sua imagem, que denotamos por $X(\Omega)$, é enumerável.

Em particular, se Ω é enumerável, então qualquer função

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma *variável aleatória discreta*.

A definição mais geral para v.a. discreta é: existe um enumerável S tal que $\mathbb{P}[X \in S] = 1$. Note que isso permite $\omega \in \Omega$ tal que $X(\omega) \notin S$, desde que $\mathbb{P}(\omega) = 0$. Entretanto, neste texto, não será preciso toda essa generalidade. Quase sempre trabalharemos com Ω enumerável.

Usaremos, quase sempre, as letras maiúsculas finais do alfabeto, como X, Y, Z, W , para denotar variáveis aleatórias.

Exemplo 2.1: Variável aleatória indicadora

Para qualquer evento A de um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, definimos a variável aleatória $\mathbb{1}_A: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ por

$$\mathbb{1}_A(\omega) := \begin{cases} 1, & \text{se } \omega \in A \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

e que chamamos de *variável aleatória indicadora* da ocorrência do evento A .

Proposição 2.1: Variável aleatória como soma de indicadoras

Toda variável aleatória discreta pode ser escrita como uma combinação linear de variáveis indicadoras.

Demonstração. Seja X uma variável aleatória discreta e seja $\{x_1, x_2, \dots\} \subseteq \mathbb{R}$ o conjunto dos valores que X pode assumir. Para cada i , considere a variável aleatória $\mathbb{1}_{A_i}$ indicadora do evento $A_i = [X = x_i]$.

Como X assume, necessariamente, um dos valores x_i , para todo $\omega \in \Omega$, existe um único i tal que $X(\omega) = x_i$. Consequentemente,

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{1}_{A_i}(\omega) = X(\omega).$$

Logo,

$$X = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{1}_{A_i} = \sum_i x_i \mathbb{1}_{[X=x_i]}.$$

No caso em que X assume apenas um número finito de valores, a soma é finita; no caso enumerável, trata-se de uma soma enumerável (série). $\square$

Proposição 2.2

Se X é uma variável aleatória que assume valores nos inteiros positivos, então

$$X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{[X \geq k]}. \quad (2.1)$$

Demonstração. Para cada $\omega \in \Omega$, existe um único $m = X(\omega) \in \mathbb{Z}_+$. Então, dado $k \geq 1$

$$\mathbb{1}_{[X \geq k]}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{se } k \leq m, \\ 0, & \text{se } k > m. \end{cases}$$

Logo,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{[X \geq k]}(\omega) = \underbrace{1 + \dots + 1}_{m \text{ termos}} = m = X(\omega).$$

Como vale para todo $\omega \in \Omega$, concluímos (2.1) $\square$

2.1 Distribuição

Se X é uma v.a. discreta. Para $a \in X(\Omega)$, $[X = a]$ denota o evento

$$[X = a] := \{\omega \in \Omega: X(\omega) = a\}$$

que ocorre com probabilidade

$$\mathbb{P}_X(a) := \mathbb{P}[X = a].$$

A função $a \mapsto \mathbb{P}_X(a)$ é chamada *lei*, ou *distribuição*, de X : trata-se de uma medida de probabilidade em $(X(\Omega), 2^{X(\Omega)})$.

Analogamente, $[X \leq a]$ denota o evento $\{\omega \in \Omega: X(\omega) \leq a\}$.

Para a v.a. indicadora, como no Exemplo 2.1 acima, temos

$$[\mathbb{1}_A \leq t] = \begin{cases} \emptyset, & \text{se } t < 0 \\ \overline{A}, & \text{se } 0 \leq t < 1 \\ \Omega, & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$$

Ainda, a notação $[X \in A]$ é usada para o evento dado pela pré-imagem de A , i.e.,

$$[X \in A] = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega: X(\omega) \in A\},$$

para todo $A \subseteq X(\Omega)$.

Por exemplo, as pré-imagens $\mathbb{1}_A^{-1}(B)$ são $\emptyset$, A , $\overline{A}$ e Ω nos casos, respectivamente, $\{0, 1\} \cap B = \emptyset$, $\{0, 1\} \cap B = \{1\}$, $\{0, 1\} \cap B = \{0\}$ e $\{0, 1\} \cap B = \{0, 1\}$ para todo $B \subseteq \mathbb{R}$.

Experimentos aleatórios com apenas duas possibilidades de resultado, *sucesso* ou *fracasso*, recebem o nome de *ensaio de Bernoulli*.

Modelamos um ensaio de Bernoulli por uma variável aleatória

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, com $X(\Omega) \in \{0, 1\}$ e 0 representa *fracasso* e 1 representa *sucesso*.

Exemplo 2.2: Distribuição de Bernoulli

Se X é uma variável aleatória com imagem $\{0, 1\}$ e lei

$$\mathbb{P}_X(1) = p \quad \text{e} \quad \mathbb{P}_X(0) = 1 - p$$

então dizemos que X tem *distribuição de Bernoulli* com parâmetro p , onde $p \in [0, 1]$ é a probabilidade de sucesso, e usamos

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

para indicar esse fato.

Em n ensaios de Bernoulli idênticos e independentes, uma resposta específica $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ com exatamente $t \in \{0, \dots, n\}$ sucessos e $n - t$ fracassos ocorre com probabilidade $p^t(1 - p)^{n-t}$. A quantidade de sequências de respostas distintas com exatamente t sucessos é $\binom{n}{t}$, assim a probabilidade de exatamente t sucessos é

$$\binom{n}{t} p^t (1 - p)^{n-t}.$$

Exemplo 2.3: Distribuição binomial

Se X é a quantidade de sucessos em n ensaios de Bernoulli, idênticos e independentes, então

$$\mathbb{P}_X(t) := \binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t}, \quad t \in \{0, 1, \dots, n\}$$

chamada **distribuição binomial** com parâmetros n e p . Nesse caso, escrevemos

$$X \sim \text{Binomial}(n, p).$$

Se $X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$ são variáveis aleatórias mutuamente independentes, então

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p).$$

Exemplo 2.4: Distribuição geométrica

Uma variável geométrica conta o número de realizações de ensaios de Bernoulli independentes e identicamente distribuídos realizados até, e incluindo, o primeiro sucesso.

Se X é uma variável aleatória geométrica, então para $X = t$ é necessário que nas primeiras $t - 1$ iterações ocorra fracasso e na t -ésima iteração ocorra sucesso. Como os ensaios são independentes, a lei de X é

$$\mathbb{P}_X(t) := (1-p)^{t-1} p, \quad t \in \{1, 2, \dots\}$$

e dizemos que X tem **distribuição geométrica** com parâmetro p , o que denotamos por $X \sim \text{Geom}(p)$.

Em alguns textos a distribuição geométrica conta o número de fracassos antes do primeiro sucesso. Nesse caso a variável aleatória $Y = X - 1$ assume valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$ e tem distribuição $\mathbb{P}_Y(t) = \mathbb{P}_X(t + 1)$.

INDEPENDÊNCIA

As variáveis aleatórias discretas X e Y definidas em Ω são **independentes** se para quaisquer $A, B \subset \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}([X \in A] \cap [Y \in B]) = \mathbb{P}[X \in A] \cdot \mathbb{P}[Y \in B].$$

Considerando as leis $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ do vetor aleatório (X, Y) , $\mathbb{P}_X$ de X e $\mathbb{P}_Y$ de Y temos que independência como definido acima é equivalente a

$$1. \quad \mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B);$$

2. $[X = a]$ e $[Y = b]$ são independentes, para quaisquer $a \in X(\Omega)$ e $b \in Y(\Omega)$;
3. $\mathbb{P}_{(X,Y)}((a,b)) = \mathbb{P}_X(a) \cdot \mathbb{P}_Y(b)$, para quaisquer $a \in X(\Omega)$ e $b \in Y(\Omega)$;
4. $\mathbb{P}([X \leq a] \cap [Y \leq b]) = \mathbb{P}[X \leq a] \cdot \mathbb{P}[Y \leq b]$ para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$.

Mais geralmente, as variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$ são *mutua-mente independentes* se para quaisquer subconjuntos $A_1, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n [X_i \in A_i]\right) = \mathbb{P}_{\mathbf{X}}(A_1 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_{X_i}(A_i) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}[X_i \in A_i].$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{P}_{\mathbf{X}}(A_1 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_{X_i}(A_i)$$

em que $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.

2.2 Valor esperado de uma variável aleatória discreta

O *valor esperado* ou, ainda, *esperança* da variável aleatória X é, ingenuamente, a média dos valores que X assume, ponderada pela probabilidade de assumir tais valores.

Uma variável aleatória X é chamada de *simples* se pode ser escrita como combinação linear finita de funções indicadoras de eventos, ou seja, existem valores $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ e eventos $A_1, \dots, A_k$ tais que

$$X = \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{1}_{A_i}.$$

Podem existir muitas maneiras de escrever uma variável aleatória simples como combinação linear de indicadoras. Descrevemos a seguir uma *forma canônica*: sejam $x_1, \dots, x_m$ os valores *distintos* assumidos por X e $B_i = [X = x_i]$. Os B_i são eventos não vazios, disjuntos dois a dois, e formam uma partição de Ω ; a *representação canônica* é

$$X = \sum_{i=1}^m x_i \mathbb{1}_{B_i}.$$

Queremos que a esperança seja linear e que $\mathbb{E}\mathbb{1}_A = \mathbb{P}(A)$. Sobre a representação canônica, isso força a seguinte definição.

Definição 2.2: Esperança de uma variável simples

Se X é uma variável aleatória simples, com valores distintos $x_1, \dots, x_m$ e $B_i = [X = x_i]$, então

$$\mathbb{E}X := \sum_{i=1}^m x_i \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i=1}^m x_i \mathbb{P}[X = x_i].$$

Vamos verificar que essa definição é compatível com as outras representações de X . É isso que fazem os resultados a seguir. Primeiro tratamos as representações por partições, que é o que precisamos para a linearidade.

Proposição 2.3: Boa definição via refinamento comum

Sejam $\{A_i\}_{i=1}^n$ e $\{B_j\}_{j=1}^m$ partições finitas de Ω em eventos (possivelmente vazios) e suponha

$$X = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{1}_{A_i} = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{1}_{B_j}.$$

Então

$$\sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(A_i) = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{P}(B_j).$$

Demonstração. Seja $C_{ij} = A_i \cap B_j$. Estes conjuntos são disjuntos dois a dois e

$$A_i = \bigcup_j C_{ij}, \quad B_j = \bigcup_i C_{ij},$$

logo, por aditividade finita de $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}(A_i) = \sum_j \mathbb{P}(C_{ij}), \quad \mathbb{P}(B_j) = \sum_i \mathbb{P}(C_{ij}). \quad (2.2)$$

Afirmamos que $x_i \mathbb{P}(C_{ij}) = a_j \mathbb{P}(C_{ij})$ para todo par (i, j) . Se $C_{ij} = \emptyset$, ambos os lados são nulos. Caso contrário, tome $\omega \in C_{ij}$: como as famílias são partições, $\mathbb{1}_{A_k}(\omega) = 1$ apenas para $k = i$ e $\mathbb{1}_{B_l}(\omega) = 1$ apenas para $l = j$, de modo que $x_i = X(\omega) = a_j$. Combinando com (2.2),

$$\sum_i x_i \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i,j} x_i \mathbb{P}(C_{ij}) = \sum_{i,j} a_j \mathbb{P}(C_{ij}) = \sum_j a_j \mathbb{P}(B_j). \quad \square$$

Corolário 2.1: Qualquer partição calcula $\mathbb{E}X$

Se $X = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{1}_{A_j}$ com $\{A_j\}$ partição finita de Ω em eventos, então $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{P}(A_j)$.

Demonstração. A representação canônica é uma representação por partição. Aplique a Proposição 2.3 a ela e à representação dada. $\square$

Proposição 2.4: Linearidade

Se X e Y são variáveis aleatórias simples e $a, b \in \mathbb{R}$, então $aX + bY$ é simples e

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a \mathbb{E}X + b \mathbb{E}Y.$$

Demonstração. Sejam $X = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{1}_{B_i}$ e $Y = \sum_{j=1}^m y_j \mathbb{1}_{C_j}$ as representações canônicas. A família $\{B_i \cap C_j\}$ é uma partição de Ω em eventos e, para $\omega \in B_i \cap C_j$, $(aX + bY)(\omega) = ax_i + by_j$. Logo

$$aX + bY = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (ax_i + by_j) \mathbb{1}_{B_i \cap C_j},$$

o que mostra que $aX + bY$ é simples. Esta é uma representação por partição de $aX + bY$, talvez não canônica (os valores $ax_i + by_j$ podem se repetir). Pelo Corolário 2.1,

$$\mathbb{E}(aX + bY) = \sum_{i,j} (ax_i + by_j) \mathbb{P}(B_i \cap C_j).$$

Por aditividade finita, $\sum_j \mathbb{P}(B_i \cap C_j) = \mathbb{P}(B_i)$ e $\sum_i \mathbb{P}(B_i \cap C_j) = \mathbb{P}(C_j)$, donde

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(B_i) + b \sum_{j=1}^m y_j \mathbb{P}(C_j) = a \mathbb{E}X + b \mathbb{E}Y. \quad \square$$

Corolário 2.2: Linearidade finita

Se $X_1, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias simples e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, então $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ é simples e

$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E}(X_i).$$

Demonstração. Indução em n : o caso $n = 1$ é trivial, e o passo segue da Proposição 2.4 aplicada a $\sum_{i < n} a_i X_i$ e X_n . $\square$

Corolário 2.3: Indicadoras arbitrárias

Se $A_1, \dots, A_k$ são eventos quaisquer (não necessariamente disjuntos) e $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, então

$$\mathbb{E}\left(\sum_{l=1}^k c_l \mathbb{1}_{A_l}\right) = \sum_{l=1}^k c_l \mathbb{P}(A_l).$$

Em particular, o valor de $\mathbb{E}X$ não depende de qual represen-

tação de X como combinação linear finita de indicadoras é usada.

Demonstração. Como $\mathbb{1}_A = 1 \cdot \mathbb{1}_A + 0 \cdot \mathbb{1}_{\bar{A}}$ é uma representação por partição, o Corolário 2.1 dá $\mathbb{E}\mathbb{1}_A = \mathbb{P}(A)$. O resultado segue do Corolário 2.2. $\square$

Observação 2. Reagrupando a soma da Definição 2.2, e supondo Ω enumerável, temos

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^m x_i \mathbb{P}(B_i) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega),$$

a média dos valores de X ponderada pela probabilidade de cada ponto. Em um espaço geral (por exemplo, $[0, 1]$ com a medida de Lebesgue) vale $\mathbb{P}(\{\omega\}) = 0$ e a soma sobre Ω não faz sentido; a fórmula correta é $\mathbb{E}X = \sum_x x \mathbb{P}(X = x)$.

Exemplo 2.5: Média pode ser pouco representativa

Consideremos um jogo de azar no qual em cada aposta pagamos R\$10,00 e, ou ganhamos R\$1.000,00 com probabilidade $p \in (0, 1)$ ou não ganhamos nada, ou seja, perdemos os R\$10,00 que já foram pagos, com probabilidade $1 - p$. Se Y é o ganho líquido em uma aposta, então a esperança do ganho por aposta é $\mathbb{E}Y = 10^6 p - 10(1 - p) = 1.000.010p - 10$.

Se $p = 1/100$ então a probabilidade de ganhar o valor alto é muito pequeno quando comparado com a probabilidade de perder 10 reais, mas o prêmio é tão grande que o ganho esperado por aposta ainda é positivo: $\mathbb{E}Y = 9.990,10$.

Apesar do ganho esperado por aposta ser positivo, a probabilidade de efetivamente ganhar o prêmio é de apenas 1%: em 99% das vezes o jogador simplesmente perde os R\$ 10,00 investidos. A esperança, portanto, não descreve o que tipicamente acontece a quem joga, apenas uma média que só se manifestaria após repetições muito numerosas do jogo.

Exemplo 2.6

Se $X \in_{\mathbb{R}}\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ é o resultado de um lançamento de um dado, então

$$\mathbb{E}X = 1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6} + 3\frac{1}{6} + 4\frac{1}{6} + 5\frac{1}{6} + 6\frac{1}{6} = \frac{7}{2}$$

e se Y é o resultado de outro lançamento de dado, qual é a esperança da soma $X + Y$ dos pontos nos dois lançamentos do

dado?

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = 7$$

pela linearidade da esperança é 7.

Assumindo que os lançamentos são independentes, a esperança do produto é

$$\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y) = \frac{49}{4}.$$

A distribuição do produto $X \cdot Y$ é mostrada na Tabela 2.1 abaixo.

$X \cdot Y$	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	18	20	24	25	30	36
$\mathbb{P}_{X \cdot Y}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Tabela 2.1: distribuição do produto de dois dados.

Exemplo 2.7: Esperança da distribuição de Bernoulli

Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, então podemos considerar o evento dado por $A = \{\omega \in \Omega: X(\omega) = 1\}$, de forma que $X = \mathbb{1}_A$. Dessa forma,

$$\mathbb{E}X = \mathbb{P}_X(1) = \mathbb{P}(A) = p.$$

Exemplo 2.8: Esperança da distribuição binomial

Se $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, então

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$$

com $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ e, pela linearidade da esperança (Corol. 2.2),

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = np.$$

Uma variável aleatória geométrica tem imagem enumerável infinita $\{1, 2, \dots\}$ e gostaríamos de estender, de modo natural, a definição de valor esperado de uma variável simples, ou seja, se X tem valores $\{x_1, x_2, \dots\} \subseteq \mathbb{R}$ queremos

$$\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} x_n \mathbb{P}[X = x_n]. \quad (2.3)$$

Exemplo 2.9: Rearranjos podem convergir para somas distintas

Desde o século XIX sabe-se que rearrranjos da série harmônica alternada

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1}}{i}$$

podem resultar em limites diferentes. Por exemplo,

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots = \ln(2)$$

enquanto que, no rearrranjo atribuído a Laurent,

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{4k} + \cdots = \frac{\ln(2)}{2}.$$

Seja X a variável aleatória que assume os valores (distintos)

$$x_i := (-1)^{i+1} i, \quad i = 1, 2, \dots, \quad \mathbb{P}[X = x_i] = \frac{6}{(\pi i)^2}.$$

Então $x_i \mathbb{P}[X = x_i] = \frac{6}{\pi^2} \frac{(-1)^{i+1}}{i}$ e, para uma enumeração σ dos valores,

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_{\sigma(i)} = \mathbb{P}[X = x_{\sigma(i)}] \begin{cases} \frac{6}{\pi^2} \ln(2) & \text{se } \sigma \text{ é a permutação identidade} \\ \frac{3}{\pi^2} \ln(2) & \text{se } \sigma \text{ é a permutação de Laurent} \end{cases}, \quad (2.4)$$

Note que $\sum_i x_i^+ \mathbb{P}[X = x_i] = \sum_i x_i^- \mathbb{P}[X = x_i] = \infty$ (os termos de cada sinal são da ordem de $1/i$). Portanto, X não tem um valor esperado bem definido.

Para que (2.3) defina um número real, é necessário que o valor da soma não dependa da ordem dos termos. O índice n não carrega nenhuma ordem imposta pela estrutura do problema: os eventos $\{X = x_n\}$ formam um conjunto enumerável, não uma sequência canonicamente ordenada (a ordem em que escrevemos $x_1, x_2, \dots$ é apenas uma escolha arbitrária de enumeração). Assim, para que (2.3) defina uma esperança finita, é necessário que a série seja *incondicionalmente convergente*, isto é, que qualquer reordenação de seus termos convirja sempre para a mesma soma.

Um teorema atribuído a Riemann (veja em Rudin, 1976, teorema

3.54) estabelece que, se $\sum_n a_n$ converge e $\sum_{i \geq 1} |a_i| = \infty$, então, para qualquer $S \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, existe uma permutação σ dos inteiros positivos tal que $\sum_{i \geq 1} a_{\sigma(i)} = S$. Se a série nem converge na ordem original, também não é incondicionalmente convergente. Por outro lado, séries com $\sum_{i \geq 1} |a_i| < \infty$ convergem para a mesma soma em qualquer ordem (Rudin, 1976, teorema 3.55). Portanto,

a série é incondicionalmente convergente, se e só se $\sum_{i \geq 1} |a_i| < \infty$.

e nesse caso dizemos que a série *converge absolutamente*.

Se $(a_n: n \geq 1)$ uma sequência de números reais com $a_n \geq 0$ para todo n , então a soma parcial $\sum_{n=1}^m a_n$ é crescente e, portanto, sempre tende a um limite S , possivelmente infinito, $S \in [0, \infty]$. Assim, tal série

- *converge* para um número real (finito), caso em que escrevemos $\sum_{n \geq 1} a_n < \infty$; ou
- *converge para* ∞ e escrevemos $\sum_{n \geq 1} a_n = \infty$.

Em ambos os casos, o valor da série não se altera se a ordem dos termos for modificada.

No caso geral, onde $a_n \in \mathbb{R}$, definimos $a^+ := \max\{a, 0\}$ e $a^- := \max\{-a, 0\}$ e

$$S^+ := \sum_{n: a_n \geq 0} a_n^+ \quad \text{e} \quad S^- := \sum_{n: a_n < 0} a_n^-. \quad (2.5)$$

Há três casos.

- Se $S^+ < \infty$ e $S^- < \infty$, então a série converge absolutamente e $S = S^+ - S^-$, em qualquer ordem.
- Se exatamente um entre S^+ e S^- é infinito, então $S = +\infty$ (se $S^+ = \infty$) ou $S = -\infty$ (se $S^- = \infty$), independentemente da ordem de somação.
- Se $S^+ = S^- = \infty$, a soma não está bem definida: pode depender da ordem dos termos, e diferentes rearranjos podem levar a valores distintos.

Em particular, para X discreta com imagem $\{x_1, x_2, \dots\}$, eventos $B_i = [X = x_i]$ as somas

$$\mathbb{E}(X^+) := \sum_i x_i^+ \mathbb{P}(B_i) \in [0, \infty], \quad \mathbb{E}(X^-) := \sum_i x_i^- \mathbb{P}(B_i) \in [0, \infty]$$

estão sempre bem definidas, independentemente da enumeração escolhida.

Definição 2.3: Esperança matemática de uma v.a. discreta

Seja X uma variável aleatória discreta com imagem $\{x_1, x_2, \dots\}$ (valores distintos) e $B_i = [X = x_i]$.

Se **não** ocorrer $\mathbb{E}(X^+) = \mathbb{E}(X^-) = \infty$, então dizemos que $\mathbb{E}X$ está *definida* e nesse caso

$$\mathbb{E}X := \mathbb{E}(X^+) - \mathbb{E}(X^-) \in [-\infty, \infty].$$

Dizemos que X tem *esperança finita* ou que X é *integrável*, se $\mathbb{E}(X^+) < \infty$ e $\mathbb{E}(X^-) < \infty$, o que equivale a

$$\sum_i |x_i| \mathbb{P}[X = x_i] < \infty,$$

e, nesse caso, $\mathbb{E}X$ é finita e, como a série converge absolutamente,

$$\mathbb{E}X = \sum_i x_i \mathbb{P}[X = x_i] \quad (2.6)$$

em qualquer ordem de somação.

Quando X é simples, esta definição coincide com a Definição 2.2, pois a soma é finita e os sinais se separam termo a termo.

Cabe perguntar se o valor de $\mathbb{E}X$ também independe da *representação* de X , isto é, se qualquer outra decomposição enumerável de Ω em que X seja constante leva ao mesmo resultado. A resposta é sim, e é o análogo, para o caso enumerável, da Proposição 2.3.

Proposição 2.5: Independência da partição

Sejam $\{A_i\}_i$ e $\{B_j\}_j$ partições enumeráveis de Ω em eventos (possivelmente vazios) tais que

$$X = \sum_i x_i \mathbb{1}_{A_i} = \sum_j b_j \mathbb{1}_{B_j}.$$

(a) Se $x_i, b_j \geq 0$ para todos i, j , então

$$\sum_i x_i \mathbb{P}(A_i) = \sum_j b_j \mathbb{P}(B_j)$$

em $[0, \infty]$.

(b) Se $\sum_i |x_i| \mathbb{P}(A_i) < \infty$, então

$$\sum_j |b_j| \mathbb{P}(B_j) < \infty \quad \text{e} \quad \sum_i x_i \mathbb{P}(A_i) = \sum_j b_j \mathbb{P}(B_j).$$

Demonstração. Seja $C_{ij} = A_i \cap B_j$. Para i e j fixos, $A_i = \dot{\bigcup}_j C_{ij}$ e

$B_j = \dot{\bigcup}_i C_{ij}$ são uniões disjuntas *enumeráveis*, de modo que, pela aditividade enumerável de $\mathbb{P}$ (e não apenas a finita),

$$\mathbb{P}(A_i) = \sum_j \mathbb{P}(C_{ij}), \quad \mathbb{P}(B_j) = \sum_i \mathbb{P}(C_{ij}).$$

Além disso, $x_i \mathbb{P}(C_{ij}) = b_j \mathbb{P}(C_{ij})$ para todo par (i, j) : se $C_{ij} = \emptyset$ ambos os lados são nulos; caso contrário, avaliando $X(\omega)$ nas duas representações para $\omega \in C_{ij}$, obtemos $x_i = b_j$. O mesmo vale com módulos.

(a) Se todos os termos são não negativos, então a soma dupla $\sum_{i,j} x_i \mathbb{P}(C_{ij}) \in [0, \infty]$ pode ser calculada em qualquer ordem (Tonelli para séries, s.5 no apêndice). Somando primeiro em j obtemos $\sum_i x_i \mathbb{P}(A_i)$; como $x_i \mathbb{P}(C_{ij}) = b_j \mathbb{P}(C_{ij})$, somando primeiro em i obtemos $\sum_j b_j \mathbb{P}(B_j)$.

(b) Aplicando (a) a $|x_i|$ e $|b_j|$ (que também representam $|X|$), temos

$$\sum_j |b_j| \mathbb{P}(B_j) = \sum_{i,j} |b_j| \mathbb{P}(C_{ij}) = \sum_{i,j} |x_i| \mathbb{P}(C_{ij}) = \sum_i |x_i| \mathbb{P}(A_i) < \infty.$$

Logo a família $\{x_i \mathbb{P}(C_{ij})\}_{i,j}$ é absolutamente somável e Fubini para séries permite somar em qualquer ordem, com o mesmo argumento de (a). $\square$

Corolário 2.4: Qualquer partição calcula $\mathbb{E}X$

Se $X = \sum_j b_j \mathbb{1}_{B_j}$, com $\{B_j\}$ uma partição enumerável de Ω em eventos, então

(a) se $b_j \geq 0$ para todo j ,

$$\mathbb{E}X = \sum_j b_j \mathbb{P}(B_j)$$

em $[0, \infty]$;

(b) se $\sum_j |b_j| \mathbb{P}(B_j) < \infty$, então X é integrável e

$$\mathbb{E}X = \sum_j b_j \mathbb{P}(B_j).$$

Em particular, $\mathbb{E}X^+ = \sum_j b_j^+ \mathbb{P}(B_j)$ e $\mathbb{E}X^- = \sum_j b_j^- \mathbb{P}(B_j)$ para qualquer partição em que X seja constante em cada elemento.

Demonstração. A partição canônica $[X = x_i]$ é uma partição enumerável em que $X = \sum_i x_i \mathbb{1}_{[X=x_i]}$. Aplique a Proposição 2.5 a ela e à partição dada. Para $X^\pm$, observe que $X^\pm = \sum_j b_j^\pm \mathbb{1}_{B_j}$ com coeficientes não negativos e aplique (a). $\square$

Observação 3. A Proposição 2.5 expõe um ingrediente que a definição usual $\mathbb{E}X := \sum_i x_i \mathbb{P}[X = x_i]$, apresentada sem passar pela construção via indicadoras, deixa implícito. A definição pela partição canônica já está bem posta apenas com convergência absoluta. Já a *compatibilidade com outras representações* depende também da aditividade enumerável de $\mathbb{P}$, algo que não era necessário no caso de variáveis simples, onde bastava aditividade finita.

Para *coberturas* enumeráveis não disjuntas $X = \sum_i y_i \mathbb{1}_{C_i}$ a igualdade $\mathbb{E}X = \sum_i y_i \mathbb{P}(C_i)$ exige a hipótese adicional $\sum_i |y_i| \mathbb{P}(C_i) < \infty$ (sem ela pode falhar, mesmo com convergência pontual) e é adiada para depois da integral geral, onde a troca entre esperança e série é justificada.

Analogamente à Observação 2, se Ω é enumerável e X é integrável, então podemos rearranjar a série de $\mathbb{E}X$. Os passos abaixo são justificados porque

$$\sum_t \sum_{\omega} |t| \mathbb{1}_{[X(\omega)=t]} \mathbb{P}(\omega) = \sum_t |t| \mathbb{P}[X = t] < \infty$$

(Tonelli para séries), o que torna a família absolutamente somável e autoriza Fubini na quarta igualdade:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \sum_t t \mathbb{P}[X = t] \\ &= \sum_t t \sum_{\omega: X(\omega)=t} \mathbb{P}(\omega) \\ &= \sum_t t \left(\sum_{\omega} \mathbb{1}_{[X(\omega)=t]} \mathbb{P}(\omega) \right) \\ &= \sum_{\omega} \left(\sum_t t \mathbb{1}_{[X(\omega)=t]} \right) \mathbb{P}(\omega) \\ &= \sum_{\omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega). \end{aligned}$$

Portanto, com $B_i = [X = x_i]$,

$$\sum_i x_i \mathbb{P}(B_i) = \sum_{\omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega), \quad (2.7)$$

e a série do lado direito também converge absolutamente.

Ideia importante

A esperança de uma variável aleatória depende apenas da sua distribuição, ou seja, se X e Y têm a mesma distribuição, então $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}X$. De fato, a Definição 2.3 usa apenas os valores x_i e as probabilidades $\mathbb{P}[X = x_i]$.

Em particular, a esperança pode ser vista como uma propriedade da

distribuição de X , não do espaço amostral subjacente.

Exemplo 2.10: Esperança da distribuição geométrica

Seja $X \sim \text{Geom}(p)$ com $p \in (0, 1)$. Lembremos que

$$\mathbb{P}_X(t) = (1-p)^{t-1}p, \quad t \in \{1, 2, \dots\}$$

portanto,

$$\mathbb{E}X = \sum_{t \geq 1} t(1-p)^{t-1}p$$

e pelo teste da razão a série converge absolutamente. Assim, usando s.6c, do apêndice,

$$\mathbb{E}X = p \sum_{t \geq 1} t(1-p)^{t-1} = p \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}. \quad (2.8)$$

ANÁLISE DO ALGORITMO 1.2

Dado $M \geq 2$, tome $k = \lceil \log_2 M \rceil$ e seja X o número de rodadas do laço repita. Então $X \sim \text{Geom}(p)$ para $p = \mathbb{P}[N < M] = \frac{M}{2^k} > 1/2$. A esperança é

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{p} < 2.$$

Vimos no Exemplo 2.5 que o valor esperado pode ser pouco representativo, mas aqui sabemos mais. Usando o Exercício 8, no final deste capítulo, temos que a probabilidade de ocorrerem mais que 5 vezes o número esperado de rodadas do repita

$$\mathbb{P}\left[X > \frac{5}{p}\right] = (1-p)^{\frac{5}{p}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.0009765625$$

O tempo de execução das instruções dentro do laço é $O(k) = O(\ln M)$. Assim, se a variável aleatória T é o tempo de execução do algoritmo, então com entrada M

$$\mathbb{E}T(M) = \mathbb{E}(X) \cdot O(k) = \frac{1}{p} \cdot O(\ln M) = O(\ln M).$$

Exemplo 2.11: Distribuição binomial negativa

Há dois entendimentos para variável com *distribuição binomial negativa*.

(1) X conta o número *total* de tentativas de Bernoulli, independentes e idênticas, com parâmetro p até o r -ésimo sucesso.

Nesse caso

$$X = G_1 + \dots + G_r$$

com $G_i \sim \text{Geom}(p)$ e sua distribuição é

$$\mathbb{P}_X(t) = \binom{t-1}{r-1} p^r (1-p)^{t-r}, \quad t = r, r+1, \dots$$

Nesse caso, $\mathbb{E}X = r/p$, por linearidade.

(2) Y conta o número de *fracassos* antes do r -ésimo sucesso.

Nesse caso, em função de (1), $Y = X - r$ e tem distribuição

$$\mathbb{P}_Y(t) = \binom{t+r-1}{t} (1-p)^t p^r, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

Notemos que o caso $r = 1$ é a lei da distribuição geométrica.

Denotamos por $\text{BN}(r, p)$ no caso 2, que chamamos de distribuição binomial negativa com parâmetros $r \in \mathbb{Z}_+$ e $p \in (0, 1)$.

Nesse caso, $\mathbb{E}Y = \frac{r}{p} - r$, por linearidade.

2.3 Propriedades da esperança

A seguir veremos propriedades importantes para a média das variáveis aleatórias discretas a valores reais. Começamos por um lema técnico com os fatos sobre $\mathbb{E}|X|$, comparação e igualdade quase certa que serão usados adiante. Todas as variáveis são discretas e usamos a Definição 2.3 e o Corolário 2.4.

Lema 2.1: Ferramentas básicas

Sejam Z, W, X, Y variáveis aleatórias discretas.

(a) Sejam z_i os valores distintos de Z . Para a v.a. $|Z|$ vale

$$\mathbb{E}|Z| = \mathbb{E}Z^+ + \mathbb{E}Z^- = \sum_i |z_i| \mathbb{P}[Z = z_i] \in [0, \infty].$$

Em particular, Z é integrável se, e só se, $\mathbb{E}|Z| < \infty$.

(b) (*Monotonicidade em $[0, \infty]$*) Se $0 \leq Z \leq W$, então $\mathbb{E}Z \leq \mathbb{E}W$.

(c) (*Domínio*) Se $|Z| \leq W$ e W é integrável, então Z é integrável e $\mathbb{E}|Z| \leq \mathbb{E}W$.

(d) (*Igualdade quase certa*) Se $\mathbb{P}[X = Y] = 1$, então, para todo $t \in \mathbb{R}$, vale $\mathbb{P}[X = t] = \mathbb{P}[Y = t]$.

Logo X e Y têm a mesma esperança (definida ou não, finita ou não).

Demonstração. (a) Escreva $|Z| = \sum_i |z_i| \mathbb{1}_{[Z=z_i]}$, uma representação por partição enumerável com coeficientes não negativos. Pelo Co-

rolário 2.4(a), $\mathbb{E}|Z| = \sum_i |z_i| \mathbb{P}[Z = z_i]$. Como $|z_i| = z_i^+ + z_i^-$ e os termos são não negativos, a série se separa em $\sum_i z_i^+ \mathbb{P}[Z = z_i] + \sum_i z_i^- \mathbb{P}[Z = z_i] = \mathbb{E}Z^+ + \mathbb{E}Z^-$.

(b) Sejam $A_i = [Z = z_i]$ e $B_j = [W = w_j]$ as partições canônicas e $C_{ij} = A_i \cap B_j$. Se $C_{ij} \neq \emptyset$, tomando $\omega \in C_{ij}$ obtemos $z_i = Z(\omega) \leq W(\omega) = w_j$; se $C_{ij} = \emptyset$ vale $z_i \mathbb{P}(C_{ij}) = 0 = w_j \mathbb{P}(C_{ij})$. Logo $z_i \mathbb{P}(C_{ij}) \leq w_j \mathbb{P}(C_{ij})$ para todo par (i, j) . Por aditividade enumerável e Tonelli para séries (termos não negativos),

$$\mathbb{E}Z = \sum_i z_i \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i,j} z_i \mathbb{P}(C_{ij}) \leq \sum_{i,j} w_j \mathbb{P}(C_{ij}) = \sum_j w_j \mathbb{P}(B_j) = \mathbb{E}W.$$

(c) Como $0 \leq |Z| \leq W$, o item (b) dá $\mathbb{E}|Z| \leq \mathbb{E}W < \infty$, e o item (a) mostra que Z é integrável.

(d) Como $\mathbb{P}[X \neq Y] = 0$, $\mathbb{P}[X = t] = \mathbb{P}([X = t] \cap [X = Y]) = \mathbb{P}([Y = t] \cap [X = Y]) = \mathbb{P}[Y = t]$. A Definição 2.3 depende de X apenas por seus valores e essas probabilidades. $\square$

Teorema 2.1: Linearidade da esperança

Se X e Y são variáveis aleatórias integráveis e $a, b \in \mathbb{R}$, então $aX + bY$ é integrável e sua esperança satisfaz

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a \mathbb{E}X + b \mathbb{E}Y.$$

Demonstração. Sejam S_X e S_Y conjuntos enumeráveis que contêm os valores de X e Y . Para $(x, y) \in S_X \times S_Y$, seja $D_{xy} = [X = x] \cap [Y = y]$. A família $\{D_{xy}\}$ é uma partição enumerável de Ω em eventos (possivelmente vazios) e, por aditividade enumerável,

$$\sum_{y \in S_Y} \mathbb{P}(D_{xy}) = \mathbb{P}[X = x], \quad \sum_{x \in S_X} \mathbb{P}(D_{xy}) = \mathbb{P}[Y = y]. \quad (2.9)$$

Em cada D_{xy} a variável $Z = aX + bY$ vale $ax + by$, ou seja,

$$Z = \sum_{x,y} (ax + by) \mathbb{1}_{D_{xy}}.$$

Em particular, Z é discreta (seus valores estão no conjunto enumerável $\{ax + by\}$). Os valores $ax + by$ podem se repetir, então esta não é a partição canônica de Z , e o Corolário 2.4 é o que permite usá-la.

Como $|ax + by| \leq |a||x| + |b||y|$, por Tonelli para séries e por (2.9),

$$\begin{aligned} \sum_{x,y} |ax + by| \mathbb{P}(D_{xy}) &\leq |a| \sum_x |x| \sum_y \mathbb{P}(D_{xy}) + |b| \sum_y |y| \sum_x \mathbb{P}(D_{xy}) \\ &= |a| \mathbb{E}|X| + |b| \mathbb{E}|Y| < \infty. \end{aligned}$$

Pelo Corolário 2.4(b), Z é integrável e $\mathbb{E}Z = \sum_{x,y} (ax + by) \mathbb{P}(D_{xy})$.

Pela estimativa acima, as famílias $\{x\mathbb{P}(D_{xy})\}$ e $\{y\mathbb{P}(D_{xy})\}$ são absolutamente somáveis (suas somas de módulos valem $\mathbb{E}|X|$ e $\mathbb{E}|Y|$). Portanto podemos separar a soma e, por Fubini para séries, somar primeiro em y (ou em x):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z &= a \sum_x x \sum_y \mathbb{P}(D_{xy}) + b \sum_y y \sum_x \mathbb{P}(D_{xy}) \\ &= a \sum_x x \mathbb{P}[X = x] + b \sum_y y \mathbb{P}[Y = y] = a \mathbb{E}X + b \mathbb{E}Y,\end{aligned}$$

onde usamos (2.9). $\square$

Teorema 2.2: Monotonicidade da esperança

Se X e Y são integráveis tais que $X \leq Y$ então $\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}Y$.

Demonstração. Se $X \leq Y$ então $Y - X \geq 0$, logo $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$. Da linearidade da esperança $\mathbb{E}Y - \mathbb{E}X \geq 0$ donde segue o teorema. $\square$

Corolário 2.5: Consequências da linearidade e monotonicidade

As seguintes propriedades decorrem dos teoremas acima.

1. Se $X = c$ então $\mathbb{E}X = c$, para qualquer $c \in \mathbb{R}$.
2. Se $\mathbb{E}X$ é integrável, então $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}X + b$.
3. Se $\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = 1$, então X é integrável e $a \leq \mathbb{E}X \leq b$.
4. Se X é integrável então $X \cdot \mathbb{1}_A$ é integrável para todo evento A .
5. Se $\mathbb{E}X$ está definida então $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$.

Demonstração. Vamos demonstrar apenas os três últimos itens, os outros ficam para verificação do leitor.

3. Seja $E = [a \leq X \leq b]$, com $\mathbb{P}(E) = 1$, e $X' = X\mathbb{1}_E + a\mathbb{1}_{\bar{E}}$. Então $a \leq X' \leq b$ em todo ponto e $\mathbb{P}[X' = X] \geq \mathbb{P}(E) = 1$. Como $|X'| \leq \max\{|a|, |b|\}$, que é constante e portanto integrável, o Lema 2.1(c) mostra que X' é integrável, e o Teorema 2.2 (com as constantes a e b) dá $a \leq \mathbb{E}X' \leq b$. Pelo Lema 2.1(d), $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X'$ (e X é integrável pois X e X' têm a mesma distribuição).

4. Temos $|X\mathbb{1}_A| = |X|\mathbb{1}_A \leq |X|$ e $|X|$ é integrável pelo Lema 2.1(a). O Lema 2.1(c) dá a integrabilidade de $X\mathbb{1}_A$.

5. Pelo Lema 2.1(a), $\mathbb{E}|X| = \mathbb{E}X^+ + \mathbb{E}X^-$. Se X não é integrável, como $\mathbb{E}X$ está definida, um entre $\mathbb{E}X^+$ e $\mathbb{E}X^-$ é infinito, logo $\mathbb{E}|X| = \infty \geq |\mathbb{E}X|$. Se X é integrável, $|X|$ também é, e de $-|X| \leq X \leq |X|$ o Teorema 2.2 dá $-\mathbb{E}|X| \leq \mathbb{E}X \leq \mathbb{E}|X|$, isto é, $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$. $\square$

O item 2 vale também quando $\mathbb{E}X = \pm\infty$ (com $a \neq 0$; para $a = 0$ é preciso a convenção $0 \cdot \infty = 0$), mas a prova exige um argumento separado com $\mathbb{E}X^\pm$, pois os teoremas acima são enunciados para variáveis integráveis. Para $a < 0$ os papéis de X^+ e X^- se trocam.

Proposição 2.6

Se X assume valores inteiros e não negativos, então $\mathbb{E}X$ está bem definida e

$$\mathbb{E}X = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}[X > n].$$

Demonstração. Se X assume valores não negativos, $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^+ \in [0, \infty]$ e que $\mathbb{E}X$ está definida. Rearranjando os termos (Tonelli para séries), a esperança é

$$\begin{aligned} \sum_{t=0}^{\infty} t \mathbb{P}_X(t) &= \mathbb{P}_X(1) + \mathbb{P}_X(2) + \mathbb{P}_X(3) + \mathbb{P}_X(4) + \cdots \\ &\quad + \mathbb{P}_X(2) + \mathbb{P}_X(3) + \mathbb{P}_X(4) + \cdots \\ &\quad + \mathbb{P}_X(3) + \mathbb{P}_X(4) + \cdots \\ &\quad + \mathbb{P}_X(4) + \cdots \\ &\quad \vdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{t=n+1}^{\infty} \mathbb{P}_X(t). \end{aligned}$$

Por aditividade enumerável, como $[X > n] = \dot{\bigcup}_{t>n} [X = t]$, temos $\sum_{t>n} \mathbb{P}[X = t] = \mathbb{P}[X > n]$, o que conclui a prova. $\square$

Proposição 2.7: Condição de integrabilidade

Uma variável aleatória X é integrável se, e somente se,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}[|X| \geq n] < +\infty.$$

Demonstração. Seja $Y = |X| \geq 0$. Pelo Lema 2.1(a), X é integrável se, e somente se, $\mathbb{E}Y < \infty$. Como Y é discreta, $\lfloor Y \rfloor$ também é, com valores inteiros e não negativos, e $0 \leq \lfloor Y \rfloor \leq Y \leq \lfloor Y \rfloor + 1$.

Pelo Lema 2.1(b) (monotonicidade em $[0, \infty]$), $\mathbb{E}\lfloor Y \rfloor \leq \mathbb{E}Y \leq \mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + 1$. Além disso, $\mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + 1 = \mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + 1$ em $[0, \infty]$: se $\lfloor Y \rfloor = \sum_i w_i \mathbb{1}_{A_i}$ é a representação canônica, o Corolário 2.4(a) e a separação de séries de termos não negativos dão $\mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + 1 = \sum_i (w_i + 1) \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + \sum_i \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + 1$. Logo

$$\mathbb{E}\lfloor Y \rfloor \leq \mathbb{E}Y \leq \mathbb{E}\lfloor Y \rfloor + 1. \quad (2.10)$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, como $\lfloor Y \rfloor$ é o maior inteiro $\leq Y$, temos $n \leq Y \iff n \leq \lfloor Y \rfloor$, isto é, $\lfloor Y \rfloor \geq n \iff \lfloor Y \rfloor > n-1$. Pela Proposição 2.6, e como $\lfloor Y \rfloor > n-1 \iff \lfloor Y \rfloor \geq n$, temos

$$\mathbb{E} \lfloor Y \rfloor = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}[\lfloor Y \rfloor \geq n+1] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}[\lfloor Y \rfloor \geq n] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}[Y \geq n].$$

Substituindo em (2.10),

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}[|X| \geq n] \leq \mathbb{E}|X| \leq \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}[|X| \geq n] + 1,$$

em $[0, \infty]$. Portanto $\mathbb{E}|X| < \infty$ se, e só se, $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|X| \geq n) < \infty$. $\square$

Teorema 2.3: Produto de variáveis aleatórias independentes

Sejam

$$X: \Omega \rightarrow S \quad \text{e} \quad Y: \Omega \rightarrow R$$

variáveis aleatórias discretas independentes (S e R enumeráveis) e sejam

$$f: S \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g: R \rightarrow \mathbb{R}$$

funções tais que $f(X)$ e $g(Y)$ são integráveis. Então $f(X) \cdot g(Y)$ é integrável e

$$\mathbb{E}(f(X) \cdot g(Y)) = \mathbb{E}(f(X)) \mathbb{E}(g(Y)).$$

Demonstração. Seja $D_{xy} = [X = x] \cap [Y = y]$, partição enumerável de Ω em que $f(X)g(Y)$ vale $f(x)g(y)$. Pela independência, $\mathbb{P}(D_{xy}) = \mathbb{P}[X = x]\mathbb{P}[Y = y]$. Aplicando o Corolário 2.4(a) a $|f(X)g(Y)|$ e Tonelli para séries,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|f(X)g(Y)| &= \sum_{x,y} |f(x)| |g(y)| \mathbb{P}[X = x] \mathbb{P}[Y = y] \\ &= \left(\sum_x |f(x)| \mathbb{P}[X = x] \right) \left(\sum_y |g(y)| \mathbb{P}[Y = y] \right) = \mathbb{E}|f(X)| \mathbb{E}|g(Y)| < \infty, \end{aligned}$$

onde a última igualdade usa o mesmo corolário na partição $[X = x]$ (em que $|f(X)|$ é constante), e analogamente para Y . Logo $f(X)g(Y)$ é integrável, o Corolário 2.4(b) dá

$$\mathbb{E}(f(X)g(Y)) = \sum_{x,y} f(x)g(y) \mathbb{P}[X = x] \mathbb{P}[Y = y]$$

e, como a família é absolutamente somável, Fubini para séries dá

$$\mathbb{E}f(X)g(Y) = \left(\sum_x f(x) \mathbb{P}[X = x] \right) \left(\sum_y g(y) \mathbb{P}[Y = y] \right) = \mathbb{E}(f(X)) \mathbb{E}(g(Y)).$$

$\square$

Corolário 2.6

Se X e Y são discretas independentes e integráveis, então XY é integrável e

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y). \quad (2.11)$$

Demonstração. Tome f e g como a identidade no teorema. $\square$

Observação 4. O Teorema 2.2, da monotonicidade, ainda vale com as hipóteses de $\mathbb{E}X$ e $\mathbb{E}Y$ definidos. Basta, por exemplo, $\mathbb{E}X^- < \infty$ ou $\mathbb{E}Y^+ < \infty$ para que ambas estejam definidas.

Se X é integrável, $\mathbb{E}Y$ está definida e $a, b \in \mathbb{R}$, então $\mathbb{E}aX + bY$ está definida e $\mathbb{E}aX + bY = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y$ (com $0 \cdot \infty = 0$). Em geral, $aX + bY$ é integrável se, e só se, bY o é.

2.3.1 Esperança de funções de variáveis aleatórias

Seja $X: \Omega \rightarrow S$, com $S \subset \mathbb{R}$ enumerável. A lei de X é a medida de probabilidade $\mathbb{P}_X$ em $(S, 2^S)$ dada por $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}[X \in A]$. Em particular, $(S, \mathbb{P}_X)$ é um espaço de probabilidade discreto.

Toda $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ é uma variável aleatória em $(S, \mathbb{P}_X)$, discreta pois $f(S)$ é enumerável. Sua lei é a medida imagem (*pushforward*) de $\mathbb{P}_X$ por f , classicamente denotado $\mathbb{P}_X \circ f^{-1}$:

$$(\mathbb{P}_X \circ f^{-1})(\{y\}) = \mathbb{P}_X[f = y] \quad \text{para } y \in f(S).$$

Por outro lado, $f(X)$ é variável aleatória em $(\Omega, \mathbb{P})$ e

$$\mathbb{P}[f(X) = y] = \mathbb{P}[X \in f^{-1}(y)] = \mathbb{P}_X(f^{-1}(y)) = (\mathbb{P}_X \circ f^{-1})(\{y\}).$$

Portanto, ***f em $(S, \mathbb{P}_X)$ e $f(X)$ em $(\Omega, \mathbb{P})$ têm a mesma lei.*** Como a esperança depende apenas da lei, $\mathbb{E}f(X)$ pode ser calculada em $(S, \mathbb{P}_X)$.

Proposição 2.8: Mudança de espaço

Para toda $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, a esperança $\mathbb{E}_S[f]$ está definida se, e somente se, $\mathbb{E}_\Omega[f(X)]$ está, e nesse caso

$$\mathbb{E}_S[f] = \mathbb{E}_\Omega[f(X)].$$

Além disso, f é integrável em $(S, \mathbb{P}_X)$ se, e somente se, $f(X)$ é integrável em $(\Omega, \mathbb{P})$.

Demonstração. Se $g: S \rightarrow \mathbb{R}$ é qualquer função, o mesmo cálculo que mostra que f e $f(X)$ têm a mesma lei dá $\mathbb{P}_X[g = y] = \mathbb{P}[g(X) = y]$ para todo $y \in \mathbb{R}$, com ambos os lados nulos se $y \notin g(S)$. Logo,

as somas $\sum_y y^\pm \mathbb{P}_E(X)g = y$ e $\sum_y y^\pm \mathbb{P}[g(X) = y]$ têm os mesmos termos não nulos, e portanto

$$\mathbb{E}_S[g^\pm] = \mathbb{E}_\Omega(g(X))^\pm \quad \text{em } [0, \infty],$$

onde usamos $g^\pm(X) = (g(X))^\pm$. Tomando $g = f$, como “ $\mathbb{E}$ está definida” e o valor $\mathbb{E}f = \mathbb{E}f^+ - \mathbb{E}f^-$ dependem só desses dois números, seguem a equivalência e a igualdade. Tomando $g = |f|$, obtemos $\mathbb{E}_S[|f|] = \mathbb{E}_\Omega[|f(X)|]$, o que dá a equivalência de integrabilidade. $\square$

Teorema 2.4: Lei do Estatístico Inconsciente (LOTUS)

Seja $f: S \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Se $f \geq 0$, então $\mathbb{E}f(X) = \sum_{s \in S} f(s) \mathbb{P}[X = s]$ em $[0, \infty]$.
- (b) Se $\mathbb{E}f(X)$ está definida, então a série $\sum_s f(s) \mathbb{P}[X = s]$ está definida e $\mathbb{E}f(X) = \sum_s f(s) \mathbb{P}[X = s]$. Se $f(X)$ é integrável, a série converge absolutamente.

Demonstração. (a) Seja $A_y = \{s \in S: f(s) = y\}$, $y \in f(S)$, a partição canônica de f em $(S, \mathbb{P}_X)$, que é um espaço de probabilidade, e a $\{\{s\}\}_{s \in S}$ a partição fina, com $\mathbb{P}_X(\{s\}) = \mathbb{P}[X = s]$. Pela Proposição 2.8 e pela definição de $\mathbb{E}$ em $(S, \mathbb{P}_X)$, $\mathbb{E}f(X) = \mathbb{E}_S f = \sum_y y \mathbb{P}_X(A_y)$. Como $f = \sum_s f(s) \mathbb{1}_{\{s\}}$ e todos os coeficientes são não negativos, o item (a) da Proposição 2.5, aplicada a $(S, \mathbb{P}_X)$, dá $\sum_y y \mathbb{P}_X(A_y) = \sum_s f(s) \mathbb{P}_X(\{s\})$.

(b) Aplique (a) a f^+ e f^- , usando $f^\pm(X) = (f(X))^\pm$: $\mathbb{E}((f(X))^\pm) = \sum_s f^\pm(s) \mathbb{P}[X = s]$. Como $\mathbb{E}f(X)$ está definida, não são ambas infinitas, e subtraindo obtém-se a igualdade. Se $f(X)$ é integrável, então $\mathbb{E}|f(X)| = \mathbb{E}(f(X))^+ + \mathbb{E}(f(X))^- < \infty$ (Lema 2.1(a)) e, por (a) aplicado a $|f|$, temos $\sum_s |f(s)| \mathbb{P}[X = s] < \infty$. $\square$

Observação 5. A Proposição 2.8 não exige integrabilidade: é uma igualdade de somas de termos não negativos. A LOTUS compara duas partições de S , a grossa $\{A_y\}$ e a fina $\{\{s\}\}$. A igualdade das duas somas é a independência da partição (Proposição 2.5), e a convergência absoluta dá o valor finito. Para $f \geq 0$, não é preciso hipótese alguma.

2.4 Variáveis contínuas, a Uniforme e simulação

Até aqui, toda variável aleatória X que consideramos era discreta, sua distribuição estava concentrada em um conjunto enumerável e $\mathbb{P}[X \in B] = \sum_{x \in B} \mathbb{P}[X = x]$. Isso não cobre situações básicas, como

O termo “Lei do Estatístico Inconsciente” foi cunhado por Sheldon Ross em seu famoso livro “A First Course in Probability” (1976). A piada interna da comunidade acadêmica é que mudar o parâmetro de x para $f(x)$ dentro do somatório ou da integral parece tão óbvio e natural que as pessoas fazem isso mecanicamente, como se fosse uma mera definição, quando na verdade trata-se de um teorema que exige demonstração.

“sortear um ponto ao acaso em $[0, 1]$ ”, em que cada valor individual deve ter probabilidade zero e, ainda assim, o valor sorteado existe. Além disso, “sortear um ponto ao acaso em $[0, 1]$ ” pode ser uma ferramenta para tratar casos discretos (em Acoplamento, por exemplo, na Seção 3.1.1).

Seja X uma variável aleatória real com *distribuição acumulada* $F_X(x) = \mathbb{P}[X \leq x]$.

Uma função $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ é a função de distribuição de alguma variável aleatória se, e somente se, satisfaz:

- (i) **Monotonicidade** $x \leq y \implies F(x) \leq F(y)$;
- (ii) **Continuidade à direita** $\lim_{y \rightarrow x^+} F(y) = F(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$;
- (iii) **Limites nos extremos** $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

A necessidade dessas três condições, quando $F(x) = \mathbb{P}[X \leq x]$ para alguma variável aleatória X , decorre dos axiomas de probabilidade:

(i) de $[X \leq x] \subseteq [X \leq y]$ para $x \leq y$; (ii) e (iii) da continuidade da probabilidade, aplicada às sequências de eventos $[X \leq y_n] \downarrow [X \leq x]$ quando $y_n \downarrow x$, $[X \leq x_n] \downarrow \emptyset$ quando $x_n \rightarrow -\infty$, e $[X \leq x_n] \uparrow \Omega$ quando $x_n \rightarrow +\infty$.

A suficiência é o conteúdo da Proposição 2.10: dada F satisfazendo (i)–(iii), a variável $X := F^{-1}(U)$, com $U \sim U(0, 1)$, tem função de distribuição F . Ou seja, as três condições *caracterizam* as funções de distribuição: toda F que as satisfaz é realizada por alguma variável aleatória.

Vale notar que não se exige continuidade de F : os saltos de F correspondem aos átomos de X (como no Exemplo 2.12), e são no máximo enumeráveis, por F ser monótona e limitada.

Dizemos que X (ou sua distribuição) é *absolutamente contínua* se existe uma função contínua por partes¹ $f_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ tal que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}. \quad (2.12)$$

A função f_X é chamada de *densidade* de X .

Proposição 2.9

Seja X absolutamente contínua com densidade $f = f_X$. Então

- (a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$;
 - (b) $\mathbb{P}[X = x] = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$; em particular, F_X é contínua
- $$\mathbb{P}[a < X < b] = \mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \mathbb{P}[a < X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$
- para quaisquer $a < b$;

¹ Uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é *contínua por partes* se, em cada intervalo limitado, ela é contínua exceto em um número finito de pontos, nos quais existem os limites laterais (finitos). De fato, basta ser Borel-mensurável.

A densidade *não* é uma probabilidade, $f(x)$ pode ser maior que 1. Sua interpretação é local: para h pequeno, $\mathbb{P}[x < X \leq x + h] \approx f(x)h$. Além disso, como $\mathbb{P}[X = x] = 0$ para todo x , alterar o valor de f em um número finito de pontos não muda a distribuição de X .

(c) $F'_X(x) = f(x)$ em todo ponto x onde f é contínua.

Demonstração. Exercício. □

Como no caso discreto, esperanças se calculam integrando contra a distribuição; agora, contra a densidade. Se g é contínua por partes e $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| dF_X(x) < \infty$, então

$$\mathbb{E}(g(X)) := \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF_X(x). \quad (2.13)$$

em que a integral é de Riemann–Stieltjes (imprópria). A definição vale para X discreta com g contínua. Quando X é absolutamente contínua com densidade f_X , vale $dF_X(x) = f_X(x) dx$, e portanto

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx. \quad (2.14)$$

Em particular, $\mathbb{E}(X) = \int x f_X(x) dx$.

2.4.1 A distribuição uniforme (contínua)

Sejam $a < b$. Dizemos que X tem distribuição *uniforme em $[a, b]$* , e escrevemos $X \sim U(a, b)$, se X é absolutamente contínua com densidade

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$$

e função de distribuição acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Para $[c, d] \subseteq [a, b]$,

$$\mathbb{P}(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a},$$

ou seja, a probabilidade de um intervalo é proporcional ao seu comprimento.

Se $X \sim U(a, b)$, então

$$\mathbb{E}X = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}, \quad \mathbb{E}(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

A uniforme em $[0, 1]$ é o “*gerador básico de aleatoriedade*”, no sentido da proposição a seguir.

Proposição 2.10: Transformação integral da probabilidade

Seja F uma função de distribuição qualquer e defina

$$F^{-1}(u) := \inf\{x \in \mathbb{R}: F(x) \geq u\}$$

para $u \in (0, 1)$.

Se $U \sim U(0, 1)$, então $F^{-1}(U)$ tem função de distribuição F .

Demonstração. F^{-1} está bem definida. Fixe $u \in (0, 1)$. Pelas condições (iii) — limites nos extremos —, existe b com $F(b) \geq u$ (pois $F(x) \rightarrow 1$) e existe a com $F(a) < u$ (pois $F(x) \rightarrow 0$); pela monotonicidade (i), $F(x) < u$ para todo $x \leq a$. Logo o conjunto

$$A_u := \{x \in \mathbb{R}: F(x) \geq u\}$$

é não vazio (contém b) e limitado inferiormente (por a), e portanto $F^{-1}(u) = \inf A_u$ é um número real bem definido.

Afirmção: para todo $x \in \mathbb{R}$ e $u \in (0, 1)$,

$$F^{-1}(u) \leq x \iff u \leq F(x). \quad (2.15)$$

($\Leftarrow$) Se $u \leq F(x)$, então $x \in A_u$, logo $F^{-1}(u) = \inf A_u \leq x$.

($\Rightarrow$) Suponha $F^{-1}(u) \leq x$. Por definição de ínfimo, existe uma sequência $(x_n)_n \subseteq A_u$ com $x_n \downarrow F^{-1}(u)$ (tome, por exemplo, $x_n \in A_u \cap (F^{-1}(u), F^{-1}(u) + 1/n]$, que é não vazio pela definição de ínfimo). Como $x_n \in A_u$, temos $F(x_n) \geq u$ para todo n . Além disso, $x_n \rightarrow F^{-1}(u)$ com $x_n \geq F^{-1}(u)$, de modo que, pela continuidade à direita (ii), $F(x_n) \rightarrow F(F^{-1}(u))$. Logo $F(F^{-1}(u)) \geq u$, isto é, $F^{-1}(u) \in A_u$ (o ínfimo é, de fato, mínimo). Como $F^{-1}(u) \leq x$ e F é não decrescente (i), segue $F(x) \geq F(F^{-1}(u)) \geq u$, o que prova a afirmação.

Conclusão. Seja $U \sim U(0, 1)$, que toma valores em $(0, 1)$ com probabilidade 1. Para todo $x \in \mathbb{R}$, usando (2.15) com $u = U$,

$$\mathbb{P}[F^{-1}(U) \leq x] = \mathbb{P}[U \leq F(x)] = F(x),$$

em que a última igualdade usa que $F(x) \in [0, 1]$ e que $\mathbb{P}[U \leq t] = t$ para $t \in [0, 1]$. Logo $F^{-1}(U)$ tem função de distribuição F . $\square$


Assim, *qualquer distribuição pode ser simulada a partir de uma variável uniforme*, o que será explorado nos algoritmos probabilísticos.

Exemplo 2.12: Simulação de uma Bernoulli

Seja $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, de modo que

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

A função tem um salto de tamanho $1 - p$ em $x = 0$ e de tamanho p em $x = 1$.



O cálculo de F_X^{-1} , via ínfimo, dá

$$F_X^{-1}(u) = \inf\{x: F_X(x) \geq u\} = \begin{cases} 0, & u \leq 1 - p \\ 1, & u > 1 - p \end{cases}$$

Dado $U \sim U(0, 1)$, a v.a. $X' = F_X^{-1}(U) = \mathbb{1}_{[U > 1-p]}$ tem a mesma distribuição de X , pela Proposição 2.10.

Note que $1 - U \sim U(0, 1)$ e que $\mathbb{P}[U \leq p] = p$, de modo que a variável $X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]}$ também tem distribuição Bernoulli(p). Por isso, costuma-se escrever de forma simétrica que U nos dá

$$X' = \mathbb{1}_{[U \leq p]}$$

que é exatamente como qualquer implementação sorteia ω uniformemente, compara com p e gera uma Bernoulli:

```
if random() <= p:
    return 1
else:
    return 0
```

Por exemplo, para simular um dado justo, $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ com

distribuição uniforme (discreta). A função de distribuição F_X é

$$F_X(x) = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{6} \mathbb{1}_{[k \leq x]} = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1/6, & 1 \leq x < 2 \\ 2/6, & 2 \leq x < 3 \\ 3/6, & 3 \leq x < 4 \\ 4/6, & 4 \leq x < 5 \\ 5/6, & 5 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

Ela é constante por partes, com saltos de tamanho $1/6$ em cada inteiro de 1 a 6. Não é bijetora, então não existe inversa de F_X no sentido clássico.




Figura 2.1: FDA de $X(\omega) = \omega$ no lançamento de um dado equilibrado.

Para $u \in (0, 1)$, $F_X^{-1}(u) = \inf\{x: F_X(x) \geq u\}$ é, por definição, o menor valor x cuja “escada” F_X já atingiu ou ultrapassou o nível u . Como F só cresce nos pontos $1, \dots, 6$, o resultado é sempre um desses inteiros (veja Figura 2.1):

$$F^{-1}(u) = k \quad \text{sempre que} \quad \frac{k-1}{6} < u \leq \frac{k}{6}, \quad k = 1, \dots, 6.$$

Dado $U \sim U(0, 1)$, devolva

$$X' = F_X^{-1}(U) = \lceil 6U \rceil,$$

que é, exatamente, k quando U cai no intervalo $\left(\frac{k-1}{6}, \frac{k}{6}\right]$. Pela proposição, X' tem função de distribuição F_X , ou seja, X' é um dado justo.

Exercícios

Exercício 5. Sejam $X = \sum_{k=1}^n x_k \mathbb{1}_{A_k}$ e $Y = \sum_{\ell=1}^m y_\ell \mathbb{1}_{B_\ell}$ duas variáveis aleatórias simples de $(\Omega, \mathbb{P})$. Verifique que valem as seguintes identidades

1. para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$

$$aX + bY = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m (ax_k + by_\ell) \mathbb{1}_{A_k \cap B_\ell};$$

2.

$$X \cdot Y = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m (x_k \cdot y_\ell) \mathbb{1}_{A_k \cap B_\ell}.$$

Exercício 6 (desigualdade de Jensen). Sejam X uma variável aleatória integrável, $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo tal que $\mathbb{P}[X \in I] = 1$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função convexa em I , então $\mathbb{E}(f(X))$ está definida e

$$\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}X). \quad (2.16)$$

Exercício 7. Conclua do teorema acima que $\mathbb{E}|X| \geq |\mathbb{E}X|$ e que $\mathbb{E}(X^2) \geq (\mathbb{E}X)^2$.

Exercício 8. Mostre que se Z tem distribuição geométrica com parâmetro p então $\mathbb{P}[Z > n-1] = (1-p)^{n-1}$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 9. Este exercício fornece uma maneira de derivar um algoritmo Las Vegas a partir de um algoritmo Monte Carlo.

Considere um algoritmo Monte Carlo A para um problema computacional Π cujo tempo de execução esperado é de no máximo $T(n)$ em qualquer instância de tamanho n e que produz uma solução correta com probabilidade $\gamma(n)$. Suponha ainda que, dada uma solução para Π , possamos verificar sua correteza no tempo $t(n)$. Mostre como obter um algoritmo Las Vegas que sempre fornece uma resposta correta para Π e roda em um tempo esperado de no máximo $(T(n) + t(n))/\gamma(n)$.

Exercício 10 (linearidade da esperança, o caso de séries). Prove que se $X_1, X_2, \dots$ são variáveis aleatórias sobre Ω enumerável e $\sum_{i \geq 1} \mathbb{E}|X_i|$ converge, então $\mathbb{E} \sum_{i \geq 1} X_i = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}X_i$.

Exercício 11. Verifique que a hipótese de convergência é necessária no Exercício 10. Para tal, considere o espaço de probabilidade $(\mathbb{N}, \mathbb{P})$ com $\mathbb{P}(n) = 2^{-n}$ e as variáveis aleatórias

$$X_n(j) := \begin{cases} 2^n, & \text{se } j = n, \\ -2^{n+1}, & \text{se } j = n+1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

1. Mostre que $\mathbb{E}X_n = 0$ para todo $n \geq 1$.
2. Tome $X = \sum_{n \geq 1} X_n$. Determine $X(1), X(2), X(3), \dots$.
3. Usando o item anterior determine $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} X(n)\mathbb{P}(n)$.

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é dita convexa se para quaisquer $x, y \in [a, b]$ e para todo $t \in [0, 1]$, tem-se que o segmento de reta que une x e y fica acima do gráfico de f entre x e y , isto é, $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$

Conclua que $\mathbb{E}\sum_n X_n \neq \sum_n \mathbb{E}X_n$.

Exercício 12. Considere uma moeda que resulta em cara com probabilidade $1/5$ e coroa com probabilidade $4/5$. Justifique que a probabilidade de sair menos que k coroas em $2k$ lançamentos (independentes) é

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} (4/5)^i (1/5)^{2k-i} < (1/5)^{2k} 4^k \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i}.$$

Prove que a probabilidade de sair menos que k coroas em $2k$ lançamentos dessa moeda é menor que $(4/5)^{2k}$ (dica: teorema do binômio de Newton para o somatório na equação acima).

3

Quicksort probabilístico

O *quicksort* é um algoritmo recursivo de ordenação que, grosso modo, funciona da seguinte maneira: dada uma sequência S de números, dos quais o primeiro é chamado de *pivô*, o *quicksort*(S) compara o pivô com cada outro elemento de S e rearranja a sequência, os elementos menores que o pivô formam a subsequência S_E (alocados à esquerda do pivô no vetor) e os demais, que não o pivô, formam a subsequência S_D (alocados à direita do pivô no vetor); o algoritmo devolve a sequência (*quicksort*(S_E), pivô, *quicksort*(S_D)) ordenada recursivamente.

O *quicksort* foi inventado por Charles A. R. Hoare por volta de 1960 e sabemos que é muito rápido em geral, mas é lento em algumas raras instâncias. É um algoritmo que ordena os números em função dos resultados das comparações entre elementos da entrada e, nesse tipo de algoritmo, medimos a eficiência do algoritmo contando o número de comparações realizadas para ordenar a sequência. O algoritmo *quicksort* executa $O(n \ln n)$ comparações em média e $O(n^2)$ comparações no pior caso para ordenar sequências de tamanho n . A Figura 3.1 abaixo ilustra exemplos de melhor caso e de pior caso da árvore de recursão para uma sequência de tamanho 6.




Figura 3.1: em cima à direita temos uma árvore de recursão do *quicksort* onde o pivô é a mediana da sequência. A outra árvore, abaixo e à esquerda, é o caso onde o pivô é sempre o menor elemento da sequência.

É sabido que para garantir $O(n \ln n)$ comparações numa execução é suficiente garantir que as subsequências geradas no pivotamento tenham sempre uma fração aproximadamente constante do tamanho da sequência que as origina. Por exemplo, se S_E (ou S_D) sempre tem 10% do tamanho de S então o número de comparações executadas pelo *quicksort* numa instância de tamanho n , que denotamos $T(n)$, é o número de comparações executadas em S_E mais o número de comparações executadas em S_D mais as $O(n)$ comparações executadas no particionamento que cria essas subsequências

$$T(n) = T(0,1n) + T(0,9n) + O(n)$$

cuja solução é uma função em $O(n \ln n)$. Não há nada de especial na escolha de 10%. De fato, se uma proporção for mantida no particionamento, digamos que a menor parte tem uma fração α da entrada, então a recorrência $t(n) \leq t(\lfloor \alpha n \rfloor) + t(\lfloor (1 - \alpha)n \rfloor) + cn$ para constantes $\alpha, c > 0$ tem solução $O(n \ln n)$ (Cormen et al., 2009).

Na versão probabilística do *quicksort* a aleatoriedade é usada para descaracterizar o pior caso no sentido de que, sorteando o pivô como qualquer elemento da sequência, com grande chance evitamos os 10% menores e os 10% maiores elementos do vetor de modo que na maior parte do tempo os particionamentos garantem pelo menos uma fração constante da sequência original no menor lado.

Algoritmo 3.1: *Quicksort* aleatorizado.

Instância: uma sequência numérica $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Resposta: os elementos de S em ordem crescente.

```

1 se  $|S| \leq 50$  então
2   ordene  $S$  na força bruta ;
3   responda a sequência ordenada.
4 senão  $z \xleftarrow{R} S$ ;
5 para cada  $y \in S, y \neq z$  faça
6   se  $y < z$  então insira  $y$  em  $S_E$ ;
7   senão insira  $y$  em  $S_D$ ;
8 ordene recursivamente a subsequência  $S_E$ ;
9 ordene recursivamente a subsequência  $S_D$ ;
10 responda  $(S_E, z, S_D)$ .
```

Sedgewick (1977) analisou matematicamente a sobrecarga das chamadas recursivas do *quicksort* em vetores muito pequenos. Ele provou que interromper a recursão para subsequências com tamanho $\leq n_0$ e aplicar o *insertion sort* reduz significativamente o tempo total de execução. Nos resultados originais da década de 1970, a constante ideal encontrada para n_0 situava-se na faixa de 10 a 25 elementos

(com 20 a 25 sendo o ponto ideal nos modelos computacionais analisados na época). Em arquiteturas modernas e linguagens atuais, esse limite costuma variar entre 10 e 15 devido ao comportamento de cache e otimizações de instrução do processador. Aqui, por conveniência, usamos 50.

Para simplificar a análise assumimos que na instância os elementos de S são distintos. Mostraremos que, com essa estratégia, o número de comparações entre elementos de S é $O(n \ln n)$ com alta probabilidade.

A análise desse algoritmo é um detalhamento da seguinte ideia: consideremos um elemento x de uma instância S para o algoritmo. Sejam $S_0 := S$ e $S_1, S_2, \dots, S_M$ as subsequências a que x pertence após cada particionamento durante uma execução. O i -ésimo particionamento é *bom* se o pivô não está entre os 10% menores nem entre os 10% maiores elementos de S_i , o que supomos, neste parágrafo, ocorrer com probabilidade exatamente $4/5$ e independente dos outros particionamentos, de modo que $|S_i|/10 \leq |S_{i+1}| \leq 9|S_i|/10$ e portanto x passa por no máximo $\log_{10/9}(n)$ particionamentos bons. Agora, a variável aleatória $M = M(x)$ não deve ser muito maior que $2 \log_{10/9}(n)$ pois pelo Exercício 12, página 55, a probabilidade de ocorrerem menos que $\log_{10/9}(n)$ particionamentos bons em $2 \log_{10/9}(n)$ particionamentos é menor que

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{2 \log_{10/9}(n)} < \left(\frac{9}{10}\right)^{2 \log_{10/9}(n)} = \frac{1}{n^2}.$$

A cada particionamento o elemento não-pivô x é comparado uma única vez, com o pivô sorteado. Assim, o número total de comparações numa execução é a soma para todo x do número de particionamentos pelos quais x passa. Portanto, uma execução realiza mais que $2n \log_{10/9}(n)$ comparações somente se existe um x que passa por mais que $2 \log_{10/9}(n)$ particionamentos o que ocorre com probabilidade no máximo $n(1/n^2) = 1/n$. Portanto, com alta probabilidade, o *quicksort* realiza $O(n \ln n)$ comparações.

As ordenações “na força bruta” das subsequências disjuntas com até 50 elementos também fazem comparações, mas são $O(1)$ comparações em cada uma e isso soma $O(n)$, o que não altera o resultado.

3.1 Dominação estocástica

Em muitas análises de algoritmos probabilísticos a distribuição exata de uma variável aleatória é complicada, mas sabemos que ela é “pelo menos tão grande quanto” (ou “no máximo tão grande quanto”) uma variável cuja distribuição conhecemos bem. Por exemplo, no *quicksort* aleatorizado a probabilidade de um particionamento ser um sucesso

muda a cada passo, mas sabemos que ela nunca é menor que uma constante p . A *dominação estocástica* formaliza essa comparação.

Intuitivamente, a dominação estocástica captura a ideia de que uma variável “tende a assumir valores maiores” do que a outra. Para variáveis aleatórias reais, ela é definida em termos de probabilidades de cauda, ou equivalentemente em termos de funções de distribuição acumulada.

Definição 3.1: Dominação estocástica

Sejam X e Y variáveis aleatórias reais (não necessariamente definidas no mesmo espaço de probabilidade). Dizemos que X *domina estocasticamente* Y , e escrevemos $X \succeq Y$, se

$$\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

Observemos que a definição compara apenas as *distribuições*; nada é dito sobre a relação entre os valores de X e Y numa mesma realização do experimento. Na verdade, X e Y podem até ser independentes, e nesse caso pode ocorrer $X < Y$ com probabilidade positiva, mesmo com $X \succeq Y$.

Por exemplo, se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ e $Y \sim \text{Bernoulli}(q)$ com $p \geq q$. Para $t < 0$ as duas probabilidades $\mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[Y > t]$ valem 1; para $0 \leq t < 1$ temos $\mathbb{P}[X > t] = p \geq q = \mathbb{P}[Y > t]$; para $t \geq 1$ ambas valem 0. Logo $X \succeq Y$.

Exemplo 3.1: Quando Poisson $\succeq$ Bernoulli

Seja X uma variável aleatória discreta representando a contagem de eventos e $\lambda \in (0, \infty)$.

Dizemos que X segue uma *distribuição de Poisson* com parâmetro de taxa λ , denotado por $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, se tem lei

$$\mathbb{P}_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k \in \{0, 1, \dots\}.$$

Sejam $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Bernoulli}(p)$ ($p \in (0, 1)$).

- Para $t < 0$, $\mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[Y > t] = 1$.
- Para $0 \leq t < 1$, $\mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[X \geq 1] = 1 - e^{-\lambda}$ e $\mathbb{P}[Y > t] = p$.
- Para $t \geq 1$, $\mathbb{P}[X > t] \geq 0 = \mathbb{P}[Y > t]$.

Assim, $\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$ se e somente se

$$1 - e^{-\lambda} \geq p \Leftrightarrow \lambda \geq -\ln(1 - p)$$

logo, $X \succeq Y$ se, e somente se, $\lambda \geq \ln((1-p)^{-1})$.

Escrevemos $X \stackrel{d}{=} Y$ para denotar que

$$\mathbb{P}[X \leq t] = \mathbb{P}[Y \leq t]$$

para todo $t \in \mathbb{R}$, e dizemos que as variáveis aleatórias X e Y são *iguais em distribuição*.

Exemplo 3.2: Dominação entre geométricas

Sejam $0 < q \leq p < 1$. Se $Y \sim \text{Geom}(q)$ e $X \sim \text{Geom}(p)$, então $\mathbb{P}[Y > j] = (1-q)^j \geq (1-p)^j = \mathbb{P}[X > j]$. Portanto, $Y \succeq X$, ou seja, um sucesso mais provável chega mais cedo.

3.1.1 Acoplamento

Para comparar duas variáveis aleatórias, podemos colocá-las no mesmo experimento aleatório, de modo que possamos observar diretamente quando elas diferem. Um acoplamento cria uma dependência entre elas sem alterar suas distribuições individuais.

Suponha que $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ e $Y \sim \text{Bernoulli}(q)$, com $p \geq q$. Podemos gerar (veja Exemplo 2.12) uma única variável $U \sim U[0, 1]$ e definir

$$X' := \mathbb{1}_{[U \leq p]}, \quad Y' := \mathbb{1}_{[U \leq q]}.$$

Assim, $X' \sim \text{Bernoulli}(p)$ e $Y' \sim \text{Bernoulli}(q)$ no mesmo espaço de probabilidade, como desejado. Ademais, temos algo interessante: $Y'(\omega) \leq X'(\omega)$ para todo ω , pois $[U \leq q] \subseteq [U \leq p]$. Em outras palavras, o par (Y', X') nunca assume o valor $(1, 0)$.

Note que $Y' \leq X'$ é uma propriedade do par construído, e não de X e Y (que podem ser, por exemplo, independentes). O que se conclui sobre X e Y é que, para toda função h não decrescente, $\mathbb{E}(h(Y)) \leq \mathbb{E}(h(X))$, pois esses valores *dependem apenas das distribuições* de X e Y .

A caracterização a seguir é a que mais usamos na prática: dominação estocástica equivale a poder construir, num mesmo espaço de probabilidade, variáveis X' e Y' com as mesmas distribuições de X e Y , respectivamente, tais que $Y' \leq X'$ com probabilidade 1.¹ Construir duas variáveis com distribuições dadas num mesmo espaço de probabilidade é chamado de *acoplamento*.

¹ Se $Y' \leq X'$ vale fora de um conjunto N com $\mathbb{P}(N) = 0$, defina $X'' := X' \mathbb{1}_{\bar{N}}$ e $Y'' := Y' \mathbb{1}_{\bar{N}}$, isto é, ambas valem 0 em N . Como N tem probabilidade zero, X'' e Y'' têm as mesmas distribuições de X' e Y' , e agora $Y'' \leq X''$ vale para todo ω : em N por serem ambas nulas, e fora de N porque nada mudou. Assim, exigir $Y' \leq X'$ com probabilidade 1 ou para todo ω dá o mesmo resultado.

Teorema 3.1: teorema de Strassen para ordem estocástica na reta

Para variáveis aleatórias reais X e Y , vale $X \succeq Y$ se, e somente se, existem variáveis aleatórias $X' \stackrel{d}{=} X$ e $Y' \stackrel{d}{=} Y$ definidas num mesmo espaço de probabilidade tais que $Y' \leq X'$ com probabilidade 1.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Sejam $F_X(t) = \mathbb{P}[X \leq t]$ e $F_Y(t) = \mathbb{P}[Y \leq t]$ as funções de distribuição de X e Y . Para uma função de distribuição F qualquer e $u \in (0,1)$, seja

$$F^{-1}(u) := \inf\{t: F(t) \geq u\}$$

a função quantil (finita para $u \in (0,1)$).

Se $U \sim U(0,1)$, então $F^{-1}(U)$ tem função de distribuição F , pela Proposição 2.10.

Da hipótese $X \succeq Y$ temos $F_X(t) \leq F_Y(t)$ para todo t . Assim, se $F_X(t) \geq u$ então $F_Y(t) \geq u$, isto é, $\{t: F_X(t) \geq u\} \subseteq \{t: F_Y(t) \geq u\}$, e o ínfimo do conjunto menor é o maior: $F_X^{-1}(u) \geq F_Y^{-1}(u)$ para todo $u \in (0,1)$. Tomando $X' = F_X^{-1}(U)$ e $Y' = F_Y^{-1}(U)$, com o mesmo U , temos $X' \stackrel{d}{=} X$, $Y' \stackrel{d}{=} Y$ e $Y' \leq X'$ sempre que $U \in (0,1)$, isto é, com probabilidade 1.

($\Leftarrow$) Se $Y' \leq X'$ com probabilidade 1, então, para todo t , o evento $[Y' > t]$ está contido em $[X' > t]$ a menos de um conjunto de probabilidade zero, logo

$$\mathbb{P}[Y > t] = \mathbb{P}[Y' > t] \leq \mathbb{P}[X' > t] = \mathbb{P}[X > t].$$

Portanto $\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$ para todo t , isto é, $X \succeq Y$. □

Corolário 3.1

Se $X \succeq Y$, então $\mathbb{E}Y \leq \mathbb{E}X$ (quando as esperanças existem) e, mais geralmente, $\mathbb{E}f(Y) \leq \mathbb{E}f(X)$ para toda função f não decrescente. Além disso, $\mathbb{P}[X \leq k] \leq \mathbb{P}[Y \leq k]$ para todo k .

Demonstração. Tome o acoplamento $Y' \leq X'$. Como f é não decrescente, $f(Y') \leq f(X')$ e a monotonicidade da esperança dá o resultado. A última afirmação é o complementar da definição. □

O corolário é o que justifica, nas análises, passar de uma variável complicada para uma variável simples. Basta que a simples esteja do lado correto da desigualdade.

Exemplo 3.3: Dominação entre Binomiais

Se $X \sim \text{Binomial}(m, p)$ e $Y \sim \text{Binomial}(m, q)$ com $1 \geq p \geq q \geq 0$, então $X \succeq Y$.

Sejam $U_1, \dots, U_m$ independentes e uniformes em $[0, 1]$ e defina

$$B_i = 1_{[U_i \leq p]} \quad \text{e} \quad C_i = 1_{[U_i \leq q]}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Como as U_i são independentes, $B_1, \dots, B_m$ são independentes com distribuição Bernoulli(p), e $C_1, \dots, C_m$ são independentes com distribuição Bernoulli(q). Portanto

$$X' := \sum_{i=1}^m B_i \sim \text{Binomial}(m, p) \quad \text{e} \quad Y' := \sum_{i=1}^m C_i \sim \text{Binomial}(m, q),$$

isto é, $X' \stackrel{d}{=} X$ e $Y' \stackrel{d}{=} Y$. (Note que B_i e C_i não são independentes, pois usam o mesmo U_i ; isso é o que se deseja e não afeta as distribuições de X' e Y' .)

Como $q \leq p$, vale $[U_i \leq q] \subseteq [U_i \leq p]$, logo $C_i \leq B_i$ para todo i e todo ω . Somando, $Y' \leq X'$. Pelo Teorema, $X \succeq Y$.

3.1.2 Dominação estocástica na análise do QS

Como dito acima, a ideia é estimar quão longa é a cadeia de subsequências $S, S'_1, S'_2, \dots, S'_M$ obtidas por particionamento e que contêm um elemento fixo, mas arbitrário x . Se cada particionamento fosse um sucesso com probabilidade p fixa, independentemente do histórico de particionamentos, então estaríamos no caso de estimar quantos particionamentos até ocorrer um sucesso, que sabemos se tratar de uma variável geométrica de média $1/p$. Como o número de sucessos é limitado, digamos que por ℓ , então queremos estimar o número de particionamentos até ocorrer o $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso em uma sequência de experimentos independentes de Bernoulli com parâmetro p , uma binomial negativa de parâmetros $\ell + 1, p$ (cf. 2.11).

Entretanto, assumindo que sucesso resulta em não escolher o pivô entre os 10% menores nem entre os 10% maiores, se a subsequência tem 100 elementos, então a probabilidade de sucesso é 0,8, mas se a subsequência tem 51 elementos, então a probabilidade de sucesso é $(\lfloor 0,9 \cdot 51 \rfloor - \lceil 0,1 \cdot 51 \rceil) / 51 \approx 0,765$ devido aos arredondamentos. As tentativas *não* são independentes, e a probabilidade de sucesso de cada uma depende do que aconteceu antes. O que sabemos é apenas que, dado qualquer histórico, a probabilidade de sucesso é *pelo menos* uma constante $\alpha \in (0, 1)$.

Lema 3.1

Sejam $Z_1, Z_2, \dots$ variáveis com valores em $\{0, 1\}$ tais que, para todo i e todo histórico $(z_1, \dots, z_{i-1})$ de probabilidade positiva,

$$\mathbb{P}[Z_i = 1 \mid Z_1 = z_1, \dots, Z_{i-1} = z_{i-1}] \geq \alpha.$$

Então

- (a) o número de sucessos em m tentativas, $\sum_{i=1}^m Z_i$, domina estocasticamente uma Binomial(m, α);
- (b) o número de tentativas até o r -ésimo sucesso é dominado estocasticamente por uma binomial negativa de parâmetros (r, α) . Em particular, o número esperado de tentativas até o r -ésimo sucesso é no máximo r/α .

Demonstração. Para todo $i \geq 1$ tome

$$U_i \sim U(0, 1), \quad Y_i = \mathbb{1}_{[U_i \leq \alpha]}, \quad Z_i = \mathbb{1}_{[U_i \leq p_i]}$$

em que $U_1, U_2, \dots$ são independentes e $p_i \geq \alpha$ é a probabilidade condicional de sucesso na i -ésima tentativa dado o histórico $Z_1, \dots, Z_{i-1}$.

Como U_i é independente de $U_1, \dots, U_{i-1}$ e p_i é função dessas variáveis, $\mathbb{P}[Z_i = 1 \mid U_1, \dots, U_{i-1}] = p_i$; assim, por indução, $(Z_i)_i$ tem a distribuição conjunta exigida. Além disso, $Y_i \sim \text{Bernoulli}(\alpha)$ e $Y_1, Y_2, \dots$ são independentes, pois cada Y_i é função só de U_i .

Como $\alpha \leq p_i$, vale a inclusão de eventos $[U_i \leq \alpha] \subseteq [U_i \leq p_i]$, isto é, $Y_i = 1 \Rightarrow Z_i = 1$. Logo $Y_i \leq Z_i$ com probabilidade 1 (não apenas em distribuição)².

(a) Da desigualdade pontual acima,

$$\sum_{i=1}^m Z_i \geq \sum_{i=1}^m Y_i.$$

Ademais, as Y_i são independentes com $\mathbb{P}[Y_i = 1] = \alpha$, de modo que $\sum_{i=1}^m Y_i \sim \text{Binomial}(m, \alpha)$.

(b) Seja τ_Z (resp. τ_Y) o instante do r -ésimo sucesso da sequência $(Z_i)_i$ (resp. $(Y_i)_i$). Como $Y_i \leq Z_i$ para todo i , todo sucesso de $(Y_i)_i$ é também sucesso de $(Z_i)_i$, logo o r -ésimo sucesso em $(Z_i)_i$ ocorre no máximo no instante do r -ésimo sucesso em $(Y_i)_i$. Portanto $\tau_Z \leq \tau_Y$. Como τ_Y é a soma de r geométricas independentes de parâmetro α , $\mathbb{E}\tau_Z \leq \mathbb{E}\tau_Y = r/\alpha$. $\square$

² é o mesmo U_i usado nas duas variáveis que torna essa comparação possível.

Fixado um elemento x , os particionamentos de que ele participa formam uma sequência de tentativas cuja probabilidade de sucesso depende do tamanho corrente da subseqüência de x , e portanto do

passado. Dado qualquer histórico, essa probabilidade é pelo menos α (com α a constante da análise). O lema acima permite, então, trocar essa sequência por tentativas independentes de parâmetro α : o número de particionamentos até o $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso tem esperança no máximo $(\ell + 1)/\alpha$. Disso podemos deduzir o número esperado de comparações pelas quais passa x sem precisar da distribuição exata do número de particionamentos.

3.2 Análise do quicksort probabilístico

O particionamento (ou pivotamento) de S nas linhas 4, 5, 6 e 7 do algoritmo acima é considerado um *sucesso* se $\min\{|S_E|, |S_D|\} \geq (1/10)|S|$, caso contrário, dizemos que o particionamento foi um fracasso. Um sucesso significa que o pivô não está entre os 10% maiores elementos da sequência particionada e nem está entre os 10% menores elementos da sequência particionada.

Para pivô de posto³ r temos $|S_E| = r - 1$ e $|S_D| = |S| - r$. O número de postos para bons pivôs é, então, $\lfloor 0,9 |S| \rfloor - \lceil 0,1 |S| \rceil$. Como $\lfloor 0,9 |S| \rfloor > 0,9 |S| - 1$ e $\lceil 0,1 |S| \rceil < 0,1 |S| + 1$, o número de pivôs bons é maior que $0,8 |S| - 2$, portanto, $p > 0,8 - 2/|S| \geq 0,76$ para $|S| > 50$. Por outro lado, $\lfloor 0,9 |S| \rfloor - \lceil 0,1 |S| \rceil \leq 0,8 |S|$, portanto

$$0,76 < p \leq 0,8.$$

³ *posto* é a posição do elemento na sequência ordenada.

Consideremos uma execução do *quicksort* com entrada $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Fixado $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, seja X_i o número de comparações entre o elemento x_i da entrada e algum pivô durante toda uma execução do algoritmo. Em cada particionamento x_i é comparado uma única vez (com o pivô) e se x_i é escolhido pivô então: (1) cada elemento da subsequência da qual x_i pertence é comparado com ele e tais comparações são contabilizadas pelos outros elementos e (2) a partir daí x_i nunca mais participará de um particionamento e nunca mais será comparado com outro elemento de S .

Exercício 13. Mostre que x_i participa de no máximo $\lfloor \log_{10/9} n \rfloor$ particionamentos com sucesso.

Fixemos x_i e escrevamos $\ell := \lfloor \log_{10/9} n \rfloor$. O tamanho da subsequência que contém x_i muda a cada particionamento, e com ele a probabilidade de sucesso. Seja s_k o tamanho da subsequência que contém x_i imediatamente antes do k -ésimo particionamento.

Lembremos que toda subsequência com no máximo 50 elementos é ordenada por força bruta; assim, enquanto x_i participa de particionamentos, a subsequência que o contém tem mais de 50 elementos.

Suponha conhecido tudo o que aconteceu nos $k - 1$ primeiros par-

ticionamentos de x_i (tamanhos das subsequências e pivôs sorteados). Isso determina s_k . Dado s_k , o pivô é escolhido uniformemente entre os s_k postos, e portanto a probabilidade de o k -ésimo particionamento ser um sucesso depende apenas de s_k . Como $s_k > 50$ (pois o k -ésimo particionamento é real), ela é maior que 0,76.

O Lema 3.1, porém, pede essa cota sabendo apenas quais dos $k - 1$ primeiros particionamentos foram sucessos ou fracassos, o que é menos informação. Ela continua valendo: vários históricos completos são compatíveis com a mesma sequência de sucessos e fracassos, e a probabilidade de sucesso no k -ésimo particionamento, sabendo só essa sequência, é uma média ponderada das probabilidades correspondentes a esses históricos. Como todas são maiores que 0,76, a média também é.

Para que a análise não dependa do instante em que x_i deixa de participar de particionamentos (por ter sido escolhido pivô ou por ter caído no caso base), imaginamos que, a partir daí, x_i continua participando de particionamentos *fictícios*, cada um deles com sucesso com probabilidade 0,76 *independentemente* do passado. Assim, para cada x_i está definida uma sequência infinita de particionamentos (os reais, seguidos dos fictícios), cada um com probabilidade condicional de sucesso pelo menos 0,76 dados os resultados (sucesso ou fracasso) dos particionamentos anteriores (que é exatamente a hipótese do Lema 3.1).

Seja M_i o número de particionamentos reais de que x_i participa, e seja τ_i o instante do $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso na sequência completada.

Pelo Exercício, os M_i primeiros particionamentos da sequência completada, que são os reais, contêm no máximo ℓ sucessos. Logo o $(\ell + 1)$ -ésimo sucesso, no instante τ_i , não está entre eles, assim $\tau_i > M_i$.

Pelo Lema 3.1(b), com $\alpha = 0,76$ e $r = \ell + 1$,

$$\mathbb{E}\tau_i \leq \frac{\ell + 1}{0,76} < \frac{10}{7}(\ell + 1) \leq 2\ell,$$

onde a última desigualdade vale porque $\ell \geq 37 \geq 3$ para $n > 50$.

Em cada particionamento de que participa sem ser o pivô, x_i é comparado uma única vez com o pivô; portanto o número X_i de comparações de x_i com pivôs satisfaz $X_i \leq M_i \leq \tau_i$. Pela monotonicidade da esperança,

$$\mathbb{E}X_i \leq \mathbb{E}\tau_i < 2\ell.$$

O número total de comparações com pivôs durante toda a execução é $T := \sum_{i=1}^n X_i$ e, pela linearidade da esperança, $\mathbb{E}T < 2n\ell$. Em resumo,

$$\mathbb{E}X_i < 2\lceil \log_{\frac{10}{9}} n \rceil \quad \text{e} \quad \mathbb{E}T < 2n\lceil \log_{\frac{10}{9}} n \rceil. \quad (3.1)$$

Além disso, as subsequências disjuntas ordenadas na força-bruta na linha 2 fazem, cada uma, $O(1)$ comparações, contribuindo no total

com $O(n)$ comparações que, somadas às $O(n \ln n)$ de (3.1), totalizam $O(n \ln n)$ comparações.

Lema 3.2: O número esperado de comparações do QS

O número esperado de comparações entre elementos de uma sequência com n elementos numa execução do *quicksort* aleatorizado é $O(n \ln n)$. $\square$

Da disciplina Análise de Algoritmos sabemos que todo algoritmo de ordenação baseado em comparação realiza $\Omega(n \ln n)$ comparações para ordenar n elementos, ou seja, em esperança o *quicksort* aleatorizado é o melhor possível (Cormen et al., 2009). Porém, saber que um algoritmo é bom em média não nos garante que ele é bom quase sempre. Vamos mostrar que com alta probabilidade o desempenho do algoritmo está próximo da média.

Teorema 3.2

O número de comparações numa execução do *quicksort* aleatorizado com uma entrada de tamanho n é $O(n \ln n)$ com probabilidade $1 - O(n^{-33})$.

Demonstração. Definimos

$$\begin{aligned}\ell &:= \lfloor \log_{10/9} n \rfloor \\ L &:= 12 \lfloor \log_{10/9} n \rfloor = 12\ell \\ F &:= L - \ell = 11\ell.\end{aligned}$$

Consideramos o evento $[X_i > L]$ que, segundo (3.1), diz que o elemento x_i foi comparado a um pivô mais do que seis vezes o valor esperado.

Como $X_i \leq M_i$, o evento $[X_i > L]$ implica que x_i participa de mais que L particionamentos reais (não fictícios); em particular, os primeiros L particionamentos de sua sequência completa são todos reais. Pelo Exercício 13, x_i tem no máximo ℓ sucessos reais ao longo de toda a execução, logo, nesse evento, há no máximo ℓ sucessos entre os primeiros L particionamentos da sequência completada.

Tomemos $Z_k^{(i)}$ o indicador de sucesso do k -ésimo particionamento de x_i e W_i o número de sucessos entre esses L particionamentos, isto é, $W_i = \sum_{k \leq L} Z_k^{(i)}$. Então

$$[X_i > L] \subseteq [W_i \leq \ell].$$

Pelo Lema 3.1(a), com $\alpha = 0,76$ e $m = L$ tentativas, W_i domina

estocasticamente uma Binomial($L, 0,76$), portanto

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[X_i > L] &\leq \mathbb{P}[W_i \leq \ell] \leq \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,76) \leq \ell] \\ &= \sum_{j=F}^L \binom{L}{j} (0,24)^j (0,76)^{L-j}.\end{aligned}$$

Usando o limitante usual para o coeficiente binomial (veja (d.2)), para $j \geq F$,

$$\binom{L}{j} (0,24)^j (0,76)^{L-j} \leq \left(\frac{eL}{j} \cdot \frac{0,24}{0,76} \right)^j (0,76)^L \leq \left(\frac{eL}{F} \cdot \frac{0,24}{0,76} \right)^j (0,76)^L.$$

Como $L/F = 12/11$ e $0,24/0,76 = 6/19$,

$$e \cdot \frac{L}{F} \cdot \frac{0,24}{0,76} = e \cdot \frac{12}{11} \cdot \frac{6}{19} = \frac{72e}{209} < 0,9365 < 1.$$

Logo, para $c = \frac{72e}{209}$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[X_i > L] &\leq (0,76)^L \sum_{j \geq F} c^j = (0,76)^L \frac{c^F}{1-c} \\ &= \frac{209}{209-72e} (0,76)^{12\ell} c^{11\ell} < 16 \left((0,76)^{12} c^{11} \right)^\ell\end{aligned}$$

portanto, $\mathbb{P}[X_i > L] < 16 (0,019)^\ell$.

Convertendo para potência de n , com $\ell > \log_{10/9}(n) - 1$,

$$(0,019)^\ell < (0,019)^{-1} (0,019)^{\log_{10/9}(n)} < 53n^{\log_{10/9}(0,019)} < 53n^{-37},$$

portanto $\text{Prob}EX_i > L < 848 n^{-37} < n^{-34}$.

A probabilidade de existir i com $X_i > L$ é

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n [X_i > L]\right) < n \cdot n^{-34} = n^{-33},$$

logo, com probabilidade $1 - O(n^{-33})$, vale $X_i \leq 12 \lfloor \log_{10/9} n \rfloor$

para todo i , e nessa probabilidade o *quicksort* aleatorizado executa $O(n \ln n)$ comparações, incluídas as $O(n)$ comparações “força bruta” feitas na linha 2 do algoritmo. $\square$

3.3 Esperança condicional

Sejam $(\Omega, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade discreto, A um evento desse espaço com probabilidade positiva e X uma variável aleatória real e integrável (ou apenas não negativa). A ocorrência de A implica uma nova medida $\mathbb{P}_A$ em Ω e temos uma nova lei, condicionada a A ,

para a variável X . A **esperança condicional** da variável X dado A é o valor médio de X com respeito à lei condicional

$$\mathbb{E}(X | A) = \sum_r r \mathbb{P}[X = r | A] = \sum_r r \mathbb{P}_A[X = r] = \sum_r r \mathbb{P}_{X|A}(r). \quad (3.2)$$

Por ser uma média de uma variável aleatória com respeito a uma distribuição, a esperança condicional usufrui das mesmas propriedades da esperança: se X e Y são integráveis, A um evento de probabilidade positiva, B um evento qualquer e $a, b \in \mathbb{R}$, então

1. $\mathbb{E}(c | A) = c$.
2. $\mathbb{E}(\mathbb{1}_B | A) = \mathbb{P}(B | A)$.
3. Se $X \leq Y$ então $\mathbb{E}(X | A) \leq \mathbb{E}(Y | A)$.
4. $\mathbb{E}(aX + bY | A) = a\mathbb{E}(X | A) + b\mathbb{E}(Y | A)$.
5. Se X e A são independentes então $\mathbb{E}(X | A) = \mathbb{E}X$. Ademais, $\mathbb{E}(XY | A) = \mathbb{E}(X | A) \cdot \mathbb{E}(Y | A)$ nem sempre decorre da independência global de X e Y , mas vale caso X e Y são independentes sob a distribuição condicionada⁴ a A .

⁴ $\mathbb{P}_A([X = x] \cap [Y = y]) = \mathbb{P}_A[X = x] \mathbb{P}_A[Y = y]$ para todos x, y

Sobre o último item acima, considere X e Y independentes, cada um com distribuição Bernoulli(1/2). A distribuição conjunta é uniforme sobre os 4 pares possíveis

$$\mathbb{P}[(X, Y) = (x, y)] = \frac{1}{4}, \quad (\forall x, y \in \{0, 1\}).$$

Agora defina o evento $A := \{X = Y\}$, ou seja, A ocorre quando X e Y são iguais. Temos

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{(0, 0), (1, 1)\}) = \frac{1}{2}$$

logo $\mathbb{E}(X | A) = 1/2$, $\mathbb{E}(Y | A) = 1/2$ e $\mathbb{E}(XY | A) = 1/2$. Nesse caso, globalmente, X e Y são independentes mas, ao condicionar em A eles se tornam dependentes. Isso mostra que a fatoração $\mathbb{E}(XY | A) = \mathbb{E}(X | A) \cdot \mathbb{E}(Y | A)$ não vale em geral, apesar de X e Y serem independentes globalmente, $1/2 \neq 1/4$ e o item 5 exige independência sob a lei condicionada a A (que aqui falha, já que A força $X = Y$).

Exemplo 3.4: Esperança da distribuição geométrica

Seja X o número de tentativas de Bernoulli até o primeiro sucesso, com probabilidade de sucesso p . Condicionando no primeiro resultado, seja A o evento “sucesso”,

- A ocorre na primeira tentativa, então $X = 1$;
- $\bar{A}$ ocorre na primeira tentativa, nesse caso, já gastamos 1 tentativa, então $X = 1 + Y$, com $Y \sim \text{Geom}(p)$ (o processo recomeça do zero). Portanto,

Assim,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_x x \mathbb{P}[X = x] \\
 &= \sum_x x (\mathbb{P}[X = x \mid A] \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}[X = x \mid \bar{A}] \mathbb{P}(\bar{A})) \\
 &= \left(\sum_x x \mathbb{P}_A[X = x] \right) \mathbb{P}(A) + \left(\sum_x x \mathbb{P}_{\bar{A}}[X = x] \right) \mathbb{P}(\bar{A}) \\
 &= \mathbb{E}(X \mid A) \mathbb{P}(A) + \mathbb{E}(X \mid \bar{A}) \mathbb{P}(\bar{A})
 \end{aligned}$$

Agora, $\mathbb{E}(X \mid A) = 1$ e $\mathbb{E}(X \mid \bar{A}) = \mathbb{E}(Y) + 1 = \mathbb{E}(X) + 1$, portanto $\mathbb{E}(X) = 1 \cdot p + (\mathbb{E}(X) + 1)(1 - p)$ e resolvendo para $\mathbb{E}X$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}.$$

Teorema 3.3: Lei de esperança total

Se Y é uma variável aleatória integrável, então

$$\mathbb{E}Y = \sum_{x \in S_X} \mathbb{E}(Y \mid X = x) \mathbb{P}[X = x]. \quad (3.3)$$

Demonstração. Seja Y uma variável aleatória integrável. Então,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}Y &= \sum_{y \in S_Y} y \mathbb{P}[Y = y] \\
 &= \sum_{y \in S_Y} y \left(\sum_{x \in S_X} \mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]) \right) \\
 &= \sum_{y \in S_Y} \sum_{x \in S_X} y \mathbb{P}[Y = y \mid X = x] \mathbb{P}[X = x] \\
 &= \sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} y \mathbb{P}[Y = y \mid X = x] \mathbb{P}[X = x] \\
 &= \sum_{x \in S_X} \mathbb{E}(Y \mid X = x) \mathbb{P}[X = x]
 \end{aligned}$$

em que a troca das ordens de soma é pelo teorema de Tonelli–Fubini para séries (s.5). $\square$

3.4 Desigualdade de Markov

A **desigualdade de Markov** tem um enunciado simples e a vantagem de valer em situações bem gerais, sem muitas hipóteses sobre a variável aleatória, o que a torna amplamente aplicável. Por outro lado, ela pode fornecer limitantes fracos que, às vezes, são pouco úteis.

Andrey Markov (1856–1922) foi um matemático russo conhecido principalmente por suas contribuições no que foi posteriormente conhecido como Cadeias de Markov. Seu filho Andrey Markov Jr (1903–1979) ficou conhecido pelas contribuições em Teoria da Computação.

Teorema 3.4: Desigualdade de Markov

Se X é uma variável aleatória integrável,

$$\mathbb{P}[|X| \geq t] \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{t} \quad (3.4)$$

para todo $t > 0$. Em particular, se X assume valores não negativos,

$$\mathbb{P}[X \geq t] \leq \frac{\mathbb{E}X}{t} \quad (3.5)$$

para todo $t > 0$.

Demonstração. De X integrável $|X|$ também é integrável. Ademais, $|X| \geq |X| \cdot \mathbb{1}_{|X| \geq t}$, para todo $t > 0$, logo a desigualdade de Markov segue da monotonicidade da esperança

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(|X|) &\geq \mathbb{E}(|X| \mathbb{1}_{|X| \geq t}) \geq \mathbb{E}(t \mathbb{1}_{|X| \geq t}) = \\ &= t \mathbb{E}(\mathbb{1}_{|X| \geq t}) = t \mathbb{P}[|X| \geq t]. \quad \square \end{aligned}$$

Há casos onde essa desigualdade é justa, como mostra o seguinte exemplo. Seja X uma variável aleatória que assume o valor 0 com probabilidade 99/100 e assume o valor 10 com probabilidade 1/100. Então $\mathbb{E}X = 1/10$ e

$$\mathbb{P}[X \geq 10] \leq \frac{1/10}{10} = \frac{1}{100}$$

que é exatamente a probabilidade do evento $[X \geq 10]$.

ANÁLISE DO QS USANDO A DESIGUALDADE DE MARKOV

Vejam uma prova alternativa de que em uma execução do *quick-sort* probabilístico o número esperado de comparações entre elementos de uma instância com n elementos é $O(n \ln n)$ com alta probabilidade. Nesta seção, para ilustrar a robustez do método de Markov mesmo no pior caso de recursão, consideramos a variante do algoritmo cujo caso base é $|S| \leq 2$ (isto é, a recursão prossegue para toda subsequência com 3 ou mais elementos).

Para pivô de posto r temos $|S_E| = r - 1$ e $|S_D| = |S| - r$. O número de postos para bons pivôs é $\lfloor 0,9 |S| \rfloor - \lceil 0,1 |S| \rceil$. Diferentemente do caso $|S| > 50$, aqui não há uma cota inferior próxima de

0,8: o pior caso ocorre no menor tamanho recursivo, $|S| = 3$, onde há um único posto bom (o do meio) entre três, dando assim,

$$\frac{1}{3} \leq p \leq \frac{4}{5}.$$

Consideremos um elemento x de uma instância S para o algoritmo 3.1 e $S_0 = S, S_1, S_2, \dots, S_M$ as subsequências a que x pertence após cada particionamento durante uma execução.

Sorteando um pivô o i -ésimo particionamento é *bom* se $|S_i|/10 \leq |S_{i+1}| \leq 9|S_i|/10$ o que ocorre com probabilidade $0,33 < p \leq 0,8$.

Fixado $|S_i| = k$, o particionamento cai em um de dois casos, dependendo do pivô sorteado: se for *sucesso* (o que ocorre com probabilidade p), então, por definição, $|S_{i+1}| \leq 9k/10$; caso contrário (*fracasso*, com probabilidade $1 - p$), não há garantia melhor que a trivial $|S_{i+1}| \leq |S_i| = k$. Tomando a esperança condicional em cada um desses dois casos e combinando-as segundo suas probabilidades,

$$\mathbb{E}(|S_{i+1}| \mid |S_i| = k) \leq \underbrace{p \cdot \frac{9k}{10}}_{\text{sucesso}} + \underbrace{(1-p) \cdot k}_{\text{fracasso}} = \left(1 - \frac{p}{10}\right)k,$$

onde a última igualdade é apenas a fatoração de k nos dois termos. Como $1 - p/10$ é *decrecente* em p , o maior valor possível dessa cota e, portanto, o pior caso, ocorre no menor p garantido. Com $p \geq 1/3$

$$\left(1 - \frac{p}{10}\right)k \leq \left(1 - \frac{1}{30}\right)k = \frac{29}{30}k.$$

Agora, podemos usar a lei de esperança total para escrever

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|S_{i+1}| &= \sum_k \mathbb{E}(|S_{i+1}| \mid |S_i| = k) \mathbb{P}[|S_i| = k] \\ &\leq \sum_k \frac{29}{30} k \mathbb{P}[|S_i| = k] \\ &= \frac{29}{30} \sum_k k \mathbb{P}[|S_i| = k] \\ &= \frac{29}{30} \mathbb{E}|S_i| \end{aligned}$$

iterando essa desigualdade, partindo de $|S_0| = |S| = n$, concluímos

$$\mathbb{E}|S_M| < \left(\frac{29}{30}\right)^M n.$$

Queremos escolher M de modo que essa cota seja pequena o bastante para, somada sobre os n elementos da instância, ainda dar uma probabilidade de falha que tende a zero. Para isso, tomando $M := a \log_{30/29} n$, para uma constante $a > 0$ a ser escolhida,

$$\left(\frac{29}{30}\right)^M n = \left(\frac{29}{30}\right)^{a \log_{30/29} n} n = \left(\frac{30}{29}\right)^{-a \log_{30/29} n} n = n^{-a} \cdot n = n^{1-a}.$$

Assim, $\mathbb{E}|S_M| < n^{1-a}$. Para que essa probabilidade, somada sobre os n elementos da instância, ainda tenda a zero; por isso fixamos, desde já, $a \geq 3$.

Pela desigualdade de Markov, aplicada à variável aleatória (não negativa) $|S_M|$ com $t = 2$ (o limiar do caso base)

$$\mathbb{P}[|S_M| > 2] \leq \frac{\mathbb{E}|S_M|}{2} < \frac{n^{1-a}}{2},$$

ou seja, a probabilidade de que o elemento fixado x ainda esteja participando de particionamentos após $M = a \log_{30/29} n$ passos é menor que $n^{1-a}/2$.

Pela união desse evento sobre os n elementos de S , a probabilidade de que *exista* algum $x \in S$ que passe por mais que $a \log_{30/29} n$ particionamentos é

$$< n \cdot \frac{n^{1-a}}{2} = \frac{n^{2-a}}{2}$$

ou seja, o número de comparações efetuadas pelo *quicksort* é $O(n \ln n)$ com probabilidade pelo menos

$$1 - \frac{n^{2-a}}{2} \stackrel{(a=3)}{\geq} 1 - \frac{1}{2n}.$$

3.5 Desigualdade de Chebyshev

A próxima desigualdade é conhecida por *desigualdade de Chebyshev*, também conhecida por *desigualdade de Bienaymé–Chebyshev*. Da equação (3.5) obtemos a desigualdade de Chebyshev

$$\mathbb{P}[|X| \geq t] = \mathbb{P}[X^2 \geq t^2] \leq \frac{\mathbb{E}(X^2)}{t^2} \quad (3.6)$$

que é mais conhecida na forma enunciada a seguir.

Teorema 3.5: desigualdade de Chebyshev

Para toda constante $t > 0$ e toda variável aleatória X com quadrado integrável temos

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq t] \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}. \quad (3.7)$$

Demonstração. Segue da desigualdade (3.6) com a variável aleatória $X - \mathbb{E}X$. □

A desigualdade (3.7) pode ser justa como no seguinte exemplo. Seja X uma variável aleatória que assume o valor 0 com probabilidade $q \in (0, 1)$ e os valores 1 e -1 com probabilidade $p/2$ cada, com

Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821–1894) foi um matemático russo conhecido por suas contribuição à Probabilidade, dentre seus alunos vários são matemáticos reconhecidos e um deles foi Andrey Markov. Irénée-Jules Bienaymé (1796–1878) foi um estatístico francês, contribuiu para a Probabilidades e o desenvolvimento da Estatística e suas aplicações.

$p = 1 - q$. A esperança de X é 0 e a variância é p . A probabilidade do evento $[|X| \geq 1]$ é p de modo que

$$p = \mathbb{P}[|X - 0| \geq 1] \leq \frac{\text{Var}(X)}{1^2} = p.$$

Quando a variância está definida mas não é finita, a desigualdade de Chebyshev não é útil. Por exemplo se X tem lei $\mathbb{P}_X(z) = c/z^3$, para $c > 0$ constante e $k \in \mathbb{Z}^+$, então $\mathbb{E}(X) = c\pi^2/6$ (veja (s.8)) e $\mathbb{E}(X^2) = +\infty$. Com $\text{Var}(X) = \infty$, a desigualdade de Chebyshev não dá informação, enquanto que pela desigualdade de Markov obtemos $\mathbb{P}[X \geq t] \leq c\pi^2/6t$.

Tomando o *desvio padrão* $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$ e trocando t por $t\sigma_X > 0$ na desigualdade de Chebyshev, obtemos

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq t\sigma_X] \leq \frac{1}{t^2}$$

e com $t\mathbb{E}X > 0$, obtemos

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq t\mathbb{E}X] \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2(\mathbb{E}X)^2} \leq \frac{\mathbb{E}(X^2)}{t^2(\mathbb{E}X)^2} \quad (3.8)$$

onde a segunda desigualdade segue do fato de

$$\frac{\text{Var}(X)}{(\mathbb{E}X)^2} = \frac{\mathbb{E}(X^2)}{(\mathbb{E}X)^2} - 1. \quad (3.9)$$

ANÁLISE DO QS USANDO A DESIGUALDADE DE CHEBYSHEV

Uma terceira estratégia para mostrar que T concentra em torno de sua média é aplicar a desigualdade de Chebyshev diretamente ao total T , em vez de tratar cada X_i separadamente e somar as probabilidades de falha. Isso requer conhecer (ou estimar) $\text{Var}(T)$.

É um resultado conhecido na literatura (citado na seção 5.2.2, pág. 120 de Knuth, 1998, como consequência do exerc. 6.2.2-8) que a variância do número de comparações do *quicksort* aleatorizado satisfaz (Iliopoulos e Penman, 2010)

$$\text{Var}(T) = \left(7 - \frac{2\pi^2}{3}\right)n^2 + O(n \log n) \approx 0,4203 n^2.$$

Pela desigualdade de Chebyshev, para qualquer $t > 0$,

$$\mathbb{P}[|T - \mathbb{E}T| \geq t] \leq \frac{\text{Var}(T)}{t^2}.$$

Tomando $t = c n \log n$ para uma constante $c > 0$, e usando $\mathbb{E}T = O(n \log n)$,

$$\mathbb{P}[T > \mathbb{E}T + c n \log n] \leq \frac{0,4203 n^2}{c^2 n^2 \log^2 n} = \frac{0,4203}{c^2 \log^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Ou seja, $T = O(n \log n)$ com probabilidade $1 - o(1)$.

3.6 Exercícios

Exercício 14. Em um treino, paraquedistas formam, de início, um grupo de n paraquedistas enfileirados nas posições $1, 2, \dots, n$ dentro de um avião. Em cada etapa do treinamento, um paraquedista é escolhido e seu grupo é dividido em dois grupos. A escolha é uniformemente ao acaso. O paraquedista escolhido cumprimenta todos os paraquedistas do seu grupo e salta do avião. A divisão do grupo em dois é assim: um novo grupo formado pelos paraquedistas que se encontravam à esquerda daquele que pulou e o outro grupo formado pelos paraquedistas à direita.

O procedimento é repetido para cada um dos grupos restantes até que todos os grupos tenham um único paraquedista; esses últimos paraquedistas saltam, então, um a um. A ordem relativa dos paraquedistas dentro de cada grupo é sempre preservada.

Observe que, a partir do momento em que dois paraquedistas pertencem a grupos distintos, eles não se cumprimentam mais.

Prove que os paraquedistas das posições i e j , com $j > i$, se cumprimentam com probabilidade $2/(j - i + 1)$.

Exercício 15. Assuma que as instâncias para o *quicksort* padrão, sem sorteios, são as permutações de $(1, 2, \dots, n)$. Demonstre que o número médio de comparações para ordenar essas instâncias é $O(n \ln n)$ (dica: o exercício dos paraquedistas).

Exercício 16. Considere o *quicksort* aleatorizado (Algoritmo 3.1) executando sobre uma sequência de n elementos distintos, mas com o limiar do caso base alterado de 50 para 100 elementos (ou seja, sequências com até 100 elementos são ordenadas na força bruta).

- (a) Refaça o cálculo que leva à desigualdade $0,76 < p < 0,8$ feito no texto, obtendo os novos limitantes para a probabilidade p de um particionamento ser *bom* quando $|S| > 100$.
- (b) Explique por que a mudança do limiar não altera a ordem de grandeza $O(n \ln n)$ do número esperado de comparações, mas pode alterar a constante multiplicativa na cota $\mathbb{E}T < 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil$ de (3.1).

Exercício 17. No Lema 3.1, a hipótese é que a probabilidade *condicional* de sucesso, dado qualquer histórico, é pelo menos α . Considere a seguinte variante do particionamento do *quicksort*: suponha que, em vez de sortear o pivô uniformemente, o algoritmo sorteia o pivô de modo que a probabilidade de sucesso no i -ésimo particionamento de uma dada subsequência de x seja *exatamente* 0,7 se o particionamento anterior de x foi um sucesso, e 0,9 se foi um fracasso (mas sempre

pelo menos 0,7).

- (a) Verifique que as hipóteses do Lema 3.1 continuam satisfeitas com $\alpha = 0,7$, mesmo essa sequência de tentativas não sendo i.i.d.
- (b) Usando o item (b) do lema, dê um limitante superior para o número esperado de particionamentos necessários para x acumular $L + 1 = 29$ sucessos.
- (c) Explique, em uma frase, por que seria *errado* aplicar diretamente a fórmula da esperança de uma binomial negativa $BN(L+1, 0,7)$ para calcular exatamente (e não apenas limitar superiormente) o número esperado de particionamentos nesse cenário.

Exercício 18. Em uma execução do *quicksort* aleatorizado sobre uma entrada de tamanho n , seja T o número total de comparações entre elementos realizadas pelo algoritmo. Vimos em (3.1) que $\mathbb{E}T < 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil$.

- (a) Usando a desigualdade de Markov (Teorema 3.4), mostre que, para qualquer constante $c > 1$,

$$\mathbb{P}[T \geq c \cdot 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil] \leq \frac{1}{c}.$$

- (b) Em particular, tome $c = 100$. Conclua que a probabilidade de o *quicksort* realizar mais que $200n \lceil \log_{10/9} n \rceil$ comparações é no máximo 1%.
- (c) Compare o limitante obtido no item anterior com o limitante do Teorema que afirma que T é $O(n \ln n)$ com probabilidade $1 - O(n^{-29})$. Qual dos dois resultados é mais forte para n grande? A desigualdade de Markov, sozinha, seria suficiente para provar esse teorema mais forte? Justifique.
- (d) Explique, em termos gerais (sem repetir a conta), por que a desigualdade de Markov aplicada diretamente a T fornece um limitante muito mais fraco do que a análise feita no Teorema 3.2 via $\mathbb{P}[X_i > L]$ para cada elemento x_i individualmente, seguida de união de eventos. (Dica: pense em quantos "graus de liberdade", ou quantas variáveis aleatórias diferentes, cada abordagem usa.)

Exercício 19. Seja $Y \sim \text{Geom}(1/2)$. Mostre que $X \succeq Y$ se, e só se, $\mathbb{P}[X > j] \geq 2^{-j}$ para todo inteiro $j \geq 0$, para toda X com valores nos naturais positivos.

Exercício 20. Mostre que a dominação estocástica é transitiva e que $Y \succeq X$ e $X \succeq Y$ implicam que $X \stackrel{d}{=} Y$.

Exercício 21. Considere, para cada elemento x_i da instância, a variável W_i igual ao número de particionamentos bem sucedidos entre os $L = 12\ell$ primeiros particionamentos sofridos por x_i , de modo que $\mathbb{E}(W_i) = \mu = L\alpha$ e $\text{Var}(W_i) \leq L\alpha(1 - \alpha) = O(\ell)$.

O objetivo deste exercício é mostrar que, se tentarmos substituir a desigualdade de Chernoff por uma aplicação *ingênua* da desigualdade de Chebyshev a cada W_i individualmente, o argumento “por elemento + união de eventos” deixa de funcionar.

- (a) Usando a desigualdade de Chebyshev (Teorema 3.5) com $t = \mu - \ell = O(\ell)$, mostre que

$$\mathbb{P}[W_i \leq \ell] \leq \frac{\text{Var}(W_i)}{t^2} = O\left(\frac{1}{\ell}\right) = O\left(\frac{1}{\log n}\right).$$

- (b) Aplicando a união de eventos sobre os n elementos $x_1, \dots, x_n$ da instância, mostre que o limitante obtido no item (a) fornece apenas

$$\mathbb{P}[\exists i: W_i \leq \ell] \leq n \cdot O\left(\frac{1}{\log n}\right),$$

e explique por que essa cota é *inútil* (isto é, por que ela não tende a 0 quando $n \rightarrow \infty$).

- (c) Compare a ordem de grandeza do desvio $t = \mu - \ell$ com a do desvio-padrão $\sqrt{\text{Var}(W_i)}$ nesse regime. Explique, em termos gerais, por que o fato de ambos serem da mesma ordem ($t = \Theta(\ell)$ e o desvio-padrão $\Theta(\sqrt{\ell})$) faz com que o quadrado no denominador de Chebyshev não seja suficiente para compensar o fator n introduzido pela união de eventos.
- (d) Conclua explicando por que, nesse argumento “por elemento + união”, é necessário usar um limitante de cauda exponencial (como o de Chernoff) em vez de um limitante polinomial como o de Chebyshev.

Exercício 22 (Seleção do k -ésimo menor elemento). Dada uma sequência A de n números inteiros distintos e um inteiro k com $1 \leq k \leq n$, queremos encontrar o k -ésimo menor elemento de A .

Aquecimento

- (a) Descreva uma solução simples para o problema, com tempo $O(n \log n)$ com alta probabilidade.
- (b) Usando o particionamento do *quicksort*, o que se pode dizer se o pivô escolhido tem posto k ?

- (c) Dependendo da relação entre k e o posto r do pivô, existem três casos. Para cada um, diga onde está o k -ésimo menor elemento de A e qual deve ser o *novo* valor de k caso seja necessário continuar a busca em uma subsequência.

Projeto do algoritmo

- (d) Com base no item anterior, escreva o pseudocódigo de um algoritmo recursivo $\text{QuickSelect}(A, k)$ que escolhe um pivô *uniformemente ao acaso*. Deixe claros o caso base e o que é devolvido quando o pivô tem posto k .
- (e) Prove, por indução forte no tamanho de A , que $\text{QuickSelect}(A, k)$ devolve de fato o k -ésimo menor elemento de A , para todo k válido. Verifique que o novo valor de k em cada chamada recursiva é válido para a subsequência recebida.
- (f) Quantas comparações são feitas na construção das subsequências à esquerda A_E e à direita A_D em uma chamada com uma sequência de tamanho m ? Conclua que o número total de comparações é, no máximo, a soma dos tamanhos dos vetores recebidos em todas as chamadas recursivas.

Análise do pior caso

- (g) Mostre que, para todo n , existem um valor de k e uma sequência de pivôs sorteados para os quais o algoritmo faz $\Theta(n^2)$ comparações. Por que isso não contradiz uma análise de tempo *esperado* linear? (Dica: qual é a probabilidade dessa sequência de pivôs?)

Análise do tempo esperado

Chame de chamada 0 a chamada inicial, com $|A| = n$. Seja Z_i o número de elementos do vetor recebido pela chamada i , com $Z_0 = n$. (Se o algoritmo já terminou antes da chamada i , defina $Z_i = 0$.) Como cada chamada descarta ao menos o pivô, $Z_i \leq \max\{n - i, 0\}$; em particular, $Z_i = 0$ para todo $i \geq n$.

- (h) *Pivôs bons e ruins*. Dizemos que ocorre o evento “ruim” B na primeira partição (a da chamada 0) se $r < \lceil n/4 \rceil$ ou $r > \lceil 3n/4 \rceil$, em que r é o posto do pivô. Como r é uniforme em $\{1, \dots, n\}$, mostre que

$$\mathbb{P}(B) \leq \frac{1}{2}.$$

- (i) Mostre que, qualquer que seja k , $Z_1 \in \{0, r - 1, n - r\}$. Conclua que $\mathbb{E}(Z_1 \mid B) \leq n$ (que garantia trivial você usa aqui?) e que $\mathbb{E}(Z_1 \mid \bar{B}) \leq 3n/4$. Em que situação $Z_1 = 0$? (Se um evento condicionante tem probabilidade zero, o termo correspondente é simplesmente omitido.)

- (j) Use a lei da esperança total para concluir que

$$\mathbb{E}Z_1 \leq \frac{n}{4}\mathbb{P}(B) + \frac{3n}{4} \leq \frac{7}{8}n.$$

(Dica: use $\mathbb{P}(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}(B)$; o resultado é crescente em $\mathbb{P}(B)$.)

- (k) *Partições seguintes.* O vetor da chamada i resulta da partição feita pela chamada $i - 1$, que recebe Z_{i-1} elementos, número que já é aleatório. Justifique que

$$\mathbb{E}(Z_i \mid Z_{i-1} = m) \leq \frac{7}{8}m$$

e, usando novamente a lei da esperança total,

$$\mathbb{E}Z_i = \sum_{m=0}^n \mathbb{P}[Z_{i-1} = m] \cdot \mathbb{E}(Z_i \mid Z_{i-1} = m) \leq \frac{7}{8}\mathbb{E}Z_{i-1}.$$

(Dica: o pivô da chamada $i - 1$ é sorteado uniformemente e independentemente de tudo o que aconteceu antes, e o argumento de (h)–(j) vale com m no lugar de n , qualquer que seja o passado e o valor de k . Saber apenas que $Z_{i-1} = m$ é saber menos que o passado completo: a probabilidade condicional correspondente é uma média ponderada de valores $\leq 7m/8$. Termos com $\mathbb{P}[Z_{i-1} = m] = 0$ são omitidos da soma.)

- (l) Conclua que para todo $i \geq 0$

$$\mathbb{E}Z_i \leq \left(\frac{7}{8}\right)^i n.$$

- (m) Usando os itens (f) e (l), a linearidade da esperança (a soma é finita, pois $Z_i = 0$ para $i \geq n$) e a fórmula da soma de uma série geométrica finita, demonstre:

Para toda sequência A com n elementos distintos e todo $k \in \{1, \dots, n\}$, QuickSelect(A, k) realiza menos de $8n$ comparações em esperança:

$$\mathbb{E}[\text{comparações}] \leq \mathbb{E}\left[\sum_{i=0}^{n-1} Z_i\right] = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}Z_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{7}{8}\right)^i n = 8n\left(1 - \left(\frac{7}{8}\right)^n\right) < 8n.$$

- (n) O que a desigualdade de Markov garante sobre a probabilidade do algoritmo fazer mais de $80n$ comparações?

Por fim, mas não finalmente

- (o) A constante $7/8$ veio de escolher a faixa “ $r \in [\lceil n/4 \rceil, \lceil 3n/4 \rceil]$ ” como pivô bom. Refaça a análise com a faixa $[\lceil n/3 \rceil, \lceil 2n/3 \rceil]$. Qual constante você obtém no lugar de $7/8$ e qual é a nova cota para o número esperado de comparações?

Alta probabilidade

Seja T o número de comparações feitas por $\text{QuickSelect}(A, k)$. Até aqui limitamos $\mathbb{E}T$. Vamos agora limitar a cauda de T .

- (p) *Da esperança à cauda.* Fixe uma constante $a > 1$ e defina

$$M := \lceil a \log_{8/7} n \rceil.$$

Usando o item (l), mostre que

$$\mathbb{E}Z_M \leq \left(\frac{7}{8}\right)^M n \leq n^{1-a}.$$

- (q) *Markov.* A variável Z_M é não negativa. Use a desigualdade de Markov com limiar 1 para mostrar

$$\mathbb{P}[Z_M \geq 1] \leq \mathbb{E}Z_M \leq n^{1-a}.$$

O que significa o evento $[Z_M = 0]$ em termos da execução do QuickSelect ? Por que, ao contrário da análise da altura do *quicksort*, aqui não é preciso usar a desigualdade de união sobre os n elementos de A ?

- (r) *Escolha de a .* Explique por que, para a cota do item anterior tender a 0 quando $n \rightarrow \infty$, basta $a > 1$. Mais precisamente, $a = 1 + c$ dá probabilidade de falha $\leq n^{-c}$, isto é, probabilidade de sucesso $1 - O(n^{-c})$. Compare com o *quicksort*, onde a união sobre n elementos multiplica a cota por n e obriga a escolher a maior. Conclua que, com $a = 2$,

$$\mathbb{P}[Z_M = 0] \geq 1 - \frac{1}{n}.$$

- (s) *Do tamanho ao número de comparações.* No evento $[Z_M = 0]$, argumente que o QuickSelect faz no máximo M chamadas recursivas (as chamadas $0, \dots, M-1$) e que, como a chamada i faz menos de $Z_i \leq n$ comparações,

$$T \leq \sum_{i=0}^{M-1} Z_i \leq Mn = O(n \log n) \quad \text{com probabilidade pelo menos } 1 - n^{1-a}.$$

Agora compare com a cota em esperança do item (m):

- (i) Que cota para T a desigualdade de Markov, aplicada diretamente a $\mathbb{E}T < 8n$, garante com probabilidade de falha $1/n$? Por que ela é muito pior que $O(n \log n)$?
- (ii) Use o evento complementar de $[Z_M = 0]$ e o fato de que sempre $T \leq n^2$ para mostrar que, com $a \geq 2$, $\mathbb{E}T = O(n \log n)$.

Conclua que a cota $O(n)$ em esperança e a cota $O(n \log n)$ com alta probabilidade são afirmações diferentes, e que nenhuma substitui a outra.

- (t) *Para refletir (desafio).* Usando a desigualdade de Markov, a cota em esperança dá $\mathbb{P}[T \geq 16n] \leq \frac{1}{2}$. Mostre que não se pode esperar nada muito melhor com c constante: para todo c existe $\delta_c > 0$ tal que, para n suficientemente grande,

$$\mathbb{P}[T \geq cn] \geq \delta_c,$$

e portanto nenhuma cota do tipo “ $T \leq cn$ com probabilidade $\geq 1 - 1/n$ ” pode valer. (Dica: tome $k = \lceil n/2 \rceil$ e $\eta = 1/(8c)$. Considere o evento em que, nas primeiras $\lfloor 1/(4\eta) \rfloor$ chamadas, o pivô tem posto entre os $\eta |\text{vetor}|$ menores. Mostre que, então, k continua dentro da parte direita, o vetor mantém tamanho pelo menos $3n/4$ e cada chamada faz $\Omega(n)$ comparações. Qual é a probabilidade desse evento?)

Observação. Essa cauda é uma propriedade do QuickSelect aleatorizado, e não uma limitação de Markov: algoritmos com escolha mais cuidadosa do pivô (amostragem de Floyd–Rivest, ou mediana das medianas) obtêm $O(n)$ também com alta probabilidade.

VARIÂNCIA DO NÚMERO DE COMPARAÇÕES DO QS

Seja C_n o número de comparações do *quicksort* ao ordenar n elementos distintos, com pivô escolhido uniformemente. Seja $U_n \sim U\{0, \dots, n-1\}$. Então, em distribuição,

$$C_n \stackrel{d}{=} C_{U_n} + C'_{n-1-U_n} + n - 1, \quad (3.10)$$

onde, para cada k , C'_k é uma cópia independente de C_k (duas execuções físicas distintas do algoritmo) e independente de U_n . Escrevemos

$$\mu_n := \mathbb{E}(C_n), \quad s_n := \mathbb{E}(C_n^2), \quad v_n := \text{Var}(C_n) = s_n - \mu_n^2,$$

com $C_0 = C_1 = 0$, e

$$H_n := \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}, \quad H_n^{(2)} := \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^2}.$$

Condicionando em $U_n = k$ em (3.10),

$$\mu_n = n - 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\mu_k + \mu_{n-1-k}) = n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu_k.$$

Multiplicando por n e subtraindo a mesma identidade para $n-1$,

$$\begin{aligned} n\mu_n - (n-1)\mu_{n-1} &= 2(n-1) + 2\mu_{n-1} \\ \implies \frac{\mu_n}{n+1} &= \frac{\mu_{n-1}}{n} + \frac{2(n-1)}{n(n+1)} = \frac{\mu_{n-1}}{n} + \frac{4}{n+1} - \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

Somando de 1 a n (com $\mu_0 = 0$):

$$\frac{\mu_n}{n+1} = 4(H_{n+1} - 1) - 2H_n = 2H_n + \frac{4}{n+1} - 4,$$

e portanto

$$\mu_n = 2(n+1)H_n - 4n. \quad (3.11)$$

Condicionando em $U_n = k$ e usando a independência,

$$\mathbb{E}\left((C_k + C'_{n-1-k} + n - 1)^2\right) = s_k + s_{n-1-k} + 2\mu_k\mu_{n-1-k} + 2(n-1)(\mu_k + \mu_{n-1-k}) + (n-1)^2.$$

Fazendo a média sobre k e multiplicando por n , com $T_n := \sum_{k=0}^{n-1} \mu_k\mu_{n-1-k}$ e $P_n := \sum_{k=0}^{n-1} \mu_k$,

$$n s_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} s_k + 2T_n + 4(n-1)P_n + n(n-1)^2, \quad \forall n \geq 1. \quad (3.12)$$

Funções geradoras. Seja

$$L = L(z) := -\ln(1-z) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} z^m$$

e sejam $\mu(z) = \sum_n \mu_n z^n$ e $M(z) = \sum_n s_n z^n$.

Da recorrência $n\mu_n = n(n-1) + 2P_n$ e de $\sum_{n \geq 1} n(n-1)z^{n-1} = 2z/(1-z)^3$,

$$\begin{aligned} \mu'(z) &= \frac{2z}{(1-z)^3} + \frac{2\mu(z)}{1-z} \iff \\ &((1-z)^2\mu)' = \frac{2z}{1-z} = 2\left(\frac{1}{1-z} - 1\right); \end{aligned}$$

Integrando de 0 a z ,

$$\mu(z) = \frac{2(L-z)}{(1-z)^2}. \quad (3.13)$$

A função geradora de (3.12): multiplicando (3.12) por z^{n-1} e somando em $n \geq 1$:

- $\sum_{n \geq 1} n s_n z^{n-1} = M'$;
- $\sum_{n \geq 1} (2 \sum_{k < n} s_k) z^{n-1} = \frac{2M}{1-z}$;
- $\sum_{n \geq 1} 2T_n z^{n-1} = 2\mu(z)^2$ (produto de séries);
- como $\sum_{n \geq 1} P_n z^{n-1} = B(z) := \frac{\mu}{1-z} = \frac{2(L-z)}{(1-z)^3}$, temos $\sum_{n \geq 1} 4(n-1)P_n z^{n-1} = 4zB'(z)$, e

$$B'(z) = \frac{2z + 6(L-z)}{(1-z)^4} \implies 4zB'(z) = \frac{24zL - 16z^2}{(1-z)^4};$$

$$\bullet \sum_{n \geq 1} n(n-1)^2 z^{n-1} = \sum n(n-1)(n-2)z^{n-1} + \sum n(n-1)z^{n-1} = \frac{6z^2}{(1-z)^4} + \frac{2z}{(1-z)^3} = \frac{4z^2 + 2z}{(1-z)^4}.$$

Logo

$$M' = \frac{2M}{1-z} + 2\mu^2 + F, \quad F(z) := \frac{24zL - 12z^2 + 2z}{(1-z)^4}.$$

Multiplicando por $(1-z)^2$,

$$((1-z)^2 M)' = (1-z)^2 (2\mu^2 + F) = \frac{8L^2 + 8zL - 4z^2 + 2z}{(1-z)^2},$$

pois $(1-z)^2 \cdot 2\mu^2 = 8(L-z)^2/(1-z)^2$. Como $M(0) = 0$,

$$(1-z)^2 M(z) = \int_0^z \frac{8L(t)^2 + 8tL(t) - 4t^2 + 2t}{(1-t)^2} dt.$$

Usando $L' = 1/(1-t)$ e integração por partes, obtêm-se as primitivas

$$\begin{aligned} \int_0^z \frac{L^2}{(1-t)^2} dt &= \frac{L^2 - 2L + 2}{1-z} - 2, \\ \int_0^z \frac{L}{(1-t)^2} dt &= \frac{L-1}{1-z} + 1, \quad \int_0^z \frac{L}{1-t} dt = \frac{L^2}{2}, \\ \int_0^z \frac{-4t^2 + 2t}{(1-t)^2} dt &= -\frac{2}{1-z} + 2 + 6L - 4z, \end{aligned}$$

onde a última usa $-4t^2 + 2t = -2 + 6(1-t) - 4(1-t)^2$ e $tL/(1-t)^2 = L/(1-t)^2 - L/(1-t)$. Somando com os pesos 8, 8 e 1,

$$M(z) = \frac{8L^2 - 8L + 6}{(1-z)^3} + \frac{-4L^2 + 6L - 4z - 6}{(1-z)^2}. \quad (3.14)$$

Lema 3.1. Para $r \geq 0$ inteiro,

$$\begin{aligned} [z^n] \frac{1}{(1-z)^{r+1}} &= \binom{n+r}{r}, \\ [z^n] \frac{L}{(1-z)^{r+1}} &= \binom{n+r}{r} (H_{n+r} - H_r), \\ [z^n] \frac{L^2}{(1-z)^{r+1}} &= \binom{n+r}{r} \left[(H_{n+r} - H_r)^2 - (H_{n+r}^{(2)} - H_r^{(2)}) \right]. \end{aligned}$$

Demonstração. Para $\alpha > 0$, $(1-z)^{-\alpha} = e^{\alpha L}$ e

$$[z^n] (1-z)^{-\alpha} = \Gamma(n+\alpha) / (\Gamma(\alpha) n!).$$

Derivando j vezes em α obtêm-se $L^j (1-z)^{-\alpha}$ do lado esquerdo. Do lado direito,

$$\partial_\alpha \ln \frac{\Gamma(n+\alpha)}{\Gamma(\alpha)} = \psi(n+\alpha) - \psi(\alpha)$$

e

$$\partial_\alpha^2 \ln \frac{\Gamma(n+\alpha)}{\Gamma(\alpha)} = \psi'(n+\alpha) - \psi'(\alpha).$$

Em $\alpha = r+1$, $\psi(n+r+1) - \psi(r+1) = H_{n+r} - H_r$ e $\psi'(n+r+1) - \psi'(r+1) = -(H_{n+r}^{(2)} - H_r^{(2)})$. Basta aplicar $\partial_\alpha^2 e^f = (f'^2 + f'')e^f$ com $f = \ln \frac{\Gamma(n+\alpha)}{\Gamma(\alpha)}$. $\square$

Fixe

$$p := n+1, \quad a := H_{n+1} \quad \text{e} \quad a_2 := H_{n+1}^{(2)}.$$

Aplicando o lema a (3.14) (com $r = 2$ nos termos em $(1-z)^{-3}$ e $r = 1$ nos termos em $(1-z)^{-2}$, e lembrando $H_2 = \frac{3}{2}$, $H_2^{(2)} = \frac{5}{4}$, $H_{n+2} = a + \frac{1}{p+1}$), os seis blocos de $[z^n]M(z)$ são:

$$\begin{aligned} \frac{8L^2}{(1-z)^3} &\mapsto 4p(p+1)(a^2 - 3a - a_2 + \frac{7}{2}) + 8pa - 12p, \\ \frac{-8L}{(1-z)^3} &\mapsto -4p(p+1)a + 6p(p+1) - 4p, \\ \frac{6}{(1-z)^3} &\mapsto 3p(p+1), \\ \frac{-4L^2}{(1-z)^2} &\mapsto -4pa^2 + 8pa - 8p + 4pa_2, \\ \frac{6L}{(1-z)^2} &\mapsto 6pa - 6p, \\ \frac{-4z-6}{(1-z)^2} &\mapsto -10p + 4. \end{aligned}$$

Somando,

$$s_n = 4p^2a^2 - 4p^2a_2 - 16p^2a + 6pa + 23p^2 - 17p + 4. \quad (3.15)$$

A variância. Por (3.11), como $H_n = a - \frac{1}{p}$, temos $\mu_n = 2pa - 4p + 2$, e então

$$\mu_n^2 = 4p^2a^2 - 16p^2a + 8pa + 16p^2 - 16p + 4.$$

Subtraindo de (3.15) (os termos em a^2 e em p^2a cancelam):

$$v_n = s_n - \mu_n^2 = 7p^2 - p - 4p^2a_2 - 2pa.$$

Voltando a n , com $a_2 = H_n^{(2)} + \frac{1}{(n+1)^2}$ e $a = H_n + \frac{1}{n+1}$:

$$\text{Var}(C_n) = 7n^2 + 13n - 4(n+1)^2H_n^{(2)} - 2(n+1)H_n. \quad (3.16)$$

Como $H_n^{(2)} = \zeta(2) - \sum_{j>n} j^{-2}$ e $\frac{1}{n+1} < \sum_{j>n} j^{-2} < \frac{1}{n}$, temos $H_n^{(2)} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{n} + O(n^{-2})$. Logo

$$-4(n+1)^2H_n^{(2)} = -\frac{2\pi^2}{3}(n+1)^2 + 4n + O(1),$$

e, com $H_n = \ln n + \gamma + O(1/n)$,

$$\text{Var}(C_n) = \left(7 - \frac{2\pi^2}{3}\right)n^2 - 2n \ln n + O(n).$$

4

Desigualdade de Chernoff–Hoeffding

As desigualdades de Chernoff formam uma classe de desigualdades derivadas da desigualdade de Markov e de limitantes para a função geradora de momentos. Essa técnica foi introduzida por [Bernstein \(1924\)](#), que desenvolveu limitantes para a soma de variáveis aleatórias com variâncias finitas. [Chernoff \(1952\)](#) derivou limitantes para soma de variáveis aleatórias independentes

“Devo mencionar que Cramér (1938) havia obtido resultados muito mais elegantes e gerais sobre grandes desvios. Descobri isso depois de derivar meus próprios resultados. No entanto, Cramér exigia uma condição que não era satisfeita pelas variáveis aleatórias de valores inteiros no meu problema. Shannon havia publicado um artigo usando o Teorema Central do Limite como uma aproximação para grandes desvios e foi criticado por isso. Meu artigo permitiu que ele modificasse seus resultados e gerou muita publicidade na literatura de ciência da computação para o que ficou conhecido como o limitante de Chernoff, que, na verdade, era o resultado de Rubin.” Herman Chernoff, ([Chernoff, 2014](#)).

Sergei N. Bernstein, 1880–1968 foi um matemático soviético. Em 1917, sugeriu a primeira base axiomática da teoria de probabilidade. Conhecido também por resolver o décimo nono problema de Hilbert sobre a solução analítica de equações diferenciais elípticas.

Por fim, [Hoeffding \(1994\)](#) introduziu uma desigualdade para soma de variáveis aleatórias independentes e limitadas.

4.1 O método de Chernoff

Se X é uma variável aleatória, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ uma função estritamente crescente e $t \in \mathbb{R}$, então vale $[X \geq t] = [f(X) \geq f(t)]$ e, pela desigualdade de Markov, deduzimos

$$\mathbb{P}[X \geq t] = \mathbb{P}[f(X) \geq f(t)] \leq \frac{\mathbb{E}f(X)}{f(t)}$$

donde derivamos, anteriormente, a desigualdade de Chebyshev usando $f(x) = x^2$. Agora, neste contexto, tomamos a função $f(x) = \exp(sx)$ para algum parâmetro $s \in \mathbb{R}$ e temos que

- se $s > 0$, então $[X \geq t] = [sX \geq st] = [\exp(sX) \geq \exp(st)]$, logo

$$\mathbb{P}[X \geq t] = \mathbb{P}[e^{sX} \geq e^{st}] \leq \frac{\mathbb{E}e^{sX}}{e^{st}}, \quad (4.1)$$

- se $s < 0$, então $[X \leq t] = [sX \geq st] = [\exp(sX) \geq \exp(st)]$, logo

$$\mathbb{P}[X \leq t] = \mathbb{P}[e^{sX} \geq e^{st}] \leq \frac{\mathbb{E}e^{sX}}{e^{st}}. \quad (4.2)$$

A esperança $M_X(s) := \mathbb{E}e^{sX}$ é a *função geradora de momentos* (FGM) de X , que estudamos com mais cuidado na Seção 4.2; aqui basta saber que ela está definida para os $s \in \mathbb{R}$ em que a esperança é finita. As desigualdades (4.1) e (4.2) valem para todo s (do sinal indicado) em que a FGM de X é finita, e, quando ela diverge, o lado direito vale $+\infty$ e a desigualdade é trivial. Obtemos delas o seguinte resultado.

Teorema 4.1: método de Chernoff–Cramér

Se X é uma variável aleatória e $t \in \mathbb{R}$, então

$$\mathbb{P}[X \geq t] \leq \inf_{s>0} \frac{\mathbb{E}e^{sX}}{e^{st}} \quad (4.3)$$

$$\mathbb{P}[X \leq t] \leq \inf_{s<0} \frac{\mathbb{E}e^{sX}}{e^{st}}. \quad (4.4)$$

O método de Chernoff–Cramér consiste em estimar o lado direito dessas desigualdades e é especialmente útil no caso de variáveis aleatórias que podem ser escritas como soma de variáveis aleatórias independentes, pois nesse caso a FGM da soma é o produto das FGMs (Seção 4.2).

4.2 Momentos e função geradora de momentos

Dado um inteiro positivo k , definimos o momento de ordem k , ou o *k -ésimo momento* da variável aleatória $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, como a esperança de X^k

$$\mathbb{E}X^k = \sum_r r^k \mathbb{P}_X(r)$$

quando está definida. De $|x|^k \leq |x|^{k+1} + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, temos que se o momento de ordem $k+1$ é finito então o de ordem k também é finito. Ainda, usando a desigualdade de Markov, podemos provar facilmente que, dado um inteiro positivo k , vale

$$\mathbb{P}[|X| \geq t] = \mathbb{P}[|X|^k \geq t^k] \leq \frac{\mathbb{E}|X|^k}{t^k} \quad (4.5)$$

para toda constante $t > 0$, sempre que $|X|^k$ é integrável.

Se X tem esperança finita, definimos o *k -ésimo momento central* por $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^k$. Em particular, a *variância* de uma variável aleatória integrável é o segundo momento central dessa variável

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2. \quad (4.6)$$

A *função geradora de momentos* (FGM) de uma variável aleatória real X é

$$M_X(s) := \mathbb{E}e^{sX}, \quad s \in \mathbb{R}, \quad (4.7)$$

definida nos valores de s para os quais a esperança é finita. Sempre vale $M_X(0) = 1$. Se a função está definida em algum intervalo $(-x_0, x_0)$ com $x_0 > 0$, então a variável aleatória X tem todos os seus momentos finitos e, usando a série de Taylor em torno de 0, vale que

$$M_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} \mathbb{E}X^k \quad (4.8)$$

para todo $s \in (-x_0, x_0)$ (ver Billingsley, 1995, Seção 21).

O nome vem do fato de que, expandindo e^{sX} em série de Taylor e trocando soma com esperança (quando isso é válido),

$$M_X(s) = \mathbb{E} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(sX)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}X^k}{k!} s^k,$$

ou seja, os *momentos* $\mathbb{E}X^k$ aparecem como os coeficientes de Taylor de M_X em $s = 0$ (a menos do fatorial). Equivalentemente, $\mathbb{E}X^k = M_X^{(k)}(0)$, a k -ésima derivada de M_X avaliada em $s = 0$. Em particular, $M_X'(0) = \mathbb{E}X$ e $M_X''(0) = \mathbb{E}X^2$.

A FGM pode não estar definida para todo s : para variáveis com cauda muito pesada¹, $M_X(s)$ pode divergir para todo $s \neq 0$. Felizmente, nas aplicações deste capítulo a FGM está definida em um intervalo em torno de 0: para variáveis limitadas, como as indicadoras, em todo $\mathbb{R}$; para a geométrica, em $s < \ln 2$ (Exemplo 4.2 e Seção 4.6).

A propriedade central que torna a FGM valiosa em nossas aplicações é que ela transforma *soma de variáveis independentes* em *produto de FGMs*. Se $X_1, \dots, X_n$ são independentes,

$$M_{X_1 + \dots + X_n}(s) = \mathbb{E}e^{s(X_1 + \dots + X_n)} = \mathbb{E} \prod_{i=1}^n e^{sX_i} = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}e^{sX_i} = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(s),$$

onde a penúltima igualdade usa a independência (a esperança do produto é o produto das esperanças).

¹ por exemplo, distribuições com densidade proporcional a $|x|^{-3}$ para $|x| \geq 1$

Exemplo 4.1: FGM da binomial

Se $X \sim \text{binomial}(n, p)$, então $X = \sum_i X_i$ com X_i independentes e distribuição de Bernoulli(p), e

$$M_{X_i}(s) = \mathbb{E}e^{sX_i} = pe^s + 1 - p,$$

logo

$$M_X(s) = (pe^s + 1 - p)^n$$

para todo $s \in \mathbb{R}$.

Exemplo 4.2: FGM da geométrica

Se $X \sim \text{Geom}(p)$, então

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \sum_{k=1}^{\infty} e^{sk} p(1-p)^{k-1} = pe^s \sum_{k=1}^{\infty} (e^s(1-p))^{k-1} \\ &= \frac{pe^s}{1 - e^s(1-p)} \quad (4.9) \end{aligned}$$

sempre que $e^s(1-p) < 1$, ou seja, $s < -\ln(1-p)$. Em particular, $\mathbb{E}X = M'_X(0) = 1/p$.

4.3 Somas de variáveis aleatórias uniformes

Antes do caso geral, vejamos duas somas em que as contas são particularmente simples.

SOMA DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DE RADEMACHER

Uma variável aleatória tem *distribuição de Rademacher* se assume os valores $\{-1, 1\}$ com probabilidade uniforme.

Teorema 4.2: Chernoff para variáveis Rademacher

Se $X = \sum_{i=1}^n X_i$ com $X_1, \dots, X_n \in_{\mathbb{R}}\{-1, 1\}$ independentes e $t > 0$, então

$$\mathbb{P}[|X| \geq t] \leq 2 \exp\left(\frac{-t^2}{2n}\right). \quad (4.10)$$

Demonstração. Seja X uma variável aleatória como no enunciado. Pela independência das X_i , para todo $s \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}e^{sX} = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}e^{sX_i} = \prod_{i=1}^n \frac{e^s + e^{-s}}{2} = (\cosh s)^n.$$

Pela série de Taylor do cosseno hiperbólico e pelo fato de que $(2i)! \geq$

$\cosh(s)$ é a função cosseno hiperbólico.

$2^i i!$ para todo inteiro $i \geq 0$ (segue facilmente por indução em i),

$$\cosh s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{s^{2i}}{(2i)!} \leq \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(s^2/2)^i}{i!} = e^{s^2/2},$$

logo $\mathbb{E}e^{sX} \leq e^{s^2 n/2}$. Para $s > 0$, a desigualdade de Markov aplicada à variável não negativa e^{sX} dá

$$\mathbb{P}[X \geq t] = \mathbb{P}[e^{sX} \geq e^{st}] \leq e^{-st} \mathbb{E}e^{sX} \leq \exp\left(\frac{s^2 n}{2} - st\right).$$

O mínimo do lado direito, entre os $s > 0$, é atingido em $s = t/n$ (positivo, pois $t > 0$), de modo que

$$\mathbb{P}[X \geq t] \leq e^{-t^2/2n}. \quad (4.11)$$

Como $-X$ tem a mesma distribuição de X (as $-X_i$ também são independentes e uniformes em $\{-1, 1\}$), $\mathbb{P}[-X \geq t] = \mathbb{P}[X \geq t]$ e, pela subaditividade (equação (1.2)),

$$\mathbb{P}[|X| \geq t] \leq 2e^{-t^2/2n}$$

para todo $t > 0$. □

SOMA DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DE BERNOULLI UNIFORMES

Sejam $X_1, \dots, X_n \in_{\mathbb{R}}\{-1, 1\}$ independentes. Então $Y_i := (X_i + 1)/2 \in_{\mathbb{R}}\{0, 1\}$ são independentes e $Y := \sum_i Y_i \sim \text{binomial}(n, 1/2)$, com $\sum_i X_i = 2Y - n$. Aplicando o Teorema 4.3 com parâmetro $2t$, para todo $t > 0$,

$$\mathbb{P}[|Y - n/2| \geq t] = \mathbb{P}[|2Y - n| \geq 2t] \leq 2 \exp\left(-\frac{(2t)^2}{2n}\right) = 2e^{-2t^2/n}.$$

Do mesmo modo, a cota unilateral (4.11), também com parâmetro $2t$, dá

$$\mathbb{P}[Y - n/2 \geq t] = \mathbb{P}[2Y - n \geq 2t] \leq e^{-(2t)^2/2n} = e^{-2t^2/n}.$$

Disso concluímos o seguinte resultado.

Teorema 4.3: Chernoff para v.a. binomial padrão

Se $X \sim \text{binomial}(n, 1/2)$ então, para todo $t > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X - \mathbb{E}X \geq t] &\leq e^{-2t^2/n} \\ &\text{e} \\ \mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq t] &\leq 2 \exp\left(\frac{-2t^2}{n}\right). \end{aligned} \quad (4.12)$$

□

Exemplo 4.3: Markov, Chebyshev e Chernoff no lançamento de moedas

Consideremos S_n a quantidade de caras no lançamento de n moedas equilibradas. O número esperado de caras é $n/2$, portanto, pela desigualdade de Markov,

$$\mathbb{P}\left[S_n \geq \frac{3}{4}n\right] \leq \frac{n/2}{3n/4} = \frac{2}{3}.$$

Usando a desigualdade de Chebyshev, com $\text{Var}(S)_n = n \cdot \frac{1}{4} = \frac{n}{4}$ (as n moedas são independentes),

$$\mathbb{P}\left[\left|S_n - \frac{n}{2}\right| \geq \frac{n}{4}\right] \leq \frac{n/4}{(n/4)^2} = \frac{4}{n},$$

em particular, $\mathbb{P}[S_n \geq 3n/4] \leq 4/n$. Pela versão unilateral da desigualdade de Chernoff (4.12), com $t = n/4$,

$$\mathbb{P}\left[S_n \geq \frac{3n}{4}\right] = \mathbb{P}\left[S_n - \frac{n}{2} \geq \frac{n}{4}\right] \leq e^{-2(n/4)^2/n} = e^{-n/8}.$$

Em resumo, os limitantes superiores para a probabilidade de $S_n \geq 1,5 \mathbb{E}S_n$ são

	Markov	Chebyshev	Chernoff
$\mathbb{P}[S_n \geq 3n/4]$	$\leq 2/3$	$\leq 4/n$	$\leq e^{-n/8}$

Embora a desigualdade de Chernoff seja muito mais poderosa, essas desigualdades assumem hipóteses diferentes: Markov só exige que a variável seja não negativa; Chebyshev, para uma soma, usa que as variâncias se somam (basta independência dois a dois); Chernoff usa a independência das X_i em conjunto.

4.4 A desigualdade de Hoeffding

O logaritmo da FGM,

$$K_X(s) := \ln M_X(s),$$

é chamado de *função geradora de cumulantes*. Sob a transformação logarítmica, a propriedade de produto vira soma:

$$K_{X_1 + \dots + X_n}(s) = \sum_{i=1}^n K_{X_i}(s),$$

uma soma de n termos, mais simples de analisar que um produto de n fatores. Suas derivadas em $s = 0$ são os *cumulantes* de X :

$K'_X(0) = \mathbb{E}X$ (o primeiro cumulante, igual ao primeiro momento) e $K''_X(0) = \text{Var}(X)$ (o segundo cumulante, que já não coincide com o segundo momento bruto, mas com a variância, justamente por causa da centralização implícita que o logaritmo introduz). É essa função, aplicada a $Z = X - \mathbb{E}X$, que aparece na prova do Lema de Hoeffding: $f(s) = K_{X-\mu}(s)$.

Combinando a FGM com a desigualdade de Markov aplicada a e^{sX} , como em (4.1), e escolhendo $s > 0$ para minimizar o lado direito, obtemos a cota mais forte possível por esse método. É o que faremos na prova do Teorema 4.4, com $s = 4t/n$. Diferentes escolhas de X e de s dão origem às várias variantes de “cotas de Chernoff” encontradas na literatura. A que provamos aqui (Lema de Hoeffding mais essa otimização) é uma das mais simples e vale para variáveis limitadas em $[0, 1]$.

Antes de enunciar o lema, vale explicar duas escolhas técnicas que tornam sua demonstração simples.

A primeira é trabalhar com o *logaritmo* da função geradora de momentos, $f(s) := \ln \mathbb{E}e^{sZ}$, em vez de $\mathbb{E}e^{sZ}$ diretamente. A função $\mathbb{E}e^{sZ}$ mistura somas e exponenciais de forma que suas derivadas de ordem superior ficam cada vez mais complicadas (a regra do produto se acumula a cada derivação). Tomando o logaritmo antes de derivar, essas derivadas assumem uma forma fechada e reconhecível: no caso de uma Bernoulli, a segunda derivada de f sai na forma $q_s(1 - q_s)$, um produto do tipo “ $p(1 - p)$ ”, fácil de limitar. Além disso, como $\ln$ é crescente, provar uma cota para $f(s)$ é equivalente a provar a mesma cota, exponenciada, para $\mathbb{E}e^{sZ}$, de modo que nada se perde ao passar para o logaritmo.

A segunda escolha é aplicar essa construção à variável *centralizada* $Z = X - \mu$, e não a X diretamente. Como $\mathbb{E}X - \mu = 0$, a variável Z tem média zero. Isso faz com que a expansão de Taylor de f em torno de $s = 0$ comece direto no termo quadrático: $f(0) = 0$ (pois $\mathbb{E}e^0 = 1$) e $f'(0) = \mathbb{E}Z = 0$, sem o termo linear, sobra apenas

$$f(s) = \frac{f''(\xi)}{2} s^2$$

para algum ξ entre 0 e s (teorema de Taylor com resto de Lagrange), e basta então limitar f'' uniformemente para obter uma cota do tipo $f(s) \leq cs^2$, válida para *toda* s , e não apenas para s pequeno, como daria uma expansão assintótica comum. Se não tivéssemos centralizado, $f'(0) = \mathbb{E}X = \mu \neq 0$ em geral, e um termo linear indesejado apareceria na cota final.

² Em geral, $\frac{d}{ds} \mathbb{E}e^{sZ} \Big|_{s=0} = \mathbb{E}Z$; após compor com o logaritmo, $f'(0) = \mathbb{E}Z$ também, pois $\mathbb{E}e^0 = 1$.

Lema 4.1: Lema de Hoeffding

Seja X uma variável aleatória com valores em $[0, 1]$ e $\mu := \mathbb{E}X$.
Para todo $s \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}e^{s(X-\mu)} \leq \exp\left(\frac{s^2}{8}\right).$$

Demonstração. Se $\mu \in \{0, 1\}$, então $X = \mu$ com probabilidade 1 e o resultado é trivial; suponha $0 < \mu < 1$.

Redução ao caso Bernoulli. Para $x \in [0, 1]$, a convexidade de $x \mapsto e^{sx}$ dá $e^{sx} \leq (1-x) + xe^s$ (a corda entre $x = 0$ e $x = 1$). Tomando a esperança,

$$\mathbb{E}e^{sX} \leq 1 + \mu(e^s - 1),$$

que vale com igualdade quando $X \in \{0, 1\}$. Logo $\mathbb{E}e^{s(X-\mu)} \leq e^{f(s)}$, onde

$$f(s) := -s\mu + \ln(1 + \mu(e^s - 1)).$$

Usando Taylor. Temos $f(0) = 0$, $f'(s) = -\mu + q_s$ com $q_s := \mu e^s / (1 - \mu + \mu e^s) \in (0, 1)$, logo $f'(0) = 0$ e, como $q'_s = q_s(1 - q_s)$,

$$f''(s) = q_s(1 - q_s) \leq \frac{1}{4} \quad \text{para todo } s.$$

Pelo teorema de Taylor com resto, existe ξ entre 0 e s tal que

$$\begin{aligned} f(s) &= f(0) + f'(0)s + \frac{f''(\xi)}{2}s^2 \\ &= \frac{f''(\xi)}{2}s^2 \leq \frac{1/4}{2}s^2 = \frac{s^2}{8}. \end{aligned}$$

Portanto $\mathbb{E}e^{s(X-\mu)} \leq e^{f(s)} \leq e^{s^2/8}$. □

Teorema 4.4: Desigualdade de Chernoff–Hoeffding

Sejam $X_1, \dots, X_n$ independentes, com valores em $[0, 1]$,
 $S := X_1 + \dots + X_n$ e $\mu := \mathbb{E}S$. Para todo $t > 0$,

$$\mathbb{P}[S \geq \mu + t] \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{n}\right),$$

$$\mathbb{P}[S \leq \mu - t] \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{n}\right)$$

e, portanto, $\mathbb{P}[|S - \mu| \geq t] \leq 2\exp(-2t^2/n)$.

Demonstração. Para $s > 0$, pela desigualdade de Markov (3.5) aplicada à variável não negativa $e^{s(S-\mu)}$,

$$\mathbb{P}[S - \mu \geq t] = \mathbb{P}[e^{s(S-\mu)} \geq e^{st}] \leq e^{-st} \mathbb{E}e^{s(S-\mu)} = e^{-st} \prod_{i=1}^n \mathbb{E}e^{s(X_i - \mathbb{E}X_i)} \leq e^{-st} \exp\left(\frac{ns^2}{8}\right),$$

usando a independência dos X_i e o Lema 4.1 em cada fator. Otimizando em s : o mínimo de $-st + ns^2/8$ ocorre em $s = 4t/n$, dando o valor $-2t^2/n$, o que prova a primeira desigualdade. Para a segunda, aplicamos a primeira às variáveis $1 - X_i \in [0, 1]$, independentes, com soma $n - S$ e esperança $n - \mu$: $\mathbb{P}[S \leq \mu - t] = \mathbb{P}[n - S \geq (n - \mu) + t] \leq e^{-2t^2/n}$. A cota bilateral segue da subaditividade. $\square$

Observação 6. Os resultados da Seção 4.3 são casos particulares. Para $X_i \in_R \{0, 1\}$ (binomial $(n, 1/2)$), o Teorema dá exatamente (4.12). Para Rademacher, $X = \sum_i X_i = 2S - n$ com $S = \sum_i (X_i + 1)/2$ e $\mu = n/2$, logo $\mathbb{P}[X \geq t] = \mathbb{P}[S \geq \mu + t/2] \leq e^{-t^2/2n}$, que é (4.11).

4.5 Soma de variáveis aleatórias Bernoulli não identicamente distribuídas

O Teorema 4.4 já dá a cota aditiva para qualquer soma de variáveis em $[0, 1]$. Para variáveis de Bernoulli com probabilidades p_i distintas obtemos, com as mesmas ideias, mais: a cota exata em função de $\hat{p}$ e a cota *multiplicativa*, bem melhor quando $\mathbb{E}X$ é pequeno, que é a usada nas aplicações a algoritmos.

A estratégia do método da função geradora de momentos (método de Chernoff: desigualdade de Markov aplicada a e^{sX}) pode ser usada na soma de variáveis aleatórias que são independentes mas não têm, necessariamente, a mesma distribuição. Sejam $X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$, $1 \leq i \leq n$, independentes, $X = \sum_i X_i$ e

$$\hat{p} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \quad \text{e} \quad \hat{q} := 1 - \hat{p}, \quad (4.13)$$

de modo que $\mathbb{E}X = n\hat{p}$. Se $\hat{p} \in \{0, 1\}$, então X é constante com probabilidade 1 e tudo o que segue é trivial; supomos $0 < \hat{p} < 1$.

Pela independência e pela desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, para todo $s \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}e^{sX} = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}e^{sX_i} = \prod_{i=1}^n (p_i e^s + (1 - p_i)) \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i e^s + (1 - p_i)) \right)^n = (\hat{p} e^s + \hat{q})^n.$$

Para $s > 0$ e $t \geq 0$, a desigualdade de Markov aplicada à variável não negativa e^{sX} dá

$$\mathbb{P}[X \geq (\hat{p} + t)n] = \mathbb{P}[e^{sX} \geq e^{s(\hat{p}+t)n}] \leq \frac{\mathbb{E}e^{sX}}{e^{s(\hat{p}+t)n}} \leq \left(\frac{\hat{p} e^s + \hat{q}}{e^{s(\hat{p}+t)}} \right)^n. \quad (4.14)$$

Para $0 < t < \hat{q}$, minimizamos o lado direito em s , isto é, a função

$$g(s) = \frac{\hat{p} e^s + \hat{q}}{e^{s(\hat{p}+t)}} = \hat{p} e^{s(\hat{q}-t)} + \hat{q} e^{-s(\hat{p}+t)}.$$

Como g é soma de exponenciais, é convexa, e portanto um ponto crítico é mínimo global. A derivada é

$$g'(s) = \hat{p}(\hat{q} - t) e^{s(\hat{q}-t)} - \hat{q}(\hat{p} + t) e^{-s(\hat{p}+t)},$$

e $g'(s) = 0$ equivale, multiplicando por $e^{s(\hat{p}+t)}$, a $\hat{p}(\hat{q} - t) e^s = \hat{q}(\hat{p} + t)$, isto é,

$$s^* = \ln\left(\frac{\hat{q}(\hat{p} + t)}{\hat{p}(\hat{q} - t)}\right).$$

Esse ponto é positivo, pois $\hat{q}(\hat{p} + t) - \hat{p}(\hat{q} - t) = t(\hat{p} + \hat{q}) = t > 0$, de modo que s^* serve para a desigualdade (4.14).

Lema 4.2

Se X é a soma das variáveis aleatórias independentes

$X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$, $1 \leq i \leq n$, $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \in (0, 1)$ e $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, então

$$\mathbb{P}[X \geq (\hat{p} + t)n] \leq \left(\left(\frac{\hat{p}}{\hat{p} + t} \right)^{\hat{p}+t} \left(\frac{\hat{q}}{\hat{q} - t} \right)^{\hat{q}-t} \right)^n \quad (0 \leq t < \hat{q}).$$

Demonstração. Para $t = 0$ o lado direito é 1 e não há o que provar.

Para $0 < t < \hat{q}$, substituímos $s = s^*$ em (4.14). Com $e^{s^*} = \hat{q}(\hat{p} + t) / (\hat{p}(\hat{q} - t))$,

$$\hat{p} e^{s^*} + \hat{q} = \frac{\hat{q}(\hat{p} + t)}{\hat{q} - t} + \hat{q} = \frac{\hat{q}}{\hat{q} - t}, \quad e^{-s^*(\hat{p}+t)} = \left(\frac{\hat{p}(\hat{q} - t)}{\hat{q}(\hat{p} + t)} \right)^{\hat{p}+t},$$

logo

$$g(s^*) = \frac{\hat{q}}{\hat{q} - t} \cdot \left(\frac{\hat{p}}{\hat{p} + t} \right)^{\hat{p}+t} \left(\frac{\hat{q} - t}{\hat{q}} \right)^{\hat{p}+t} = \left(\frac{\hat{p}}{\hat{p} + t} \right)^{\hat{p}+t} \left(\frac{\hat{q}}{\hat{q} - t} \right)^{1-\hat{p}-t},$$

e $1 - \hat{p} - t = \hat{q} - t$. $\square$

Cota aditiva Reescrevendo o lado direito do Lema 4.2,

$$\mathbb{P}[X \geq (\hat{p} + t)n] \leq \exp(-f(t) \cdot n), \quad (4.15)$$

onde, para $-\hat{p} < t < \hat{q}$,

$$f(t) = (\hat{p} + t) \ln \frac{\hat{p} + t}{\hat{p}} + (\hat{q} - t) \ln \frac{\hat{q} - t}{\hat{q}}.$$

Vamos estudar essa função f . Sua primeira e segunda derivadas são

$$f'(t) = \ln\left(\frac{(\hat{p} + t)\hat{q}}{\hat{p}(\hat{q} - t)}\right) \quad \text{e} \quad f''(t) = \frac{1}{\hat{p} + t} + \frac{1}{\hat{q} - t} = \frac{1}{(\hat{p} + t)(\hat{q} - t)},$$

de modo que $f(0) = f'(0) = 0$. Para $0 \leq t < \hat{q}$, o denominador de f'' é o produto de dois reais positivos que somam 1, logo é no máximo

$1/4$ e $f''(t) \geq 4$. Pela fórmula de Taylor com resto, com $a = 0$, existe $\xi \in (0, t)$ tal que

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{f''(\xi)}{2}t^2 = \frac{f''(\xi)}{2}t^2 \geq 2t^2.$$

Substituindo em (4.15),

$$\mathbb{P}[X \geq (\hat{p} + t)n] \leq \exp(-2t^2n) \quad (0 \leq t < \hat{q}).$$

Essa cota vale para todo $t \geq 0$. Se $t > \hat{q}$, o evento é vazio, pois $(\hat{p} + t)n > n$. Se $t = \hat{q}$, o evento está contido em $[X \geq (\hat{p} + t')n]$ para todo $t' < \hat{q}$, e basta fazer $t' \rightarrow \hat{q}$.

Para a cauda inferior, as variáveis $Y_i := 1 - X_i \sim \text{Bernoulli}(1 - p_i)$ são independentes, com média amostral $\hat{q}$, e $\sum_i Y_i = n - X$. Portanto, pela cota anterior aplicada a (Y_i) , para todo $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}[X \leq (\hat{p} - t)n] = \mathbb{P}\left[\sum_i Y_i \geq (\hat{q} + t)n\right] \leq \exp(-2t^2n).$$

Em particular, pelo Lema 4.2 aplicado a (Y_i) ,

$$\mathbb{P}[X \leq (\hat{p} - t)n] \leq \exp(-f(-t) \cdot n) \quad (0 \leq t < \hat{p}), \quad (4.16)$$

pois o expoente associado a (Y_i) é $(\hat{q} + t) \ln \frac{\hat{q} + t}{\hat{q}} + (\hat{p} - t) \ln \frac{\hat{p} - t}{\hat{p}} = f(-t)$.

Corolário 4.1

Com as hipóteses do Lema 4.2, $\mathbb{E}X = n\hat{p}$ e

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq tn] \leq 2\exp(-2t^2n), \quad \text{para todo } t \geq 0.$$

□

Esse corolário também segue do Teorema 4.4 (com tn no lugar de t). A demonstração acima é uma segunda prova, que mostra a cota aditiva como consequência da cota exata do Lema e deixa disponível a função f , usada abaixo na cota inferior multiplicativa.

Cota multiplicativa Fazendo $s = \ln(1 + \varepsilon)$ e $t = \varepsilon\hat{p}$, para todo $\varepsilon > 0$, em (4.14), ao invés de tomarmos o ótimo como acima, obtemos uma desigualdade mais fraca, mas que pode ser mais fácil de aplicar. Com essa escolha, $\hat{p}e^s + \hat{q} = 1 + \varepsilon\hat{p}$ e $e^{s(\hat{p}+t)} = (1 + \varepsilon)^{(1+\varepsilon)\hat{p}}$, logo, usando $1 + x \leq e^x$,

$$\mathbb{P}[X \geq (1 + \varepsilon)\mathbb{E}X] \leq \left(\frac{1 + \varepsilon\hat{p}}{(1 + \varepsilon)^{(1+\varepsilon)\hat{p}}}\right)^n \leq \left(\frac{e^\varepsilon}{(1 + \varepsilon)^{(1+\varepsilon)}}\right)^{\mathbb{E}X}, \quad (4.17)$$

pois $n\hat{p} = \sum_i p_i = \mathbb{E}X$ e $(1 + \varepsilon)\mathbb{E}X = (\hat{p} + \varepsilon\hat{p})n$.

Exercício 23. Deduza que, para todo $\varepsilon \in (0, 1)$, vale

$$\mathbb{P}[X \leq (1 - \varepsilon)\mathbb{E}X] \leq \left(\frac{e^{-\varepsilon}}{(1 - \varepsilon)^{1-\varepsilon}} \right)^{\mathbb{E}X}.$$

(Dica: repita o argumento acima com $s < 0$, escolhendo $s = \ln(1 - \varepsilon)$, e use $1 + x \leq e^x$ em cada fator de $\mathbb{E}e^{sX} = \prod_i (1 + p_i(e^s - 1))$.)

Lema 4.3

Sejam $p_i \in [0, 1]$ e $X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$, para $1 \leq i \leq n$, variáveis aleatórias independentes. Se $X = \sum_{i=1}^n X_i$, então

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X \geq (1 + \varepsilon)\mathbb{E}X] &\leq \left(\frac{e^\varepsilon}{(1 + \varepsilon)^{1+\varepsilon}} \right)^{\mathbb{E}X} && \text{para todo } \varepsilon > 0, \text{ e} \\ \mathbb{P}[X \leq (1 - \varepsilon)\mathbb{E}X] &\leq \left(\frac{e^{-\varepsilon}}{(1 - \varepsilon)^{1-\varepsilon}} \right)^{\mathbb{E}X} && \text{para todo } \varepsilon \in (0, 1). \end{aligned} \quad (4.18)$$

Demonstração. A primeira desigualdade é (4.17) e a segunda é o Exercício 23. $\square$

A seguir vamos trabalhar os limitantes dos lemas acima para obtermos desigualdades mais fáceis de serem usadas. Usamos a seguinte desigualdade, cuja demonstração está no final desta seção.

Proposição 4.1

$$\text{Para todo } x > 0, (1 + x) \ln(1 + x) - x \geq \frac{3x^2}{6 + 2x} = \frac{x^2}{2(1 + x/3)}.$$

Como o limitante superior de (4.18) é igual a $\exp(-((1 + \varepsilon) \ln(1 + \varepsilon) - \varepsilon)\mathbb{E}X)$, a proposição dá

$$\mathbb{P}[X \geq (1 + \varepsilon)\mathbb{E}X] \leq \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 \mathbb{E}X}{2(1 + \varepsilon/3)}\right) \leq \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 \mathbb{E}X}{3}\right), \quad (4.19)$$

em que a segunda desigualdade vale se $2(1 + \varepsilon/3) \leq 3$, isto é, se $\varepsilon \leq 3/2$. Em particular, vale para $0 < \varepsilon \leq 1$.

Para o limitante inferior, seja $h(x) := f(-x\hat{p})$, com $0 \leq x < 1$. Então $h(0) = 0$, $h'(x) = -\hat{p} f'(-x\hat{p})$, $h'(0) = 0$ e

$$h''(x) = \hat{p}^2 f''(-x\hat{p}) = \frac{\hat{p}^2}{(\hat{p} - x\hat{p})(\hat{q} + x\hat{p})} = \frac{\hat{p}}{(1 - x)(\hat{q} + \hat{p}x)} \geq \frac{\hat{p}}{1 - x} \geq \hat{p},$$

pois $\hat{q} + \hat{p}x \leq \hat{q} + \hat{p} = 1$. Portanto, pela fórmula de Taylor com resto, $h(x) \geq \hat{p}x^2/2$. Por (4.16) com $t = \varepsilon\hat{p} < \hat{p}$,

$$\mathbb{P}[X \leq (1 - \varepsilon)\mathbb{E}X] = \mathbb{P}[X \leq (\hat{p} - \varepsilon\hat{p})n] \leq \exp(-h(\varepsilon) \cdot n) \leq \exp\left(-\frac{\hat{p} \varepsilon^2 n}{2}\right) = \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 \mathbb{E}X}{2}\right)$$

para todo $\varepsilon \in (0, 1)$.

Reunindo os resultados acima, a partir do Corolário 4.1, de (4.19) e do limitante anterior, escrevemos o teorema a seguir.

Teorema 4.5: Chernoff para somas de Bernoulli

Se $X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$ são independentes com $p_i \in [0, 1]$ e $X = \sum_{i=1}^n X_i$, então

1. para todo $t > 0$,

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq t] \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{n}\right); \quad (4.20)$$

2. para todo $0 < \varepsilon \leq 1$,

$$\mathbb{P}[X \geq (1 + \varepsilon)\mathbb{E}X] \leq \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 \mathbb{E}X}{3}\right); \quad (4.21)$$

3. para todo $0 < \varepsilon < 1$,

$$\mathbb{P}[X \leq (1 - \varepsilon)\mathbb{E}X] \leq \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 \mathbb{E}X}{2}\right). \quad (4.22)$$

Além disso, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}[X \geq (1 + \varepsilon)\mathbb{E}X] \leq \exp(-\varepsilon^2 \mathbb{E}X / (2 + \varepsilon)).$$

O item 1 é o Corolário 4.1 com t/n no lugar de t . Os casos $\hat{p} \in \{0, 1\}$, excluídos acima, são triviais, pois X é constante. A última afirmação segue de (4.19), já que $2(1 + \varepsilon/3) \leq 2 + \varepsilon$.

Observação 7. Na prática podemos ter apenas uma estimativa $0 < \alpha \leq \mathbb{E}X \leq \beta$ para a esperança. Então, para todo $t \in (0, 1)$,

$$\mathbb{P}[X \geq (1 + t)\beta] \leq \exp\left(-\frac{t^2\beta}{3}\right) \quad \text{e} \quad \mathbb{P}[X \leq (1 - t)\alpha] \leq \exp\left(-\frac{t^2\alpha}{2}\right).$$

Para a primeira, acrescentamos a X novas variáveis de Bernoulli independentes ($k = \lceil \beta - \mathbb{E}X \rceil$ variáveis, cada uma com probabilidade $(\beta - \mathbb{E}X)/k$), de modo que a esperança total seja exatamente β , obtendo $X' \geq X$ com $\mathbb{E}X' = \beta$; então $\mathbb{P}[X \geq (1 + t)\beta] \leq \mathbb{P}[X' \geq (1 + t)\mathbb{E}X']$ e basta usar o item 2 do Teorema. Para a segunda, tomamos $c = \alpha/\mathbb{E}X \leq 1$ e $B_i \sim \text{Bernoulli}(c)$ independentes entre si e das X_i ; então $X'_i = X_i B_i \sim \text{Bernoulli}(cp_i)$ são independentes, $X'' = \sum_i X'_i \leq X$ e $\mathbb{E}X'' = \alpha$, logo $\mathbb{P}[X \leq (1 - t)\alpha] \leq \mathbb{P}[X'' \leq (1 - t)\mathbb{E}X'']$ e basta usar o item 3.

Demonstração da Proposição 4.1. Seja $\varphi(x) = (1 + x) \ln(1 + x) - x -$

$\frac{3x^2}{6+2x}$, para $x \geq 0$. Então $\varphi(0) = 0$,

$$\varphi'(x) = \ln(1+x) - \frac{3x(6+x)}{2(3+x)^2}, \quad \varphi''(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{27}{(3+x)^3},$$

e $\varphi'(0) = 0$. Como $(3+x)^3 = 27 + 27x + 9x^2 + x^3 \geq 27(1+x)$, temos $\varphi''(x) \geq 0$. Logo φ' é não decrescente, $\varphi' \geq \varphi'(0) = 0$, e portanto φ é não decrescente, $\varphi \geq \varphi(0) = 0$. $\square$

4.6 Soma de variáveis aleatórias geométricas

Vamos derivar uma desigualdade do tipo Chernoff para soma de variáveis aleatórias com distribuição geométrica. Diferentemente das seções anteriores, essas variáveis são ilimitadas, e a FGM só é finita para $s < \ln 2$ (Exemplo 4.2); como o método só usa $s > 0$, basta trabalhar com $0 < s < \ln 2$.

Sejam $X_i \sim \text{Geom}(1/2)$, para $1 \leq i \leq n$, variáveis aleatórias independentes, e $X := \sum_{i=1}^n X_i$. Pelo Exemplo 4.2 com $p = 1/2$, $\mathbb{E}X = 2n$ e, para $0 < s < \ln 2$,

$$\mathbb{E}e^{sX} = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}e^{sX_i} = \left(\frac{e^s}{2 - e^s} \right)^n.$$

Usando a desigualdade (4.1) com $t = (2+a)n$, para qualquer $a > 0$, temos

$$\mathbb{P}[X \geq (2+a)n] \leq e^{-s(2+a)n} \left(\frac{e^s}{2 - e^s} \right)^n = \left(\frac{e^{-(1+a)s}}{2 - e^s} \right)^n.$$

Minimizamos o logaritmo da base, $-(1+a)s - \ln(2 - e^s)$, que é convexo em s (sua segunda derivada é $2e^s / (2 - e^s)^2 > 0$). Seu ponto crítico satisfaz $-(1+a) + e^s / (2 - e^s) = 0$, isto é, $e^s = 2(1+a) / (2+a) = 1 + a / (2+a) \in (1, 2)$, logo $s = \ln(1 + a / (2+a)) \in (0, \ln 2)$ é o mínimo, e nele

$$\mathbb{P}[X \geq (2+a)n] \leq \left(\left(1 + \frac{a}{2}\right) \left(1 - \frac{a}{2+2a}\right)^{1+a} \right)^n \quad \text{para todo } a > 0. \quad (4.23)$$

Usando que $1 - x \leq \exp(-x)$, para todo x ,

$$\left(1 - \frac{a}{2+2a}\right)^{1+a} \leq e^{-a/2},$$

e que $1 + a/2 \leq \exp(a/4)$ para $a \geq 6$ (a função $\varphi(a) = a/4 - \ln(1 + a/2)$ é não decrescente para $a \geq 2$, pois $\varphi'(a) = 1/4 - 1/(2+a) \geq 0$, e $\varphi(6) = 3/2 - \ln 4 > 0$),

$$\left(1 + \frac{a}{2}\right)^n \leq e^{an/4}.$$

Finalmente, para todo $a \geq 6$ vale que $\mathbb{P}[X \geq (2+a)n] \leq \exp(-an/4)$. Como $(2+a)n = (1+a/2)\mathbb{E}X$, fazendo $t = a/2$ obtemos o teorema a seguir.

Teorema 4.6: Chernoff para v.a. geométrica padrão

Sejam $X_i \sim \text{Geom}(1/2)$, para $1 \leq i \leq n$, variáveis aleatórias independentes e $X = \sum_{i=1}^n X_i$. Então

$$\mathbb{P}[X \geq (1+t)\mathbb{E}X] \leq \exp\left(-\frac{tn}{2}\right) \quad (4.24)$$

para todo $t \geq 3$. $\square$

A cota exata (4.23) vale para todo $a > 0$; o enunciado simplificado exige $t \geq 3$ apenas por causa da passagem $1 + a/2 \leq \exp(a/4)$.

4.7 Amplificação de probabilidade em algoritmos de Monte Carlo

Um algoritmo de Monte Carlo A tem erro bilateral no máximo $\varepsilon < 1/2$ se, para toda entrada w ,

$$\mathbb{P}[A(w) \text{ responde errado}] \leq \varepsilon < \frac{1}{2},$$

isto é, A pode responder *sim* quando a resposta correta é *não* e vice-versa. Queremos, dado $\delta \in (0, 1)$, um algoritmo com erro menor que δ .

Dada a entrada w , executamos k vezes o algoritmo A sobre w , cada uma com sorteios novos e independentes das anteriores, e respondemos a resposta que aparecer mais vezes (em caso de empate, qualquer uma).

Teorema 4.7: Amplificação por maioria

Se A tem erro bilateral no máximo $\varepsilon < 1/2$, então, para toda entrada w e todo $k \geq 1$,

$$\mathbb{P}[A_k(w) \text{ responde errado}] \leq \exp\left(-\frac{k(1-2\varepsilon)^2}{2}\right). \quad (4.25)$$

Em particular, para todo $\delta \in (0, 1)$, se

$$k > \frac{2}{(1-2\varepsilon)^2} \ln \frac{1}{\delta}, \quad (4.26)$$

então A_k erra com probabilidade menor que δ .

Demonstração. Fixe w e seja Z_j o indicador de que a j -ésima execução erra. As Z_j são independentes (sorteios novos a cada execução), com

$Z_j \sim \text{Bernoulli}(q)$ e $q := \mathbb{P}[A(w) \text{ erra}] \leq \varepsilon$. Seja $Z = \sum_{j=1}^k Z_j$ o número de execuções erradas, de modo que $\mu := \mathbb{E}Z = qk$.

Se menos da metade das execuções erra, isto é, se $Z < k/2$, então a resposta correta aparece mais de $k/2$ vezes e vence a votação. Portanto

$$[A_k(w) \text{ erra}] \subseteq [Z \geq k/2].$$

Escreva $k/2 = \mu + t$, com

$$t = \frac{k}{2} - qk = k\left(\frac{1}{2} - q\right) \geq k\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right) > 0.$$

Pela desigualdade de Chernoff–Hoeffding (Teorema 4.4), com as variáveis $Z_j \in [0, 1]$,

$$\mathbb{P}[Z \geq \mu + t] \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{k}\right) \leq \exp\left(-2k\left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right)^2\right) = \exp\left(-\frac{k(1 - 2\varepsilon)^2}{2}\right),$$

em que a segunda desigualdade usa $t \geq k(1/2 - \varepsilon)$. Isso prova (4.25).

Se vale (4.26), então o expoente é menor que $-\ln(1/\delta)$, e o erro é menor que δ . $\square$

Duas observações sobre o enunciado. Primeiro, o número de repetições é $k = O(\ln(1/\delta))$ quando ε é uma constante menor que $1/2$: o erro decai *exponencialmente* em k , e o custo cresce só com o *logaritmo* do erro desejado. O tempo total é k vezes o tempo de A . Segundo, a folga $\gamma := 1/2 - \varepsilon$ em relação a $1/2$ é essencial: o número de repetições é proporcional a $1/\gamma^2$, de modo que $\varepsilon = 1/2 - 1/\text{poly}(n)$ ainda pode ser amplificado com um número polinomial de repetições, enquanto com $\varepsilon = 1/2$ (o algoritmo não é melhor que uma moeda) não há como amplificar.

Exemplo 4.4: Erro 1/3

Com $\varepsilon = 1/3$ temos $(1 - 2\varepsilon)^2 = 1/9$, e (4.26) pede $k > 18 \ln(1/\delta)$.

- Para $\delta = 2^{-100}$, $18 \ln(2^{100}) \approx 1247,7$, então $k = 1248$ repetições bastam.
- Para $\delta = n^{-c}$, o número de repetições é $k > 18c \ln n$, isto é, $O(\log n)$. Assim, um algoritmo com erro $1/3$ vira um algoritmo com erro $1/\text{poly}(n)$ ao custo de um fator $O(\log n)$ no tempo. $\diamond$

A cota exata. Quando ε é pequeno, a cota (4.25) desperdiça muito, pois a desigualdade de Hoeffding não distingue erros pequenos de erros próximos de $1/2$. A cota exata do Lema 4.2 (cuja prova é a

mesma do método de Chernoff, sem as simplificações) dá mais. Com $\hat{p} = q$, $n = k$ e $t = 1/2 - q$, temos $\hat{p} + t = \hat{q} - t = 1/2$ e

$$\mathbb{P}[Z \geq k/2] \leq \left(\left(\frac{q}{1/2} \right)^{1/2} \left(\frac{1-q}{1/2} \right)^{1/2} \right)^k = (4q(1-q))^{k/2} \leq (4\varepsilon(1-\varepsilon))^{k/2},$$

pois $q \mapsto 4q(1-q)$ é crescente em $[0, 1/2]$ e $q \leq \varepsilon$ (para $q = 0$ o erro é nulo). Como $4\varepsilon(1-\varepsilon) = 1 - (1-2\varepsilon)^2 \leq \exp(-(1-2\varepsilon)^2)$, essa cota implica (4.25), e dá o número de repetições

$$k > \frac{2 \ln(1/\delta)}{\ln(1/(4\varepsilon(1-\varepsilon)))}.$$

Por exemplo, com $\varepsilon = 1/3$ a base é $8/9$ e $k > 16,98 \ln(1/\delta)$ (em vez de 18); com $\varepsilon = 0,01$, a cota exata pede $k > 0,62 \ln(1/\delta)$, contra $2,08 \ln(1/\delta)$ de (4.26).

Observação 8. • A votação só usa que a resposta correta é única. Para problemas com mais de duas respostas possíveis vale o mesmo argumento: se $Z < k/2$, a resposta correta aparece mais de $k/2$ vezes e é a mais frequente.

- Se o algoritmo devolve um número $\tilde{x}$ com $\mathbb{P}[|\tilde{x} - x| \leq \eta] \geq 1 - \varepsilon$, devolva a mediana das k execuções. Se menos da metade das execuções está fora de $[x - \eta, x + \eta]$, a mediana está dentro, e a análise é a mesma, com o mesmo número de repetições. É o chamado “truque da mediana”.
- Em termos de classes de complexidade, o teorema mostra que a constante $1/3$ na definição de BPP é arbitrária: qualquer constante em $(0, 1/2)$ define a mesma classe, e o erro pode ser reduzido até $2^{-\text{poly}(n)}$.

4.8 Quicksort

Vimos duas estratégias de que o *quicksort* aleatorizado executa $O(n \ln n)$ comparações com alta probabilidade, usando propriedades de distribuições conhecidas e usando desigualdades para desvios da média (Markov e Chebyshev). Nessas últimas provas a probabilidade de falha obtida é fraca: apenas $O(1/n)$ com a desigualdade de Markov, que é a melhor delas. Nesta seção obtemos uma cota de falha muito mais forte — polinomialmente pequena em qualquer grau desejado — usando a desigualdade de Chernoff.

Preliminares. Relembramos a montagem já estabelecida. Um particionamento de S é um sucesso se $\min\{|S_E|, |S_D|\} \geq |S|/10$; a probabilidade de sucesso é $p > 0,76$, qualquer que seja o histórico anterior. um

elemento fixo x_i participa de no máximo $\ell := \lfloor \log_{10/9} n \rfloor$ particionamentos; temos $\log_{10/9} n \approx 9,49 \ln n$, logo $\ell < 10 \ln n$.

A sequência de particionamentos de x_i é completada com particionamentos *fictícios* após o fim de sua participação real, cada um com sucesso de probabilidade exatamente 0,76, independentemente do passado. Isso produz uma sequência infinita em que, a cada posição, a probabilidade condicional de sucesso é sempre pelo menos 0,76.

Como antes, se M_i denota o número de particionamentos reais de que x_i participa, vale $X_i \leq M_i$, pois x_i é comparado com o pivô uma única vez por particionamento real do qual participa sem ser o pivô.

Dominação estocástica. Fixe uma constante $c > 10$, a ser escolhida mais adiante, e defina

$$L := c \ln n$$

(mais precisamente $\lceil c \ln n \rceil$, o que altera apenas constantes aditivas que são irrelevantes na análise). Seja B o número de sucessos entre os L primeiros particionamentos da sequência completada de x_i . Pelo Lema 3.1(a), com $\alpha = 0,76$ e $m = L$ tentativas,

$$B \succeq \text{Binomial}(L, 0,76).$$

Denotando por $F := L - B$ o número de *fracassos* entre esses L particionamentos, para todo t ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[F \geq t] &= \mathbb{P}[B \leq L - t] \leq \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,76) \leq L - t] \\ &= \mathbb{P}[\text{Binomial}(L, 0,24) \geq t]. \end{aligned}$$

Tome $G \sim \text{Binomial}(L, 0,24)$, o número de fracassos de uma binomial com parâmetro de sucesso 0,76 (ou 0,24, trocando os papéis). Note que $\mathbb{E}G = 0,24 L = 0,24 c \ln n$.

O evento “muitos particionamentos”. Suponha $M_i > L$. Então os L primeiros particionamentos da sequência completada de x_i são todos *reais* (pois x_i ainda não saiu do processo), e, pelo Exercício 13, contêm no máximo $\ell < 10 \ln n$ sucessos. Logo, supondo $c > 10$, o número de fracassos é

$$F = L - B \geq L - \ell > c \ln n - 10 \ln n = (c - 10) \ln n.$$

Combinando essa implicação com a dominação estocástica da seção anterior, obtemos a cadeia

$$\mathbb{P}[M_i > L] \leq \mathbb{P}[F \geq (c - 10) \ln n] \leq \mathbb{P}[G \geq (c - 10) \ln n],$$

onde o primeiro “ $\leq$ ” é a implicação determinística recém-obtida e o segundo vem da dominação estocástica de B .

Cota de Chernoff. Usamos a seguinte forma da desigualdade de Chernoff para a cauda superior de uma soma de Bernoulli independentes.

Teorema 4.8: Desigualdade de Chernoff

Se G é soma de variáveis de Bernoulli independentes, $\mu = \mathbb{E}G$ e $\delta > 0$, então

$$\mathbb{P}[G \geq (1 + \delta)\mu] \leq \exp\left(\frac{-\delta^2\mu}{2 + \delta}\right).$$

No nosso caso, $G \sim \text{Binomial}(L, 0,24)$ é soma de L Bernoulli independentes, com $\mu = 0,24c \ln n$. Queremos aplicar o teorema com $(1 + \delta)\mu = (c - 10) \ln n$, isto é,

$$1 + \delta = \frac{c - 10}{0,24c}, \quad \delta = \frac{0,76c - 10}{0,24c}.$$

Para que $\delta > 0$ (hipótese do teorema), precisamos $c > 10/0,76 \approx 13,16$; assumimos isso daqui em diante (condição mais restritiva que $c > 10$, já suposta acima).

Substituindo $\mu = 0,24c \ln n$ e o δ no limitantes exponencial do teorema,

$$\delta^2\mu = \frac{(0,76c - 10)^2}{(0,24c)^2} \cdot 0,24c \ln n = \frac{(0,76c - 10)^2}{0,24c} \ln n,$$

e

$$2 + \delta = \frac{2 \cdot 0,24c + (0,76c - 10)}{0,24c} = \frac{1,24c - 10}{0,24c}.$$

Dividindo,

$$\frac{\delta^2\mu}{2 + \delta} = \frac{(0,76c - 10)^2}{0,24c} \cdot \frac{0,24c}{1,24c - 10} \ln n = \frac{(0,76c - 10)^2}{1,24c - 10} \ln n.$$

Definindo

$$b := \frac{(0,76c - 10)^2}{1,24c - 10}$$

a desigualdade de Chernoff dá

$$\mathbb{P}[G \geq (c - 10) \ln n] \leq n^{-b},$$

e, pela cadeia de implicações da seção anterior,

$$\mathbb{P}[M_i > c \ln n] \leq n^{-b} \quad \text{para cada } i.$$

Observação 9 (Dependência de δ, μ, b em c). Note que $\delta = \delta(c)$ satura: quando $c \rightarrow \infty$, temos $\delta(c) \rightarrow 19/6$. Também, $2 + \delta \rightarrow 31/6$, logo para $b = b(c)$

$$\frac{\delta^2\mu}{(2 + \delta) \ln n} \sim \frac{(19/6)^2}{31/6} \cdot 0,24c = \frac{361}{186} \cdot 0,24c \approx 0,4658c \xrightarrow{c \rightarrow \infty} \infty.$$

Alguns valores, para ilustrar o crescimento:

$$b(20) \approx 1,83, \quad b(30) \approx 6,02, \quad b(50) \approx 15,08, \quad b(100) \approx 38,21.$$

Pela união sobre os n elementos de S ,

$$\mathbb{P}[\exists i : M_i > c \ln n] \leq n \cdot n^{-b} = n^{1-b}.$$

Em particular, $\mathbb{P}[\exists i : M_i > 30 \ln n] \leq n \cdot n^{-b} < n^5$.

Dado qualquer $a > 0$ desejado para o expoente final da probabilidade de falha, basta escolher c de modo que $b(c) \geq a + 1$. Escrevendo $K := a + 1$ e expandindo $b(c) = K$,

$$(0,76c - 10)^2 = K(1,24c - 10) \iff 0,5776c^2 - (15,2 + 1,24K)c + (100 + 10K) = 0,$$

cuja raiz positiva relevante (a maior das duas) é

$$c = \frac{(15,2 + 1,24K) + \sqrt{(15,2 + 1,24K)^2 - 4 \cdot 0,5776(100 + 10K)}}{2 \cdot 0,5776}.$$

Como $b(c) \rightarrow \infty$ quando $c \rightarrow \infty$, essa equação sempre admite solução real para qualquer $K > 0$, isto é, para qualquer $a > 0$ desejado. Por exemplo, $a = 6$ (logo $K = 7$) dá $c \approx 32,2$; conferindo, $b(32,2) \approx 7,00 = K$, como esperado. Com essa escolha,

$$\mathbb{P}[\exists i : M_i > c \ln n] < n^{-a}.$$

Concluindo, fixada a constante c (e, portanto, a) como acima, com probabilidade pelo menos $1 - n^{-a}$ vale $X_i \leq M_i \leq c \ln n$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Como cada comparação com um pivô é contabilizada uma única vez, pelo elemento não-pivô envolvido,

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \leq c \cdot n \cdot \ln n = O(n \ln n).$$

Somando as $O(n)$ comparações realizadas pela ordenação por força bruta nas folhas da recursão, concluímos que o número total de comparações do *quicksort* aleatorizado é

$$T = O(n \ln n) \quad \text{com probabilidade } 1 - O(n^{-a}),$$

onde $a > 0$ é uma constante que pode ser escolhida livremente, ao custo de uma constante multiplicativa maior (via c) escondida no $O(n \ln n)$.

4.9 Exercícios

Exercício 24. Reescreva a prova do Teorema 4.7 usando, no lugar do Teorema 4.4, o item 2 do Teorema 4.5 (cota multiplicativa) com $\mathbb{E}Z \leq \varepsilon k$. Que cota você obtém, e por que ela é pior quando ε está próximo de $1/2$?

Exercício 25. Seja X uma variável aleatória com $\text{Var}(X) = 0$ (em particular, quadrado integrável). Prove que $\mathbb{P}[X = \mathbb{E}X] = 1$. (*Dica:* use a desigualdade de Chebyshev para mostrar que $\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}X| \geq 1/k] = 0$ para todo inteiro $k \geq 1$, e a subaditividade para a união enumerável sobre k .)

Exercício 26. Seja X uma variável aleatória quadrado integrável com $\text{Var}(X) > 0$. Calcule a esperança e a variância da variável aleatória

$$Y := \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\text{Var}(X)}}.$$

(Por que a hipótese $\text{Var}(X) > 0$ é necessária? Veja o exercício anterior.)

Exercício 27. Prove que, se X e Y são variáveis aleatórias simples e $M_X(s) = M_Y(s)$ para todo $s \in \mathbb{R}$, então X e Y têm a mesma distribuição.

(*Dica:* sejam $a_1 < \dots < a_m$ os valores possíveis de X ou de Y e $c_j = \mathbb{P}[X = a_j] - \mathbb{P}[Y = a_j]$. Então $\sum_{j=1}^m c_j e^{a_j s} = 0$ para todo s . Se algum $c_j \neq 0$, tome o maior j com essa propriedade, divida por $e^{a_j s}$ e faça $s \rightarrow \infty$.)

Observação. O resultado vale, mais geralmente, para variáveis cuja FGM é finita em algum intervalo $(-x_0, x_0)$ com $x_0 > 0$ (veja, por exemplo, [Billingsley 1995](#)); essa hipótese não pode ser retirada: se X tem densidade $\frac{1}{2}|x|^{-3}$ em $|x| \geq 1$, então X e $2X$ têm FGM igual a $+\infty$ para todo $s \neq 0$, mas distribuições diferentes.

Exercício 28. Prove que se $X_1, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes com distribuição de Rademacher e $t \in (0, 1)$, então

$$\mathbb{P}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq t\right] \leq \exp\left(-\frac{n}{2}((1+t)\ln(1+t) + (1-t)\ln(1-t))\right). \quad (4.27)$$

(*Dica:* para $s > 0$, aplique a desigualdade de Markov a $e^{s \sum_i X_i}$ e use $\mathbb{E}e^{sX_i} = \cosh s$ para obter $\mathbb{P}[\sum_i X_i \geq nt] \leq (\cosh(s) e^{-st})^n$. Depois minimize $f(s) = \cosh(s) e^{-st}$ em $s > 0$ usando técnicas de Cálculo Diferencial: mostre que o ponto crítico satisfaz $\tanh s = t$ e que então $\cosh s = (1 - t^2)^{-1/2}$.)


Exercício 29. Seja $g(t) = (1+t)\ln(1+t) + (1-t)\ln(1-t)$ para $t \in [0, 1)$. Mostre que $g(t) \geq t^2$ (*dica:* $g(0) = g'(0) = 0$ e $g''(t) = 2/(1-t^2)$) e conclua que o lado direito de (4.27) é no máximo $e^{-nt^2/2}$. Compare com o Teorema 4.3.

4.10 Skip list

Uma *skip list* (Pugh, 1989) é uma estrutura de dados para representar conjuntos dinâmicos que usa aleatoriedade para obter, em tempo esperado, desempenho comparável ao de uma árvore de busca balanceada³, com a vantagem de ser mais simples de implementar e de manter.

Numa *skip list* mantemos um conjunto S de n elementos distintos de um universo U dotado de ordem total. Os elementos de S são mantidos em uma lista ligada ordenada, a *lista do nível 0*, denotada $S_0 = S$. Dada a lista S_i do nível $i \geq 0$, a *lista do nível $i + 1$* , denotada S_{i+1} , é um subconjunto aleatório de S_i no qual cada elemento de S_i é escolhido com probabilidade $1/2$, com as escolhas independentes. A lista S_{i+1} é ordenada e cada elemento seu tem um apontador para a sua cópia imediatamente abaixo, no nível S_i . Seja ℓ o menor índice com $S_\ell = \emptyset$; ℓ é uma variável aleatória, e a estrutura tem os níveis $0, 1, \dots, \ell$, dos quais só o último é vazio.

Além dos elementos de S mantemos dois sentinelas em cada nível, $-\infty$ no começo e $+\infty$ no fim de cada lista (inclusive da vazia S_ℓ), que não pertencem a U . Todas as listas são duplamente ligadas. Um apontador topo aponta para o sentinela $-\infty$ do nível ℓ . A Figura 4.1 descreve um exemplo.



³ Uma árvore binária balanceada é uma árvore com raiz r cujas subárvores esquerda e direita satisfazem algum critério de balanceamento como, por exemplo, a diferença entre as alturas ser de no máximo 1. Um critério bom garante que a altura da árvore é logarítmica no número de elementos, o que faz uma busca ser rápida. Em contrapartida, toda alteração exige o esforço de recompor o balanceamento.

Figura 4.1: exemplo de uma *skip list* com 6 níveis que representa o conjunto $\{11, 23, 39, 41, 55, 63, 67, 68, 99\}$.

A *altura* de $x \in S$, denotada $h(x)$, é o número de sorteios realizados na inserção de x , então $h(x) \sim \text{Geom}(1/2)$, que é também o número de cópias de x : $x \in S_i$ se, e somente se, $i < h(x)$. A *altura da skip* é

$$H := \max_{x \in S} h(x)$$

de modo que $\ell = H$ e $S_H = \emptyset$. No exemplo da Figura 4.1, $h(11) = 1$ e $h(67) = 5 = H$. Como $x \in S_i$ equivale a $h(x) > i$, e as alturas são independentes,

$$|S_i| \sim \text{Binomial}(n, 2^{-i}).$$

As operações de dicionário são descritas a seguir.

busca: dado $x \in U$, a busca devolve um apontador para o maior elemento de S_0 menor ou igual a x (ou para $-\infty$, se não há). Assim, devolve o próprio x se $x \in S$; caso contrário, devolve o antecessor de x , e o próximo elemento de S_0 é o menor elemento maior que x . A busca começa em topo. Em cada nível, enquanto o próximo elemento da lista é menor ou igual a x , a busca avança por ele; quando o próximo é maior que x , ela desce um nível pela cópia abaixo, e termina quando não é possível descer, isto é, no nível 0. O último nó visitado em cada nível i é o maior elemento de S_i menor ou igual a x . A Figura 4.2 destaca um exemplo na estrutura da Figura 4.1;




Figura 4.2: o caminho da busca por 55 na skip list da Figura 4.1.

inserção: dado $x \in U$, a inserção coloca x no lugar apropriado da estrutura caso ele não esteja. Supondo $x \notin S$, uma busca por x determina, para cada nível i , o último nó a_i visitado nele, que é o antecessor de x nesse nível; esses nós são guardados durante a busca. Inserimos x em S_0 logo depois de a_0 . Em seguida jogamos uma moeda: se der cara, inserimos uma cópia de x no nível 1 logo depois de a_1 , ligada à cópia de baixo, e jogamos outra moeda para decidir se há inclusão no nível 2, e assim sucessivamente até sair coroa. Se a replicação chega a um nível que ainda não existe, criamos esses níveis (com sentinelas) e mais um nível vazio no topo, de modo que o último nível continue vazio; assim, ℓ pode aumentar numa inserção;

remoção: dado $x \in S$, uma busca por x passa por todas as cópias de x , da mais alta, no nível $h(x)$, até a do nível 0. Cada cópia é retirada de sua lista usando os apontadores para o elemento anterior e o seguinte, que é o motivo de as listas serem duplamente ligadas. Depois, eliminamos os níveis do topo que ficaram vazios; se x era o único elemento dos r níveis mais altos não vazios, então ℓ diminui de r .

Em cada uma das operações, o custo é proporcional ao comprimento do caminho percorrido pela busca, que tem as ℓ descidas e os passos horizontais. Essas quantidades são variáveis aleatórias, e dependem da estrutura sorteada.

Como $\mathbb{E}|S_i| = n/2^i$ fica abaixo de 1 quando $i > \log_2 n$, esperamos que o número de níveis seja da ordem de $\log_2 n$; e como os níveis mais altos são muito esparsos, esperamos caminhar pouco na horizontal em cada um, de modo que, no total, a quantidade de passos de uma busca seja de ordem logarítmica no tamanho do conjunto.

Observe que sortear as listas nível a nível, ou jogar moedas a cada inserção, produz a mesma distribuição de alturas e que a remoção de um elemento não afeta as alturas dos demais. Por isso, nas análises seguintes supomos que a sequência de operações não depende dos sorteios feitos pela estrutura. Vamos estudar essa estrutura de dados e, para isso, começamos definindo alguns parâmetros importantes.

De $h(x) \sim \text{Geom}(1/2)$, temos $\mathbb{P}[h(x) = t] = 2^{-t}$ para todo inteiro $t \geq 1$. Além disso, $h(x) > t$ equivale a os t primeiros sorteios serem cara, de modo que

$$\mathbb{P}[h(x) = t] = 2^{-t} = \mathbb{P}[h(x) > t] \quad (4.28)$$

para todo inteiro $t \geq 1$ (a segunda, para $t \geq 0$). Para $t \in \mathbb{R}$, como $h(x)$ é inteira, $\mathbb{P}[h(x) > t] = 2^{-\lfloor t \rfloor}$.

Podemos calcular a esperança de H , que é uma variável aleatória inteira positiva, pela Proposição 2.6, e como $\mathbb{P}[H \geq i] = \mathbb{P}[H > i - 1]$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}H &= \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}[H \geq i] = \sum_{i \geq 0} \mathbb{P}[H > i] \\ &= \sum_{i=0}^m \mathbb{P}[H > i] + \sum_{i>m} \mathbb{P}[H > i], \quad m := \lfloor \log_2 n \rfloor. \end{aligned} \quad (4.29)$$

Na primeira soma, limitamos trivialmente $\mathbb{P}[H > i] \leq 1$, e ela é no máximo $m + 1$. Na segunda, para cada i , pela subaditividade e por (4.28),

$$\mathbb{P}[H > i] \leq \mathbb{P}\left[\bigcup_{x \in S} [h(x) > i]\right] \leq \sum_{x \in S} \mathbb{P}[h(x) > i] = n 2^{-i},$$

logo, como $\sum_{i>m} 2^{-i} = 2^{-m}$,

$$\mathbb{E}H \leq m + 1 + n \sum_{i>m} 2^{-i} = m + 1 + n 2^{-m} < m + 3, \quad (4.30)$$

em que a última desigualdade vale porque $m > \log_2 n - 1$ implica $2^m > n/2$, isto é, $n 2^{-m} < 2$. Ou seja, a estrutura tem altura esperada logarítmica no número de elementos de S , como numa árvore balanceada de busca.

Mais que isso, a altura é logarítmica no número de elementos de S com alta probabilidade.

Seja $x_0 := 2 \log_2 n$. Como $h(x)$ é inteira, $\mathbb{P}[h(x) > x_0 + 1] = 2^{-\lfloor x_0 + 1 \rfloor} < 2^{-x_0} = n^{-2}$ (pois $\lfloor x_0 \rfloor + 1 > x_0$) e, pela subaditividade,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left[\bigcup_{x \in S} [h(x) > 2 \log_2 n + 1]\right] &\leq \sum_{x \in S} \mathbb{P}[h(x) > 2 \log_2 n + 1] \\ &< n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}, \quad (4.31) \end{aligned}$$

ou seja, $H \leq 2 \log_2 n + 1$ com alta probabilidade. Note que, nas contas acima, só usamos a distribuição *marginal* de cada $h(x)$, e não a independência das alturas.

Proposição 4.2

Se S é uma *skip list* para um conjunto com n elementos então a altura $H = H(S)$ satisfaz

$$\mathbb{E}H < \log_2 n + 3 \quad \text{e} \quad \mathbb{P}[H > 2 \log_2 n + 1] < \frac{1}{n}.$$

SOBRE O TAMANHO DA ESTRUTURA

Seja $N := \sum_{i=0}^H |S_i|$ o número de cópias de elementos de S na *skip list*. Como $S_H = \emptyset$ e x tem $h(x)$ cópias, $N = \sum_{x \in S} h(x)$. Da linearidade da esperança e de $\mathbb{E}h(x) = 2$,

$$\mathbb{E}N = \sum_{x \in S} \mathbb{E}h(x) = 2n. \quad (4.32)$$

Notemos que, apesar de $N = \sum_{i=0}^H |S_i|$, em geral $\mathbb{E}N$ não é a soma $\sum_i \mathbb{E}|S_i|$ truncada em um limite fixo como $\mathbb{E}H$: o limite superior H da soma é *aleatório*, e depende dos mesmos sorteios que determinam os $|S_i|$ (veja o Exercício 30 no final deste capítulo).

Mais que a esperança, o tamanho é $O(n)$ com probabilidade exponencialmente próxima de 1. De fato, N é soma de n variáveis $\text{Geom}(1/2)$ *independentes* (cada elemento é sorteado com moedas próprias) e $\mathbb{E}N = 2n$. Para $a = 3$, a cota exata (4.23) da seção sobre somas de geométricas dá

$$\mathbb{P}[N \geq 5n] \leq \left(\frac{5}{2} \left(\frac{5}{8}\right)^4\right)^n < (0,382)^n < e^{-0,96n}.$$

Como cada nível tem ainda os dois sentinelas, o espaço total da estrutura é $N + 2(H + 1)$ nós (mais um número constante de apontadores por nó). Pela Proposição 4.2, $H \leq 2 \log_2 n + 1$ com probabilidade pelo menos $1 - 1/n$, de modo que, com probabilidade pelo menos $1 - 1/n - e^{-0,96n}$, uma *skip list* que representa um conjunto com n elementos usa espaço $O(n)$.

4.10.1 O tempo de uma busca

Para determinar o número esperado de passos numa busca sobre uma *skip list* vamos limitar o número de comparações em dois grupos de níveis: os mais altos e os mais baixos. Em cada nível visitado, a busca compara x com o próximo elemento da lista: se ele é menor ou igual a x , a busca *avança* para ele; caso contrário, ela *desce* um nível (ou termina, no nível 0). Assim, o número de comparações em um nível é o número de avanços nele mais uma comparação, a que provoca a descida ou o término.

Seja $\ell := \lfloor \log_2 n \rfloor$ e consideremos primeiro os níveis $\ell, \ell + 1, \dots, H$.

Proposição 4.3: comparações nos níveis altos

O número esperado de comparações feitas, durante uma busca, nos níveis $\ell, \dots, H$ de uma *skip list* com n elementos é menor que 9.

Demonstração. Seja $N' := \sum_{i \geq \ell} |S_i|$ o número de cópias de elementos nesses níveis ($S_i = \emptyset$ para $i \geq H$). Em cada nível a busca visita cada nó no máximo uma vez, e só avança para elementos de S_i , logo o número de avanços nesses níveis é no máximo N' . O número de níveis visitados é no máximo $H - \ell + 1$, e, se $H > \ell$, os níveis $\ell, \dots, H - 1$ são não vazios, então $H - \ell \leq N'$. Portanto, o número de comparações nos níveis $\geq \ell$ é

$$\leq N' + (N' + 1) = 2N' + 1.$$

Como $x \in S_i$ se, e somente se, $i < h(x)$, cada elemento x tem $(h(x) - \ell)^+$ cópias nesses níveis, logo $N' = \sum_{x \in S} (h(x) - \ell)^+$ e, por (4.28),

$$\mathbb{E}(h(x) - \ell)^+ = \sum_{i \geq \ell} \mathbb{P}[h(x) > i] = \sum_{i \geq \ell} 2^{-i} = 2 \cdot 2^{-\ell}.$$

Como $2^\ell > n/2$, vale $n 2^{-\ell} < 2$ e, pela linearidade, $\mathbb{E}N' = 2n 2^{-\ell} < 4$. Logo o número esperado de comparações é menor que $2 \cdot 4 + 1 = 9$. $\square$

O segundo passo é estimar o número de comparações nos ℓ níveis mais baixos, $0, \dots, \ell - 1$, onde se concentram a maior parte dos elementos. A ideia-chave é percorrer o caminho da busca *de trás para frente*.

O caminho da busca termina, no nível 0, no nó y que é o maior elemento de S_0 menor ou igual a x (ou $-\infty$). O *caminho reverso* começa em y e, estando em um nó v do nível i ,

- **sobe**, se v tem cópia no nível $i + 1$, isto é, se $v \in S_{i+1}$;
- **vai para a esquerda**, ao elemento anterior de S_i , caso contrário.

Isso reproduz o caminho da busca: se $v \in S_{i+1}$, então v é o último elemento de S_{i+1} menor ou igual a x , e a busca chegou a v descendo do nível $i + 1$; se $v \notin S_{i+1}$, a busca chegou a v avançando no nível i . Cada passo reverso para cima corresponde a uma descida (precedida de uma comparação que falhou) e cada passo para a esquerda, a um avanço, de modo que o número de comparações nos níveis $0, \dots, \ell - 1$ é no máximo o número de passos do caminho reverso até o nível ℓ , mais 1 (a comparação final do nível 0).

Qual é a probabilidade de um passo reverso ser para cima? Ela é a probabilidade de $v \in S_{i+1}$, dado que $v \in S_i$, que é $1/2$. Além disso, o caminho reverso nunca visita duas vezes o mesmo par (elemento, nível), então cada passo depende de uma moeda que ainda não foi examinada (princípio das decisões adiadas). Logo cada passo é “para cima” com probabilidade $1/2$, independentemente dos anteriores.

Para ir do nível 0 ao nível ℓ são necessárias ℓ subidas. O número de passos de cada trecho “esquerda, $\dots$, esquerda, cima” (passos horizontais mais a subida) é o número de moedas até a primeira cara, ou seja, tem distribuição $\text{Geom}(1/2)$, com valores em $\{1, 2, \dots\}$ e média 2. O caminho reverso pode, porém, alcançar o sentinela $-\infty$ ou o último nível antes de completar as ℓ subidas, e daí em diante só sobe, sem passos horizontais. Imaginando que o processo continua com moedas fictícias (como nos particionamentos fictícios do *quicksort*), o número T de passos reverso até o nível ℓ satisfaz

$$T \leq G_1 + \dots + G_\ell, \quad G_j \sim \text{Geom}(1/2) \text{ independentes,}$$

e, pela linearidade da esperança, $\mathbb{E}T \leq 2\ell$. O custo esperado nos níveis mais baixos é, portanto, no máximo $2\ell + 1$.

Observação 10 (distribuição binomial negativa). A soma de ℓ variáveis $\text{Geom}(1/2)$ é $\ell + L$, em que L é o número de passos horizontais, com distribuição binomial negativa de parâmetros $(\ell, 1/2)$ no sentido de contar fracassos: a variável que conta o número de fracassos até o k -ésimo sucesso em experimentos independentes de Bernoulli com parâmetro p tem lei

$$\binom{t+k-1}{t} (1-p)^t p^k, \quad t = 0, 1, \dots,$$

e esperança $k/p - k$; o caso $k = 1$ é a geométrica contada em fracassos. Com $k = \ell$ e $p = 1/2$, $\mathbb{E}L = \ell$ e $\mathbb{E}\ell + L = 2\ell$. Atenção: na análise do *quicksort* a binomial negativa conta *tentativas* (esperança k/p), o que difere por k da convenção desta observação. $\diamond$

Teorema 4.9: o tempo esperado de uma busca

O número esperado de comparações feitas por uma busca em uma *skip list* que representa um conjunto com n elementos é $O(\log n)$.

Demonstração. As comparações dos níveis $0, \dots, \ell - 1$ têm esperança no máximo $2\ell + 1$, e as dos níveis $\ell, \dots, H$ têm esperança menor que 9 (Proposição acima). Pela linearidade da esperança, o total é menor que $2\lfloor \log_2 n \rfloor + 10 = O(\log n)$. $\square$

De fato, o custo de uma busca é $O(\log n)$ não apenas em esperança, mas também com alta probabilidade. Assim, a *skip list* alcança, em esperança e com alta probabilidade, desempenho comparável ao das árvores balanceadas, com manutenção significativamente mais simples.

Teorema 4.10

Numa *skip list* que representa um conjunto com $n \geq 2$ elementos, com probabilidade pelo menos $1 - 3/n$ valem simultaneamente:

1. o tamanho da estrutura é $N = \sum_{x \in S} h(x) < 5n$, isto é, o espaço é $O(n)$;
2. toda busca percorre no máximo $16 \log_2 n + 16$ passos (descidas mais avanços), e portanto faz $O(\log n)$ comparações.

Teorema 4.11:

Seja $c \geq 1$ uma constante. Numa *skip list* que representa um conjunto com $n \geq 2$ elementos, com probabilidade pelo menos $1 - 2n^{-c} - e^{-0,96n}$ valem simultaneamente:

1. o tamanho da estrutura é $N = \sum_{x \in S} h(x) < 5n$, isto é, o espaço é $O(n)$;
2. toda busca percorre menos de $8(c + 1) \log_2 n + 16$ passos (descidas mais avanços), e portanto faz $O(\log n)$ comparações.

Em particular, a probabilidade de falha é $O(n^{-c})$.

4.11 Exercícios

Exercício 30. Sejam $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/2)$, para $i \geq 1$, variáveis aleatórias independentes e $N = \min\{n \geq 1: X_{n+1} = 1\}$. Prove que $N + 1 \sim \text{Geom}(1/2)$ e que $\mathbb{E}N = 1$. Assuma que se $N = 0$ então $X_1 + \cdots + X_N = 0$ e prove que

$$\mathbb{E} \sum_{i=1}^N X_i \neq \sum_{i=1}^{\mathbb{E}N} \mathbb{E}X_i. \quad (4.33)$$

A

Sobre convergência de séries

A.1 Sequências e séries

- (s.1) Uma série $\sum_{i \geq 1} x_i$ **converge** se existe o limite das somas parciais $S_n := \sum_{i=1}^n x_i$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{A.1})$$

e **converge absolutamente** se $\sum_{i \geq 1} |x_i|$ converge. Uma prova dos seguintes resultados pode ser encontrada em ¹.

- (a) Uma série que converge absolutamente também converge.
- (b) Se $\sum_n x_n$ converge e $\sum_n y_n$ é a série obtida de $\sum_n x_n$ eliminando-se os termos $x_n = 0$, então $\sum_n y_n$ converge para o mesmo valor.
- (c) Se uma série converge absolutamente então qualquer série obtida rearranjando os termos dessa série converge absolutamente para o mesmo valor. Ademais, vale que se $\{A_i : i \in I\}$ é uma partição finita ou enumerável de $\mathbb{N}$ e $y_i = \sum_{j \in A_i} x_j$, então

$$\sum_n x_n = \sum_{i \in I} y_i.$$

- (s.2) Se $\sum_{i \geq 1} x_i$ é tal que $x_i \geq 0$ para todo i , então a série converge ou tende ao infinito. A série converge se, e só se, converge absolutamente.
- (s.3) Teste de convergência por comparação: se $0 \leq x_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande e $\sum_n y_n$ converge então $\sum_n x_n$ converge.
- (s.4) a convergência absoluta de uma série implica que toda subsérie da série é convergente. Isso segue de (s.1b) acima e do teste de convergência por comparação.
- (s.5) Seja I, J conjuntos enumeráveis (finitos ou infinitos) e $(x_{i,j} : i \in I, j \in J)$ uma família duplamente indexada. Para termos não negativos, ou absolutamente somáveis, a soma sobre $I \times J$ não depende da enumeração escolhida para $I \times J$.

(Tonelli) Se $x_{i,j} \geq 0$ para todo (i, j) , então

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{i,j} = \sum_{(i,j) \in I \times J} x_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} x_{i,j} \in [0, +\infty].$$

(Fubini) Se $\sum_{(i,j) \in I \times J} |x_{i,j}| < \infty$, então cada soma interna converge absolutamente, a série dupla $\sum_{(i,j)} x_{i,j}$ converge absolutamente e

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{i,j} = \sum_{(i,j) \in I \times J} x_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} x_{i,j} \in \mathbb{R}.$$

(Produto) Se $a_i, b_j \geq 0$, então $\sum_{(i,j)} a_i b_j = (\sum_i a_i) (\sum_j b_j)$ em $[0, \infty]$ (com $0 \cdot \infty = 0$). Se $\sum_i |a_i| < \infty$ e $\sum_j |b_j| < \infty$, a igualdade vale também sem o sinal, e a família $(a_i b_j)$ é absolutamente somável.

(s.6) se $|x| < 1$ então

(a) $\sum_{n \geq 0} x^n = (1 - x)^{-1};$

(b) $\sum_{n \geq k} x^n = x^k (1 - x)^{-1};$

(c) $\sum_{n \geq 1} n x^n = x(1 - x)^{-2}.$

(s.7) O Teorema Binomial (de Newton) generalizado

$$(1 - x)^{-k} = \sum_{t=0}^{\infty} \binom{t+k-1}{t} x^t.$$

(s.8) $\sum_{n \geq 1} n^{-2} = \pi^2/6.$

A convergência dessa série foi estabelecida pela primeira vez por Euler e é um dos resultados responsáveis por lançar à notoriedade, na época, o matemático.

(s.9) A sequência $(1 + 1/n)^n$ é estritamente crescente e a sequência $(1 - 1/n)^{-n}$ é estritamente decrescente, ambas convergem para a constante $e = 2,71 \dots$ quando $n \rightarrow \infty$. Além disso, para todo x real

$$e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}.$$

B

Desigualdades

(d.1) De (s.9), para todo $n \geq 0$ vale

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} \geq e \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

e para qualquer $x > 0$

$$1 - x + \frac{x^2}{2} > e^{-x} > (1 - x).$$

(d.2) O coeficiente binomial tem os seguintes limitantes triviais

$$0 \leq \binom{n}{i} \leq 2^n.$$

Para um limitante inferior melhor podemos escrever

$$\binom{n}{i} = \prod_{j=0}^{i-1} \frac{n-j}{j-i} \geq \left(\frac{n}{i}\right)^i$$

e para um limitante superior usamos o teorema binômial de Newton e (s.9)

$$e^{nx} \geq (1+x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i \geq \binom{n}{i} x^i$$

para todo $x > 0$ e todo $i \in \{0, 1, \dots, n\}$. Logo

$$\binom{n}{i} \leq e^{nx} x^{-i}.$$

Em particular, fazendo $x = i/n$, temos a segunda desigualdade de

$$\left(\frac{n}{i}\right)^i \leq \binom{n}{i} \leq \left(e \frac{n}{i}\right)^i.$$

(d.3) A seguinte igualdade assintótica conhecida como fórmula de Stirling

$$n! = \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n = (1 + o(1)) \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (\text{B.1})$$

A seguinte tabela que exhibe exemplos para números pequenos nos dá ideia da qualidade dessa aproximação

n	$n!$	Stirling
1	1	0.922137
3	6	5.83621
7	5040	4980.396
10	3628800	3598696
20	$2.432902e + 18$	$2.422787e + 18$
50	$3.041409e + 64$	$3.036345e + 64$
75	$2.480914e + 109$	$2.478159e + 109$
100	$9.332622e + 157$	$9.324848e + 157$
142	$2.695364e + 245$	$2.693783e + 245$

também valem os limitantes

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Nos limitantes em (d.2) para $\binom{n}{i}$ usamos que

$$\prod_{j=0}^{i-1} (n-j) > (n-i)^i = \left(1 - \frac{i}{n}\right)^i n^i \geq \left(1 - \frac{i^2}{n}\right) n^i = (1 + o(1)) n^i$$

e se $i = o(\sqrt{n})$

$$\binom{n}{i} = (1 + o(1)) \frac{n^i}{i!} = (1 + o(1)) \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \left(\frac{en}{i}\right)^i.$$

(d.4) Para quaisquer números reais $x_1, x_2, \dots$, para todo natural n

$$|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|.$$

Ademais, $|x_1| + \dots + |x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots$, portanto, $|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots$ e pela continuidade da função valor absoluto $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_1 + \dots + x_n| = |x_1 + x_2 + \dots|$ portanto

$$|x_1 + x_2 + \dots| \leq |x_1| + |x_2| + \dots$$

sempre que $\sum_n x_n$ converge.

C

Resolução dos exercícios

1. Sejam os eventos:

- U_1 : urna escolhida é a das duas bolas brancas;
- U_2 : urna escolhida é a das duas bolas pretas;
- U_3 : urna escolhida é a mista (uma branca, uma preta);
- Br : a bola retirada é branca.

Queremos a probabilidade de a bola que ficou na urna ser preta, o que só pode acontecer se a urna escolhida foi a urna U_3 (mista). Ou seja, queremos $\mathbb{P}(U_3 \mid Br)$.

Cada urna é escolhida com probabilidade $1/3$: $\mathbb{P}(U_1) = \mathbb{P}(U_2) = \mathbb{P}(U_3) = \frac{1}{3}$.

A probabilidade de sair bola branca dado cada urna:

$$\mathbb{P}(Br \mid U_1) = 1, \quad \mathbb{P}(Br \mid U_2) = 0, \quad \mathbb{P}(Br \mid U_3) = \frac{1}{2}.$$

Probabilidade total de sair branca

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Br) &= \mathbb{P}(Br \mid U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(Br \mid U_2)\mathbb{P}(U_2) + \mathbb{P}(Br \mid U_3)\mathbb{P}(U_3) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Agora,

$$\mathbb{P}(U_3 \mid Br) = \frac{\mathbb{P}(Br \mid U_3)\mathbb{P}(U_3)}{\mathbb{P}(Br)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

Portanto $\mathbb{P}[\text{bola restante é preta} \mid \text{bola retirada é branca}] = \frac{1}{3}$.

2.

3. Seja k o número de bits de M , ou seja, $2^{k-1} \leq M < 2^k$. No algoritmo, $N = \sum_i d_i 2^i$ é obtido a partir de $k+t$ bits uniformes e independentes, logo N é uniforme sobre $\{0, 1, \dots, K-1\}$, onde $K = 2^{k+t}$. A saída do algoritmo é $N \bmod M$.

Na divisão euclidiana de K por M

$$K = qM + r, \quad 0 \leq r < M, \quad q = \left\lfloor \frac{K}{M} \right\rfloor$$

e para cada resto $n \in \{0, \dots, M-1\}$, os inteiros em $\{0, \dots, K-1\}$ congruentes a n módulo M são

$$n, n+M, n+2M, \dots$$

e há exatamente $q+1$ deles se $n < r$, e exatamente q deles se $n \geq r$ (isso decorre diretamente de $K = qM + r$).

Como N é uniforme em $\{0, \dots, K-1\}$,

$$\mathbb{P}[N = n] = \begin{cases} \frac{q+1}{K}, & 0 \leq n < r, \\ \frac{q}{K}, & r \leq n \leq M-1. \end{cases}$$

Agora, calculando os desvios em relação a $1/M$.

De $K = qM + r$ obtemos $q = \frac{K-r}{M}$, logo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{M} - \frac{q}{K} &= \frac{1}{M} - \frac{K-r}{MK} = \frac{r}{MK}, \\ \frac{q+1}{K} - \frac{1}{M} &= \frac{K-r+M}{MK} - \frac{1}{M} = \frac{M-r}{MK}. \end{aligned}$$

Ambas as quantidades são não negativas (pois $0 \leq r < M$), então

$$\left| \mathbb{P}[N = n] - \frac{1}{M} \right| = \begin{cases} \frac{M-r}{MK}, & 0 \leq n < r, \\ \frac{r}{MK}, & r \leq n \leq M-1. \end{cases}$$

Há r valores de n no primeiro caso e $M-r$ valores no segundo, logo

$$\sum_{n=0}^{M-1} \left| \mathbb{P}[N = n] - \frac{1}{M} \right| = r \cdot \frac{M-r}{MK} + (M-r) \cdot \frac{r}{MK} = \frac{2r(M-r)}{MK}.$$

A função $r \mapsto r(M-r)$ é uma parábola côncava em r , com máximo em $r = M/2$, onde vale $M^2/4$. Assim, para todo $r \in [0, M]$ (em particular para o inteiro r em questão),

$$r(M-r) \leq \frac{M^2}{4}.$$

Substituindo, usando que $M < 2^k$ e $K = 2^{k+t}$

$$\sum_{n=0}^{M-1} \left| \mathbb{P}[N = n] - \frac{1}{M} \right| \leq \frac{2}{MK} \cdot \frac{M^2}{4} = \frac{M}{2K} < \frac{1}{2^{t+1}}.$$

4. seja p_n a probabilidade de o laço repeat-until executar pelo me-

```

1  $j \leftarrow 0$ ;
2 repita
nos  $n$  vezes, para  $n \geq 1$ . 3  $j \leftarrow j + 1$ ;
4 para cada  $i \in \{1, 2, \dots, j\}$  faça  $d_i \xleftarrow{\mathbb{R}} \{0, 1\}$ ;
5 até que  $d_i = 1$  para todo  $i$ .
```

Na j -ésima execução do corpo do laço, sorteiam-se j bits $d_1, \dots, d_j$ uniformes e independentes em $\{0, 1\}$, e o laço termina se, e somente se, todos eles forem iguais a 1. Como esses bits são *redefinidos do zero* a cada execução, o evento

$$E_j := [\text{"todos os } j \text{ bits sorteados na iteração } j \text{ são iguais a 1"}]$$

tem probabilidade

$$\mathbb{P}[E_j] = 2^{-j},$$

e os eventos $E_1, E_2, E_3, \dots$ são mutuamente independentes, pois dizem respeito a sorteios distintos e independentes entre si.

O laço executa pelo menos n vezes se, e somente se, ele não é interrompido em nenhuma das iterações $j = 1, \dots, n-1$, ou seja, se nenhum dos eventos $E_1, \dots, E_{n-1}$ ocorre. Pela independência,

$$p_n = \mathbb{P}[\overline{E_1} \cap \dots \cap \overline{E_{n-1}}] = \prod_{j=1}^{n-1} (1 - 2^{-j}),$$

com a convenção usual de que o produto vazio (caso $n = 1$) vale 1.

Para cada $j \geq 1$ temos $2^{-j} \in (0, 1)$, logo cada fator $1 - 2^{-j}$ pertence a $(0, 1)$. Como p_n é um produto *finito* de números estritamente positivos, segue que $p_n > 0$.

Como

$$p_{n+1} = p_n \cdot (1 - 2^{-n}) \quad \text{e} \quad 0 < 1 - 2^{-n} < 1,$$

temos $p_{n+1} \leq p_n$ para todo n . Sendo decrescente e limitada inferiormente por 0, a sequência (p_n) converge para algum limite $L \geq 0$. Resta mostrar que $L > 0$.

Como $2^{-j} \leq \frac{1}{2}$ para todo $j \geq 1$, podemos aplicar a desigualdade $1 - x \geq e^{-2x}$, válida para $x \in [0, 1/2]$, com $x = 2^{-j}$:

$$1 - 2^{-j} \geq \exp(-2 \cdot 2^{-j}) = \exp(-2^{1-j}).$$

Multiplicando essas desigualdades para $j = 1, \dots, n-1$ (todos os fatores são positivos, logo a desigualdade é preservada pelo produto):

$$p_n = \prod_{j=1}^{n-1} (1 - 2^{-j}) \geq \prod_{j=1}^{n-1} \exp(-2^{1-j}) = \exp\left(-\sum_{j=1}^{n-1} 2^{1-j}\right) = \exp\left(-2 \sum_{j=1}^{n-1} 2^{-j}\right).$$

A soma geométrica satisfaz

$$\sum_{j=1}^{n-1} 2^{-j} = 1 - 2^{-(n-1)} < 1 \quad \text{para todo } n \geq 1,$$

donde

$$p_n \geq \exp\left(-2\left(1 - 2^{-(n-1)}\right)\right) > \exp(-2),$$

para todo $n \geq 1$. Ou seja, obtemos uma cota inferior *uniforme*, independente de n :

$$p_n > e^{-2} \quad \text{para todo } n.$$

Como $(p_n)_{n \geq 1}$ é decrescente, converge para $L = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n$, e como $p_n > e^{-2}$ para todo n , segue que

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n \geq e^{-2} > 0.$$

Portanto $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n > 0$.

5.

6. De f convexa em I , deduzimos que para todo $a \in I$ existe um real m_a tal que

$$\frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq m_a \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$$

para todo $x < a$ e todo $y > a$. Portanto, $f(x) \geq f(a) + m_a(x - a)$ para todo $x \in I$ e, tomando $a = \mathbb{E}X$, $x = X$ e a esperança nos dois lados dessa desigualdades

$$\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}X) + m_a \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))$$

donde segue a desigualdade que queremos demonstrar.

7.

8.

9. Construiremos um algoritmo Las Vegas B a partir do algoritmo Monte Carlo A da seguinte maneira.

Dada uma instância I de tamanho n , o algoritmo B repete independentemente os seguintes passos:

- (a) Execute A sobre I e obtenha uma solução s .
- (b) Verifique a corretude de s em tempo $t(n)$.
- (c) Se s for correta, retorne s ; caso contrário, repita.

Como a solução só é retornada depois de ser verificada, o algoritmo B sempre fornece uma resposta correta. Resta analisar seu tempo esperado de execução.

Cada tentativa consiste em executar A e verificar a solução obtida. Como o tempo esperado de execução de A é no máximo $T(n)$, o tempo esperado de uma tentativa é no máximo $T(n) + t(n)$.

Além disso, pela hipótese, cada execução de A produz uma solução correta com probabilidade $\gamma(n)$. Como as execuções são independentes, o número N de tentativas até obter a primeira solução correta tem distribuição geométrica com parâmetro $\gamma(n)$.

Assim, $\mathbb{E}N = \frac{1}{\gamma(n)}$.

Seja X_k o tempo gasto na k -ésima tentativa. O tempo total de B é $X_1 + \dots + X_N$.

Como cada tentativa tem tempo esperado no máximo $T(n) + t(n)$, obtemos

$$\mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^N X_k \right) \leq \mathbb{E}(N)(T(n) + t(n)).$$

Portanto,

$$\mathbb{E}[\text{tempo}(B)] \leq \frac{T(n) + t(n)}{\gamma(n)}.$$

Logo, B é um algoritmo Las Vegas: ele sempre retorna uma solução correta e seu tempo esperado de execução é, no máximo,

$$\frac{T(n) + t(n)}{\gamma(n)}.$$

10. Por definição

$$\mathbb{E} \sum_{i \geq 1} X_i = \sum_{\omega \in \Omega} \left(\sum_{i \geq 1} X_i(\omega) \right) \mathbb{P}(\omega),$$

desde que essa soma (dupla) esteja bem definida, o que precisamos justificar antes de trocar a ordem de somação.

Por hipótese, $\sum_{i \geq 1} \mathbb{E}|X_i| = \sum_{i \geq 1} \sum_{\omega} |X_i(\omega)| \mathbb{P}(\omega)$ converge. Como os termos $|X_i(\omega)| \mathbb{P}(\omega)$ são todos não negativos, essa soma dupla converge *absolutamente*, independentemente da ordem em que é somada (é uma soma de termos não negativos indexada por $\mathbb{N} \times \Omega$, um conjunto enumerável). Em particular, para $\mathbb{P}$ -quase todo ω a série $\sum_i X_i(\omega)$ converge absolutamente, então $\sum_i X_i(\omega)$ está bem definida.

Pelo teorema de Tonelli–Fubini para séries (s.5) (o mesmo resultado já usado na demonstração do Teorema 3.3) a convergência absoluta de $\sum_{i,\omega} X_i(\omega)\mathbb{P}(\omega)$ garante que podemos trocar a ordem das somas:

$$\sum_{\omega \in \Omega} \sum_{i \geq 1} X_i(\omega)\mathbb{P}(\omega) = \sum_{i \geq 1} \sum_{\omega \in \Omega} X_i(\omega)\mathbb{P}(\omega).$$

O lado esquerdo é, por definição, $\mathbb{E}\sum_{i \geq 1} X_i$, e cada termo do lado direito é $\mathbb{E}X_i$. Logo

$$\mathbb{E}\sum_{i \geq 1} X_i = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}X_i.$$

11. Com essa definição,

$$\mathbb{E}X_n = \sum_{j \geq 1} X_n(j)\mathbb{P}(j) = 2^n 2^{-n} + (-2^{n+1}) 2^{-(n+1)} = 0,$$

portanto, $\sum_{n \geq 1} \mathbb{E}X_n = 0$. No entanto, para a variável aleatória $X = \sum_{n \geq 1} X_n$ temos $X(1) = 2$ e para todo $j \geq 2$

$$X(j) = \sum_{n \geq 1} X_n(j) = 0 + \cdots + 0 + (-2)^j + 2^j + 0 + 0 + \cdots = 0$$

portanto, $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} X(n)\mathbb{P}(n) = 2\frac{1}{2} + 0 + 0 + \cdots = 1$. Logo $\mathbb{E}\sum_n X_n \neq \sum_n \mathbb{E}X_n$.

12. Em $2k$ lançamentos independentes de uma moeda com $\mathbb{P}(\text{cara}) = \frac{1}{5}$ e $\mathbb{P}(\text{coroa}) = \frac{4}{5}$, a probabilidade de sair menos que k coroas é

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \left(\frac{4}{5}\right)^i \left(\frac{1}{5}\right)^{2k-i}.$$

Primeiro, escrevemos cada termo como

$$\left(\frac{4}{5}\right)^i \left(\frac{1}{5}\right)^{2k-i} = \frac{4^i}{5^{2k}}.$$

Assim,

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \left(\frac{4}{5}\right)^i \left(\frac{1}{5}\right)^{2k-i} = \frac{1}{5^{2k}} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} 4^i.$$

Como para $i \leq k-1$ temos $4^i \leq 4^k$, obtemos a cota simples:

$$\frac{1}{5^{2k}} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} 4^i \leq \frac{1}{5^{2k}} \cdot 4^k \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i}.$$

Isto é exatamente a primeira desigualdade pedida:

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \left(\frac{4}{5}\right)^i \left(\frac{1}{5}\right)^{2k-i} < \left(\frac{1}{5}\right)^{2k} \cdot 4^k \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i}.$$

Agora, majoramos o somatório de binomiais. Sabemos que

$$\sum_{i=0}^{2k} \binom{2k}{i} = 2^{2k}$$

e que os coeficientes binomiais são simétricos em torno de $i = k$.

Logo,

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \leq \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2k} \binom{2k}{i} = \frac{1}{2} \cdot 2^{2k} = 2^{2k-1}.$$

(essa desigualdade é imediata porque a soma dos termos até $k - 1$ não pode ultrapassar metade da soma total — a igualdade só ocorreria se $\binom{2k}{k} = 0$, o que não acontece.) Combinando as duas cotas:

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \left(\frac{4}{5}\right)^i \left(\frac{1}{5}\right)^{2k-i} \leq \frac{1}{5^{2k}} \cdot 4^k \cdot 2^{2k-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^{2k}.$$

Portanto, a probabilidade pedida é menor que

$$\frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^{2k},$$

e, em particular, é menor que $\left(\frac{4}{5}\right)^{2k}$, como queríamos demonstrar.

13. Fixado $x \in S$, considere a sequência de subsequências $S'_0 = S, S'_1, \dots, S'_M$ às quais x pertence ao longo da execução, onde $M = M(x)$ é o número total de particionamentos pelos quais x passa.

Em cada particionamento, o pivô z é removido da subsequência (ele não é reinserido em S_1 nem em S_2), logo

$$|S'_{i+1}| \leq |S'_i| - 1 < |S'_i| \quad \text{para todo } i.$$

Em particular, a sequência $|S'_0|, |S'_1|, \dots, |S'_M|$ é estritamente decrescente.

Por definição, o i -ésimo particionamento (o particionamento de S'_i) é bom se o pivô não está entre os 10% menores nem entre os 10% maiores elementos de S'_i . Nesse caso, tanto S_1 quanto S_2 (e portanto a subsequência S'_{i+1} que contém x , seja ela qual for) têm tamanho no máximo $9|S'_i|/10$:

$$|S'_{i+1}| \leq \frac{9}{10} |S'_i|.$$

Suponha que, entre os M particionamentos que x sofre, exatamente k sejam bons, ocorrendo nos passos $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (em ordem cronológica). Pelo Fato 1, o tamanho da subsequência só

pode diminuir nos passos entre dois particionamentos bons consecutivos; logo o tamanho imediatamente antes do $(j + 1)$ -ésimo particionamento bom é no máximo o tamanho imediatamente depois do j -ésimo particionamento bom. Combinando isso com o Fato 2, obtemos, para $j = 1, \dots, k - 1$,

$$|S'_{i_{j+1}}| \leq |S'_{i_j+1}| \leq \frac{9}{10} |S'_{i_j}|,$$

e também $|S'_{i_1}| \leq |S'_0| = n$. Por indução em j ,

$$|S'_{i_j}| \leq n \left(\frac{9}{10} \right)^{j-1}, \quad j = 1, \dots, k,$$

ao k -ésimo particionamento bom,

$$|S'_{i_{k+1}}| \leq \frac{9}{10} |S'_{i_k}| \leq n \left(\frac{9}{10} \right)^k.$$

Como x pertence à subsequência $S'_{i_{k+1}}$, e toda subsequência não vazia tem tamanho pelo menos 1, segue que

$$1 \leq |S'_{i_{k+1}}| \leq n \left(\frac{9}{10} \right)^k \implies \left(\frac{10}{9} \right)^k \leq n \implies k \leq \log_{10/9} n.$$

Como k é um número inteiro, concluímos que

$$k \leq \lfloor \log_{10/9} n \rfloor,$$

ou seja, x participa de no máximo $\lfloor \log_{10/9} n \rfloor$ particionamentos bem-sucedidos (bons). ■

14.

15.

16.

17. (a) Fixe i e um histórico $(x_1, \dots, x_{i-1}) \in \{0, 1\}^{i-1}$ de probabilidade positiva. Pela descrição do algoritmo, a probabilidade condicional de sucesso no i -ésimo particionamento depende apenas de se o particionamento anterior (o $(i - 1)$ -ésimo, i.e., x_{i-1}) foi sucesso ou fracasso, e vale

$$\mathbb{P}[X_i = 1 \mid X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}] = \begin{cases} 0,7, & \text{se } x_{i-1} = 1 \text{ (sucesso anterior)}, \\ 0,9, & \text{se } x_{i-1} = 0 \text{ (fracasso anterior)}, \end{cases}$$

(com a convenção usual para $i = 1$, em que não há particionamento anterior). Em qualquer um dos dois casos,

$$\mathbb{P}[X_i = 1 \mid X_1 = x_1, \dots, X_{i-1} = x_{i-1}] \geq 0,7 = \alpha,$$

pois $0,7 \geq 0,7$ e $0,9 \geq 0,7$. Como isso vale para todo i e todo histórico de probabilidade positiva, a hipótese do Lema 3.1 é satisfeita com $\alpha = 0,7$ — mesmo a sequência (X_i) não sendo i.i.d., já que a distribuição de X_i depende de X_{i-1} .

(b) Seja T o número de particionamentos necessários até x acumular $r = L + 1 = 29$ sucessos. Pelo item (b) do Lema 3.1 (com $\alpha = 0,7$), T é dominado estocasticamente por uma $\text{BN}(29, 0,7)$, e portanto

$$\mathbb{E}(T) \leq \frac{r}{\alpha} = \frac{29}{0,7} = \frac{290}{7} \approx 41,43.$$

Logo, o número esperado de particionamentos necessários para acumular 29 sucessos é no máximo $290/7$.

(c) Seria errado aplicar diretamente a fórmula $\mathbb{E}(T) = r/\alpha$ da binomial negativa $\text{BN}(29, 0,7)$ como valor exato, porque os sucessos aqui não formam um processo i.i.d. Bernoulli(0,7): a probabilidade de sucesso é 0,9 (estritamente maior que 0,7) sempre que o particionamento anterior foi um fracasso, de modo que T apenas é dominado por (e não tem a mesma distribuição que) uma $\text{BN}(29, 0,7)$, fazendo de $290/7$ apenas um limitante superior, e não o valor exato de $\mathbb{E}(T)$.

18. (c) O limitante de Markov do item (b) afirma que

$$\mathbb{P}[T \geq 200 n \lceil \log_{10/9} n \rceil] \leq \frac{1}{100} = O(1),$$

ou seja, é uma probabilidade de erro **constante** (não decresce com n): por maior que n seja, o limitante garante apenas que o algoritmo realiza $O(n \log n)$ comparações com probabilidade pelo menos 99%.

Já o Teorema 3.2 garante que $T = O(n \ln n)$ com probabilidade

$$1 - O(n^{-29}),$$

uma probabilidade de erro que *tende a zero* (polinomialmente, e rapidamente) quando $n \rightarrow \infty$.

Para n grande, o segundo resultado é muito mais forte: ele diz que a chance de o algoritmo ser lento fica desprezível à medida que n cresce, enquanto o limitante de Markov mantém sempre a mesma chance de 1% de falha, não importa quão grande seja n .

A desigualdade de Markov, aplicada *sozinha e diretamente a T* como no item (a)–(b), **não** é suficiente para provar o teorema mais forte: ela usa apenas $\mathbb{E}(T)$, e por si só dá um limitante da forma $\mathbb{P}[T \geq c \cdot \mathbb{E}(T)] \leq 1/c$, que é sempre $\Omega(1)$ em c fixo — para obter

uma probabilidade de exceção que decai como n^{-29} seria preciso tomar c crescendo com n (por exemplo $c = n^{29} \cdot (\text{constante})$), o que tornaria o limitante correspondente, $c \cdot 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil = \Theta(n^{30} \log n)$, muito maior que $O(n \ln n)$ e portanto inútil para concluir que T é $O(n \ln n)$. Ou seja, Markov sozinha, aplicada a T como um todo, não tem "resolução" suficiente para dar simultaneamente um limitante *linear-log* em T e uma probabilidade de exceção polinomialmente pequena; é preciso a análise mais refinada do Teorema 3.2.

(d) A diferença fundamental está em *sobre o que* se aplica a concentração.

No item (a)–(b), a desigualdade de Markov é aplicada a uma *única* variável aleatória, $T = \sum_i X_i$, a soma de todas as comparações do algoritmo. Isso "achata" toda a informação da execução em um único número (sua esperança $\mathbb{E}(T)$), descartando qualquer estrutura sobre como as comparações se distribuem entre os n elementos. Com apenas essa esperança global, o único controle que se tem sobre o desvio de T é grosseiro: $\mathbb{P}[T \geq c \mathbb{E}(T)] \leq 1/c$, que decai apenas de forma *linear* (recíproca) em c , e não pode, sozinho, produzir uma cauda que decaia polinomialmente rápido em n sem sacrificar o expoente do limitante em $n \log n$.

Já a abordagem do Teorema 3.2 decompõe T em n variáveis $X_1, \dots, X_n$, uma para cada elemento x_i , onde X_i conta os particionamentos (comparações) envolvendo x_i . Para *cada* X_i individualmente aplica-se um limitante de cauda muito mais forte (do tipo exponencial/Chernoff, via a dominação estocástica do lema anterior), obtendo $\mathbb{P}[X_i > L]$ decaindo rapidamente (polinomialmente pequeno, e ajustável para ser $O(n^{-30})$, digamos). Só depois, usa-se a união de eventos sobre os n elementos:

$$\mathbb{P}[\exists i : X_i > L] \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[X_i > L] \leq n \cdot O(n^{-30}) = O(n^{-29}).$$

Em outras palavras: a primeira abordagem usa apenas 1 "grau de liberdade" (a variável agregada T) e por isso só pode extrair da esperança um controle fraco sobre a cauda. A segunda usa n variáveis aleatórias distintas, cada uma analisada com uma cauda forte e individual, e paga o preço de somar n termos na união de eventos — mas como cada termo individual já decai muito mais rápido que $1/n$, a soma ainda é pequena. É exatamente esse "dividir para depois unir", em vez de tratar T como um bloco só, que permite trocar uma probabilidade de erro constante por uma que decai polinomialmente em n .

19. ($\Rightarrow$) Se $X \succeq Y$, a definição vale para todo $t \in \mathbb{R}$, em particular para $t = j$ com $j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, donde $\mathbb{P}[X > j] \geq \mathbb{P}[Y > j] = 2^{-j}$.

($\Leftarrow$) Suponha $\mathbb{P}[X > j] \geq 2^{-j}$ para todo inteiro $j \geq 0$. Precisamos mostrar $\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$ para todo $t \in \mathbb{R}$, não apenas para t inteiro.

Como X e Y assumem valores em $\{1, 2, \dots\}$, ambas as funções de sobrevivência $t \mapsto \mathbb{P}[X > t]$ e $t \mapsto \mathbb{P}[Y > t]$ são constantes em cada intervalo $[j, j+1)$, $j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: de fato, para $t \in [j, j+1)$, como X só assume valores inteiros, $[X > t] = [X \geq j+1] = [X > j]$, e o mesmo vale para Y . Logo

$$\mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[X > j] \quad \text{e} \quad \mathbb{P}[Y > t] = \mathbb{P}[Y > j] = 2^{-j} \quad \text{para todo } t \in [j, j+1).$$

Pela hipótese, $\mathbb{P}[X > j] \geq 2^{-j}$, logo $\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$ para todo $t \in [j, j+1)$, $j \geq 0$.

Para $t < 1$ (incluindo $t < 0$), como $X, Y \geq 1$ sempre, $\mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[Y > t] = 1$ trivialmente.

Como todo $t \in \mathbb{R}$ está em algum desses casos, $\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t]$ para todo $t \in \mathbb{R}$, ou seja, $X \succeq Y$.

20. (Igualdade em distribuição)

Suponha agora $X \succeq Y$ e $Y \succeq X$. Para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}[X > t] \geq \mathbb{P}[Y > t] \quad \text{e} \quad \mathbb{P}[Y > t] \geq \mathbb{P}[X > t].$$

Combinando as duas desigualdades e as as funções de distribuição acumulada, obtemos, para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$1 - F_X(t) = 1 - F_X(t) \mathbb{P}[X > t] = \mathbb{P}[Y > t] = 1 - F_Y(t)$$

equivalente a

$$F_X(t) = F_Y(t) \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Como duas variáveis aleatórias reais têm a mesma distribuição se, e somente se, possuem a mesma função de distribuição acumulada, concluímos que $X \stackrel{d}{=} Y$.

Isso mostra que $\succeq$ é uma *pré-ordem* (reflexiva e transitiva) no espaço de todas as variáveis aleatórias reais.

21. (a) Pela desigualdade de Chebyshev, para qualquer variável aleatória W com média $\mu = \mathbb{E}(W)$ e qualquer $t > 0$,

$$\mathbb{P}[|W - \mu| \geq t] \leq \frac{\text{Var}(W)}{t^2}.$$

Aplicando isso a $W = W_i$, com $t = \mu - \ell$, temos que o evento $\{W_i \leq \ell\}$ está contido no evento $\{|W_i - \mu| \geq \mu - \ell\} = \{|W_i - \mu| \geq$

$t\}$ (pois $W_i \leq \ell$ implica $\mu - W_i \geq \mu - \ell = t$, logo $|W_i - \mu| \geq t$). Assim,

$$\mathbb{P}[W_i \leq \ell] \leq \mathbb{P}[|W_i - \mu| \geq t] \leq \frac{\text{Var}(W_i)}{t^2}.$$

Como $\text{Var}(W_i) \leq L\alpha(1 - \alpha) = O(\ell)$ e $t = \mu - \ell = O(\ell)$ (de modo que $t^2 = O(\ell^2)$), obtemos

$$\mathbb{P}[W_i \leq \ell] \leq \frac{O(\ell)}{\Theta(\ell^2)} = O\left(\frac{1}{\ell}\right) = O\left(\frac{1}{\log n}\right),$$

já que $\ell = \Theta(\log n)$.

(b) Pela união de eventos sobre os n elementos $x_1, \dots, x_n$,

$$\mathbb{P}[\exists i : W_i \leq \ell] \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[W_i \leq \ell] \leq n \cdot O\left(\frac{1}{\log n}\right) = O\left(\frac{n}{\log n}\right).$$

Como $n / \log n \rightarrow \infty$ quando $n \rightarrow \infty$, essa cota tende a ∞ , não a 0 — ou seja, o limitante superior obtido para a probabilidade de falha (algum elemento ter poucos sucessos) é maior que 1 para n suficientemente grande, o que é trivialmente verdadeiro e não diz absolutamente nada de útil sobre a probabilidade real do evento. O argumento "por elemento + união" exige que cada termo individual $\mathbb{P}[W_i \leq \ell]$ decaia mais rápido que $1/n$ (idealmente, polinomialmente em n) para que a soma dos n termos ainda tenda a 0; um decaimento de apenas $O(1/\log n)$ é rápido demais devagar para isso, e a cota de Chebyshev é, portanto, inútil aqui.

(c) Temos $t = \mu - \ell = \Theta(\ell)$, enquanto o desvio-padrão é

$$\sqrt{\text{Var}(W_i)} = \sqrt{O(\ell)} = \Theta(\sqrt{\ell}).$$

Assim, o desvio t que estamos exigindo é apenas uma constante vezes o desvio-padrão elevado ao quadrado dividido por ele mesmo, ou mais precisamente: o número de desvios-padrão que t representa é

$$\frac{t}{\sqrt{\text{Var}(W_i)}} = \frac{\Theta(\ell)}{\Theta(\sqrt{\ell})} = \Theta(\sqrt{\ell}) = \Theta(\sqrt{\log n}),$$

que cresce apenas como $\sqrt{\log n}$ — um crescimento muito lento em n . A desigualdade de Chebyshev converte " k desvios-padrão de distância" em uma probabilidade de cauda de ordem $1/k^2$; aqui isso dá $1/k^2 = O(1/\log n)$. Para que a união sobre n elementos funcione, precisaríamos de uma cauda de ordem $1/n^{1+\varepsilon}$ (ou melhor), o que exigiria $k^2 = \Omega(n^{1+\varepsilon})$, ou seja, t da ordem de $\sqrt{n} \cdot \sqrt{\text{Var}(W_i)}$ — muitíssimo maior que o $t = \Theta(\ell) = \Theta(\log n)$ de que efetivamente dispomos. Em suma: como o afastamento t que temos disponível corresponde a apenas $\Theta(\sqrt{\log n})$ desvios-padrão

(e não a algo que cresce como uma potência de n), o quadrado no denominador de Chebyshev, t^2 , nunca poderá compensar o fator n trazido pela união de eventos — os dois crescem em escalas incompatíveis ($\log n$ contra n).

(d) O problema de fundo é que a desigualdade de Chebyshev fornece apenas uma cauda polinomial (de ordem $1/k^2$ em número de desvios-padrão k), enquanto o argumento "por elemento + união sobre n elementos" exige, para cada um dos n termos, uma probabilidade de exceção que decaia mais rápido que $1/n$ — idealmente, de forma que a soma dos n termos ainda vá a 0 (ou até seja $O(n^{-c})$ para algum $c > 0$, como no Teorema 3.2). Como no nosso regime o desvio t é apenas $\Theta(\sqrt{\log n})$ desvios-padrão, uma cauda polinomial como a de Chebyshev produz um limitante da ordem de $1/\log n$, que é grande demais: multiplicado por n , diverge.

Uma desigualdade de Chernoff, por outro lado, fornece uma cauda *exponencial* no desvio t (tipicamente da forma $e^{-\Theta(t^2/\mu)}$ ou similar), e não apenas $1/t^2$. Com $t = \Theta(\ell) = \Theta(\log n)$, uma cauda exponencial produz um limitante da forma $e^{-\Theta(\log n)} = n^{-\Theta(1)}$ — ou seja, *polinomialmente pequeno em n* , e ajustável (escolhendo as constantes da análise) para ser tão pequeno quanto $O(n^{-30})$, por exemplo. Só assim a soma dos n termos na união de eventos permanece pequena ($n \cdot O(n^{-30}) = O(n^{-29})$), e o argumento "por elemento + união" tem sucesso. É exatamente por isso que a análise do Teorema 3.2 precisa de Chernoff, e não pode ser feita apenas com Chebyshev.

Referências Bibliográficas

- Robert G. Bartle. *The elements of real analysis*. John Wiley & Sons, New York-London-Sydney, second edition, 1976.
- Sheldon Ross. *Probabilidade: Um Curso Moderno com Aplicações*. Porto Alegre: Bookman, 8.º ed., 2010.
- Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, New York, 3rd edition, 1976.
- Devdatt Dubhashi e Alessandro Panconesi. *Concentration of Measure for the Analysis of Randomized Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Juraj Hromkovic. *Design and Analysis of Randomized Algorithms: Introduction to Design Paradigms*. Berlin: Springer, 2005. (online)
- Sanjeev Arora e Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Avrim Blum, John Hopcroft e Ravindran Kannan. *Foundations of Data Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. (online)
- Roman Vershynin. *High-Dimensional Probability: An Introduction with Applications in Data Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. (online, soluções)
- Olle Häggström. *Finite Markov Chains and Algorithmic Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Michael Mitzenmacher e Eli Upfal. *Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Rajeev Motwani e Prabhakar Raghavan. *Randomized Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. 3rd ed. Cambridge: MIT Press, 2009.

- Patrick Billingsley. *Probability and Measure*. 3rd. ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.
- Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2nd edition, 1998.
- Robert Sedgewick. *The Analysis of Quicksort Programs*. Acta Informatica 7(4), 327–355, 1977.
- Robert Sedgewick and Philippe Flajolet. *An Introduction to the Analysis of Algorithms*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1996.
- Vasileios Iliopoulos and David Penman. *Variance of the number of Comparisons of Randomized Quicksort*. arXiv 1006.4063, 2010. <https://arxiv.org/abs/1006.4063>.
- Sergei Bernstein. *On a modification of Chebyshev's inequality and of the error formula of Laplace*. Ann. Sci. Inst. Sav. Ukraine, Sect. Math, 1(4), 38–49, 1924.
- Herman Chernoff. *A Measure of Asymptotic Efficiency for Tests of a Hypothesis Based on the sum of Observations*. The Annals of Mathematical Statistics, 23(4), 493 – 507, 1952.
- Herman Chernoff. *A career in statistics em Past, Present, and Future of Statistical Science*. Ed. Lin, X. and Genest, C. and Banks, D.L. and Molenberghs, G. and Scott, D.W. and Wang, J.L.. CRC Press, pages = 29–40, 2014.
- Wassily Hoeffding. *Probability inequalities for sums of bounded random variables*. The collected works of Wassily Hoeffding, 409–426, Springer, 1994.
- William Pugh. *Skip lists: a probabilistic alternative to balanced trees*. Algorithms and data structures (Ottawa, ON, 1989), Lecture Notes in Comput. Sci., 382, 437–449, Springer 1989.

Índice Remissivo

- $X \sim \text{Geom}(p)$, 30
- $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 60
- $X(\Omega)$, 27
- $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 29
- $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, 30
- $[X = a]$, 28
- $[X \in A]$, 29
- $[X \leq a]$, 29
- $\text{BN}(r, p)$, 42
- k -a- k independente, 15
- k -ésimo momento, 88
- k -ésimo momento central, 89
- σ -álgebra de subconjuntos de Ω , 5
- $X \stackrel{d}{=} Y$, 61
- A probabilidade do complemento, 6
- Aditividade enumerável, 5
- Aditividade finita, 6
- Algoritmos Las Vegas, 25
- Algoritmos Monte Carlo, 17
- altura, 108
- altura da *skip*, 108
- continuidade da medida de probabilidade, 21
- converge, 117
- converge absolutamente, 117
- desigualdade de Bienaymé–Chebyshev, 73
- desigualdade de Chebyshev, 73
- desigualdade de Jensen, 54
- desigualdade de Markov, 71
- desvio padrão, 74
- distribuição, 29
- distribuição binomial, 30
- distribuição binomial negativa, 41
- distribuição de Bernoulli, 29
- distribuição de Poisson, 60
- distribuição de Rademacher, 90
- distribuição geométrica, 30
- ensaio de Bernoulli, 29
- escolha aleatória uniforme, 7
- espaço amostral, 5
- espaço de probabilidade, 5
- espaço de probabilidade discreto, 8
- esperança, 31
- esperança condicional, 69
- evento impossível, 6
- eventos independentes, 14
- função geradora de cumulantes, 92
- função geradora de momentos, 88, 89
- função massa de probabilidade, 8

- iguais em distribuição, 61
- independentes, 30
- lei, 29
- lista do nível 0, 108
- lista do nível $i + 1$, 108
- medida de probabilidade, 5
- modelo probabilístico discreto, 8
- Monotonicidade, 6
- monótona, 21
- mutuamente independente, 15
- mutuamente independentes, 31
- Normalização, 5
- Não-negatividade, 5
- posto, 65
- probabilidade condicional, 11
- probabilidade de A dado E , 11
- probabilidade uniforme, 7
- Regra da adição, 6
- regra do produto, 11
- skip list, 108
- Subaditividade, 6
- teorema da multiplicação, 11
- uniforme em $[a, b]$, 50
- valor esperado, 31
- variável aleatória discreta, 27
- variável aleatória indicadora, 27
- variância, 89