

ALGORITHMEN UND DATENSTRUKTUREN

ÜBUNG 13: DAS PROZESSPROBLEM

Eric Kunze

`eric.kunze@mailbox.tu-dresden.de`

TU Dresden, 30.01.2020

Algebraisches Pfadproblem

ABSTRAKTION: ALGEBRAISCHES PFADPROBLEM

- ▶ **bisher:** kürzeste Wege
 - ▷ Summation + entlang der Pfade
 - ▷ Minimum min über alle Pfade
- ▶ **jetzt:** Verallgemeinerung
 - ▷ Pfadoperation \odot entlang der Pfade
 - ▷ Akkumulationsoperation \oplus
- ▶ **Ergebnis:** allgemeine algebraische Struktur — Semiring
($S, \oplus, \odot, 0, 1$)

	Werte S	\oplus	\odot	0	1
kürzeste Wegeproblem	$\mathbb{R}_{\geq 0}^{\infty}$	min	+	∞	0
Kapazitätsproblem	\mathbb{N}_{∞}	max	min	0	∞
Erreichbarkeitsproblem	$\{\text{true}, \text{false}\}$	\vee	\wedge	false	true
Zuverlässigkeitsproblem	$[0, 1]$	max	\cdot	0	1
Prozessproblem	$\mathcal{P}(\Sigma^*)$	\cup	\circ	\emptyset	$\{\varepsilon\}$

FLOYD-WARSHALL → AHO-HOPCRAFT-ULLMANN

- ▶ modifizierte Adjazenzmatrix

$$mA_G = \begin{cases} A_G(u, v) & \text{wenn } u \neq v \\ A_G(u, v) \oplus \mathbf{1} & \text{wenn } u = v \end{cases}$$


- ▶ **Initialisierung:** $D_G^{(0)} = mA_G$
- ▶ **Rekursion:**

$$\begin{aligned} & D_G^{(k+1)}(u, v) \\ &= D_G^{(k)}(u, v) \oplus \left(D_G^{(k)}(u, k+1) \odot (D_G^{(k)}(k+1, k+1))^* \odot D_G^{(k)}(k+1, v) \right) \end{aligned}$$


- ▶ vgl. dazu Floyd-Warshall:

$$\begin{aligned} & D_G^{(k+1)}(u, v) \\ &= \min \left\{ D_G^{(k)}(u, v), D_G^{(k)}(u, k+1) + D_G^{(k)}(k+1, v) \right\} \end{aligned}$$

AUFGABE 12.3




AUFGABE 12.3



Teil (a) :

$$(S, \oplus, \odot, \mathbf{0}, \mathbf{1}) =$$
$$(\mathcal{P}(\Sigma^*), \cup, \circ, \emptyset, \{\varepsilon\})$$

AUFGABE 12.3



Teil (a) :

$$(S, \oplus, \odot, \mathbf{0}, \mathbf{1}) = (\mathcal{P}(\Sigma^*), \cup, \circ, \emptyset, \{\varepsilon\})$$

Update-Formel: $D_G^{(k+1)}(u, v)$

$$\begin{aligned} &= D_G^{(k)}(u, v) \oplus \left(D_G^{(k)}(u, k+1) \odot (D_G^{(k)}(k+1, k+1))^* \odot D_G^{(k)}(k+1, v) \right) \\ &= D_G^{(k)}(u, v) \cup \left(D_G^{(k)}(u, k+1) \circ (D_G^{(k)}(k+1, k+1))^* \circ D_G^{(k)}(k+1, v) \right) \\ &= \text{alt} \quad \cup \left(\text{Zeile} \quad \circ \quad (\text{Diagonale})^* \quad \circ \quad \text{Spalte} \right) \end{aligned}$$

AUFGABE 12.3

Teil (b) : $mA_G = D_G^{(0)} = \begin{pmatrix} \{\varepsilon, d\} & \{a\} & \emptyset \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{b\} \\ \{c\} & \emptyset & \{\varepsilon\} \end{pmatrix}$

AUFGABE 12.3

Teil (b) : $mA_G = D_G^{(0)} = \begin{pmatrix} \{\varepsilon, d\} & \{a\} & \emptyset \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{b\} \\ \{c\} & \emptyset & \{\varepsilon\} \end{pmatrix}$

Teil (c) : $D_G^{(1)} = \begin{pmatrix} \{d\}^* & \{d\}^* \{a\} & \emptyset \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{b\} \\ \{c\} \{d\}^* & \{c\} \{d\}^* \{a\} & \{\varepsilon\} \end{pmatrix}$

Teil (d) :

$$\begin{aligned} D_G^{(2)}(3,3) &= D_G^{(1)}(3,3) \cup \left(D_G^{(1)}(3,2) \circ (D_G^{(1)}(2,2))^* \circ D_G^{(1)}(2,3) \right) \\ &= \{\varepsilon\} \cup \left(\{c\} \{d\}^* \{a\} \circ \{\varepsilon\}^* \circ \{b\} \right) \\ &= \{\varepsilon\} \cup \left(\{c\} \{d\}^* \{ab\} \right) \end{aligned}$$

AUFGABE 12.3


Teil (d) :

$$\begin{aligned}D_G^{(2)}(3,3) &= D_G^{(1)}(3,3) \cup \left(D_G^{(1)}(3,2) \circ (D_G^{(1)}(2,2))^* \circ D_G^{(1)}(2,3) \right) \\&= \{\varepsilon\} \cup \left(\{c\} \{d\}^* \{a\} \circ \{\varepsilon\}^* \circ \{b\} \right) \\&= \{\varepsilon\} \cup \left(\{c\} \{d\}^* \{ab\} \right)\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}D_G^{(3)}(3,3) &= D_G^{(2)}(3,3) \cup \left(D_G^{(2)}(3,3) \circ (D_G^{(2)}(3,3))^* \circ D_G^{(2)}(3,3) \right) \\&= D_G^{(2)}(3,3) \cup \left(D_G^{(2)}(3,3) \right)^* \\&= \left(D_G^{(2)}(3,3) \right)^* \\&= \left(\{\varepsilon\} \cup \{c\} \{d\}^* \{ab\} \right)^* \\&= \left(\{c\} \{d\}^* \{ab\} \right)^*\end{aligned}$$

Übungsblatt 13

AUFGABE 1




AUFGABE 1



Teil (a) :

$$mA_G = \begin{pmatrix} \{\varepsilon\} & \{b\} & \{b\} \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{a\} \\ \{c\} & \emptyset & \{\varepsilon\} \end{pmatrix}$$

AUFGABE 1



Teil (a) :

$$mA_G = \begin{pmatrix} \{\varepsilon\} & \{b\} & \{b\} \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{a\} \\ \{c\} & \emptyset & \{\varepsilon\} \end{pmatrix}$$

Teil (b):

$$D_G^{(1)} = \begin{pmatrix} \{\varepsilon\} & \{b\} & \{b\} \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{a\} \\ \{c\} & \{cb\} & \{cb, \varepsilon\} \end{pmatrix} \quad D_G^{(2)} = \begin{pmatrix} \{\varepsilon\} & \{b\} & \{b, ba\} \\ \emptyset & \{\varepsilon\} & \{a\} \\ \{c\} & \{cb\} & \{cb, cba, \varepsilon\} \end{pmatrix}$$

AUFGABE 1

Teil (c):

$$\begin{aligned} D_G(3,1) &= D_G^{(3)}(3,3) \\ &= D_G^{(2)}(3,3) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3,3) \cdot (D_G^{(2)}(3,3))^* \cdot D_G^{(2)}(3,1) \right\} \\ &= \{c\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{c\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \cdot \{c\} \end{aligned}$$

AUFGABE 1

Teil (c):

$$\begin{aligned}D_G(3,1) &= D_G^{(3)}(3,3) \\&= D_G^{(2)}(3,3) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3,3) \cdot (D_G^{(2)}(3,3))^* \cdot D_G^{(2)}(3,1) \right\} \\&= \{c\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{c\} \right\} \\&= \{cb, cba\}^* \cdot \{c\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D_G(3,2) &= D_G^{(2)}(3,2) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3,3) \cdot (D_G^{(2)}(3,3))^* \cdot D_G^{(2)}(3,2) \right\} \\&= \{cb\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{cb\} \right\} \\&= \{cb, cba\}^* \cdot \{cb\}\end{aligned}$$

AUFGABE 1

Teil (c):

$$\begin{aligned} D_G(3, 1) &= D_G^{(3)}(3, 3) \\ &= D_G^{(2)}(3, 3) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3, 3) \cdot (D_G^{(2)}(3, 3))^* \cdot D_G^{(2)}(3, 1) \right\} \\ &= \{c\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{c\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \cdot \{c\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_G(3, 2) &= D_G^{(2)}(3, 2) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3, 3) \cdot (D_G^{(2)}(3, 3))^* \cdot D_G^{(2)}(3, 2) \right\} \\ &= \{cb\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{cb\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \cdot \{cb\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_G(3, 3) &= D_G^{(2)}(3, 3) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3, 3) \cdot (D_G^{(2)}(3, 3))^* \cdot D_G^{(2)}(3, 3) \right\} \\ &= \{cb, cba, \varepsilon\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{cb, cba, \varepsilon\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \end{aligned}$$

AUFGABE 1

Teil (c):

$$\begin{aligned} D_G(3, 1) &= D_G^{(3)}(3, 3) \\ &= D_G^{(2)}(3, 3) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3, 3) \cdot (D_G^{(2)}(3, 3))^* \cdot D_G^{(2)}(3, 1) \right\} \\ &= \{c\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{c\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \cdot \{c\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_G(3, 2) &= D_G^{(2)}(3, 2) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3, 3) \cdot (D_G^{(2)}(3, 3))^* \cdot D_G^{(2)}(3, 2) \right\} \\ &= \{cb\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{cb\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \cdot \{cb\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_G(3, 3) &= D_G^{(2)}(3, 3) \cup \left\{ D_G^{(2)}(3, 3) \cdot (D_G^{(2)}(3, 3))^* \cdot D_G^{(2)}(3, 3) \right\} \\ &= \{cb, cba, \varepsilon\} \cup \left\{ \{cb, cba, \varepsilon\} \cdot \{cb, cba, \varepsilon\}^* \cdot \{cb, cba, \varepsilon\} \right\} \\ &= \{cb, cba\}^* \end{aligned}$$

Teil (d): $D_G(3, 3) = \{cb, cba, ba\}^* \rightsquigarrow (3, 3, \{cb, cba, ba\}^*)$