Зайцы.

Логистическое отображение.

Рассматриваемая система описывает изменение какой-либо величины по закону

$$X_{n+1} = r \cdot X_n (1 - X_n)$$

Бифуркационная диаграмма.

Для данной системы можно построить бифуркационную диаграмму показывающую, как себя ведёт система при разных значениях r.

Создание диаграммы

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from scipy import *
from pylab import *
from scipy import stats
# f(x)
f = lambda x, r : r * x * (1 -x)
# набор г
rlist = linspace( 0, 4, 1000)
# начальная популяция зайцев
X = [0.3 * ones_like(rlist),]
# эволюция за N шагов
for i in arange(0,2000): X += [f(X[-1], rlist),]
# берём последние N
X = hsplit( vstack(X[-1000:]), rlist.size)
# Разбиваем на участки по вертикали (чем больше точек, тем ярче будет участок)
H = map( lambda Z : stats.histogram( Z, defaultlimits=(0,1), numbins=300 )[0],X)
# нормируем по весу и инвертируем цвет (чтобы линия была чёрной а не белой)
H = map(lambda Z : 1-Z/Z.max(), H)
figure(figsize=(9, 6), dpi=100)
imshow( rot90(vstack(H)), aspect = 'auto', extent = [0, 4, 0, 1])
bone() # переводим цвет в чб
xlabel('r')
ylabel(r'$X_{n \rightarrow \infty}$')
```

savefig('Bifurcation.png')

Результат




Figure 1: Бифуркационная диаграмма

Интерпретация

При значениях г от 0 до 1, точка X=0 была аттрактором (все зайцы быстро умирали). При r=1 точка X=0 перестаёт быть устойчивой, но остается неподвижной. В то время, как популяция зайцев стремится к аттрактору (устойчивая неподвижная точка) при значении $\frac{r-1}{r}$. При г больше 3 численность популяции будет колебаться между двумя значениями. При $r>1+\sqrt{6}$ численность будет колебаться между 4 значениями и так дальше: 8, 16, 32. Так же существуют окна периодичности в которых популярность колеблется между 3 значениями (окно примерно в 3.83), потом между 6, потом 12 и так далее.

Фрактальная структура

Если рассмотреть в увеличенном масштабе часть диаграммы, то можно увидеть её фрактальную структуру. Для примера приведён участок r от 3.5 до 3.7 и x от 0.3 до 0.7

Фурье.

Можно построить Фурье преобразования для нескольких значений г.




Figure 2: Участок бифуркационной диаграммы

Организованная самокритичность

