

## Løsning til opgave KF 2.4.1

### Løsning til (A):

Laurentrækken for  $e^z$  er

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n ,$$

og substitution med  $1/z$  giver os

$$z^3 e^{1/z} = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{3-n} .$$

### Løsning til (B):

Der er en singularitet i  $z = 0$  og da Laurentrækken har uendelig mange  $b_n \neq 0$  er den essentiel.

### Løsning til (C):

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = b_1 = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24} .$$

### Løsning til (D):

Integralet kan deles i to og da  $\sin z$  er analytisk i hele det komplekse plan får vi

$$\oint_C \sin z + z^3 e^{1/z} dz = \oint_C \sin z + \oint_C z^3 e^{1/z} dz = 0 + 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} f(z) = \frac{2\pi i}{24} = \frac{\pi i}{12} .$$

## Løsning til opgave KF 2.4.2

### Løsning til (A):

Da  $\sin$  ikke har singulariteter findes alle singulariteterne for  $f(z)$  ved at løse

$$(z + \pi)\left(z - \frac{\pi}{2}\right) = 0 ,$$

hvilket giver singulariteter i  $z = -\pi$  og  $z = \pi/2$ . Singulariteten  $z = \pi/2$  er en simpel pol. Da både  $\sin z$  og  $z + \pi$  har et simpelt nulpunkt i  $-\pi$ , så er singulariteten  $z = -\pi$  removable.

### Løsning til (B):

De to residuer

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=-\pi} f(z) &= b_1 = 0 \\ \operatorname{Res}_{z=\pi/2} f(z) &= \lim_{z \rightarrow \pi/2} \left(z - \frac{\pi}{2}\right) \frac{\sin z}{(z + \pi)(z - \frac{\pi}{2})} = \frac{\sin z}{z + \pi} \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi} = \frac{2}{3\pi} . \end{aligned}$$

### Løsning til (C):

Kun den ene singularitet ligger inden for  $C_1$ , så vi får

$$\oint_{C_1} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=\pi/2} f(z) = 2\pi i \frac{2}{3\pi} = \frac{4}{3} i .$$

Begge singulariteter ligger inden for  $C_2$ , og da residuet for  $z = \pi$  er 0 så får det andet integral samme værdi

$$\oint_{C_2} f(z) dz = \frac{4}{3} i .$$

## Løsning til opgave KF 2.4.3

### Løsning til (A):

Polerne er nulpunkter i nævneren

$$\begin{aligned} z^2 - 1 &= 0 &\Leftrightarrow & z^2 = 1 &\Leftrightarrow & z = \pm 1 && \text{(simple poler)} \\ z^2 + 4 &= 0 &\Leftrightarrow & z^2 = -4 &\Leftrightarrow & z = \pm 2i && \text{(simple poler)} \end{aligned}$$

**Løsning til (B):**

For at finde residuerne for alle fire poler bemærker vi først at

$$f(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-1)(z+2i)(z-2i)}.$$

Så får vi at

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=1} f(z) &= \frac{z^2}{(z+1)(z+2i)(z-2i)} \Big|_{z=1} = \frac{1}{2 \cdot (1^2 + 2^2)} = \frac{1}{10} \\ \operatorname{Res}_{z=-1} f(z) &= \frac{z^2}{(z-1)(z+2i)(z-2i)} \Big|_{z=-1} = \frac{1}{-2 \cdot 5} = -\frac{1}{10} \\ \operatorname{Res}_{z=2i} f(z) &= \frac{z^2}{(z+1)(z-1)(z+2i)} \Big|_{z=2i} = \frac{-4}{(-(1^2 + 2^2)) \cdot 4i} = \frac{1}{5i} = -\frac{i}{5} \\ \operatorname{Res}_{z=-2i} f(z) &= \frac{z^2}{(z+1)(z-1)(z-2i)} \Big|_{z=-2i} = \frac{-4}{-4i \cdot (-5)} = -\frac{1}{5i} = \frac{i}{5}\end{aligned}$$

**Løsning til (C):**

Samtlige poler ligger inden for  $C$ , så vi får at

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \left( \frac{1}{10} - \frac{1}{10} + \frac{i}{5} - \frac{i}{5} \right) = 0.$$

**Løsning til (D):**

Singulariteterne i funktionen under integralet har kun simple poler på den reelle akse, og graden af tælleren er 2, mens graden af nævneren er 4 (og altså 2 større), så betingelserne for Cauchys hovedværdisætning er opfyldte. Vi finder at

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2-1)(x^2+4)} dx = 2\pi i \sum_{\substack{\text{Øvre} \\ \text{halvplan}}} \operatorname{Res} f(z) + \pi i \sum_{\substack{\text{Reelle} \\ \text{akse}}} \operatorname{Res} f(z) = 2\pi i \cdot \frac{-i}{5} + \pi i \left( \frac{1}{10} - \frac{1}{10} \right) = \frac{2\pi}{5}.$$