

VEKTOR DI RUANG DIMENSI TIGA

Wisnu Priyo Hutomo, MSi

Vektor adalah besaran yang mempunyai panjang dan arah. Jika tanpa arah, maka disebut skalar.
Vektor dapat berada di ruang dimensi dua (R^2), dimensi tiga (R^3), atau dimensi n (R^n).
Mengapa tidak ada vektor di ruang dimensi satu/nol ?

VEKTOR SATUAN


Selanjutnya kita fokus ke vektor di ruang dimensi tiga.

Sebarang vektor \vec{a} di R^3 dinyatakan sebagai : $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$

dimana : $\vec{i} = (1, 0, 0)$ = vektor satuan searah sumbu x

$\vec{j} = (0, 1, 0)$ = vektor satuan searah sumbu y


$\vec{k} = (0, 0, 1)$ = vektor satuan searah sumbu z



Contoh : vektor $\vec{OP} = (2, 3, 5)$

\vec{OP} artinya titik pangkalnya di titik O (Origin) dan titik ujungnya di titik P .

$(2, 3, 5) = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$ artinya: 2 satuan kearah x , 3 satuan kearah y , dan 5 satuan kearah z .



PANJANG VEKTOR (NORM) YANG MELALUI TITIK ORIGIN

$$P = (p_x, p_y, p_z)$$

$$O = (0, 0, 0)$$

$$\overline{OP} = P - O = (p_x - 0, p_y - 0, p_z - 0)$$

$$\|\overline{OP}\| = \sqrt{(p_x - 0)^2 + (p_y - 0)^2 + (p_z - 0)^2}$$


Contoh : Hitung panjang vektor $\overline{OP} = (2, 3, 5)$

Jawab :

Berarti: $P = (2, 3, 5)$ dan $O = (0, 0, 0)$

$$\|\overline{OP}\| = \sqrt{(2-0)^2 + (3-0)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{4+9+25} = \sqrt{38}$$

PANJANG VEKTOR YANG TIDAK MELALUI TITIK ORIGIN = JARAK ANTARA DUA TITIK



$$\|\overline{AB}\| = d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$


Contoh : Hitung jarak antara titik $A(1, 2, 3)$ ke titik $B(4, 6, 3)$

$$\text{Jawab : } \|\overline{AB}\| = d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2 + (3-3)^2} = 5$$


OPERASI PENJUMLAHAN/PENGURANGAN

SECARA GEOMETRI

$$a. \overline{a} + \overline{b} = \overline{c}$$



$$b. \overline{a} - \overline{b} = \overline{d}$$



SECARA ALJABAR

Misal : $\overline{a} = (5, 4, 2)$ dan $\overline{b} = (3, 2, 1)$, maka:

$$\overline{a} + \overline{b} = (5, 4, 2) + (3, 2, 1) = (8, 6, 3)$$

$$\overline{a} - \overline{b} = (5, 4, 2) - (3, 2, 1) = (2, 2, 1)$$

PERKALIAN TITIK (DOT PRODUCT)

Ada dua rumus, yaitu :

$$\text{Rumus 1: } \vec{u} \cdot \vec{v} = (u_x)(v_x) + (u_y)(v_y) + (u_z)(v_z)$$

$$\text{Rumus 2: } \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

dimana : θ = sudut antara vektor \vec{u} dengan vektor \vec{v} .

Contoh soal :

Diketahui vektor: $\vec{u} = (2, -1, 1)$ dan $\vec{v} = (1, 1, 2)$

Hitunglah : a. $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (2\vec{u} + \vec{v})$

b. Besarnya sudut antara \vec{u} dan \vec{v} .

c. $3\vec{u} - 2\vec{v}$

Tentukan: d. Vektor satuan yang searah vektor $3\vec{u} - 2\vec{v}$.

JAWAB :

$$\text{a. } (1, -2, -1) \cdot (5, -1, 4) = (1)(5) + (-2)(-1) + (-1)(4) = 3$$

$$\text{b. } \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (2)^2} = \sqrt{6}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{3}{(\sqrt{6})(\sqrt{6})} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = 60^\circ$$


$$\text{c. } 3(2, -1, 1) - 2(1, 1, 2) = (6, -3, 3) - (2, 2, 4) = (4, -5, -1)$$

$$\text{d. } \|3\vec{u} - 2\vec{v}\| = \|4, -5, -1\| = \sqrt{16 + 25 + 1} = \sqrt{42}$$

$$\text{Vektor satuan yg searah vektor } 3\vec{u} - 2\vec{v} = \frac{3\vec{u} - 2\vec{v}}{\|3\vec{u} - 2\vec{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{42}}i - \frac{5}{\sqrt{42}}j - \frac{1}{\sqrt{42}}k$$

VEKTOR PROYEKSI

Proyeksi \vec{a} pada $\vec{b} : \vec{c}_1$



Vektor proyeksi \bar{a} pada \bar{b} : $\bar{c}_1 = \frac{\bar{a} \cdot \bar{b}}{\|\bar{b}\|^2} \cdot \bar{b}$

$\bar{c}_1 + \bar{c}_2 = \bar{a} \rightarrow \bar{c}_2 = \bar{a} - \bar{c}_1$ (vektor proyeksi \bar{a} pada $\perp \bar{b}$)

Diketahui vektor : $\bar{a} = (1,1,2)$ dan $\bar{b} = (1,4,5)$

Tentukan :

a. Vektor proyeksi dari \bar{a} pada \bar{b}

b. Vektor proyeksi dari \bar{a} pada $\perp \bar{b}$ (disebut juga sebagai proyeksi ortogonal \bar{a} pada \bar{b}).

Jawab :

$$a. \bar{c}_1 = \frac{(1,1,2) \cdot (1,4,5)}{(\sqrt{1+16+25})^2} (1,4,5) = \frac{1+4+10}{42} (1,4,5) = \left(\frac{15}{42}, \frac{60}{42}, \frac{75}{42} \right)$$

$$b. \bar{c}_2 = (1,1,2) - \left(\frac{15}{42}, \frac{60}{42}, \frac{75}{42} \right) = \left(\frac{27}{42}, \frac{-18}{42}, \frac{9}{42} \right)$$

PERKALIAN SILANG (CROSS PRODUCT)

Diketahui : $\bar{u} = (2,-1,1)$, $\bar{v} = (1,1,2)$ dan $\bar{w} = (1,2,1)$

Hitunglah : a. $\bar{u} \times \bar{v}$

b. $\bar{v} \times \bar{u}$

c. $(\bar{u} + \bar{v}) \times \bar{w}$

Jawab :

$$a. \bar{u} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} k = -3i - 3j + 3k = (-3, -3, 3)$$

$$b. \bar{v} \times \bar{u} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} k = 3i + 3j - 3k = (3, 3, -3)$$

Kesimpulan :

$$\bar{u} \times \bar{v} = -(\bar{v} \times \bar{u})$$

c. $(\bar{u} + \bar{v}) \times \bar{w} = \{(2,-1,1) + (1,1,2)\} \times (1,2,1)$

$$= (3,0,3) \times (1,2,1)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} k = -6i - 0j + 6k = (-6, 0, 6)$$

Secara geometri :

$$\vec{u} \times \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

Catatan: $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} \neq \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$

SCALAR TRIPLE PRODUCT

Diketahui vektor: $\vec{u} = (3, -2, -5)$, $\vec{v} = (1, 4, -4)$, dan $\vec{w} = (0, 3, 2)$

Hitunglah : $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$, $\vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u})$, $\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$

Jawab :

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \{(3)(4)(2) + (-2)(-4)(0) + (-5)(3)(1)\} - \{(-5)(4)(0) + (-2)(1)(2) + (3)(3)(-4)\} \\ &= \{24 + 0 - 15\} - \{0 - 4 - 36\} = 49\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \{(1)(3)(-5) + (4)(2)(3) + (-4)(-2)(0)\} - \{(-4)(3)(3) + (4)(0)(-5) + (1)(-2)(2)\} \\ &= \{-15 + 24 + 0\} - \{-36 + 0 - 4\} = 49\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) &= \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \end{vmatrix} \\ &= \{(0)(-2)(-4) + (3)(-5)(1) + (2)(4)(3)\} - \{(2)(-2)(1) + (3)(3)(-4) + (0)(4)(-5)\} \\ &= \{0 - 15 + 24\} - \{-4 - 36 + 0\} = 49\end{aligned}$$

KESIMPULAN:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = \vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \rightarrow \text{SCALAR TRIPLE PRODUCT}$$

SOAL UNTUK DICOBA SENDIRI :

1. Diberikan vektor $\vec{u} = (1, 1, -1)$, $\vec{v} = (6, 7, -15)$ dan $\vec{w} = (-4, 3, -1)$

Hitunglah :

a. $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w})$

b. $(\vec{u} - \vec{v}) \times \vec{w}$

c. $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$, $\vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u})$, $\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$

2. Diberikan vektor $\vec{u} = 4i + 3j - 2k$ dan $\vec{v} = 2i - j + 2k$

Misalkan: $(\vec{u} \cdot \vec{v})(\vec{u} \times \vec{v}) = ai + bj + ck$

Tentukan nilai a, b dan c .

KOMBINASI LINIER

Wisnu Priyo Hutomo, MSi

Adalah cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai jumlah kelipatan beberapa vektor lainnya dalam suatu ruang vektor.

Misal : $\vec{w} = k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + k_3 \vec{v}_3$

Dimana : $\vec{w}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 = \text{vektor}$

$k_1, k_2, k_3 = \text{skalar}$

Contoh :

Diketahui vektor-vektor : $\vec{u} = (1, 2, -1)$ dan $\vec{v} = (6, 4, 2)$ di \mathbb{R}^3 .

Tunjukkan apakah :

a. $\vec{w} = (9, 2, 7)$ merupakan kombinasi linier \vec{u} dan \vec{v} ?

b. $\vec{z} = (4, -1, 8)$ bukan merupakan kombinasi linier \vec{u} dan \vec{v} ?

Jawab :

$$\vec{w} = k_1 \vec{u} + k_2 \vec{v}$$

a. $(9, 2, 7) = k_1 (1, 2, -1) + k_2 (6, 4, 2)$

$$(9, 2, 7) = (k_1 + 6k_2, 2k_1 + 4k_2, -k_1 + 2k_2)$$

1. $k_1 + 6k_2 = 9$

2. $2k_1 + 4k_2 = 2$

3. $-k_1 + 2k_2 = 7$

Pers.1 + pers.3 : $8k_2 = 16 \rightarrow k_2 = 2 \rightarrow \text{substitusi pers.1 : } k_1 + 6(2) = 9 \rightarrow k_1 = 9 - 12 = -3.$

Cek ke pers. :

1. $(-3) + 6(2) = 9 \rightarrow \checkmark$

2. $2(-3) + 4(2) = 2 \rightarrow \checkmark$

3. $-(-3) + 2(2) = 7 \rightarrow \checkmark$

Jadi : $(9, 2, 7) = -3 (1, 2, -1) + 2 (6, 4, 2) \rightarrow \text{adalah kombinasi linier.}$

b. $(4, -1, 8) = k_1 (1, 2, -1) + k_2 (6, 4, 2)$

$$(4, -1, 8) = (k_1 + 6k_2, 2k_1 + 4k_2, -k_1 + 2k_2)$$

1. $k_1 + 6k_2 = 4$

2. $2k_1 + 4k_2 = -1$

$$3. -k_1 + 2k_2 = 8$$

Pers.1 + pers.3 : $8k_2 = 12 \rightarrow k_2 = 3/2 \rightarrow$ substitusi pers.1 : $k_1 + 6(3/2) = 4 \rightarrow k_1 = 4 - 9 = -5$.

Cek ke pers. :

$$1. (-5) + 6(3/2) = 4 \rightarrow \checkmark$$

$$2. 2(-5) + 4(3/2) = -4 \rightarrow \times$$

$$3. -(-5) + 2(3/2) = 8 \rightarrow \checkmark$$

Jadi : $(4, -1, 8) = -5(1, 2, -1) + 3/2(6, 4, 2) \rightarrow$ **adalah bukan kombinasi linier.**

HIMPUNAN VEKTOR-VEKTOR YANG BEBAS LINIER/BERGANTUNG LINIER

Contoh1 :

Apakah vektor-vektor : $\vec{u} = (9, 2, 7)$, $\vec{v} = (1, 2, -1)$, $\vec{w} = (6, 4, 2)$ bebas linier atau bergantung linier ?

Jawab :

$$\text{Misal : } A = \begin{bmatrix} 9 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & -1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{maka } \det(A) = 0 \rightarrow \text{bergantung linier.}$$

Contoh2 :

Tunjukkan bahwa vektor-vektor : $\vec{a} = (4, -1, 8)$, $\vec{b} = (1, 2, -1)$, $\vec{c} = (6, 4, 2)$ bebas linier atau bergantung linier.

Jawab :

$$\text{Misal : } B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & -1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{maka } \det(B) = -24 \rightarrow \text{bebas linier.}$$

SOAL UNTUK DICoba SENDIRI :

1. Diketahui vektor-vektor : $\vec{a} = (3, 2, 1, -1)$, $\vec{b} = (4, 3, 2, 1)$, $\vec{c} = (18, 13, 8, 1)$.

Apakah \vec{c} merupakan kombinasi linier dari \vec{a} dan \vec{b} ?

2. Diketahui vektor-vektor : $\vec{u} = (-2, 0, 4)$, $\vec{v} = (3, -1, 6)$, dan $\vec{w} = (2, , -5, -5)$.

Apakah vektor-vektor tersebut bebas linier atau bergantung linier ?