

1. Considere as funções reais de duas variáveis reais definidas por:

$$f(x, y) = x^2 + y^2;$$

$$g(x, y) = \sqrt{f(x, y)}; \quad h(x, y) := \begin{cases} \text{se } x^2 + y^2 \leq 16 \\ \text{então } z = -g(x, y) \end{cases}; \quad j(x, y) = \begin{cases} -\sqrt{32 - f(x, y)}, \text{ se } 16 < x^2 + y^2 \leq 32 \\ h(x, y) \end{cases}$$




Figura 1




Figura 2




Figura 3

- [1.0] (a) Determine o domínio da função j e represente-o geometricamente. O domínio é fechado? Justifique.
- [1.0] (b) Defina a função j em forma de algoritmo e mostre que $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 16\}$ é uma curva de nível comum a todas as funções.
- [2.0] (c) Identifique as superfícies associadas às funções e trace um esboço das mesmas.
- [3.0] (d) Resolva apenas três das alíneas seguintes.
- Qual o valor lógico das seguintes afirmações? Justifique a sua resposta.
- (i) Das figuras apresentadas, apenas a figura 2 representa o gráfico de uma função/campo escalar.
- (ii) O vetor $\begin{bmatrix} x & 5 & \sqrt{7} \end{bmatrix}$ define a equação da reta tangente à curva de intersecção da superfície $z = j(x, y)$ com o plano $y = -5$ no ponto de coordenadas $P(0, -5, -\sqrt{7})$.
- (iii) A função j é contínua nos pontos do *cordão de soldadura* definido por $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 16\}$.
- (iv) As funções f , g e h têm um mínimo absoluto em $(0, 0)$ e a função j não tem extremos.
- (v) A função seguinte, definida em Maple, é simétrica da função j
- ```
M:=(x, y)->piecewise(x^2+y^2 <= 16, sqrt(x^2+y^2),
16 < x^2+y^2 <= 32, sqrt(32-x^2-y^2), undefined)
```
- [3.0] (e) Das alíneas seguintes resolva apenas duas
- (i) Supondo que a temperatura em qualquer ponto do plano  $xOy$  é dada por  $T = g(x, y)$ , as taxas de variação máxima e mínima da temperatura no ponto  $P(-1, -1)$  ocorrem na direção e sentido dos vetores  $\vec{w} = \langle 2, 2 \rangle$  e  $\vec{v} = \langle -2, -2 \rangle$  respetivamente? Justifique a sua resposta.
- (ii) Supondo que o potencial em qualquer ponto do plano  $xOy$  é dado por  $V = f(x, y)$ , utilizando diferenciais, obtenha uma aproximação da diferença do potencial entre os pontos  $(-1, -1)$  e  $(-1.33, -1.33)$ .

iii) Mostre que se  $z = (g(x, y))^2$ ,  $y = \rho \sin \theta$  e  $x = \rho \cos \theta$ , então  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 z}{\partial \rho^2}$ .

iv) Determine a equação do plano tangente à superfície definida por

$z = 4 - f(x-2, y-2)$  se  $(x-2)^2 + (y-2)^2 \leq 16$ , no ponto  $P(2, 2, 4)$ . Represente a superfície e o plano tangente.

2. A figura 4 representa um sólido, de densidade igual a 2, composto por três partes:

- Cone de raio  $r = 4$  e altura  $h = 4$ ;
- Cilindro de raio  $r = 4$  e altura  $h = 4$ ;
- Segmento de esfera de raio  $r = \sqrt{32}$ .

[3.0] (a) Associando os conjuntos seguintes a três sistemas de coordenadas 3D, mostre que o sólido é definido por  $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ , onde:

$$S_1 = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 16 \wedge 0 \leq z \leq -\sqrt{x^2 + y^2} + 4 \right\}$$

$$S_2 = \left\{ (\rho, \theta, z) : 0 \leq \rho \leq 4 \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge -4 \leq z \leq 0 \right\}$$

$$S_3 = \left\{ (R, \theta, \varphi) : 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge \frac{3}{4}\pi \leq \varphi \leq \pi \wedge -\frac{4}{\cos \varphi} \leq R \leq \sqrt{32} \right\}$$




Figura 4

[1.0] (b) As instruções seguintes permitem-lhe esboçar em MAPLE a superfície que limita o sólido definido na alínea anterior por  $S_1$ ? Justifique.

```
> addcoords(MyCylindrical,[z,r,theta],[r*cos(theta),r*sin(theta),z])
> plot3d(4-r,r=0..4,theta=0..2*Pi,coords=MyCylindrical)
```

[3.0] (c) Calcule o volume e a massa do sólido.

[3.0] (d) Das alíneas seguintes resolva apenas **três**

i) Prove, usando coordenadas esféricas, que o volume de uma esfera de raio  $r$  é  $\frac{4}{3}\pi r^3$ .

ii) Mostre, que a área da superfície cônica que limita o sólido é igual a  $A(S) = \pi r m = 16\sqrt{2}\pi$ , em que  $r$  é o raio e  $m$  a medida da hipotenusa do triângulo que se obtém por projeção da superfície no plano  $yOz$ .

Sugestão: A área de uma superfície de equação  $z = g(x, y)$  é dada por

$$A(S) = \iint_D \sqrt{(g_x(x, y))^2 + (g_y(x, y))^2 + 1} \, dydx, \text{ com } g_x \text{ e } g_y \text{ funções contínuas em } D.$$

iii) Em coordenadas cartesianas o sólido com forma igual à de um lápis é definido por

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 16 \wedge -\sqrt{32 - x^2 - y^2} \leq z \leq -\sqrt{x^2 + y^2} + 4 \right\}?$$
 Justifique a sua resposta.

iv) Complete a função seguinte e associe-a a uma transformação/mudança de variáveis.

```
> Esfericas2Cartesianas := proc(r, theta, phi)
 local x, y, z;
 if evalf(
 then
 x :=
 y :=
 z :=
 return ([x, y, z]);
 else error "
 end if
end proc
```

Nome Completo: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

Nome/login utilizado no LVM: \_\_\_\_\_

Curso

- ☐ Licenciatura em Eng. Informática
- ☐ Licenciatura em Eng. Informática - Pós-laboral
- ☐ Licenciatura em Informática - Curso Europeu

Trabalhador-Estudante

- ☐ Sim
- ☐ Não

Frequência às aulas de AM2

- ☐ Regime diurno
- ☐ Regime Pós-laboral

Atividades de aprendizagem e avaliação

- ☐ Não
- ☐ Sim
  - ☐ At01\_Matlab - ACrescimento + Prog.Geométrica
  - ☐ At02\_Matlab - Método da Secante e Método da Falsa Posição
  - ☐ At03\_Matlab - Integração Numérica (Presencial)
  - ☐ At04\_Matlab - Métodos de Euler e de Runge-Kutta com GUI
  - ☐ At05\_TP\_Maple - Cálculo Diferencial e Integral em  $\mathbb{R}^n$
  - ☐ Participação nos fóruns (pelo menos 3 vezes)

Acompanhou registos sobre AM2 e outros em [facebook/armeniocorreia](https://www.facebook.com/armeniocorreia)

- ☐ Sim
- ☐ Não