

秩的性质

$A_{2 \times 3}$ $B_{5 \times 5}$

(1) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$;

秩小于等于行数和列数

(2) $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$;

秩的和...

$\left. \begin{array}{l} \text{pr: 0h3} \\ (3) \end{array} \right\}$

设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;

秩...

(4) $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(\underline{A \parallel B}) \leq r(A) + r(B)$;

联立...

(5) $r(A) = r(kA) (k \neq 0)$; 乘非零常数...

(6) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则 和证...

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ);$$

证: $r(A) \geq r(PA)$

$$r(A) = r(EA) = r(P^{-1}PA)$$

$$\text{故 } r(A) = r(PA) \leq r(PA)$$

(7) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 若 $r(A) = n$, 则 $r(AB) = r(B)$; 若 $r(A) = m$, 则 $r(CA) = r(C)$;

pr: 0h4

左乘... 右乘...

(8) $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$; 未转置...

(9) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, 满足 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

未取为0...

【例 2.7】(2010, 数一、二、三) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times m$ 阶矩阵, 满足 $AB = E$, 则【 】

(A) $r(A) = m, r(B) = m$

(B) $r(A) = m, r(B) = n$

(C) $r(A) = n, r(B) = m$

(D) $r(A) = n, r(B) = n$

【详解】

经典错误. 由 $AB = E$, 知 A 可逆 \times

$$r(A) \leq \min\{m, n\}$$

$$r(A) \geq r(AB) = r(E) = m$$

故 $r(A) = m$.

【例 2.8】 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(ABC) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

注一. 先求 ABC

注二: 由 $|A| = |E| = 1$, $|C| = 6$, $|A| \neq 0$, $|C| \neq 0$

又 $|B| = 0$ 且 $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$, 从而 $r(B) = 2$

故 $r(ABC) = r(B) = 2$ ✓



秩的求法

(1) A 为数字矩阵：对 A 作初等行变换，化为行阶梯形矩阵，则 $r(A)$ 等于行阶梯形矩阵中非零行的
 行数；
 (n=3)

每个非零行下面元素均为0

(2) A 为抽象矩阵：利用秩的定义或性质.

$$A_{10 \times 10}$$

$$|A|=0, \quad 9 \times 9 \quad 100 \downarrow$$

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(A)=2$$

【例 2.9】 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 2 & a & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

且 $r(A) = 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 2 & a & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & ab-2b+2 \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{pmatrix}$$

由 $r(A)=2$, 得 $a=1, b=2$

专题四 伴随矩阵

定义
性质(略)

伴随矩阵的定义 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 由 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 构成的矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{\underline{A_{1n}}} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵, 记作 A^* .

【评注】设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

主对角互换
副对角变号

若 A 可逆, 则

$$A^* = |A| A^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例) 如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ ✓

伴随矩阵的性质

$$(1) \quad AA^* = A^*A = |A|E \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad \boxed{A^* = |A| A^{-1}}; \triangle$$

证: $AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix}$

$$= |A|E$$

同理 $A^*A = |A|E$

若 $|A| \neq 0$, 则 $A \cdot \frac{A^*}{|A|} = E$, 故 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, 即 $A^* = |A|A^{-1}$

$$(2) (kA)^* = k^{\boxed{n-1}} A^*; (98)$$

$$\begin{aligned} \text{py: } (kA)^* &= |kA| (kA)^{-1} = k^n |A| \cdot \frac{1}{k} A^{-1} \\ &= k^{n-1} A^* \end{aligned}$$

$$(3) (AB)^* = B^* A^*;$$

证: $(AB)^* = |AB| (AB)^{-1} = \underbrace{|A| |B|}_{\text{red arrow}} \cdot \underbrace{B^{-1} A^{-1}}_{\text{purple X and arrow}}$
 $= B^* A^*$


$$(4) |A^*| = |A|^{n-1};$$

$$PV: |A^*| = |\underline{A}A^{-1}| = |A|^n \cdot |A^{-1}| = |A|^{n-1}$$

$$\Delta \frac{1}{b}: \equiv \text{个 } n-1 \text{ 次} \left\{ \begin{array}{l} |A^*| \\ (kA)^* \\ ab \text{ 型} \end{array} \right.$$

$$(5) (A^T)^* = (A^*)^T;$$

$$\text{证: } (A^T)^* = |A^T| (A^T)^{-1} = |A| (A^{-1})^T.$$

$$(A^*)^T = (\underline{|A|} A^{-1})^T = |A| (A^{-1})^T$$


$$(6) (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \boxed{\frac{A}{|A|}};$$

$$\text{pr: } (A^{-1})^* = |A^{-1}| (A^{-1})^{-1} = \frac{A}{|A|}$$

$$(A^*)^{-1} = (\underline{|A|} A^{-1})^{-1} = \frac{A}{|A|}$$

总结: 上标运算 $\underline{n}, T, -, *$ 可交换
高次幂

$$(7) (A^*)^* = |A|^{\boxed{n-2}} A;$$

$$|A^*| (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \frac{A}{|A|}$$

$$((A^*)^*)^* = |(A^*)^*| ((A^*)^*)^{-1} = |A|^{n-2} A$$

补例 设 A 为 4 阶矩阵, 且 $r(A) = 3$, 则 $[(A^*)^T]^* = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$r(A) = ((A^*)^*)^T = \left(\begin{array}{c} |A|^{n-2} \\ \hline 0 \end{array} A \right)^T = 0$$

$$(8) \quad r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = \underline{n-1} \text{ 强化} \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases}$$

【证明】当 $r(A) = n$ 时, $|A| \neq 0$, 从而 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$, 故 $r(A^*) = n$.

(强化)

当 $r(A) < n-1$ 时, A 所有的 $n-1$ 阶子式均为零, 即 A 所有的余子式均为零, 亦即 A 所有的代数余子式均为零, 从而 $A^* = O$, 故 $r(A^*) = 0$.

当 $r(A) = n-1$ 时, A 有个 $n-1$ 阶子式非零, 即 A 有个余子式非零, 亦即 A 有个代数余子式非零, 从而 $A^* \neq O$, 故 $r(A^*) \geq 1$. 又 $AA^* = |A|E = 0$, 故 $r(A) + r(A^*) \leq n$, 从而 $r(A^*) \leq 1$, 故 $r(A^*) = 1$.

【例 2.10】(2003, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 且 $r(A^*) = 1$, 则 【 】

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$

【详解】

由 $r(A^*) = 1$, 且 $r(A) = 2$, 故 A 有 2 个非零特征值且 $|A| = 0$.

由 $|A| = (a+2b)(a-b)^2 = 0$, 且 $a = b$ 或 $a+2b=0$

当 $a = b$ 时, $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$, $r(A) \leq 1$ 矛盾, 故 $a \neq b$ 且 $a+2b=0$.