



1. Determine o coeficiente do termo $x^2y^2z^3$ no desenvolvimento de $\left(2x - y + \frac{z^3}{x}\right)^6$. Justifique.
2. A matriz \mathcal{W} contém os custos de instalação (em milhares de euros) de uma rede de fibra ótica entre um conjunto de localizações $\{A, B, C, D, E, F, G\}$:

$$\mathcal{W} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D & E & F & G \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 10 & \infty & \infty & \infty & \infty & 20 \\ 10 & 0 & 50 & \infty & 60 & 20 & \infty \\ \infty & 50 & 0 & 50 & 50 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 50 & 0 & 40 & \infty & \infty \\ \infty & 60 & 50 & 40 & 0 & 10 & \infty \\ \infty & 20 & \infty & \infty & 10 & 0 & 30 \\ 20 & \infty & \infty & \infty & \infty & 30 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- (a) Desenhe o grafo \mathcal{G} que tem como matriz de custos \mathcal{W} e recorra ao algoritmo de Dijkstra para determinar o caminho de custo mínimo entre as localizações A e D , indicando o respetivo caminho e o custo do mesmo.
 - (b) Seja \mathcal{H} o subgrafo de \mathcal{G} induzido pelo subconjunto de vértices $\{B, C, D, E, F\}$. Aplicando uma fórmula recursiva adequada determine o número de árvores abrangentes de \mathcal{H} . Justifique.
 - (c) Obtenha, justificando, um subgrafo abrangente de \mathcal{G} que seja conexo e bipartido, não se esquecendo de indicar a respetiva bipartição do conjunto dos seus vértices.
3. Usando a decodificação de Prüfer construa a árvore correspondente ao código $t = (4, 4, 4, 5, 4, 8)$.
 4. O número de arestas e_n do grafo completo K_n , com $n \in \mathbb{N}$, satisfaz a seguinte relação de recorrência

$$e_n = e_{n-1} + n - 1, \quad \text{com } n \geq 2 \text{ e } e_1 = 0.$$

- (a) Determine uma fórmula fechada para e_n , $n \in \mathbb{N}$, resolvendo a relação de recorrência dada.
 - (b) Obtenha na sua forma racional a função geradora da sucessão $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
5. Seja a_n o número de sequências ternárias de comprimento n , $n \in \mathbb{N}$, ou seja, sequências da forma $d_1 d_2 \dots d_n$, com $d_i \in \{0, 1, 2\}$, $i = 1, 2, \dots, n$, para as quais as ocorrências do dígito 0 se verificam sempre antes das do dígito 2. Por exemplo, para $n = 3$, as sequências 000, 002, 021, 222, são válidas, enquanto 200, 201, 202, 220, 210, 020 e 120 não são válidas. Obtenha, justificando, uma relação de recorrência para a_n , indicando também as respetivas condições iniciais.

Cotações:

1.	2.(a)	2.(b)	2.(c)	3.	4.(a)	4.(b)	5.
2.0	3.5	2.5	2.0	2.0	3.0	2.5	2.5