

Ecuaciones Diferenciales Parciales

1. Para $\lambda \in \mathbb{R}$ considere la ecuación diferencial parcial: Hallar $u = u(x, y)$ tal que

$$\lambda u_{xx} + 4u_{xy} + 21u_{yy} = 0$$

- (i) Clasifique la ecuación diferencial parcial para los distintos valores de $\lambda \in \mathbb{R}$.
(ii) Para $\lambda = -1$ transforme la ecuación a su forma normal y encuentre la solución general.

Solución:

(i) Se tiene el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$, donde $a = \lambda$, $b = 4$ y $c = 21$. Luego:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 84\lambda \implies \begin{cases} \Delta > 0 & \Leftrightarrow \lambda < 4/21 & \therefore \text{ EDP Hiperbólica,} \\ \Delta = 0 & \Leftrightarrow \lambda = 4/21 & \therefore \text{ EDP Parabólica,} \\ \Delta < 0 & \Leftrightarrow \lambda > 4/21 & \therefore \text{ EDP Elíptica.} \end{cases}$$

(ii) Para $\lambda = -1$, las ecuaciones características quedan: $\frac{dy}{dx} = \frac{4 \pm \sqrt{100}}{-2}$

$$y = 3x + C_1, \quad y = -7x + C_2.$$

Luego el cambio de coordenadas es $\xi = y - 3x$ y $\eta = y + 7x$. Así se tiene que:

$$\begin{aligned} u_x &= -3u_\xi + 7u_\eta \\ u_y &= u_\xi + u_\eta \\ u_{xx} &= 9u_{\xi\xi} - 42u_{\xi\eta} + 49u_{\eta\eta} \\ u_{xy} &= -3u_{\xi\xi} + 4u_{\xi\eta} + 7u_{\eta\eta} \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

sustituyendo en la EDP y reduciendo términos se tiene que $100u_{\xi\eta} = 0$, luego solo es necesario resolver

$$u_{\xi\eta} = 0,$$

esta nueva ecuación tiene como solución

$$u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta), \quad F, G \in C^2,$$

así la solución general de la EDP es:

$$u(x, y) = F(y - 3x) + G(y + 7x), \quad F, G \in C^2,$$

2. Considere el problema de hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$u_{tt} = 4u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0.$$

Determine todos los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$, tales que el problema con las condiciones $u(x, \lambda x) = f(x)$ y $u_t(x, \lambda x) = g(x)$ tenga una solución única para todo $f, g \in C^2(\mathbb{R})$

Solución: Se sabe que la solución de la ecuación de onda $u_{tt} = 4u_{xx}$ para $x \in \mathbb{R}$ y $t > 0$ se obtiene mediante la transformación $\xi = x + 2t$ y $\eta = x - 2t$, la cual reduce la ecuación a $u_{\xi\eta} = 0$ lo que permite concluir que la solución de la EDP es $u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta)$ donde F y G son funciones arbitrarias o bien:

$$u(x, t) = F(x + 2t) + G(x - 2t),$$

reemplazando las condiciones $u(x, \lambda x) = f(x)$ y $u_t(x, \lambda x) = g(x)$ se tiene

$$\begin{aligned} u(x, \lambda x) &= F(x + 2\lambda x) + G(x - 2\lambda x) = f(x) \\ u_t(x, \lambda x) &= 2F'(x + 2\lambda x) - 2G'(x - 2\lambda x) = g(x) \end{aligned}$$

derivando se obtiene un sistema de ecuaciones para $F'(x + 2\lambda x)$ y $G'(x - 2\lambda x)$

$$\begin{aligned}(1 + 2\lambda)F'(x + 2\lambda x) + (1 - 2\lambda)G'(x - 2\lambda x) &= f'(x) \\ 2F'(x + 2\lambda x) - 2G'(x - 2\lambda x) &= g(x)\end{aligned}$$

el cual tiene como soluciones

$$F'(x + 2\lambda x) = \frac{f'(x)}{2} - \frac{(2\lambda - 1)}{4}g(x), \quad G'(x - 2\lambda x) = \frac{f'(x)}{2} - \frac{(2\lambda + 1)}{4}g(x)$$

- Si $\lambda \in \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ se tiene que integrando las ecuaciones anteriores, se obtienen las expresiones

$$\frac{F(x + 2\lambda x)}{1 + 2\lambda} = \frac{f(x)}{2} - \frac{(2\lambda - 1)g(x)}{4} + C_1,$$

$$\frac{G(x - 2\lambda x)}{1 - 2\lambda} = \frac{f(x)}{2} - \frac{(2\lambda + 1)g(x)}{4} + C_2,$$

como C_1 y C_2 están en \mathbb{R} hay infinitas soluciones.

- Si $\lambda = \frac{1}{2}$ se tiene que $G'(0) = \frac{f'(x) - g(x)}{2}$ y además $2F'(2x) = f'(x)$, luego $F(2x) = f(x) + C_1$, es decir, si $f'(x) - g(x) \in \mathbb{R}$ hay infinitas soluciones y si $f'(x) - g(x) = h(x)$ no hay soluciones.

- Si $\lambda = -\frac{1}{2}$ se tiene que $F'(0) = \frac{f'(x) + g(x)}{2}$ y además $2G'(2x) = f'(x)$, luego $G(2x) = f(x) + C_2$, es decir, si $f'(x) + g(x) = k \in \mathbb{R}$ hay infinitas soluciones y si $f'(x) + g(x) = h(x)$ no hay soluciones.

3. Para $f(x)$ una función continua sobre todo \mathbb{R} considere el problema: Hallar $u = u(x, y)$ tal que

$$\begin{cases} u_{xx} &= 2u_{xy} + 3u_{yy} & x \in \mathbb{R}, \quad y > 0, \\ u(x, -x) &= f(x) & x \in \mathbb{R}, \\ u_y(x, -x) &= 1 & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

(i) Clasifique la ecuación diferencial parcial según su forma normal.

(ii) Encuentre la solución general del problema propuesto.

Sugerencia: Considere el cambio de coordenadas $\eta = x + y$, $\xi = x$ y observe que las condiciones iniciales del problema están puestas sobre la recta $y = -x$.

Solución:

- (i) Se tiene que el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$, con $a = 1$, $b = -2$ y $c = -3$. esta dado por:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 16 \implies \Delta > 0 \quad \therefore \text{ EDP Hiperbólica}$$

- (ii) Las condiciones iniciales del problema $u(x, -x) = f(x)$ y $u_y(x, -x) = 1$ están sobre la recta $y = -x$, luego usando el cambio de coordenadas entregado se tiene que las nuevas condiciones iniciales son:

$$u(\xi, 0) = f(\xi), \quad u_\eta(\xi, 0) = 1.$$

Ademas se observa que:

$$\begin{aligned}u_x &= u_\xi + u_\eta \\ u_y &= u_\eta \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \\ u_{xy} &= u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \\ u_{yy} &= u_{\eta\eta}\end{aligned}$$

sustituyendo los términos anteriores en la EDP se obtiene que:

$$u_{\eta\eta} = \frac{1}{4}u_{\xi\xi}$$

la cual es una ecuación de Onda. La resolución de esta última ecuación pasa por el uso de la fórmula D'Alembert, se tiene que:

$$u(\xi, \eta) = \frac{f(\xi + \frac{1}{2}\eta) + f(\xi - \frac{1}{2}\eta)}{2} + \int_{\xi - \frac{1}{2}\eta}^{\xi + \frac{1}{2}\eta} d\tau = \frac{f(\xi + \frac{1}{2}\eta) + f(\xi - \frac{1}{2}\eta)}{2} + \eta,$$

la solución final de la ecuación es

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \left\{ f\left(\frac{y+3x}{2}\right) + f\left(\frac{x-y}{2}\right) \right\} + x + y$$

4. Determine la solución general $u = u(x, t)$ de la ecuación diferencial parcial

$$u_{xx} + 4u_x + 4u_t = u_{tt} + 4(x-t)e^{-2(x-t)}.$$

Solución: Notamos que la ecuación característica de esta EDP es $\frac{dx}{dt} = \pm 1$ y corresponde a ser una ecuación del tipo Hiperbólica. Luego las curvas características son

$$\eta = x - t \quad \xi = x + t,$$

de esta forma se reduce la EDP a su forma normal, para esto

$$\begin{aligned} u_x &= u_\eta + u_\xi \\ u_{xx} &= u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta} + u_{\xi\xi} \\ u_t &= -u_\eta + u_\xi \\ u_{tt} &= u_{\eta\eta} - 2u_{\xi\eta} + u_{\xi\xi} \end{aligned}$$

luego

$$u_{xx} + 4u_x + 4u_t = u_{tt} + 4(x-t)e^{-2(x-t)} \implies u_{\xi\eta} + 2u_\xi = \eta e^{-2\eta},$$

la cual es una EDO de primer orden para $w = u_\xi$, es decir, $w_\eta + 2w = \eta e^{-2\eta}$. Con solución dada por

$$w = \frac{\eta^2}{2} e^{-2\eta} + f(\xi) e^{-2\eta} \implies u = \frac{\xi \eta^2}{2} e^{-2\eta} + F(\xi) e^{-2\eta} + G(\eta),$$

con F y G funciones arbitrarias, de esta forma la solución final de la EDP es

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(x+t)(x-t)^2 e^{-2(x-t)} + F(x+t) e^{-2(x-t)} + G(x-t)$$

5. Encuentre la solución general del problema: Hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$t^5 u_{xx} + 2u_t = t u_{tt}, \quad t > 0$$

posteriormente encuentre la solución si se tienen las condiciones $u(0, t) = \frac{t^6}{9}$ y $u_x(0, t) = 1$.

Solución: Las ecuaciones características vienen dadas por $x'(t) = \pm t^2$, de esta forma las curvas características son $x = \pm \frac{t^3}{3}$, luego el cambio de coordenadas a utilizar es $r = x + \frac{t^3}{3}$ y $s = x - \frac{t^3}{3}$, lo cual al ser reemplazado en la ecuación permite obtener

$$t^4 u_{rs} = 0,$$

como $t > 0$ se tiene que la solución general es

$$u(r, s) = f(r) + g(s)$$

con f y g funciones arbitrarias, luego al volver a las variables originales se tiene que

$$u(x, t) = f\left(x + \frac{t^3}{3}\right) + g\left(x - \frac{t^3}{3}\right),$$

al imponer las condiciones se tiene que

$$f\left(\frac{t^3}{3}\right) + g\left(-\frac{t^3}{3}\right) = \frac{t^6}{9}$$

y también

$$f'\left(\frac{t^3}{3}\right) + g'\left(-\frac{t^3}{3}\right) = 1$$

e integrando respecto a t se tiene que

$$f\left(\frac{t^3}{3}\right) - g\left(-\frac{t^3}{3}\right) = \frac{t^3}{3} + c$$

luego tomando $z = \frac{t^3}{3}$ se logra obtener $f(z) = \frac{1}{2}(z^2 + z + c)$ y $g(z) = \frac{1}{2}(z^2 + z - c)$. Así la solución final es

$$u(x, t) = x + \frac{1}{2} \left[\left(x + \frac{t^3}{3}\right)^2 + \left(x - \frac{t^3}{3}\right)^2 \right]$$

6. Resuelva el problema de Sturm Liouville: Hallar $m(x)$ y λ tal que

$$m''(x) + \lambda m(x) = 0, \quad 0 < x < \ell$$

sujeto a las condiciones de contorno o de borde:

- (i) $m(0) = m(\ell) = 0$.
- (ii) $m'(0) = m'(\ell) = 0$.
- (iii) $m(0) = m'(\ell) = 0$.
- (iv) $m'(0) = m(\ell) = 0$.
- (v) $m(0) + m'(0) = 0, m(\ell) = 0$.
- (vi) $m(0) = m(\ell), m'(0) = m'(\ell)$.
- (vii) $m(0) - m'(0) = 0, m(\ell) - m'(\ell) = 0$

Solución: Analizamos directamente el caso $\lambda > 0$ pues no entrega soluciones no nulas, en tal caso, la solución de la ecuación viene dada como

$$m(x) = a \cos \sqrt{\lambda}x + b \sin \sqrt{\lambda}x$$

- (i) $m(0) = m(\ell) = 0$. Al imponer las condiciones tenemos que $\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{\ell^2}$ luego $m_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{\ell}$.
- (ii) $m'(0) = m'(\ell) = 0$. Similar al caso anterior al imponer las condiciones tenemos que $\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{\ell^2}$ luego $m_k(x) = \cos \frac{k\pi x}{\ell}$.
- (iii) $m(0) = m'(\ell) = 0$. Tenemos que $\lambda_k = \frac{(2k+1)^2\pi^2}{4\ell^2}$ y $m_k(x) = \sin \sqrt{\lambda_k}x$.
- (iv) $m'(0) = m(\ell) = 0$. También es similar al caso anterior, así tenemos que $\lambda_k = \frac{(2k+1)^2\pi^2}{4\ell^2}$ y $m_k(x) = \cos \sqrt{\lambda_k}x$.
- (v) $m(0) + m'(0) = 0, m(\ell) = 0$. Tenemos que $\lambda = \lambda_k$ satisface $\sqrt{\lambda_k} = \tan \sqrt{\lambda_k}\ell$ y las funciones propias son: $\sin \sqrt{\lambda_k}x$ y $\cos \sqrt{\lambda_k}x$.
- (vi) $m(0) = m(\ell), m'(0) = m'(\ell)$. El valor propio es $\lambda_k = \frac{4k^2\pi^2}{\ell^2}$ y las funciones propias son: $\sin \sqrt{\lambda_k}x$ y $\cos \sqrt{\lambda_k}x$.
- (vii) $m(0) - m'(0) = 0, m(\ell) - m'(\ell) = 0$. Para este caso tenemos que el valor propio es $\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{\ell^2}$ así la funciones propias son: $\sin \sqrt{\lambda_k}x$ y $\cos \sqrt{\lambda_k}x$.

7. Resuelva el siguiente problema: Hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} u_t + u_{xx} = \sin(x) & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 2 & t > 0, \\ u(\pi, t) = 6 & t > 0, \\ u_t(x, 0) = 10 \sin(5x) & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Solución:

El problema es no homogéneo por lo cual utilizamos que $u(x, t) = v(x, t) + \phi(x)$, así la función $\phi(x)$ satisface la ecuación diferencial $\phi''(x) = \sin(x)$ con las condiciones $\phi(0) = 2$ y $\phi(\pi) = 6$, la cual tiene como solución $\phi(x) = -\sin(x) + c_1x + c_2$, imponiendo las condiciones se obtiene que $\phi(x) = -\sin(x) + \frac{4x}{\pi} + 2$. Luego el problema homogéneo a resolver es:

$$\begin{cases} v_t + v_{xx} = 0 & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ v(0, t) = 0 & t > 0, \\ v(\pi, t) = 0 & t > 0, \\ v_t(x, 0) = 10 \sin(5x) & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Utilizamos $v(x, t) = m(x)n(t)$ luego al reemplazar en la ecuación y usando el método de separación de variables se llega a

$$\frac{m''(x)}{m(x)} = \frac{n'(t)}{-n(t)} = -\lambda,$$

el problema de contorno asociado es $m''(x) + \lambda m(x) = 0$ sujeto a las condiciones $m(0) = m(\pi) = 0$, así las soluciones son $\lambda_k = k^2$ y $m_k(x) = \sin(kx)$. Mientras que el problema para la variable temporal es:

$$n'_k(t) - kn_k(t) = 0,$$

el cual tiene como solución $n_k(t) = a_k e^{k^2 t}$, de esta forma la solución de la ecuación diferencial sin imponer condiciones iniciales es:

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{k^2 t} \sin(kx),$$

imponiendo la condición inicial se tiene que

$$v_t(x, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 a_k \sin(kx) = 10 \sin(5x),$$

igualando coeficientes se tiene que $a_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N} - \{5\}$, mientras que para $k = 5$ se tiene $a_5 = \frac{2}{5}$. Así la solución final del problema es

$$u(x, t) = \frac{2}{5} e^{25t} \sin(5x) - \sin(x) + \frac{4x}{\pi} + 2.$$

8. Obtener la solución de la siguiente ecuación diferencial parcial es

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 & t > 0, \\ u(x, 0) = 4 \sin(4x) & 0 < x < \pi, \\ u_t(x, 0) = 0 & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Solución: Consideramos $u(x, t) = m(x)n(t)$ de esta forma tenemos que

$$\frac{m''(x)}{m(x)} = \frac{n''(t)}{n(t)} = -\lambda$$

luego el problema de Sturm Liouville es $m''(x) + \lambda m(x) = 0$ sujeto a las condiciones $m(0) = m(\pi) = 0$ el cual tiene como valor propio $\lambda_k = k^2$ y función propia $m_k(x) = \sin(kx)$. Similarmente la solución del problema temporal $n_k''(t) + \lambda_k n_k(t) = 0$ es $n_k(t) = a_k \sin(kt) + b_k \cos(kt)$. Así

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \sin(kt) + b_k \cos(kt)) \sin kx,$$

si reemplazamos la condición $u(x, 0) = 4 \sin(4x)$ obtenemos que $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin(kx) = 4 \sin(4x)$, obteniéndose $b_4 = 4$ y $b_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N} - \{4\}$, luego si reemplazamos la condición $u_t(x, 0) = 0$ obtenemos que $a_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Concluyéndose que la solución final es

$$u(x, t) = 4 \cos(4t) \sin(4x).$$

9. Resuelva el siguiente problema: Hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} u_{tt} = 2u_{xx} - u_t & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = u(\pi, t) = 0 & t > 0, \\ u(x, 0) = 0 & 0 < x < \pi, \\ u_t(x, 0) = \cos\left(\frac{3x}{2}\right) & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Solución:

Para la resolución de la EDP, se procede mediante separación de variables para esto construimos la solución como $u(x, t) = m(x)n(t)$, donde se tiene que:

$$u_{tt} = 2u_{xx} - u_t \quad \rightarrow \quad \frac{m''(x)}{m(x)} = \frac{n''(t) + n'(t)}{2n(t)} = -\lambda$$

de lo anterior se genera un problema de contorno, el cual consiste en: Hallar $m(x)$ y λ tal que

$$m''(x) + \lambda m(x) = 0, \quad m'(0) = 0, \quad m(\pi) = 0,$$

las soluciones a este problema son $m_k(x) = \cos(\sqrt{\lambda_k}x)$ y $\lambda_k = \frac{(1+2k)^2}{4}$. Posteriormente se genera el problema temporal asociado, el cual esta dado por

$$n_k''(t) + n_k'(t) + 2\lambda_k n_k(t) = 0$$

tal problema tiene como solución:

$$n_k(t) = a_k e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{8\lambda_k - 1}}{2}t\right) + b_k e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{8\lambda_k - 1}}{2}t\right)$$

de este modo la solución de la ecuación diferencial parcial sin imponer la condición inicial es:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{8\lambda_k - 1}}{2}t\right) \cos(\sqrt{\lambda_k}x) + b_k e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{8\lambda_k - 1}}{2}t\right) \cos(\sqrt{\lambda_k}x)$$

imponiendo la condición $u(x, 0) = 0$ se tiene que

$$u(x, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(\sqrt{\lambda_k}x) = 0,$$

es decir $a_k = 0$ para $k \geq 0$, ahora imponiendo la condición $u_t(x, 0) = \cos\left(\frac{3x}{2}\right)$ se obtiene que

$$u_t(x, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sqrt{8\lambda_k - 1} b_k}{2} \cos(\sqrt{\lambda_k}x) = \cos\left(\frac{3x}{2}\right)$$

donde $b_k = 0$ si $k \neq 1$ mientras que para $k = 1$ se obtiene $b_1 = \frac{2}{\sqrt{8\lambda_1 - 1}}$, de este modo la solución final de la EDP es:

$$u(x, t) = b_1 e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{8\lambda_1 - 1}}{2} t\right) \cos(\sqrt{\lambda_1} x), \quad \lambda_1 = \frac{9}{4}.$$

10. Resuelva el siguiente problema: Hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} u_t &= u_{xx} - 6x & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) &= 0 & t > 0, \\ u(1, t) &= 3 & t > 0, \\ u_t(x, 0) &= 8\pi^2 \sin(2\pi x) & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Solución: El problema es no homogéneo por lo cual lo descomponemos en una parte homogénea y no homogénea, para esto tomamos $u(x, t) = v(x, t) + \phi(x)$, donde la función $\phi(x)$ se construye de modo que se tenga un problema homogéneo para $v = v(x, t)$.

De lo anterior tenemos que $\phi(x)$ satisface la ecuación diferencial $\phi''(x) = 6x$ con las condiciones $\phi(0) = 0$ y $\phi(1) = 3$, al resolver se obtiene que $\phi(x) = x^3 + 2x$. Luego el problema homogéneo corresponde a: Hallar $v = v(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} v_t &= v_{xx} & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ v(0, t) &= 0 & t > 0, \\ v(1, t) &= 0 & t > 0, \\ v_t(x, 0) &= 8\pi^2 \sin(2\pi x) & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Para resolver este último problema usamos separación de variables, es decir, tomamos $v(x, t) = m(x)n(t)$ luego al reemplazar en la ecuación y separar las variables se llega a

$$\frac{m''(x)}{m(x)} = \frac{n'(t)}{n(t)} = -\lambda.$$

• El problema de contorno generado es $m''(x) + \lambda m(x) = 0$ bajo las condiciones $m(0) = m(1) = 0$, cuyo valor propio es $\lambda_k = k^2\pi^2$ y la respectiva función propia es $m_k(x) = \sin(k\pi x)$.

• Para cada $k \in \mathbb{N}_0$ se resuelve el problema para la variable temporal, el cual es $n'_k(t) + \lambda_k n_k(t) = 0$, en tal caso la solución viene dada por $n_k(t) = a_k e^{-k^2\pi^2 t}$.

De forma la solución de la ecuación diferencial sin imponer las condiciones iniciales es:

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{-k^2\pi^2 t} \sin(k\pi x),$$

imponiendo la condición inicial se tiene que

$$v_t(x, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (-k^2\pi^2) \sin(k\pi x) = 8\pi^2 \sin(2\pi x),$$

igualando coeficientes se tiene que $a_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N} - \{2\}$, mientras que para $k = 2$ se tiene $a_2(-4\pi^2) = 8\pi^2$, así $a_2 = -2$. De este modo la solución final de la ecuación diferencial parcial es:

$$u(x, t) = x^3 + 2x - 2e^{-4\pi^2 t} \sin(2\pi x)$$

11. Encuentre la solución $u = u(r, \theta)$ de la ecuación de Laplace:

$$\begin{cases} r^2 u_{rr} + r u_r + u_{\theta\theta} &= 0 & 1 < r < 2, \quad 0 < \theta < \pi, \\ u_{\theta}(r, 0) &= u_{\theta}(r, \pi) &= 0 & 1 < r < 2, \\ u(1, \theta) &= 4 & 0 < \theta < \pi, \\ u_r(2, \theta) &= 1 + 5 \cos(\theta) & 0 < \theta < \pi, \end{cases}$$

Solución:

Utilizamos $u(r, \theta) = m(\theta)n(r)$ luego al reemplazar en la ecuación y usando el método de separación de variables se llega a

$$\frac{m''(\theta)}{m(\theta)} = \frac{r^2 n''(r) + rn'(r)}{-n(r)} = -\lambda,$$

el problema de contorno asociado es $m''(\theta) + \lambda m(\theta) = 0$ sujeto a las condiciones $m'(0) = m'(\pi) = 0$, así las soluciones son $\lambda_k = k^2$ y $m_k(\theta) = \cos(k\theta)$. Mientras que el problema para la variable radial es:

$$r^2 n_k''(r) + rn_k'(r) - \lambda_k n_k(r) = 0,$$

de esta forma la solución de la ecuación diferencial sin imponer condiciones iniciales es:

$$u(r, \theta) = a_0 \ln(r) + b_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k r^k \cos(k\theta) + b_k r^{-k} \cos(k\theta),$$

imponiendo la condición inicial $u(1, \theta) = 4$ se tiene que

$$u(1, \theta) = b_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\theta) + b_k \cos(k\theta) = 4,$$

igualando coeficientes se tiene que $b_0 = 4$ y $a_k + b_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Ahora imponiendo la condición inicial $u_r(2, \theta) = 1 + 5 \cos(\theta)$ se tiene que

$$u_r(2, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (ka_k 2^{k-1} - kb_k 2^{-k-1}) \cos(k\theta) = 1 + 5 \cos(\theta),$$

igualando coeficientes se tiene que $a_0 = 2$ y $ka_k 2^{k-1} - kb_k 2^{-k-1} = 0$ para todo $k \in \mathbb{N} - \{1\}$, mientras que para $k = 1$ se tiene $a_1 - \frac{b_1}{4} = 5$, resolviendo el sistema se llega a $a_1 = 4$ y $b_1 = -4$. Así la solución final del problema es

$$u(r, \theta) = 2 \ln(r) + 4 + 4r \cos(\theta) - 4r^{-1} \cos(\theta),$$

12. Considere el problema de valores propios

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0, \quad y(0) + y(1) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

(i) ¿Es un problema de Sturm Liouville?.

(ii) Resuelva el siguiente problema: Hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} u_t + u &= 2tu_{xx} & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= -u(1, t) & t > 0, \\ u_x(0, t) &= 0 & t > 0, \\ u(x, 0) &= x & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Solución:

(i) Es suficiente probar que los valores propios están en los reales y las funciones propias son ortogonales. La solución de la ecuación diferencial viene dada por $y(x) = a \cos \sqrt{\lambda}x + b \sin \sqrt{\lambda}x$ luego al imponer las condiciones dadas se tiene que de $y'(0) = 0$ se llega a $b\sqrt{\lambda} = 0$, de este modo $b = 0$ luego de la condición $y(0) + y(1) = 0$ se obtiene que $\cos \sqrt{\lambda} = -1$, de este modo $\lambda_k = \pi^2(1 + 2k)^2 \in \mathbb{R}$ y las funciones propias $y_k(x) = \cos \sqrt{\lambda_k}x$ son ortogonales. En efecto

$$\begin{aligned}
\langle y_k(x), y_m(x) \rangle &= \int_0^1 \cos \sqrt{\lambda_k} x \cos \sqrt{\lambda_m} x dx = \int_0^1 \cos \pi(1+2k)x \cos \pi(1+2m)x dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\cos(\pi(1+2k)x + \pi(1+2m)x) + \cos(\pi(1+2k)x - \pi(1+2m)x) \right] dx \\
&= \frac{\sin(\pi(1+2k) + \pi(1+2m))}{2\pi(1+2k) + 2\pi(1+2m)} - \frac{\sin(\pi(1+2k) - \pi(1+2m))}{2\pi(1+2k) - 2\pi(1+2m)} = 0, \quad k \neq m. \\
\langle y_k(x), y_k(x) \rangle &= \int_0^1 \cos^2 \pi(1+2k)x dx, \\
&= \int_0^1 \left(\frac{1 - \cos 2\pi(1+2k)x}{2} \right) dx = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

(ii) Para la resolución de la EDP, se procede mediante separación de variables para esto tomamos $u(x, t) = m(x)n(t)$ luego

$$u_t + u = 2tu_{xx} \quad \rightarrow \quad \frac{m''(x)}{m(x)} = \frac{n'(t) + n(t)}{2tn(t)} = -\lambda$$

el cual genera el problema $m''(x) + \lambda m(x) = 0$ sujeto a las condiciones $u(0, t) + u(1, t) = 0$, $u_x(0, t) = 0$, cuya solución es $m_k(x) = \cos \pi(1+2k)x$ y $\lambda_k = \pi^2(1+2k)^2$ y el problema temporal es $n'_k(t) + (1+2t\lambda_k)n_k(t) = 0$ cuya solución es $n_k(t) = a_k e^{-t-\lambda_k t^2}$, de este modo la solución de la ecuación sin imponer la condición inicial es

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{-t-\lambda_k t^2} \cos \pi(1+2k)x$$

imponiendo la condición $u(x, 0) = x$ y usando la ortogononalidad de las funciones propias se tiene que

$$u(x, 0) = x = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos \pi(1+2k)x \quad \rightarrow \quad a_k = \frac{\langle x, m_k(x) \rangle}{\langle m_k(x), m_k(x) \rangle} = 2 \int_0^1 x \cos \pi(1+2k)x dx = \frac{-4}{(\pi + 2k\pi)^2}$$

luego la solución final de la ecuación es

$$u(x, t) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4e^{-t-\lambda_k t^2} \cos \pi(1+2k)x}{(\pi + 2k\pi)^2}$$

13. Determine soluciones acotadas para el problema: Hallar $u = u(r, \theta)$ tal que

$$\left\{ \begin{array}{lll} r^2 u_{rr} + r u_r & = & 6\theta - u_{\theta\theta} \quad r > 1, \quad 0 < \theta < \pi, \\ u_{\theta}(r, 0) & = & 0 \quad r > 1, \\ u_{\theta}(r, \pi) & = & 3\pi^2 \quad r > 1, \\ u(1, \theta) & = & 4 + \theta^3 + 6 \cos 3\theta \quad 0 < \theta < \pi. \end{array} \right.$$

Solución:

El problema es no homogéneo por lo cual utilizamos que $u(r, \theta) = v(r, \theta) + \phi(\theta)$, así la función $\phi(\theta)$ satisface la ecuación diferencial $\phi''(\theta) = 6\theta$ con las condiciones $\phi'(0) = 0$ y $\phi'(\pi) = 3\pi^2$, la cual tiene como solución $\phi(\theta) = \theta^3 + b$ con $b \in \mathbb{R}$, tomamos $b = 4$. Luego el problema homogéneo a resolver es:

$$\left\{ \begin{array}{lll} r^2 v_{rr} + r v_r & = & -v_{\theta\theta} \quad r > 1, \quad 0 < \theta < \pi, \\ v_{\theta}(r, 0) & = & 0 \quad r > 1, \\ v_{\theta}(r, \pi) & = & 0 \quad r > 1, \\ v(1, \theta) & = & 6 \cos 3\theta \quad 0 < \theta < \pi, \end{array} \right.$$

Utilizamos $v(r, \theta) = m(\theta)n(r)$ luego al reemplazar en la ecuación y usando el método de separación de variables se llega a

$$\frac{m''(\theta)}{m(\theta)} = \frac{r^2 n''(r) + r n'(r)}{-n(r)} = -\lambda,$$

el problema de contorno asociado es $m''(\theta) + \lambda m(\theta) = 0$ sujeto a las condiciones $m'(0) = m'(\pi) = 0$, así las soluciones son $\lambda_k = k^2$ y $m_k(\theta) = \cos(k\theta)$. Mientras que el problema para la variable radial es:

$$r^2 n_k''(r) + r n_k'(r) - \lambda_k n_k(r) = 0,$$

de esta forma la solución de la ecuación diferencial sin imponer condiciones iniciales

$$v(r, \theta) = a_0 \ln(r) + b_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k r^k \cos k\theta + b_k r^{-k} \cos k\theta,$$

buscamos soluciones acotadas, de este modo pedimos que $\lim_{r \rightarrow +\infty} v(r, \theta) < +\infty$, así $a_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Luego imponiendo la condición inicial se tiene que

$$v(1, \theta) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \cos k\theta = 6 \cos 3\theta,$$

igualando coeficientes se tiene que $b_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N} - \{3\}$, mientras que para $k = 3$ se tiene $b_3 = 6$. Así la solución final del problema es

$$u(r, \theta) = \theta^3 + 4 + 6r^{-3} \cos 3\theta.$$

14. Determine la solución $u = u(x, t)$ de la siguiente ecuación diferencial parcial

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} &= 2t + 4te^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= u(1, t) & t > 0, \\ u_x(0, t) &= u_x(1, t) & t > 0, \\ u(x, 0) &= \cos(2\pi x) & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Solución:

Procedemos mediante variación de parámetros, para esto consideramos el problema de Sturm Liouville o de contorno asociado a la EDP, el cual es: Hallar $m(x)$ y λ tal que

$$m_k''(x) + \lambda_k m_k(x) = 0, \quad m_k(0) = m_k(1), \quad m_k'(0) = m_k'(1)$$

el cual tiene como valor propio $\lambda_k = 4k^2\pi^2$ y función propia $m_k(x) = a_k \cos(2k\pi x) + b_k \sin(2k\pi x)$. De este modo se propone como solución del problema

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(t) \cos(2k\pi x) + b_k(t) \sin(2k\pi x),$$

si reemplazamos la condición $u(x, 0) = \cos(2\pi x)$ obtenemos que

$$\cos(2\pi x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(0) \cos(2k\pi x) + b_k(0) \sin(2k\pi x),$$

así $b_k(0) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$ y $a_k(0) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0 - \{1\}$ mientras que para $k = 1$ se tiene $a_1(0) = 1$. Luego si reemplazamos la solución propuesta en la ecuación diferencial tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k'(t) \cos(2k\pi x) + b_k'(t) \sin(2k\pi x) + \sum_{k=0}^{+\infty} 4a_k(t)k^2\pi^2 \cos(2k\pi x) + 4b_k(t)k^2\pi^2 \sin(2k\pi x) &= 2t + 4te^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) \\ \sum_{k=0}^{+\infty} \left(a_k'(t) + 4a_k(t)k^2\pi^2 \right) \cos(2k\pi x) + \left(b_k'(t) + 4b_k(t)k^2\pi^2 \right) \sin(2k\pi x) &= 2t + 4te^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) \end{aligned}$$

igualando coeficiente a coeficiente se tiene que

$$\begin{aligned} a'_k(t) + 4k^2\pi^2 a_k(t) &= 0, & a_k(0) &= 0, & k > 1, \\ b'_k(t) + 4k^2\pi^2 b_k(t) &= 0, & b_k(0) &= 0, & k \in \mathbb{N}_0, \\ a'_1(t) + 4\pi^2 a_1(t) &= 4te^{-4\pi^2 t}, & a_1(0) &= 1 \\ a'_0(t) &= 2t, & a_0(0) &= 0 \end{aligned}$$

del cual tenemos como solución $b_k(t) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$ y $a_k(t) = 0$ para todo $k > 1$, mientras que

$$\begin{aligned} a_1(t) &= e^{-4\pi^2 t} + e^{-4\pi^2 t} \int_0^t 4\tau d\tau = (1 + 2t^2)e^{-4\pi^2 t}, \\ a_0(t) &= t^2. \end{aligned}$$

Luego la solución de la ecuación diferencial parcial es

$$u(x, t) = t^2 + (1 + 2t^2)e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x)$$

15. Determine la solución $u = u(x, t)$ de la siguiente ecuación diferencial parcial

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 2tx^2 - 2xt - 2t^2 + 16\pi^4 t \cos 2\pi x & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) & t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(1, t) - 2t^2 & t > 0, \\ u(x, 0) = \cos 2\pi x & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Sugerencia: Considere $u(x, t) = w(x, t) + (ax^2 + bx + c)t^2$ donde a, b y c son constantes a determinar.

Solución: Utilizando la sustitución indicada $u(x, t) = w(x, t) + (ax^2 + bx + c)t^2$ se tiene que

$$\begin{aligned} u_t &= w_t + (ax^2 + bx + c)2t \\ u_x &= w_x + (2ax + b)t^2 \\ u_{xx} &= w_{xx} + 2at^2 \end{aligned}$$

Utilizando la condición $u(0, t) = u(1, t)$ se tiene que $w(0, t) + ct^2 = (a + b + c)t^2 + w(1, t)$ de este modo si tiene que $a + b = 0$ la condición de borde sería $w(0, t) = w(1, t)$. Posteriormente usando la condición $u_x(0, t) = u_x(1, t) - 2t^2$ se tiene que $w_x(0, t) + bt^2 = w_x(1, t) + (2a + b)t^2 - 2t^2$ así se tiene que $2a - 2 = 0$ para obtener $w_x(0, t) = w_x(1, t)$. Luego

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Reemplazando en la ecuación se obtiene

$$\begin{aligned} u_t - u_{xx} &= w_t + (x^2 - x + c)2t - w_{xx} - 2t^2 \\ &= w_t - w_{xx} + 2x^2t + 2ct - 2xt - 2t^2 + 16\pi^4 t \cos 2\pi x \\ &= 2tx^2 - 2xt - 2t^2 + 16\pi^4 t \cos 2\pi x, \end{aligned}$$

tomando $c = 0$ se tiene que $w_t - w_{xx} = 16\pi^4 t \cos 2\pi x$. Luego solo es necesario resolver el problema

$$\begin{cases} w_t - w_{xx} = 16\pi^4 t \cos 2\pi x & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ w(0, t) = w(1, t) & t > 0, \\ w_x(0, t) = w_x(1, t) & t > 0, \\ w(x, 0) = \cos 2\pi x & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Procedemos mediante variación de parámetros, para esto consideremos el problema de Sturm Liouville o de contorno, $m''_k(x) + \lambda_k m_k(x) = 0$ sujeto a las condiciones $m_k(0) = m_k(1)$ y $m'_k(0) = m'_k(1)$ el cual tiene como valor propio $\lambda_k = 4k^2\pi^2$ y función propia $m_k(x) = \hat{a}_k \cos 2k\pi x + \hat{b}_k \sin 2k\pi x$. De este modo se propone como solución del problema

$$w(x, t) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(t) \cos 2k\pi x + b_k(t) \sin 2k\pi x,$$

si reemplazamos la condición $w(x, 0) = \cos 2\pi x$ obtenemos que

$$\cos 2\pi x = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(0) \cos 2k\pi x + b_k(0) \sin 2k\pi x,$$

así $b_k(0) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$ mientras que $a_1 = 1$ y $a_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0 - \{1\}$. Luego si reemplazamos en la ecuación diferencial tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} a'_k(t) \cos 2k\pi x + b'_k(t) \sin 2k\pi x + \sum_{k=0}^{+\infty} 4a_k(t)k^2\pi^2 \cos 2k\pi x + 4b_k(t)k^2\pi^2 \sin 2k\pi x &= 16\pi^4 t \cos 2\pi x \\ \sum_{k=0}^{+\infty} \left(a'_k(t) + 4a_k(t)k^2\pi^2 \right) \cos 2k\pi x + \left(b'_k(t) + 4b_k(t)k^2\pi^2 \right) \sin 2k\pi x &= 16\pi^4 t \cos 2\pi x \end{aligned}$$

igualando coeficiente a coeficiente se tiene que

$$\begin{aligned} a'_k(t) + 4k^2\pi^2 a_k(t) &= 0, & a_k(0) &= 0 \\ b'_k(t) + 4k^2\pi^2 b_k(t) &= 0, & b_k(0) &= 0 \\ a'_1(t) + 4\pi^2 a_1(t) &= 16\pi^4 t, & a_1(0) &= 1 \end{aligned}$$

del cual tenemos como solución $b_k(t) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$ y $a_k(t) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0 - \{1\}$, mientras que

$$a_1(t) = e^{-4\pi^2 t} + e^{-4\pi^2 t} \int_0^t 16\pi^2 \tau e^{4\pi^2 \tau} d\tau = 4t - \frac{1}{\pi^2} + e^{-4\pi^2 t} \left(1 + \frac{1}{\pi^2} \right),$$

luego la solución de la ecuación diferencial es

$$u(x, t) = (x^2 - x)t^2 + \left[4t - \frac{1}{\pi^2} + e^{-4\pi^2 t} \left(1 + \frac{1}{\pi^2} \right) \right] \cos(2\pi x)$$

16. Sean $f(\theta)$ y $g(\theta)$ dos funciones acotadas en todo \mathbb{R} y $a > 0$, mediante el método de separación de variables encuentre una solución acotada para el problema

$$\left\{ \begin{array}{ll} r^2 u_{rr} + r u_r + u_{\theta\theta} &= g(\theta) \quad a < r < +\infty, \quad 0 < \theta < \pi, \\ u(r, 0) &= A \quad a < r < +\infty, \\ u_\theta(r, \pi) &= B \quad a < r < +\infty, \\ u_r(a, \theta) &= f(\theta) \quad 0 < \theta < \pi, \end{array} \right.$$

donde $A, B \in \mathbb{R}$.

Solución: El problema es no homogéneo por lo cual utilizamos que $u(r, \theta) = v(r, \theta) + \phi(\theta)$, así la función $\phi(\theta)$ satisface la ecuación diferencial $\phi''(\theta) = g(\theta)$ con las condiciones $\phi(0) = A$ y $\phi(\pi) = B$. Luego el problema homogéneo es

$$\left\{ \begin{array}{ll} r^2 v_{rr} + r v_r + v_{\theta\theta} &= 0 \quad a < r < +\infty, \quad 0 < \theta < \pi, \\ v(r, 0) &= 0 \quad a < r < +\infty, \\ v_\theta(r, \pi) &= 0 \quad a < r < +\infty, \\ v_r(a, \theta) &= f(\theta) \quad 0 < \theta < \pi, \end{array} \right.$$

suponiendo como solución $v(r, \theta) = m(\theta)n(r)$ el problema de contorno es $m''(\theta) + \lambda m(\theta) = 0$ bajo las condiciones $m(0) = m'(\pi) = 0$, así $\lambda_k = (k + 1/2)^2$ y la función propia es $m_k(\theta) = \sin \sqrt{\lambda_k} \theta$. Mientras que el problema para el radio es

$$r^2 n''_k(r) + r n'_k(r) - \lambda_k n_k(r) = 0,$$

así, el problema homogéneo tiene como solución

$$v(r, \theta) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k r^{-\sqrt{\lambda_k}} \sin \sqrt{\lambda_k} \theta,$$

imponiendo la condición inicial se logra que

$$f(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\sqrt{\lambda_k} \right) a_k a^{-\sqrt{\lambda_k}-1} \sin \sqrt{\lambda_k} \theta,$$

así $a_k = -\frac{2a^{\sqrt{\lambda_k}+1}}{\pi\sqrt{\lambda_k}} \int_0^{\pi} f(\xi) \sin \sqrt{\lambda_k} \xi d\xi$. La solución final del problema es

$$v(r, \theta) = -\sum_{k=0}^{\infty} r^{-\sqrt{\lambda_k}} \sin \sqrt{\lambda_k} \theta \frac{2a^{\sqrt{\lambda_k}+1}}{\pi\sqrt{\lambda_k}} \int_0^{\pi} f(\xi) \sin \sqrt{\lambda_k} \xi d\xi,$$

con

$$u(r, \theta) = v(r, \theta) + \phi(\theta)$$

17. Determine la solución $u = u(x, t)$ de la siguiente ecuación diferencial parcial

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} &= t + 16\pi^4 t \cos 2\pi x & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= u(1, t) & t > 0, \\ u_x(0, t) &= u_x(1, t) & t > 0, \\ u(x, 0) &= \cos 2\pi x & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Solución: Procedemos mediante variación de parámetros, para esto consideremos el problema de Sturm Liouville o de contorno, $m_k''(x) + \lambda_k m_k(x) = 0$ sujeto a las condiciones $m_k(0) = m_k(1)$ y $m_k'(0) = m_k'(1)$ el cual tiene como valor propio $\lambda_k = 4k^2\pi^2$ y función propia $m_k(x) = \hat{a}_k \cos 2k\pi x + \hat{b}_k \sin 2k\pi x$. De este modo se propone como solución del problema

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(t) \cos 2k\pi x + b_k(t) \sin 2k\pi x,$$

si reemplazamos la condición $w(x, 0) = \cos 2\pi x$ obtenemos que

$$\cos 2\pi x = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(0) \cos 2k\pi x + b_k(0) \sin 2k\pi x,$$

así $b_k(0) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$ mientras que $a_1 = 1$ y $a_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0 - \{1\}$. Luego si reemplazamos en la ecuación diferencial tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k'(t) \cos 2k\pi x + b_k'(t) \sin 2k\pi x + \sum_{k=0}^{+\infty} 4a_k(t)k^2\pi^2 \cos 2k\pi x + 4b_k(t)k^2\pi^2 \sin 2k\pi x &= t + 16\pi^4 t \cos 2\pi x \\ \sum_{k=0}^{+\infty} \left(a_k'(t) + 4a_k(t)k^2\pi^2 \right) \cos 2k\pi x + \left(b_k'(t) + 4b_k(t)k^2\pi^2 \right) \sin 2k\pi x &= t + 16\pi^4 t \cos 2\pi x \end{aligned}$$

igualando coeficiente a coeficiente se tiene que

$$\begin{aligned} a_k'(t) + 4k^2\pi^2 a_k(t) &= 0, & a_k(0) &= 0 \\ b_k'(t) + 4k^2\pi^2 b_k(t) &= 0, & b_k(0) &= 0 \\ a_0'(t) &= t, & a_0(0) &= 0 \\ a_1'(t) + 4\pi^2 a_1(t) &= 16\pi^4 t, & a_1(0) &= 1 \end{aligned}$$

del cual tenemos como solución $b_k(t) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$ y $a_k(t) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}_0 - \{1\}$, mientras que

$$a_1(t) = e^{-4\pi^2 t} + e^{-4\pi^2 t} \int_0^t 16\pi^2 \tau e^{4\pi^2 \tau} d\tau = 4t - \frac{1}{\pi^2} + e^{-4\pi^2 t} \left(1 + \frac{1}{\pi^2} \right),$$

y también

$$a_0(t) = \frac{t^2}{2}.$$

luego la solución de la ecuación diferencial es

$$u(x, t) = (x^2 - x)t^2 + \left[4t - \frac{1}{\pi^2} + e^{-4\pi^2 t} \left(1 + \frac{1}{\pi^2} \right) \right] \cos 2\pi x + \frac{t^2}{2}$$

Ecuaciones Diferenciales Parciales: Problemas Propuestos

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

- (i) Hallar $u = u(x, t)$ tal que: $u_x + 2xu = xe^{-x^2}$
- (ii) Hallar $u = u(x, t)$ tal que: $tu_{xt} + u_x = t^2e^t$
- (iii) Hallar $u = u(x, t)$ tal que: $u_{xt} = x + t$
- (iv) Hallar $u = u(x, t)$ tal que: $u_{tt} + u_t = e^{-t}$
- (v) Hallar $u = u(x, t)$ tal que: $u_{xx} = x + 1$

2. Considere la EDP, $4u_{xx} + u_{yy} = 0$

- (i) ¿Qué clase de EDP es la Ecuación Considerada?.
- (ii) Encontrar un cambio de coordenadas que transforma la EDP a su forma normal.
- (iii) Resuelva la EDP.

3. Determine $u = u(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} & x \in \mathbb{R}_0^+, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u_t(x, 0) = 0 & x \in \mathbb{R}_0^+, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x). \end{cases}$$

Hint: Realizar una extensión impar a todo \mathbb{R} , y aplicar la formula D'Alembert.

4. Clasificar y reducir a su forma normal:

- (i) $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x - u_y = 0$
- (ii) $u_{xx} + 2u_{xy} + 5u_{yy} + 3u_x + u = 0$
- (iii) $y^2u_{xx} + 2xyu_{xy} - 3x^2u_{yy} = y^2xu_x - 3x^2yu_y$
- (iv) $x^2u_{xx} - y^2u_{yy} = 0$

5. Considere la ecuación diferencial parcial: Hallar $u = u(x, y)$

$$\Delta u + (x^2 + y^2)u = 0,$$

- (i) ¿Admite soluciones de la forma $u(x, y) = m(x)n(y)$?
- (ii) Transforme la ecuación a coordenadas polares. ¿Admite soluciones de la forma $u(r, \theta) = m(r)n(\theta)$?

6. Mediante el método de separación de variables resuelva la ecuación de Laplace

$$\begin{cases} r^2u_{rr} + ru_r = u_{\theta\theta} & 1 < r < e, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ u(1, \theta) = u(e, \theta) = 0 & 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ u(r, 0) = \sin(9\pi \ln r) & 1 < r < e, \\ u(r, \pi) = 8\sin(4\pi \ln r) & 1 < r < e. \end{cases}$$

7. Determine soluciones acotadas para el problema: Hallar $u = u(r, \theta)$ tal que

$$\begin{cases} r^2u_{rr} + ru_r + u_{\theta\theta} = -\cos \theta & 0 < r < 4, \quad -\pi < \theta < \pi, \\ u(r, -\pi) = u(r, \pi) & 0 < r < 4, \\ u_{\theta}(r, -\pi) = u_{\theta}(r, \pi) & 0 < r < 4, \\ u_r(4, \theta) = 6 \cos 4\theta & -\pi < \theta < \pi. \end{cases}$$

¿Es posible encontrar alguna solución que cumpla la condición $u(1, 0) = 4$?

8. Sea $f(x)$ una función continua en todo \mathbb{R} y $a > 0$, resuelva la siguiente ecuación diferencial parcial

$$\begin{cases} u_t + au = u_{xx} & -\pi < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t) & t > 0, \\ u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t) & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x) & -\pi < x < \pi. \end{cases}$$

para esto considere una sustitución del tipo $v(x, t) = u(x, t)e^{at}$

9. Resuelva la ecuación diferencial parcial

$$\begin{cases} u_t = 2tu_{xx} + f(x, t) & 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\ell, t) = 0 & t > 0, \\ u(x, 0) = g(x) & 0 < x < \ell, \end{cases}$$

10. Determine la solución $u = u(x, t)$ de la ecuación diferencial parcial

$$\begin{cases} u_t + 9u = (1 + 2t)u_{xx} + x & -\pi < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t) - \frac{2\pi}{9} & t > 0, \\ u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t) & t > 0, \\ u_t(x, 0) = 4\sin 3x + 8\cos 6x & -\pi < x < \pi. \end{cases}$$

Sugerencia: Considere $u(x, t) = v(x, t) + \varphi(x)$ con $\varphi(x)$ un polinomio de grado menor o igual a 1.

11. Sea $f(\theta)$ una función continua en todo \mathbb{R} y $a > 0$, encuentre una solución acotada para el problema

$$\begin{cases} r^2 u_{rr} + ru_r + u_{\theta\theta} = 2 + u & a < r < +\infty, \quad 0 < \theta < 1, \\ u(r, 0) = 0 & a < r < +\infty, \\ u_{\theta}(r, 1) = 2e & a < r < +\infty, \\ u_r(a, \theta) = f(\theta) & 0 < \theta < 1, \end{cases}$$

12. Si $u = u(x, t)$ es la solución del problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = g(t) + d & 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = a & t > 0, \\ u_x(\ell, t) = b & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x) & 0 < x < \ell. \end{cases}$$

(i) Probar que la función $v(x, t) = u(x, t) - \int_0^t g(s) ds$ es una solución del problema de calor

$$v_t = v_{xx} + d \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0$$

con las mismas condiciones en la frontera y la misma condición inicial.

(ii) Resuelva el siguiente problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = e^{-t} + t - 2 & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0 & t > 0, \\ u_x(1, t) = 2 & t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \cos(\pi x) & 0 < x < 1. \end{cases}$$

13. Considere el problema de hallar $u = u(x, t)$ tal que

$$\begin{cases} u_t = tu_{xx} + 2tu_x + f(x, t) & 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ u(0, t) = h_1(t) & t > 0, \\ u(\ell, t) = h_2(t) & t > 0, \\ u(x, 0) = g(x) & 0 < x < \ell. \end{cases}$$

Sabiendo que $f(x, t)$ es una función continua en \mathbb{R}^2 y además que $h_1(t)$, $h_2(t)$ y $g(x)$ son funciones continuas en \mathbb{R} . Resuelva la ecuación diferencial parcial.