

7.7

Jardner: fitting vyznani; talk to

$$b^5 \mapsto b^4 \mapsto b^3 \mapsto b^2 \mapsto b \mapsto \vec{0}$$

$$b^9 \mapsto b^7 \mapsto b^6 \mapsto \vec{0}$$

$$b^{10} \mapsto b^9 \mapsto 0^{\rightarrow}$$

kle $\rightarrow$ zuzunahme $\rightarrow$ zohuzun $y = f - |d \cdot \lambda| = f$

z toho je vidieť že $\text{Ker } f \cong \text{span}\{b_1, b_0, b_9\}$

$$\text{Ker } f^2 \supseteq \{ -4 - i, -11 - i, b_2, b_1^2, b^{10} \}$$

$$-11-f^3 \geq -11- \text{---} b_2^3 b_8^3$$

$$-11-f^4 \geq -11 - b_4$$

$$-k f^5 \approx -11 - 6\frac{1}{2}$$

Z podmínky lze odělat rovnost množit pokud zvažíme
že kdyby dimenze $\text{Ker } f^i$ byla větší, šel by nějaký b_k
~~báze~~ vektor který se nerozkládá na $\vec{0}$ v $(\text{Ker } f^i)$ vyjádřit
jako LK vektor z $\text{Ker } f^i$ a byl by tedy v $\text{Ker } f^i$ a to je spor.

Podobni

$$\dim F^4 = \dim \text{span} \{ \text{---}, \text{---}, \text{---} \} = 3$$

$$f^3 \geq \frac{1}{11} \text{ (Stark } \{b_2\})$$

$$f^2 \supset 1 \leftarrow 11 \leftarrow \text{version } \{b_6, b_7\}$$

f = 2 — 11 — V San {64, 67, 69}

Podmnožina se zleži na točnost uvek

2e $\dim \ker f^i + \dim \operatorname{Im} f^i = 10$

stále určíme Průniky těchto 0 prostoru touto
 tabulkou kde čísla značí index bezových vektorů v prostoru.

	$\text{Im } f$	$\text{Im } f^2$	$\text{Im } f^3$	$\text{Im } f^4$	$\text{Im } f^5$
$\text{Ker } f$	1, 6, 9	1, 6	1	1	$\emptyset$
$\text{Ker } f^2$	1, 2, 6, 7, 9	1, 2, 6	1, 2	— —	$\emptyset$
$\text{Ker } f^3$	1, 2, 3, 6, 7, 9	1, 2, 3, 6	— —	— —	$\emptyset$
$\text{Ker } f^4$	3, 4, 9 6, 7, 9	↓ — —	↓ — —	— —	$\emptyset$
$\text{Ker } f^5$	↓ stejně 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9	↓ stejně	↓ r↓	↓	

↓
stejně