


7.7, bázis rozdělíme na 3 vektory splývající jednotlivě
 bunkám. Platí-li f pro b_i barva prvek b_i platí
 b_i je nula pak $f(b_i) = \vec{0}$ a když není prvním $f(b_i) = \vec{b}_{i-1}$
 z toho je vidět že $\ker f^3 = 3$ protože máme 3

bloky a 3 vlastní vektory, které se na 0 zobrazí rovnou
 a z každého umocnění se rozdělí v 3 bloky počet vektorů
 zobrazujících na 0 a pedem kdy $\dim \ker(f^i) =$

$\dim \ker(f^i) = \max(i, 5) + \max(i, 3) + \max(i, 2)$
~~naopak dáváme ale dykt se na 0 zobrazí rovnou tedy~~
 $\dim \ker(f^i) = \max(5-i, 0) + \max(3-i, 0) + \max(2-i, 0)$

$\ker(f^i) \cap \ker(f^j)$ jsou vektory které se ještě zobrazí

na nulový vektor p i j krát. Máme vlastní vektory $b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, \vec{0}$ a ekvální obrazy pro



$i=3$ a $j=2$
 $\dim(\ker f^3 \cap \ker f^2) = 2$
 celkově
 $\dim(\ker f^i \cap \ker f^j) = \sum_{p \in \{5, 3, 2\}} \max(0, \max(i, p) - j)$