

$f: R^{10} \rightarrow R^{10}$. matica operatora $J = [f]_B$ má bázi $B = b_1 \dots b_{10}$
 $\lambda = 0$ J o veľkosti $k_1=5, k_2=3, k_3=2$

B je rozdelená na 3 relácie

1. $B_1 = b_1 \dots b_5$
 2. $B_2 = b_6 \dots b_8$
 3. $B_3 = b_9 \dots b_{10}$
- $f(b_{5k+1}) = 0, f(b_{5k+2}) = b_{5k+1}$
 $\text{Ker } f' \cap \text{Im } f' \neq \text{span}\{v_1 \dots v_{k-1}\}$ f pôsobí ako ľavý posun

$\text{Ker } f' \cap \text{span}\{v_1 \dots v_k\}$

f' vyvoláva posun o 1

Príenik: $\text{Ker } f' \cap \text{Im } f'$

získame ako rozklad lineárnej bázi

v jednotlivých bunkách:

k_i - veľkosť i -tej bunky

vektor leží v príeniku keď padá do oboch

podpriestorov $\{1, \dots, \min(i, k_i-1)\}$

Dim podpriestoru: $d(i, j) = \sum_{k \in \{5, 3, 2\}} \max(0, \min(i, k-1))$

Báza $W_{i,j} = \text{Ker } f' \cap \text{Im } f^j$: $B_{i,j} = (b_1 \dots b_{\min(i, 5-1)}) \cup (b_6 \dots b_{6+\min(i, 3-1)-1}) \cup (b_9 \dots b_{9+\min(i, 2-1)-1})$

$j=0 \dots \text{Im } f^0 = R^{10}$		dim
1	$j < 5$	$\min(i, 5) + \min(i, 3) + \min(i, 2)$
2	$j < 5$	$\min(i, 4) + \min(i, 2) + \min(i, 1)$
3	$j < 5$	$\min(i, 3) + \min(i, 1) + 0$
4	$j < 5$	$\min(i, 2) + 0 + 0$
5	$j < 5$	$\min(i, 1) + 0 + 0$
≥ 5	$\emptyset$	$\emptyset$