

Na diagonále matice lineární operátora f v $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem
 $\leftarrow B$ v Jordanově tvaru jsou samé unity.
 Buzky mají následující struktury:

přvní:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A_1}$$

druhá:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A_2}$$

třetí:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A_3}$$

Bud' $J = \text{diag}(A_1, A_2, A_3)$, $J^u = \text{diag}(A_1^u, A_2^u, A_3^u)$

$$J = [J]_B^B.$$

Na maticích A_1, A_2, A_3 lze rovněž jít k specifické
 matice operátora, kde se po vyčíslení ~~z~~ první
 řádku ukáže druhý, druhý třetí a tak. Poslední
 řádek bude nulový. Dále se na tohle kochet i
 sloupce: Poslední sloupec se ukáže předposlední,
 ten se ukáže tím předtím a tak, a první sloupec
 bude nulový. Proto, ~~protože~~ si označíme oblast

L_1 jako sloupec matice J $1 \leq i \leq 5$

L_2

$6 \rightarrow 8$

L_3

$9 \rightarrow 10$

Po i-tém mocnění matice A_1 se v sekci L_1 budou
 posunovat vektory do "dopředu". Bude tam $[i]$ nulových
 sloupců, respektive $\min(i, 5)$ nulových sloupců.

Znovu tam však budou vektory $\{e_1, \dots, e_{5-i}\}$

Analogicky se násobení bude odebrat s užitím A_2, A_3 . Jelikož počítáme v matici $[f]_B^B$

jsou neslučitelní slopce matice bazické vektorů v souřadnicích $B \rightarrow$ pub st. bazické vektorů $e_1, \dots, e_{10}$.

Pak $[f b_i]_B = [f]_B^B [b_i]_B = [f]_B^B e_i$

Pak podle násobení matice J vektorů b_i v bázi B bude pro i -tý sloupec.

Kauť jsou jen b_i kde i je index usložený sloupců.

proto dimenze Kauť $f^i \cap \text{Im } f^j = \underbrace{\min(i, \max(0, 5-j))}_{\max(0, 5-j)} + \underbrace{\min(i, \max(0, 3-j))}_{\max(0, 3-j)} + \underbrace{\min(i, \max(0, 2-j))}_{\max(0, 2-j)}$

máme bazický vektorů píšou je

$$\{b_k \mid k \in [\min(i, \max(0, 5-j))] \} \cup \{b_{5+k} \mid k \in [\min(i, \max(0, 3-j))] \} \cup \{b_{8+k} \mid k \in [\min(i, \max(0, 2-j))] \}.$$

Báze pak může být uspořádaní posloupnost těchto vektorů