

7.1 báze $B = (b_1, \dots, b_{10})$,
 máme zobrazení $[f]_B$ (značíme J)

Imá 3 jordanovy bloky příslušné 0
 jordanovy řetězky jsou

$$\begin{array}{l}
 b_5 \mapsto b_4 \mapsto b_3 \mapsto b_2 \mapsto b_1 \mapsto 0 \\
 \qquad b_8 \mapsto b_7 \mapsto b_6 \mapsto 0 \\
 \qquad \qquad b_{10} \mapsto b_9 \mapsto 0
 \end{array}$$

~~pro určení~~

pro určení prostorů $(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j)$, $j, i \in \mathbb{N}$
 použijeme ~~pro~~ větu 9.46, body (3) a (4)

	$\text{Im } f$	$\ker f$	$\ker f^2$	$\ker f^3$	$\ker f^4$	$\ker f^i, i \geq 5$
$\text{Im } f$	$\{b_1, b_6, b_9\} \mid \dim 3$	$\{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9\} \mid \dim 5$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9\} \mid \dim 6$	$\{b_1, \dots, b_4, b_6, b_7, b_9\} \mid \dim 7$	$\{b_1, \dots, b_4, b_6, b_7, b_9\} \mid \dim 7$	
$\text{Im } f^2$	$\{b_1, b_6\} \mid \dim 2$	$\{b_1, b_2, b_6\} \mid \dim 3$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\} \mid \dim 4$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\} \mid \dim 4$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\} \mid \dim 4$	
$\text{Im } f^3$	$\{b_1\} \mid \dim 1$	$\{b_1, b_2\} \mid \dim 2$	$\{b_1, b_2\} \mid \dim 2$	$\{b_1, b_2\} \mid \dim 2$	$\{b_1, b_2\} \mid \dim 2$	
$\text{Im } f^4$	$\{b_1\} \mid \dim 1$	$\{b_1\} \mid \dim 1$	$\{b_1\} \mid \dim 1$	$\{b_1\} \mid \dim 1$	$\{b_1\} \mid \dim 1$	
$\text{Im } f^i, i \geq 5$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	