




→ vytvořme SLR; je $\bar{z}_i$ je řešení $b_1 \bar{z}_1 + b_2 \bar{z}_2 + \dots + b_n \bar{z}_n = c$ a také koeficienty a, b, c ; ze body $g_I, \dots, g_n$ " $\bar{z}_i$ " v rovině $z = ax + by + c$

tedy

$$(A|b) := \left(\begin{array}{ccc|c} g_{I1} & g_{I2} & 1 & g_{I3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & 1 & g_{n3} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

... soustava z jedné nezávislé rovnice; použijeme
aproximaci pomocí nejmenších čtverců,

použijeme vztah $x = (A^T A)^{-1} \cdot A \cdot b$

pak $x = \left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}; \frac{3}{5} \right)$; tedy máme

rovinu $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$