V FERNANDE/

LINFOMA HODGKIN: "SEMI" MANTO

CASO

- L Paciente do sexo feminino, 49A, C81, Doença de Hodgkin
- Ly Prescrição: 3060 cGy (17 × 180 cGy) em região cervical bilateral, mediastinal e paraórtica superior (intuito adjuvante)

SIMULAÇÃO E ACESSÓRIOS

- La Decúbito dorsal, *head first*
- Ly Máscara termoplástica longa + apoio de cabeça + extensor de ombros
- L Slice da CT: 2,5 mm

STRUCTURE SET EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA

Ly CTV 17x180 cGy, PTV 17x180 cGy, Medula, Esôfago, Coração, Pulmão (D/E)

Prótese Mamária (rED = 1.6) [2], Strikes (rED = 1.00)

DEFINIÇÃO DOS PONTOS

MARCADOR CT \rightarrow X: -0.16 Y: -3.20 Z: -0.04

ISOCENTRO → X: -0.76 Y: -12.20 Z: -0.04

La Deslocamento do primeiro dia (0.6, 9.0 e 0.0)

CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS

ACELERADOR → Synergy

IGRT: Imagem Portal (iView)

ENERGIA → 6 MV

GEOMETRIA → 4 semiarcos ida e volta

CAMPO	1_CCW	2_CW	3_CCW	4_CW	
Gantry	0° ⇄ 120°	0° ⇄ 120°	0° ⇄ 120°	0° ⇄ 120°	
Incremento	15°	16°	17º	18°	
Colimador	5⁰	355⁰	85°	95°	
Mesa	O°	O°	O°	O°	

Lessa configuração de arco foi escolhida para otimizar o tratamento em sala, começando e terminando com o *gantry* a 0°.


PROPRIEDADES DE CÁLCULO E SEGMENTAÇÃO


MoDO → Dose to medium


GRADE DE CÁLCULO \rightarrow 0.30 ^[1] [2]

INCERTEZA DE DOSE ightarrow 1% por cálculo

CONTROL POINTS | COMP. SEGMENTO → 180 *control points* **|** 1 cm










Y FERNANDE/

ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO


L Modo → Otimização por restrição nas duas fases, MCO ativo nas duas fases.











L, PTV 17x180 cGy

Target Penalty (3060 cGy, 95% de volume, p = 100) Target Penalty (2999 cGy, 98% de volume, p = 50)

L Anel@3-30mm

QOD (2754 cGy, RMS = 2, SM = 0.05, p = 1) QOD (1530 cGy, RMS = 2, SM = 2.0, p = 1)

L Coração

QOD (3060 cGy, RMS = 2, SM = 0, p = 1) Serial (280 cGy, SM = 0, PLE = 1. p = 1) Parallel (320 cGy, 6%, PLE = 3, SM = 0, p = 1) Maximum Dose (485 cGy, SM = 0.5, p = 1)

Ļ Esôfago

QOD (3060 cGy, RMS = 2, SM = 0.0, p = 1) I Parallel (2000 cGy, 10%, PLE = 3, SM = 0.3, p = 1)

L Pulmão Direito

Parallel (1680 cGy, 4%, PLE = 3, SM = 0, p = 1) I Parallel (880 cGy, 20%, PLE = 3, SM = 0, p = 1) Serial (1000 cGy, SM = 0, PLE = 15. p = 1)

L Pulmão Esquerdo

Parallel (1680 cGy, 1%, PLE = 3, SM = 0, p = 1) | Parallel (880 cGy, 5%, PLE = 3, SM = 0, p = 1)

L zPróteses mamárias

Parallel (1200 cGy, 30%, PLE = 3, SM = 0, p = 1)

L z0mbros

Maximum Dose (1400 cGy, Opt. Over All Voxels, p = 1)

L Patient


QOD (3060 cGy, RMS = 2, SM = 0, p = 100) I QOD (2295 cGy, RMS = 10, SM = 1.0, p = 100) I QOD (1530 cGy, RMS = 20, SM = 2.0, p = 100) I Serial (1670 cGy, SM = 0, PLE = 15. p = 1) Maximum Dose (3366 cGy, Opt. Over All Voxels, p = 50)

NORMALIZAÇÃO

🕽 3060 cGy cobrindo 93% do PTV 17x180 cGy

V FERNANDEZ

DISTRIBUIÇÃO DE ISODOSES



ESTATÍSTICAS DO DVH DO PLANO SOMA

ESTRUTURA	DESCRITOR DVH	IDEAL	ACEITÁVEL	RESULTADO	VALOR
PTV 17x180 CGY	D95% [Gy]	>= 30.60 (100%)	>= 29.07 (95%)		30,38 Gy
	D0.03% [Gy]	<= 32.10 Gy (107%)	<= 33.66 Gy (110%)		33.74 Gy
ΆREA CARDÍACA	Mean [Gy]	< 26 Gy	-		10.61 Gy
	D10% [Gy]	< 46 Gy	-		30.93 Gy
	D46% [Gy]	< 10 Gy	<12.5 Gy		4.67 Gy
PULMÃO DIREITO	Mean [Gy]	< 13 Gy	-		10.11 Gy
	D30% [Gy]	< 30%	-		0.45 Gy
PULMÃO ESQUERDO	Mean [Gy]	< 13 Gy	-		10.67 Gy
	D30% [Gy]	< 30%	-		0.36 Gy
MEDULA	Max [Gy]	< 45 Gy			23.58 Gy
PRÓTESE MAMÁRIA	Mean [Gy]	-	-		6.37 Gy
	Max [Gy]				30,80 Gy

REFERÊNCIAS

[1] - WOLFF, Dirk. *Monaco TPS Advanced Workshop*, Istanbul. 2019.

[2] - PRAH, Douglas. *Guidelines for Monaco VMAT/IMRT Optimization*. Wisconsin. 2022