JF 5 - α, β, γ - rozpady jader

4.2 Alfa rozpady jader

- pro rozpady zavádíme Q-hodnotu reakce, rozpad je energeticky možný, pokud $Q > 0$:

$$X_1 + \dots + X_N \to Y_1 + \dots + Y_L$$

$$Q := \sum_{j=1}^{N} M_{X_j} - \sum_{j=1}^{L} M_{Y_j}$$

- α-rozpad: $^A_ZX \to {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2He\ (\equiv \alpha)$

$$Q = M_X - M_Y - M_\alpha$$
$$= [Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z)] - [(Z-2)m_p + (A-Z-2)m_n - B(A-4,Z-2)] - [2m_p + 2m_n - B(4,2)]$$
$$= B(A-4,Z-2) + B(4,2) - B(A,Z) > 0$$

=> rozpady jsou možné jen pro těžká jádra

- výjimka $^8_4Be \to 2\alpha$

- obvykle je α-rozpad doprovázen γ-zářením
  -> deexcitace do základního stavu
  - např. $^{232}_{90}Th \to {}^{228}_{88}Ra + \alpha$



- velmi silná korelace mezi dobou života a energií α
- popis α-rozpadu:
  - α vznikne v jádře
  - α má velkou vazebnou energii => má kladnou kinetickou energii
  - aby α opustila jádro musí se protunelovat




$k_0 = \frac{\sqrt{2m(T_k+V_0)}}{\hbar c}$
L
$k = \frac{\sqrt{2mT_k}}{\hbar c}$
V
T_k
$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V-T_k)}}{\hbar c}$
V_0

-> $|T|^2 \propto e^{-2\kappa L}$ pro $2\kappa L \gg 1$

↑ koeficient transmise ↔ pravděpodobnost průchodu P

pro $^{210}_{84}Po \to {}^{206}_{82}Pb + \alpha$ $|T^2| \sim 10^{-30}$

- odhad doby života

$$\tau = \frac{1}{\underset{\text{pravděpodobnost průchodu}}{P}\ \underset{\text{frekvence nárazů na bariéru}}{f}\ \underset{\text{pravděpodobnost tvorby α v jádře}}{p_\alpha}} \Rightarrow T_{1/2} = \frac{\ln 2}{P \cdot f \cdot p_\alpha}$$

$$f = \frac{\beta_\alpha c}{2\underset{\text{efektivní šířka jámy}}{R_{eff}}} \approx \sqrt{\frac{2T_\alpha}{m_\alpha}}\frac{c}{2R_{eff}}$$

=> závislost střední doby života na energii:

$$P = |T|^2 \propto e^{-2\frac{\sqrt{2m(V-T_k)}}{\hbar c}L}$$

integruje se přes V

bariéra je ve tvaru



=> ↑ T_k znamená:
- menší výšku bariéry $V - T_k$
- menší délku bariéry L

=> mnohem větší pravděpodobnost průchodu

=> Geiger Nuttallovo pravidlo
Poločas rozpadu je mnohem delší při menší energii α částice. Při stejné energii α bude poločas rozpadu mnohem menší pro jádra s menším nábojem.

5.1 Rozpady beta

β⁻: $^A_ZX \to {}^A_{Z+1}Y + e^- + \bar{\nu}_e$

$n^0 \to p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$

β⁺: $^A_ZX \to {}^A_{Z-1}W + e^+ + \nu_e$

$p^+ \to n^0 + e^+ + \nu_e$

EC: (K-záchyt) $^A_ZX + e^- \to {}^A_{Z-1}W + \nu_e$

$p^+ + e^- \to n + \nu_e$

↑ záchyt e^- z elektronového obalu -> z hladiny nejblíže jádru

↑ EC je zdrojem monochromatických neutrin

- volný proton se nerozpadá (zatím nebylo pozorováno), jeho přeměna je možná jen v jádrech
- tříčásticový rozpad => e^+/e^- mají spojité spektrum

5.1.1 Spektrum e± v β-rozpadech

- tříčásticový rozpad:



$$E_Y + E_\nu + E_e = M_X$$
$$\vec{p}_Y + \vec{p}_\nu + \vec{p}_e = 0$$

$E_j = M_j + T_j$, pro Y je E_Y vůči E_ν, E_e zanedbatelné:

$$T_e + T_\nu = \overbrace{M_X - M_Y - M_\nu - M_e}^{\text{je to Q hodnota}} = Q$$

-> ze statistiky je spektrum elektronů dáno vztahem:
↑ objem fázového prostoru

$$\frac{d\Phi}{dT_e} = S(T_e) \approx p_e(T_e)E_e(T_e)p_\nu(T_e)E_\nu(T_e)$$
$$= \sqrt{(T_e+m_e)^2 - m_e^2}\,(T_e - m_e)\sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)$$
$$\xrightarrow{Q\sim T_e} \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)$$



$m_\nu = 0 \Rightarrow \frac{d\Phi}{dT_e} \xrightarrow{T_e \to Q} (Q-T_e)^2$

$m_\nu \neq 0 \Rightarrow \frac{d\Phi}{dT_e} \xrightarrow{T_e \to Q} \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)$



5.1.2 Souvislost doby života a Q-hodnoty

- pravděpodobnost β-rozpadu je úměrná velikosti fázového prostoru ← tj. integrálu spektra

$$\Rightarrow P(Q) = \int_0^Q \sqrt{(T_e+m_e)^2 - m_e^2}\,(T_e+m_e) \cdot \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)\,dT_e$$

$$P(Q) \approx Q^5\left[c_1\left(\frac{m_e}{Q}\right)^{3/2} + c_2\sqrt{\frac{m_e}{Q}} + c_3\sqrt{\frac{Q}{m_e}} + c_4\left(\frac{Q}{m_e}\right)^{3/2}\right]$$

- pro $Q \ll m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^{7/2} m_e^{3/2}$
- pro $Q \sim m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^5$
- pro $Q \gg m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^{13/2} m_e^{-3/2}$

-> doba života $\tau \approx \frac{1}{P(Q)} \sim \frac{1}{Q^5}$ pro $Q \sim m_e$

- spektrum elektronů jsou ovlivněna nábojem jádra
  - elektrony jsou přitahovány => spektrum je posunuto k nižším hodnotám
  - pozitrony jsou odpuzovány => spektrum je posunuto k vyšším hodnotám
- po β rozpadu může docházet k deexcitaci jádra pomocí vyzáření γ
  - to, jestli rozpad půjde do základního stavu, nebo do excitovaného nezáleží jen na Q hodnotě, ale i na rozdílu spinů a parit stavů mateřského a dceřiného jádra
    -> rozpady s velkým rozdílem spinů jsou silně potlačeny
  - dvojice e + ν má spin 1,0
    => potlačuje rozpady s velkým rozdílem spinů

$X \to Y + e + \nu$

$\vec{J}_X = \vec{J}_Y + \vec{L}_{e\nu} + \vec{S}_{e\nu}$ $S_{e\nu} = 0,1$

$P_X P_Y = (-1)^{L_{e\nu}}$

$\vec{J}_X - \vec{J}_Y = \vec{L}_{e\nu} + \vec{S}_{e\nu}$

Superallowed	$L_{e\nu} = 0$	$\Delta j = 0$	ΔP no
Allowed	$L_{e\nu} = 0$	$\Delta j = 0,1$	ΔP no
1st forbiden	$L_{e\nu} = 1$	$\Delta j = (0),1,2$	ΔP yes
2nd forbiden	$L_{e\nu} = 2$	$\Delta j = (1),2,3$	ΔP no
3rd forbiden	$L_{e\nu} = 3$	$\Delta j = (2),3,4$	ΔP yes
4th forbiden	$L_{e\nu} = 4$	$\Delta j = (3),4,5$	ΔP no

Příklady β rozpadů:

- volný neutron
  $Q = m_n - m_p - m_e = 939,6 - 938,3 - 0,5 \approx 0,8$
  $\tau \approx 900$ s $T_{1/2} \approx 600$ s
- rozpad $^3_1H \to {}^3_2He + e^- + \bar{\nu}_e$
  velmi malé Q => dobře se projeví m_ν
  -> současný odhad $m_\nu < 1$ eV
- rozpad $^{14}_6C \to {}^{14}_7N + e^- + \bar{\nu}_e$
  $T_{1/2} \approx 5700$ let, stále se vyskytuje v atmosféře
- rozpad $^{12}_5B \to {}^{12}_6C + e^- + \bar{\nu}_e$
  $Q \approx 13,4$ MeV, $T_{1/2} \approx 20,2$ ms

- β rozpady nemění počet nukleonů
  => dějí se kolmo k linii stability



- izobary = jádra se stejným počtem nukleonů A
  - liché izobary - 1 stabilní jádro
  - sudé izobary - více (2, výjimečně i 3)

Liché izobary => sudo-liché / licho-sudé jádro

$$M(A,Z) = Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z)\,\Big|_{A=\text{konst}}\ \swarrow\text{izobary}$$

$$\propto \underbrace{+\underbrace{\frac{Z^2}{A^{1/3}}}_{\text{Coulomb}}0,7\,\text{MeV} + \underbrace{\frac{(A-2Z)^2}{A}}_{\text{Symetrický člen}}23,3\,\text{MeV}}_{\text{parabola}}$$



Sudé izobary => licho-liché / sudo-sudé jádro

v M(A,Z) je navíc $\mp \underbrace{\frac{1}{\sqrt{A}}12,0\,\text{MeV}}_{\text{sudo-sudý / licho-lichý člen}}$



- dvojitý beta rozpad ← u některých sudo-sudých jader, např.:



- zajímavý by byl objev bezneutrinového dvojitého β rozpadu -> možný, pokud mají neutrina hmotu a jsou totožná s antineutriny
  => narušuje leptonové číslo

5.3 γ-záření

- doprovází α, β rozpady, které nevedou do základního stavu jádra
- γ-zářič ≡ něco, co nezáří γ, ale rozpadá se α/β na něco, co pak γ vyzáří při přechodu do základního stavu
  - $^{137}_{55}Cs$, $^{60}_{27}Co$
- poločasy rozpadů jsou velice krátké (~100 ps a méně), závisí na:
  - energii γ -> mnohem kratší pro větší energii γ
  - rozdílu spinů hladin -> dramaticky vyšší pro velké rozdíly spinů hladin

  -> výjimečně existují dlouho žijící stavy - metastabilní
  - $^{99}_{43}Tc$ -> základní stav $j = 9/2$ $P = +$
    excitovaný stav $j = 1/2$ $P = -$

  $T_{1/2} \sim 6$ hod

- rozpadový zákon $N(t) = N(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$
  - stav se nerozpadá $\psi(\vec{r},t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0t}\psi(\vec{r},0)$
    => $P(t) = \int |\psi(\vec{r},t)|^2 d\vec{r} = P(0)$
  - stav se rozpadá $\psi(\vec{r},t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0t}e^{\underbrace{-\frac{t}{2\tau}}_{-\frac{i}{\hbar}i\frac{\Gamma}{2}t}}\psi(\vec{r},0)$
    => $P(t) = \int |\psi(\vec{r},t)|^2 d\vec{r}$
    $= e^{-\frac{\Gamma}{\hbar}t}P(0) = e^{-\frac{t}{\tau}}P(0)$

    $\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}$ ... rozpadová šířka

- pro velmi malé τ se mění rozdělení energií γ
  => Fourierovsky sdružená veličina

$$\Phi(\vec{r},E) = \mathcal{N}\int \psi(\vec{r},t)\,e^{\frac{i}{\hbar}Et}\,dt$$
$$= \mathcal{N}\psi(\vec{r},0)\int_0^\infty e^{-\frac{i}{\hbar}(E_0-E)t}e^{-\frac{1}{\hbar}\frac{\Gamma}{2}t}\,dt$$
$$= \mathcal{N}\psi(\vec{r},0)\frac{-1}{-\frac{i}{\hbar}\left[(E_0-E) - i\frac{\Gamma}{2}\right]}$$
$$= \mathcal{N}\psi(\vec{r},0)\frac{i\hbar}{(E-E_0) - i\frac{\Gamma}{2}}$$
$$\Rightarrow |\Phi(\vec{r},E)|^2 = |\mathcal{N}|^2|\psi(\vec{r},0)|^2\frac{\hbar^2}{(E-E_0)^2 + (\frac{\Gamma}{2})^2}$$
$$\int |\Phi(\vec{r},E)|^2 dE = |\psi(\vec{r},0)|^2$$

$$\frac{dP}{dE} = \frac{1}{\pi}\frac{\frac{\Gamma}{2}}{(E-E_0)^2 + (\frac{\Gamma}{2})^2}$$ Breit-Wignerovo rozdělení

-> Γ ... rozpadová šířka <=> FWHM



pro $\Gamma \to 0$ jde $\frac{dP}{dE} \to \delta_{E_0}$

Mössbauerův jev

- energie γ emitované v přechodu:



$$E_\gamma' \approx E_\gamma - \underbrace{\frac{E_\gamma^2}{2M}}_{\approx\text{ kinetická energie jádra ze ZZH}}$$



$$E_\gamma'' \approx E_\gamma + \underbrace{\frac{E_\gamma^2}{2M}}_{\approx\text{ kinetická energie jádra ze ZZH}}$$

- např. pro $^{191}_{77}Ir$ s $T_{1/2} = 0,126$ ns
  je $\Delta E \approx 47$ meV
  $\Gamma \approx 3,6$ μeV
  $E_\gamma \approx 129$ keV
  } γ emitované jádrem v klidu nemůže být volným jádrem absorbováno

- Mössbauerův jev -> jádro se zabuduje do krystalu
  => $M \to M_{krystal} \to \infty$ ↑ je odražen celý krystal



Olovo -> propouští pouze γ letící přímo ve směru k absorbátoru

- zdroj a absorbátor jsou izotopy zabudované v krystalu v kryostatu => minimální tepelný pohyb

  -> zdroj se pohybuje ve směru / proti absorbátoru
  => posune spektrum doprava nebo doleva
  => pohlcení absorbátorem je dáno překryvem B-W rozdělení
  => ↑ překryv => detektor měří ↓ případů

$$\frac{dP_{emise}}{dE} = \frac{\Gamma}{2\pi}\frac{1}{(E-\underline{E_z})^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

$$\frac{dP_{absorpce}}{dE} = \frac{\Gamma}{2\pi}\frac{1}{(E-\underline{E_a})^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

střední energie pro zdroj / absorbátor

$$\int \frac{dP_{absorpce}}{dE}\frac{dP_{emise}}{dE}\,dE = \frac{\Gamma}{\pi}\underbrace{\frac{1}{(E_z - E_a)^2 + \Gamma^2}}$$

=> BW s dvojnásobným Γ

=> E_a je fixní E_z závisí na pohybu zdroje => lze proměřit BW a určit Γ

=> určuje střední délku života