ČF 8 - Higgsův boson, experimenty na urychlovačích, současná poznání

11.3 Experimenty na urychlovačích

- urychlovač = urychlí pouze nabité částice, které mají elektrický náboj
- v současnosti pouze urychlovače $p, \bar{p}, e^+, e^-$
 - existují plány urychlovací μ
 - p jsou ve hmotných
 - e se ve hmotných ztrácí : brzdění
 - brzdění kvůli zákonu energie při pohybu po kruhové dráze

Experiment na pevném terči

$s = (E+mc)^2 - p^2$
$= m^2 + mE + 2Em$
$\approx 2Em$
$\sqrt{s} \approx \sqrt{2Em}$

Vzájemné srážky

$s = (E_1+E_2)^2 - (\vec{p}_1+\vec{p}_2)^2$
$= m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1E_2 + \vec{p}_1\cdot\vec{p}_2)$
$\approx 4E_1E_2$
$\sqrt{s} \approx 2\sqrt{E_1E_2} \approx 2E$

11.3.1 LHC

- 27 km obvod
- srážky protonů s energiemi 6,5 + 6,5 TeV ↑ před to 7+7
- skládá se z
 - 8 oblouků
 - 4 rovných částí
 - 4 interakčních oblastí
- supravodivé pole 8T
 - 2 pro urychlení se musí současně zajistit supravodivé pole
 - pole vakuové → akceptační supravodiv
 - pole fokusace → kvadrupólové supravodiv
 - 2 protilehlá potrubí 1 svazek → 20 µm
- protony jsou ve svazcích shlukováním
 → 1 proton se srazí s ~ 340 sv

Luminosita

$N_{int} = \sigma \cdot L$


- počet interakcí při srážce "kvantů"



$N \text{ kvantů/cm}^2 = p \cdot N = \sigma \frac{N^2}{\pi r^2}$


$L = \frac{N^2}{\pi r^2} \cdot f$ ← frekvence srážek kvantů

11.3.2 Experiment ATLAS




11.4 Higgsův boson

- interakčními bosony W, Z mají velkou hmotu, hmotu fotonu γ je 0
 - → W a Z získají hmotu interakcí s Higgsovým polem
- v nejjednodušší verzi existuje jen jeden Higgsův boson se spinem 0 a kladnou paritou
- vznikají se ve srážkách částic, ne klid. částic
- objeven v ATLAS a CMS na LHC
- hmotu ~ 125 GeV
- byl do Standardního modelu zanesen, ale objevení neznamí hmoty základních bosonů W, Z
 - → ověří i další předpoklady :
 - obecná gaugeová teorie fundamentálních interakcí
 - role pohybu vůči základnímu prostředí interakcí
 - fundamentálních bosonů
- interakce Higgsova bosonu s částmi hmotou částic
 ⇒ vznikají se nejvíce na nejtěžší částice



- Jak vznikají při pp interakci ?
 - proton je složen z kvarků, gluonů a 99
 - → hmotný zanedbatelný hmotnost
 ⇒ interakce s Higgsovým polem je zanedbatelná
 - → gluony mají nulovou hmotu ⇒ nevzniká se se na počátku vůbec
 ⇒ prostřednictvím top kvarku
 - dvojice vzniklých $q\bar{q}$ pak WW a ZZ fúze



Rozpady Higgsova bosonu


- Higgs je obecně to vzniku vznikají, kromě párové produkce, i jiným způsobem, jeden od pouze tohoto kvarku.

H →	$b\bar{b}$	58 %.
	WW	22 %.
	gg	8,6 %.
	$\tau\tau$	6,3 %.
	$c\bar{c}$	2,9 %.
	ZZ	2,6 %. ← pozorováno v ATLAS
	$\gamma\gamma$	0,2 %. ← pozorováno v ATLAS
	$Z\gamma$	0,1 %.
	$\mu\mu$	0,01 %.

$H \to Z + Z^* \to e^+ + e^- + e^+ + e^-$
$\to \mu^+ + \mu^- + \mu^+ + \mu^-$
$\to e^+ + e^- + \mu^+ + \mu^-$
$\to \mu^+ + \mu^- + e^+ + e^-$

11.5 Současné otázky částicové fyziky

- současná představy vybraných oblastech částic se standardního modelem, ale :
 - modelového nejednotí původu hmoty mezi architektonu
 - nejednotí pro SM hmoty neutrinos, chybějící DE a DM
 - → modelů nejednotí : existence supersymetrických partnerů ke standardním částicím
 → nebyly objeveny ⇒ modely by měly velkou hmotu ~ TeV
 - hmoty a hybnosti ↔ stavebný a chybějící ↳ bosony
 - bosony ↔ fotony, bílé gluony, ... ↳ fermiony
 - → hmoty by neobsahují, ale LSP je nejlépe supersymetrické částice by mohla být složitá a tvořit chybějící hmotu
- je proton stabilní ?
 ⇒ hmoty by vznikaní mezi bosony $X, \bar{X}$, které umožňovaly hmotnost mezi kvarkové částic, ale jsou velké



$uu \to e^+ \bar{d}$

- Je Higgsův částice, nebo jiný jiné více ? → LHC
- Existují supersymetrické částice ?

- Je v oscilacích neutrin narušena CP symetrie ?
- Jaká je hmotu neutrin ?
- Neutrina je Majoranovi částice ?
- Jaká je podstata oscilace neutrin ?
- Je proton stabilní ?

} současné experimenty

- Jaká je původ chybějící hmoty ve Vesmíru
 → Fermi, LHC

- Další otázky : Více dimenzí, kvantová gravitace