Hamiltonův formalismus
středa 30. listopadu 2022 14:51

Hamiltonův formalismus

Lagrange $L(q^j, \dot{q}^j, t)$ na TQ → LR II n ODR 2. řádu
Hamilton $H(q^j, p_j, t)$ na T^*Q → HKR $2n$ ODR 1. řádu

Kanonická hybnost

$p_j := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}$ ⇒ každé q^j přiřazeno příslušné p_j

⇒ páry sdružených veličin $q^1 \dots q^n$, $p_1 \dots p_n$

(q^j, p_j) ≡ dvojice kanonicky sdružených proměnných

Fázový prostor

- prostor fyzikálních stavů systému dimenze $2n$

$$(\underbrace{q^1, \dots, q^n}_{\substack{\text{poloha} \\ P}}, \underbrace{p_1, \dots, p_n}_{\substack{\text{hybnost} \\ \theta \in T^*_P Q}})$$ dim = $2n$ bod ≡ stav

- q_j a p_j jsou navzájem nezávislé parametry

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta^i_j \quad \frac{\partial p_i}{\partial p_j} = \delta^j_i \quad \frac{\partial q^i}{\partial p_j} = 0 \quad \frac{\partial p_i}{\partial q^j} = 0 \quad \forall i,j$$

- trajektorie ve fázovém prostoru zobrazují časový vývoj systému z určitých počátečních podmínek



fázový portrét = soustava přípustných trajektorií vývoje systému pro všechny smysluplné počáteční podmínky

trajektorie – každým prochází právě jedna

- harmonický oscilátor $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$



$q(t) = A\cos(\omega t + \delta)$
$p(t) = -m\omega A \sin(\omega t + \delta)$

$$\Rightarrow \left(\frac{q}{A}\right)^2 + \left(\frac{p}{m\omega A}\right)^2 = 1$$

⇒ elipsy

Hamiltonova funkce

$$H(q^j, p_j, t) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}^i - L$$ = Legendreova duální transformace

$$\Rightarrow L = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}^i - H \qquad \dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

❗ Pozor ❗ Je nutné vyjádřit $\dot{q}^i$ pomocí q^j, p_j

nutno dosadit $\dot{q}^i = \dot{q}^i(q^j, p_j, t)$, které získáme inverzí $p_j = \frac{\partial L(q^j, \dot{q}^j, t)}{\partial \dot{q}^j}$

L a H nejsou vždy ekvivalentní! – problém pokud nelze invertovat, což nenastane, pokud

$$\frac{\partial p}{\partial \dot{q}} \neq 0 \iff \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} \neq 0 \iff$$ nenulovost Hessiánu

$$\Rightarrow H \equiv \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}^i(q^j, p_j, t) - L(q^j, \dot{q}^i(q^j, p_j, t), t)$$

je to dr. často zobrazení energie ⇒ pokud nezávisí na čase, pak je IP

Poté mají pohybové rovnice následující tvar:

$$\frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$

Hamiltonovy kanonické rovnice

⇒ $2n$ ODR 1. řádu

→ Hamiltonův a Lagrangeův popis je ekvivalentní, pokud $\det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^k}\right) \neq 0$

$$H(q^j, p_j, t) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}^i(q^k, p_k, t) - L(q^k, \dot{q}^i(q^k, p_k, t), t)$$

1) Důkaz přímo:

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \sum_{i=1}^{n}\left[\frac{\partial p_i}{\partial p_j}\dot{q}^i + p_i \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial p_j} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\frac{\partial \dot{q}^i}{\partial p_j}\right]$$
$$= \sum_{i=1}^{n}\left[\delta^j_i \dot{q}^i + \cancel{p_i \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial p_j}} - \cancel{p_i \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial p_j}}\right]$$
$$= \dot{q}^j = \frac{dq^j}{dt}$$ Q.E.D

$$\frac{\partial H}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^{n}\left[p_i \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^j} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^j}\right] - \frac{\partial L}{\partial q^j}$$
$$= \sum_{i=1}^{n}\left[p_i \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^j} - p_i \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^j}\right] - \frac{\partial L}{\partial q^j}$$
$$= -\frac{\partial L}{\partial q^j} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{z LRII}}}{=} -\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}\right) = -\frac{dp_j}{dt}$$

2) elegantně: z $\delta S = 0$

$$0 = \delta S = \delta\int_{t_1}^{t_2} L\, dt = \delta\int_{t_1}^{t_2}\left(\sum_j p_j \dot{q}^j - H\right) dt$$
$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left(\dot{q}^j \delta p_j + p_j \delta\dot{q}^j - \frac{\partial H}{\partial q^j}\delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\delta p_j\right) dt$$

per partes pro izochronní variace

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left(\dot{q}^j \delta p_j - \dot{p}_j \delta q^j - \frac{\partial H}{\partial q^j}\delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\delta p_j\right) dt$$
$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left[\left(\dot{q}^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\right)\delta p_j - \left(\dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial q^j}\right)\delta q^j\right] dt$$

$\forall \delta p_j \quad \forall \delta p_j \quad \forall j$

$$\Rightarrow \dot{q}^j = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$
$$\Rightarrow \frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$

- Rozdílné geometrické interpretace:
  - L je na tečném bandlu konfigurační variety TQ ≡ rychlostní fázový prostor
  - H je na kotečném bandlu konfigurační variety T^*Q ≡ (hybnostní) fázový prostor

⇒ nemůžeme duální popisy → přechod odpovídá Legendreově transformaci

Harmonický oscilátor

$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$

$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \rightarrow \dot{x} = \frac{p}{m} \rightarrow H = p\dot{x} - L$

$$\Rightarrow H = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

HKR: $\frac{dp}{dt} = -kx \qquad \frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m}\frac{dp}{dt} = -\frac{k}{m}x$$
$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$
$$\rightsquigarrow X = \frac{d}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{p}{m} \\ -kx \end{pmatrix}$$ ⇒ fázový portrét

Nabitá částice

$$L = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 - e(\varphi - \vec{v}\cdot\vec{A})$$
$$H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - e\vec{A})^2 + e\varphi$$

Poissonovy závorky

- mějme 2 funkce na fázovém prostoru: $f(q^j, p_j, t) \qquad g(q^j, p_j, t)$

⇒ z nich vytvoříme novou funkci:

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial q^j}\right)$$

- má užitečné algebraické vlastnosti:

1) $\{f, g\} = -\{g, f\}$ antisymetrie
2) $\{\alpha f_1 + \beta f_2, g\} = \alpha\{f_1, g\} + \beta\{f_2, g\}$ bilinearita
3) $\{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} = 0$
Jacobiho identita

⇒ Je to Lieova algebra na fázovém prostoru

4) $\{f, f\} = 0$ důsledek antisymetrie
5) $\{fg, h\} = \{f, h\}g + f\{g, h\}$ Leibniz
6) $\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} = \{\frac{\partial f}{\partial t}, g\} + \{f, \frac{\partial g}{\partial t}\}$ derivace podle parametru

Fundamentální Poissonovy závorky

- za f a g vezmeme přímo proměnné fázového prostoru

$$\{q^i, q^j\} = 0$$
$$\{p_i, p_j\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\left(\begin{array}{c|c} 0 & -I \\ \hline I & 0 \end{array}\right)}_{2n} \Big\} 2n$$
$$\{q^i, p_j\} = \delta^i_j$$

⇒ symplektická matice $\omega_{\alpha\beta}$ $\alpha, \beta \in \{1, \dots, 2n\}$

Poissonovy závorky a integrál pohybu

$f(q^j, p_j)$ je IP $\iff \frac{df}{dt} = 0$

⇒ platí identita: $\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$

Důkaz

$$\frac{df}{dt}(q^j(t), p_j(t), t) = \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{dq^j}{dt} + \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{dp_j}{dt}\right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$
$$= \sum_{j=1}^{n}\left[\frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial H}{\partial q^j}\right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$
$$= \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

⇒ pro $f = f(q^j, p^j)$

f je IP $\iff \{f, H\} = 0$

⇒ pokud H nezávisí na čase, pak $\{H, H\} \equiv 0$ ⇒ H je IP

⇒ jsou-li f a g IP, pak $\{f, g\}$ je IP
Dk: Jacobiho identita a derivace podle parametru

Moment hybnosti

$$L_i = \varepsilon_{ij}{}^k x^j p_k$$

$$\{x^i, L_j\} = \varepsilon^i{}_{jk} x^k \qquad \{p_i, L_j\} = \varepsilon_{ij}{}^k p_k$$

$$\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ij}{}^k L_k$$

Kanonické transformace

- fázový prostor (q^j, p_j) dim $2n$
  → jak můžu tyto proměnné měnit?
  ⇒ změna parametrizace T^*Q
    → změna q^j ovlivní p_j ⇒ kanonické transformace zachovávají fibrovanou strukturu

$$\begin{matrix} q^j \\ p_j \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} Q^j = Q^j(q^i, p_i, t) \\ \underbrace{P_j}_{\text{nové souřadnice}} = P_j(\underbrace{q^i, p_i, t}_{\text{staré souřadnice}}) \end{matrix}$$

Kanonická transformace je taková, která zachovává tvar HKR

- pro obecné transformace se HKR změní
- neboli $\exists H' = H'(Q^j, P_j, t)$ taková, že

$$\frac{dQ_j}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial P_j} \qquad \frac{dP_j}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial Q^j}$$

Hledejme podmínky kanoničnosti transformace:

- využijme nejednoznačnosti Lagrangeovy funkce:

Lagrangeova funkce $L + \frac{dF}{dt}$, kde F je libovolná hladká funkce, dává stejné pohybové rovnice LRII jako původní L:

$$\delta S' = \delta\int_{t_1}^{t_2}\left(L + \frac{dF}{dt}\right) dt = \delta S + \delta\int_{t_1}^{t_2}\frac{dF}{dt} dt =$$
$$= \delta S + \delta\left[F(t)\right]_{t_1}^{t_2} = \delta S + \underbrace{\delta F(t_2)}_{\overset{\parallel}{0}} - \underbrace{\delta F(t_1)}_{\overset{\parallel}{0}}$$
$$= \delta S$$

úloha s pevnými konci

- funkce F se nazývá generující funkce kanonických transformací:
- máme 4 možnosti:

F závisí na staré < q, p; nové < Q, P

$F_1(q, Q)$
$F_2(q, P)$
$F_3(p, Q)$
$F_4(p, P)$

nyní lze odvodit podmínky kanoničnosti transformace pomocí $L \rightarrow L + \frac{dF_a}{dt}$ $a \in \{1, \dots, 4\}$



generující funkce	podmínky kanoničnosti		podmínky integrability
$F_1(q^j, Q^j, t)$	$\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = +p_i$	$\frac{\partial F_1}{\partial Q^k} = -P_k$	$\frac{\partial p_i}{\partial Q^k} = -\frac{\partial P_k}{\partial q^i}$
$F_2(q^j, P_j, t)$	$\frac{\partial F_2}{\partial q^i} = +p_i$	$\frac{\partial F_2}{\partial P_k} = +Q^k$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_k} = \frac{\partial Q^k}{\partial q^i}$
$F_3(p_j, Q^j, t)$	$\frac{\partial F_3}{\partial p_i} = -q^i$	$\frac{\partial F_3}{\partial Q^k} = -P_k$	$\frac{\partial q^i}{\partial Q^k} = \frac{\partial P_k}{\partial p_i}$
$F_4(p_j, P_j, t)$	$\frac{\partial F_4}{\partial p_i} = -q^i$	$\frac{\partial F_4}{\partial P_k} = +Q^k$	$\frac{\partial q^i}{\partial P_k} = -\frac{\partial Q^k}{\partial p_i}$

pro $F_1(q^j, Q^j, t)$: 2. sloupec $\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = +p_i \qquad \frac{\partial F_1}{\partial Q^k} = -P_k$

2. sloupec ⇒ 3. sloupec:

$$\boxed{-\frac{\partial P_k}{\partial q^i}} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial q^i \partial Q^k} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^k \partial q^i} = \boxed{\frac{\partial p_i}{\partial Q^k}}$$

ale zároveň 3. sloupec ⇒ 2. sloupec
Důkaz si nechci!.

navíc: $H'(Q^j, P_j, t) = H(q^j, p_j, t) + \frac{\partial F_a}{\partial t}\Big|_{\text{po dosazení}}$

Vlastnosti kanonických transformací

- spojeny Legendreovou transformací:

F_1: $F_2 = F_1 + P_i Q^i$
$F_3 = F_1 - p_i q^i$
$F_4 = F_1 + P_i Q^i - p_i q^i$

vzorově:
$F_1(q, Q)$, $F_2(q, P)$ ⇒ dáváme $Q^i P_i$
$F_1(q, Q)$, $F_3(p, Q)$ ⇒ dáváme $-q^i p_i$

⇒ F_a jsou obecně ekvivalentní
- pozor ❗ někdy ne – např. identita $q^j = Q^j \qquad p_j = P_j$
→ není F_1 a F_4, pouze F_2, F_3

- tvoří grupu (Lieovu grupu)

- hledání generující funkce odpovídá hledání potenciálu vektorového políčka

Jak prakticky ověřovat kanoničnost?

vnější – z vlastních tabulky ⇒ fungují 2. a 3. sloupec?
pomocí $\{\cdot, \cdot\}$

Platí věta:

Transformace je kanonická $\iff \{Q^i, P_j\} = \delta^i_j$
postačí na zadání Q^j, P_j $\Leftarrow$ $\{Q^i, Q^j\} = 0$, $\{P_i, P_j\} = 0$

Př:

$Q = \alpha q + \beta p \qquad P = \gamma q + \delta p$ → lineární transformace

$\{Q, Q\} = 0$, $\{P, P\} = 0$ } díky antisymetrii

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = \alpha\delta - \beta\gamma \overset{\text{obecně}}{\neq} 1$$

→ většinou není kanonická transformace
→ jenom pokud $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$

- $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$
- objem fázového prostoru je invariantní vůči kanonickým transformacím

$$V' = \iint_\Omega dQ\,dP = \iint_\Omega \det\begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} dq\,dp =$$
$$= \iint_\Omega \underbrace{\{Q, P\}_{q,p}}_{\overset{\parallel}{1}} dq\,dp = \iint_\Omega dq\,dp = V$$

Hamiltonova-Jacobiho teorie

Stojí na 5 základních vztazích:

1) $\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = p_i$ 2) $\frac{\partial F_1}{\partial Q^i} = -P_i$
3) $H'(Q^j, P_j, t) = H(q^j, p_j, t) + \frac{\partial F_1}{\partial t}$
4) $\frac{dQ^j}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial P_j}$ 5) $\frac{dP_j}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial Q^j}$

Uvažujme speciální generující funkci $S(q^j, Q^j, t) \equiv F_1$ (akční funkce) tak, aby $H'(Q^i, P_i, t) \equiv 0$

$$H' = H + \frac{\partial S}{\partial t} \overset{\text{chci}}{\Rightarrow} H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$ Hamiltonova-Jacobiho rovnice

↑ rovnice pro S

$$H(q^j, \underset{\substack{\updownarrow \\ p_j}}{\frac{\partial S}{\partial q^j}}, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$ = Parciální diferenciální rovnice pro $S(q^j, t)$

"vlnová verze klasické mechaniky"



pro každý bod v potenciálu $V(x)$

→ směr ⊥ k S-konst $H = \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + V(x)$
→ velikost určená $2m[E - V(\vec{r})]$, tedy $V(\vec{r})$

S = konst = "vlnoplochy"

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = 2m[E - V(x)]$$ ansatz ↖ charakteristická Hamiltonova funkce

→ ve 3D

$$\underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2}_{(\nabla S)^2} = 2m[E - V(x, y, z)]$$

pak HKR jsou: $Q^j = \alpha_j$ … konst, $P_j = -\beta_j$ … konst

⇒ jak to vypadá v q^j a p_j — zde zkoušíme

$$\frac{\partial S}{\partial Q^i} = -P_i$$

$$\Rightarrow \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \qquad S(q^j, \alpha_j, t)$$

⇒ $q^j(\alpha_i, \beta_i, t)$ prostor inverzí

Př: Volný pád

① $H = T + V = \frac{1}{2m}p^2 + V(x) \qquad V(x) = -mgx$

② H-J rovnice:

$$\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + V(x) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$ → rovnice pro $S(x, t)$

1 nelineární parciálka ⇒ řešení trikem

H nezávisí na čase

$$\Rightarrow S(x, t) = W(x) - Et$$

} hledáme ve tvaru ← konstanta (energie)
↖ charakteristická Hamiltonova funkce

$$\Rightarrow \frac{1}{2m}\left(\frac{dW}{dx}\right)^2 + V(x) = E$$

$$\frac{dW}{dx} = \sqrt{2m(E - V(x))}$$

$$\Rightarrow W(x) = \int\sqrt{2m(E - V(x))}\, dx$$

$V(x) = -mgx$

$$\Rightarrow W(x) = \int\sqrt{2m(E + mgx)}\, dx$$
$$= \frac{1}{3m^2 g}\left[2m(E + mgx)\right]^{3/2} + C$$

$$\Rightarrow S(t, x) = \frac{1}{3m^2 g}\left[2m(E + mgx)\right]^{3/2} - Et$$

nyní: $\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \rightarrow \frac{\partial S}{\partial E} = \beta_i$

$$\Rightarrow \frac{1}{mg}\left[2m(E + mgx)\right]^{1/2} - t = \beta$$

$$\Rightarrow [\ \ ]^{1/2} = mg(t - \beta)$$
$$2(E + mgx) = mg^2(t - \beta)^2$$
$$\Rightarrow E + mgx = \frac{1}{2}mg^2(t - \beta)^2$$
$$x(t) = \frac{1}{2}g(t - \beta)^2 - \frac{E}{mg}$$ 🙂