2 Molekuly a jejich struktura

2.1 Popis molekul

- molekula ≡ soubor vázaných atomů
  - ⇒ musíme jim dodat nějakou energii, abychom molekulu porušili
- lze ji popisovat souhrnně, strukturními vzorci, délky a úhly vazeb, symetrie
- sumární vzorec – C_2H_6O, …
  - • umožňuje určit hmotnost
  - • ethylalkohol × dimethylether
    - = konstituční izomerie
- strukturní vzorec
  - • CH_3CH_2OH × CH_3OCH_3
- stereoizomerie

cis-but-2-en trans-but-2-en



- enantiomerie

L-alanin D-alanin



⇒ chiralita → odlišné stáčení roviny polarizace světla
- • 50/50 ⇒ nestáčí – racemát

→ v přírodě více L, mohou mít různé vlastnosti

- prostorové uspořádání molekul

lineární $O=C=O$



→ rozhoduje o min. energie

2.2 Symetrie molekul

- symetrie = souměrnost
  - → odlišuje fyzikální i chemické vlastnosti

prvek symetrie	symbol	operace symetrie	symbol
rovina zrcadlení	σ	zrcadlení, reflexe	Σ
střed inverze	i	inverze	$\mathbb{I}$
vlastní osa rotace	C_n	rotace kolem C_n	$\mathbb{C}_n$
nevlastní osa rotace	S_n	rotace kolem S_n s následnou reflexí na rovině kolmé k S_n	$\mathbb{S}_n$
identita	E	identita	$\mathbb{E}$

- platí:

$$\Sigma^n = \begin{cases} \mathbb{E} & \text{pro } n \text{ sudé} \\ \Sigma & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \qquad n\,\mathbb{C}_n = \mathbb{C}_n^n = \mathbb{E}$$

$$\mathbb{I}^n = \begin{cases} \mathbb{E} & \text{pro } n \text{ sudé} \\ \mathbb{I} & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases}$$

$$\mathbb{S}_n^m = \begin{cases} \mathbb{C}_n^m = \mathbb{C}_{\frac{n}{2}}^{\frac{m}{2}} & \text{pro } m \text{ sudé} \\ \Sigma_n \circ \mathbb{C}_n^m & \text{pro } m \text{ liché} \\ \mathbb{I} & \text{pro } m = \frac{n}{2} \text{ liché} \\ \mathbb{C}_2 & \text{pro } m = \frac{n}{2} \text{ sudé} \\ \mathbb{E} & \text{pro } m = n \end{cases}$$





2.2.1 Bodové grupy

- operace symetrie dané molekuly jsou grupa:
  1) uzavřenost
  2) asociativita
  3) jednotkový prvek
  4) inverzní prvek



- např. molekula vody

	$\mathbb{E}$	$\mathbb{C}_2$	Σ_v	Σ_v'
$\mathbb{E}$	$\mathbb{E}$	$\mathbb{C}_2$	Σ_v	Σ_v'
$\mathbb{C}_2$	$\mathbb{C}_2$	$\mathbb{E}$	Σ_v'	Σ_v
Σ_v	Σ_v	Σ_v'	$\mathbb{E}$	$\mathbb{C}_2$
Σ_v'	Σ_v'	Σ_v	$\mathbb{C}_2$	$\mathbb{E}$

⇒ je to grupa

- bodové grupy = zachovávají jeden bod v prostoru nehybný

bodová grupa	prvky symetrie
C_1	E
C_i	i
C_s	σ
C_n	C_n
C_{nv}	$C_n + n\sigma_v$
C_{nh}	$C_n + \sigma_h$
D_n	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n)
D_{nh}	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n) $+ n\sigma_v + \sigma_h$
D_{nd}	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n) $+ n\sigma_d$
T_d	molekula symetrie tetraedru
O_h	molekula symetrie krychle nebo oktaedru
R_h	molekula symetrie koule

- σ_h … rovina zrcadlení kolmá na rotační osu s nejvyšší četností ≡ hlavní osou
- σ_v … rovina zrcadlení rovnoběžná s hlavní osou
- σ_d … roviny půlící úhel mezi osami

2.2.2 Maticové vyjádření operací symetrie

- výhodný popis

$$\mathbb{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbb{C}_n(z) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{I}(\underset{\text{počátek}}{0}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \Sigma(xy) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{S}_n(z) = \mathbb{C}_n(z) \circ \Sigma(xy) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2.3 Meziatomové potenciály

- věnujeme se dvouatomovým molekulám, nelineárním
- atomy ⌈ e⁻ obal / jádro ⇒ nejprve se odpuzují elektricky, s dalším přibližováním dojde k průniku e⁻ obalů a vzniku vazby
  - ⇒ vzniká konfigurace s nižší energií!
- jeden z nejčastěji používaných potenciálů je Lennard-Jonesův, nejčastěji ve tvaru:

$$U(r) = 4\varepsilon\left[\underset{\text{silné odpuzování}}{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}} - \underset{\text{přitažlivé působení dipólu a dipólu – van der Waalsovy síly}}{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}}\right]$$

ε … hloubka energ. minima

σ … vzdálenost, ve které je U nulový

⇒ minimum:

$$0 = 12\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{11} - 6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{5} \Rightarrow r_0 = \sqrt[6]{2}\,\sigma$$

→ vhodný pro svou aplikaci, ale nejsou analyticky řešitelné (ve Schrödingerově)

- Morseův potenciál → umožňuje analytické řešení

$$U(r) = D\left(1 - e^{-a(r-r_0)}\right)^2$$

D … hloubka minima

r_0 … vzdálenost atomů v energetickém minimu

a … šířka potenciální jámy $a = \sqrt{\frac{k}{2D}}$

k … silová konstanta vazby v okolí minima potenciálu

- v blízkosti minima ⇒ harmonická aproximace

$$U(r) = U_0 + \frac{1}{2}k(r-r_0)^2$$

⇒ vede k oscilacím kolem rovnovážné polohy
- • vibrace budou kvantovány

2.4 Molekulová spektra

- molekuly jako dynamické objekty, které kromě translace konají vibrační a rotační pohyby

2.4.1 Rotační hladiny dvouatomových molekul

- moment setrvačnosti molekuly:

$$I = m_1r_1^2 + m_2r_2^2$$



→ zákon zachování hybnosti

$m_1r_1 = m_2r_2$, $r_1 + r_2 = R$

⇒ $r_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}R$, $r_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}R$

$$\Rightarrow I = m_1r_1^2 + m_2r_2^2 = \underbrace{\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}}_{=:\,m'}R^2$$

… redukovaná hmotnost

- moment hybnosti: $L = I\omega$
- • platí kvantování momentu hybnosti:
  - – J kvantuje rotační hladiny molekul

$$|\vec{L}| = L = \hbar\sqrt{J(J+1)}, \quad J \in \mathbb{N}_0$$

- pro energii rotující molekuly

$$E_J = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{L^2}{2I} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}$$

⇒ při přechodu mezi hladinami dochází k absorpci nebo emisi fotonu s energií:

$$\Delta E = E_{J+1} - E_J = \frac{\hbar^2}{I}(J+1)$$

→ pozorujeme molekulová spektra

- experimentálně vyhodnocená data nesedí – hodnoty frekvencí molekulových spekter nesedí podle teorie očekávaných

⇐ důsledek toho, že vazby nejsou tuhé, ale elastické

⇒ vzdálenosti v molekulách se mění, a tak závisí na J, se J závisí tedy i I

→ pokud je r_0 vzdálenost mezi nerotujícími atomy, pak z rovnováhy sil v harmonické aproximaci máme:

$$F = k(r-r_0) = m'\omega^2 r$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}k(r-r_0)^2 = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} + \frac{J^2(J+1)^2\hbar^4}{2I^2r^2k}$$

ale $r = r(J)$ a $I = I(r(J))$

⇒ pokud $|r - r_0| \ll r_0$, pak → $\Delta r = r - r_0$

$$I = m'r^2 = m'(r_0 + \Delta r)^2 \approx m'r_0^2 + 2m'r_0\Delta r \approx m'r_0^2$$

$$\Rightarrow E_J \approx \frac{J(J+1)\hbar^2}{2m'r_0^2} + \frac{J^2(J+1)^2\hbar^4}{2m'^2r_0^6k}$$

2.4.2 Rotační hladiny víceatomových molekul

- pro lineární platí vztahy jako výše
- pro nelineární je situace složitější
  - → zdaleka ne existenci význačné rotační osy, která nemusí existovat
- vztahujeme k hlavním osám momentu setrvačnosti, popisujeme k hlavním osám souřadného systému:

$$E = \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y} + \frac{L_z^2}{2I_z}$$

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

- stále platí kvantovací podmínky + podmínka do vybraného směru, který označíme z:

$$L = \hbar\sqrt{J(J+1)} \qquad L_z = K\hbar \qquad K \in \{-J, \dots, 0, \dots, J\}$$

- molekula je symetrický rotátor, tj. $I_x = I_y$,

pak

$$L_x^2 + L_y^2 = J(J+1)\hbar^2 - K^2\hbar^2$$

$$E_{J,K} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I_x} + \left(\frac{\hbar^2}{2I_z} - \frac{\hbar^2}{2I_x}\right)K^2$$

⇒ závisí na 2 kvantových číslech

Pro $I_z < I_x$ ⇒ ↑K ↑E

$I_x < I_z$ ⇒ ↑K ↓E

+ obecně bychom měli dále uvažovat zkrácení vazeb

- molekula typu sférického rotátoru, tj. $I_z = I_x = I_y$, pak energie nezávisí na K
  - ⇒ podobají se lineárním molekulám
- u molekul typu asymetrického rotátoru je kvantována "pouze" velikost momentu hybnosti, jelikož není žádná rotační symetrie

2.4.3 Rotační spektra

- pro lineární molekuly a molekuly typu sférického rotátoru platí:

$$\nu_{J\to J+1} = \frac{\Delta E_{J\to J+1}}{h} = \frac{\hbar}{2\pi I}(J+1)$$

⇒ spektrum je ekvidistantní

- pozorované linie odpovídají výběrovým pravidlům

$$\Delta J = \pm 1 \qquad \Delta K = 0$$

→ ΔJ si lze představit jako zákon zachování hybnosti, když foton jako boson má celočíselnou hodnotu spinu → momentu hybnosti

→ číslo K udává prostorovou orientaci momentu hybnosti, který foton kvůli svým kvantovým vlastnostem nemůže změnit

- • ve vzorci pro $E_{J,K}$ vystupuje K ve druhé mocnině ⇒ nezáleží na jeho znaménku
  - ⇒ dojde k rozštěpení spektrální linie s J na J+1 linií

např. pro J = 2 → J = 1, pak

J = 2 K = 2 ✗ ΔK ≠ 0

J = 2 K = 1 → J = 1 K = 1 • stejný stav! energie

J = 2 K = 0 → J = 1 K = 0 •

J = 2 K = −1 → J = 1 K = −1 •

J = 2 K = −2 ✗ ΔK ≠ 0

Příklad

- výpočet délky vazeb $N \equiv N^+ - O^-$
  - • uvažujeme 2 izotopy N, ale délka vazeb se nemění
  - • frekvence (dvě) → momenty setrvačnosti (pro 2 izotopy + z.z.h.) } → délky vazeb

2.4.4 Vibrační spektra molekul

- 2 molekuly $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

máme $\Delta x = x_2 - x_1 - L$



⇒ pohybové rovnice:

$$F_1 = m_1\ddot{x}_1 = k\Delta x$$
$$F_2 = m_2\ddot{x}_2 = -k\Delta x$$

} uvažujeme pouze derivaci délky mezi atomy, ne x_1, x_2

→ víme $\Delta\ddot{x} = \ddot{x}_2 - \ddot{x}_1$

⇒ $m_1m_2\Delta\ddot{x} = -k(m_1+m_2)\Delta x$

⇒ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m'}}$ $m' = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$

- vibrace jsou kvantované – nejjednodušší popis je pomocí harmonické aproximace, pro energetické hladiny pak platí:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu_0 \qquad \nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m'}}$$

- spektra vibrační leží v jiných oborech než rotační

2.4.5 Rotačně-vibrační spektra molekul

- ve skutečnosti nejsou rotační a vibrační spektra nezávislá
  - → pozorujeme přechody v rotačně vibračních hladinách s výběrovými pravidly:

$\Delta n = 1$ pro vibrační $\Delta J = \pm 1$ pro rotační

⇒ přechodu n = 0 → n = 1 odpovídá několik přechodů v rotačních hladinách:

J = 0 → J = 1	J = 1 → J = 0
J = 1 → J = 2	J = 2 → J = 1
J = 2 → J = 3	J = 3 → J = 2
J = 3 → J = 4	J = 4 → J = 3
J = 4 → J = 5	J = 5 → J = 4
R-větev ΔJ = +1	P-větev ΔJ = −1

⇒ pro R-větev:

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{2I}\left((J+1)(J+2) - J(J+1)\right) = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{I}(J+1)$$

pro P-větev

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{2I}\left((J-1)J - J(J+1)\right) = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar^2}{I}J$$

- navíc v intenzitách P, R linií závisí na teplotě podle Maxwell-Boltzmannovy statistiky:

$$W_{n_1,J_1} \sim (2J_1+1)\,e^{-\frac{\hbar\omega_0(n_1+\frac{1}{2})}{k_BT}}\,e^{-\frac{\hbar^2}{2Ik_BT}J_1(J_1+1)}$$

⇒ pravděpodobnost nalezení molekuly ve stavu n_1, J_1, intenzita spektrální čáry je jí úměrná

⇒ $J_1 = J$ pro P větev a $J_1 = J - 1$ pro R-větev

$$\Rightarrow \frac{I_P}{I_R} = \frac{2J+1}{2J-1}e^{-\frac{\hbar^2}{Ik_BT}J}$$

2.4.6 - Infračervená spektroskopie

- vibrační a rotační spektra jsou pozorována ve střední až daleké IR oblasti
- vzdálenosti atomů jsou mnohem menší než vlnová délka IR záření
  - ⇒ na molekulu lze nahlížet jako na dipól bez vnitřní struktury

⇒ uvažujme dipól s tuhostí k, tlumením s koeficientem B a buzený elektrickým polem s frekvencí ω, pak pro dipól platí pohybová rovnice:

$$m\ddot{x} = qE_0e^{-i\omega t} - kx - B\dot{x}$$

$$\Rightarrow x = x_0e^{-i\omega t} \qquad x_0 = \frac{q}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}E_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \gamma = \frac{B}{m}$$

⇒ maximální výchylka nastává pro ω ≈ ω₀.

2.4.7 - Kvantový popis rotací a vibrací molekul

- do Hamiltoniánu je nutné přidat další členy:

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_\alpha\left(-\frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_\alpha\right)}_{\text{kinetická energie jader}} + \underbrace{\sum_i\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_i\right)}_{\text{kinetická energie elektronů}} + \underbrace{\sum_i\sum_\alpha\frac{-Z_\alpha e'^2}{\|\vec{r}_i - \vec{R}_\alpha\|}}_{\text{jádro-elektron interakce}}$$

$$+ \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \alpha\neq\beta}}\frac{Z_\alpha Z_\beta e'^2}{\|\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta\|}}_{\text{jádro-jádro}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j \\ i\neq j}}\frac{e'^2}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|}}_{\text{elektron-elektron}}$$

- uvažujeme adiabatickou aproximaci
  - ⇒ lze oddělit pohyb atomů a elektronů a hledat vlnovou funkci v separovaném tvaru:

$$\psi(R_\alpha, r_i) = \Phi(R_\alpha)\underbrace{\psi_e(r_i|R_\alpha)}_{\text{elektronová část vlnové funkce při poloze jader } R_\alpha}$$

⇒ z Hamiltoniánu můžeme vzít pouze členy vztahující se k jádrům a upravit jej:

$$\hat{H}_\alpha = \sum_\alpha\frac{\hat{P}_\alpha^2}{2M_\alpha} + U(R_1, \dots, R_N),$$

kde $U(R_1, \dots, R_N)$ je účinný potenciál popisující meziatomové interakce.

→ lze spočítat buď aproximací účinných potenciálů

→ ab initio = zvolí se přesné potenciály – např. dvouatomové

- uvažujme dvouatomovou molekulu s malými výchylkami jader atomů,

nechť r_0 je rovnovážná vzdálenost atomů A a B



⇒ Hamiltonián jader:

$$H_\alpha = \frac{P_A^2}{2M_A} + \frac{P_B^2}{2M_B} + U(\|\vec{r}\|),$$

kde U je účinný potenciál – Morseův, Lennard-Jonesův, …

→ přejdeme do těžišťové soustavy

$$\vec{R} = \frac{M_A\vec{R}_A + M_B\vec{R}_B}{M_A + M_B}$$

$$\vec{R}_A = \vec{R} + \frac{M_B}{M_A+M_B}\vec{r} \qquad \vec{R}_B = \vec{R} - \frac{M_A}{M_A+M_B}\vec{r}$$

$$\Rightarrow \hat{H}_\alpha = \frac{1}{2}M_A\dot{\vec{R}}_A^2 + \frac{1}{2}M_B\dot{\vec{R}}_B^2 + U(\|\vec{r}\|)$$

jelikož $R_A \sim R_B \sim R \gg r$

$$\hat{H}_\alpha = \frac{1}{2}(M_A + M_B)\dot{\vec{R}}^2 + \frac{1}{2}M'\dot{\vec{r}}^2 + U(\|\vec{r}\|),$$

kde $M' = \frac{M_AM_B}{M_A+M_B}$ je redukovaná hmotnost

$$\Rightarrow \hat{H}_\alpha = \frac{P^2}{2(M_A+M_B)} + \frac{p^2}{2M'} + U(\|\vec{r}\|)$$

⇒ řešení Schrödingerovy rovnice budeme hledat ve tvaru $\psi(\vec{R}_A, \vec{R}_B) = e^{i\vec{K}\cdot\vec{R}}\psi(\vec{r})$,

pro energie, tj. vlastní čísla Hamiltoniánu vychází:

$$E = \underbrace{\frac{\hbar^2K^2}{2(M_A+M_B)}}_{\text{kinetická energie volné částice}} + \varepsilon$$

↖ odpovídá zvolené SR vzhledem k molekule, tj. vztahuje se k vibracím a rotacím

- abychom mohli vyšetřovat zvlášť rotace a vibrace, přejdeme k p_r a $p_\perp$:

$$p_r = \vec{p}\cdot\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \qquad p_\perp^2 = p^2 - p_r^2$$

↓ pomocí identity $(\vec{a}\times\vec{b})^2 = a^2b^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$

$$p_\perp^2 = p^2 - p_r^2 = p^2 - \frac{(\vec{p}\cdot\vec{r})^2}{r^2} = \frac{1}{r^2}\left[p^2r^2 - (\vec{p}\cdot\vec{r})^2\right] = \frac{1}{r^2}(\vec{p}\times\vec{r})^2 = \frac{1}{r^2}L^2$$

⇒ vnitřní část Hamiltoniánu lze psát:

$$\hat{H}_{\text{vnitř}} = \frac{\hat{p}_r^2}{2M'} + U(r) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2}$$

→ řešíme v separovaném tvaru:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\,Y(\theta, \varphi)$$

s vlastními čísly tj. energiemi ε_v pro $R(r)$ – vibrace; ε_r pro $Y(\theta, \varphi)$ – rotace

$\varepsilon_v = \hbar\omega_0\left(n + \frac{1}{2}\right)$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M'}}$ při harmonické aprox.

$$\varepsilon_r = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}$$

⇒ celkově:

$$E = E_T + \varepsilon_v + \varepsilon_r = \frac{\hbar^2K^2}{2(M_A+M_B)} - \underset{\substack{= U(r_0) \text{ – odpovídá hloubce potenciálu v rovnovážné poloze} \\ \| \\ \text{disociační energie}}}{D} + \hbar\omega_0\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2}{2I}l(l+1)$$

2.5 Měrné teplo molekul

- molekula může translatovat, vibrovat a rotovat, příspěvky energie jsou:

$$E_T \qquad \varepsilon_v = \hbar\omega_0\left(n + \frac{1}{2}\right) \qquad \varepsilon_r = \frac{\hbar^2J(J+1)}{2I}$$

→ pro výpočet příspěvků rotací a vibrací k měrné tepelné kapacitě je nutné znát jejich střední energii pro teplotu T

⇒ pravděpodobnost, že se molekula nachází ve stavu s energiemi E_T, ε_v a ε_r je:

$$W = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_T}e^{-\beta\varepsilon_v}e^{-\beta\varepsilon_r}, \quad \text{kde } \beta = \frac{1}{k_BT}$$

a Z je statistická suma normující W na 1.

$$Z = \sum e^{-\beta E_T}e^{-\beta\varepsilon_v}e^{-\beta\varepsilon_r} = \sum e^{-\beta E_T}\sum e^{-\beta\varepsilon_v}\sum e^{-\beta\varepsilon_r} = Z_T\cdot Z_V\cdot Z_R$$

$$Z_r = \sum_{J=0}^{\infty}e^{-\beta\frac{\hbar^2}{2I}J(J+1)}$$

$$Z_v = \sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta\hbar\omega_0\left(n+\frac{1}{2}\right)} = e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(e^{-\beta\hbar\omega_0}\right)^n = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_0}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_0}}$$

- pro střední energii vibrací platí: $\langle E_v\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_v$

$$\Rightarrow \langle E_v\rangle = \hbar\omega_0\left(\underset{\text{nulové kmity}}{\frac{1}{2}} + \underset{\text{Bose-Einsteinovo rozdělení}}{\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_0} - 1}}\right)$$

- měrná tepelná kapacita je definována vztahem:

$$C_v = N_A\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} \Rightarrow C_V^v = N_Ak_B(\beta\hbar\omega_0)^2\frac{e^{\beta\hbar\omega_0}}{\left(e^{\beta\hbar\omega_0} - 1\right)^2}$$

⇒ střední energie vybuzení na 1 mol plynu

⇒ pro T → ∞, tj. β → 0⁺ máme $C_V^v \to N_Ak_B = R$

- pro celkovou vnitřní energii platí:

$$\langle U\rangle = \frac{1}{Z}(E_T + \varepsilon_r + \varepsilon_v)e^{-\beta(E_T + \varepsilon_r + \varepsilon_v)}$$

↓ z tvaru statistické sumy

$$\langle U\rangle = \frac{1}{Z_T}\sum E_Te^{-\beta E_T} + \frac{1}{Z_v}\sum\varepsilon_ve^{-\beta\varepsilon_v} + \frac{1}{Z_r}\varepsilon_re^{-\beta\varepsilon_r}$$

$$= \langle E_T\rangle + \langle E_v\rangle + \langle E_r\rangle$$

pro T a r analogicky:

$$\langle E_T\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_T \qquad \langle E_r\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_r$$

Pro T → ∞ máme

$C_V^v \to R$

$C_V^r \to \frac{1}{2}R$

$C_V^T \to \frac{3}{2}R$

⇒ $C_V = C_V^v + C_V^r + C_V^T$

- při nízkých teplotách pozorujeme jen translaci, zvyšováním teploty dojde k excitaci rotace a později vibrace

T_{rot}: $k_BT_{rot} \sim \frac{\hbar^2}{2I}$ T_{vib}: $k_BT_{vib} \sim \hbar\omega_0$



2-atomová molekula

→ má 2 stupně volnosti v rotaci