Hamiltonův formalismus

středa 30. listopadu 2022 14:51

Hamiltonův formalismus

Lagrange ↕ $L(q^j, \dot q^j, t)$ na TQ → LR II ≡ ODR 2. řádu

Hamilton $H(q^j, p_j, t)$ na T^*Q → HKR 2n ODR 1. řádu

Kanonická hybnost

$p_j := \frac{\partial L}{\partial \dot q^j}$ ⇒ každé $\dot q^j$ přiřazena příslušná p_j

⇒ páry združených veličin $q^1 \dots q^n$, $p_1 \dots p_n$

(q^j, p_j) ≡ dvojice kanonicky združených proměnných

Fázový prostor

- prostor fyzikálních stavů systému dimenze 2n

$$(\underbrace{q^1,\dots,q^n}_{\substack{\text{poloha}\\ P}}, \underbrace{p_1,\dots,p_n}_{\substack{\text{hybnost}\\ \theta \in T^*_P Q}}) \quad \dim = 2n \quad \text{bod} \equiv \text{stav}$$

- q_j a p_j jsou navzájem nezávislé parametry

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta^i_j \quad \frac{\partial p_i}{\partial p_j} = \delta_i^j \quad \frac{\partial q^i}{\partial p_j} = 0 \quad \frac{\partial p_i}{\partial q^j} = 0 \quad \forall i,j$$

- trajektorie ve fázovém prostoru zobrazuje časový vývoj systému z určitých počátečních podmínek



fázový portrét = soustava přípustných trajektorií vývoje systému pro všechny smysluplné počáteční podmínky

trajektorie – každým prochází právě jedna

- harmonický oscilátor $L = \frac{1}{2}m\dot x^2 - \frac{1}{2}kx^2$



$q(t) = A\cos(\omega t + \delta)$

$p(t) = -m\omega A \sin(\omega t + \delta)$

⇒ $\left(\frac{q}{A}\right)^2 + \left(\frac{p}{m\omega A}\right)^2 = 1$

⇒ elipsy

Hamiltonova funkce

$H(q^j, p_j, t) = \sum_{i=1}^n p_i \dot q^i - L$ = Legendreova duální transformace

⇒ $L = \sum_{i=1}^n p_i \dot q^i - H$ $\quad \dot q^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$

! Pozor ! Je nutné vyjádřit $\dot q^i$ pomocí q^j, p_j

nutno dosadit $\dot q^i = \dot q^i(q^j, p_j, t)$, které získám inverzí $p_j = \frac{\partial L(q^j, \dot q^j, t)}{\partial \dot q^j}$ •

L a H nejsou vždy ekvivalentní – problém pokud nelze invertovat •, což nenastane, pokud

$\frac{\partial p}{\partial \dot q} \neq 0 \iff \frac{\partial^2 L}{\partial \dot q^2} \neq 0 \iff$ nenulovost Hessiánu

⇒ $H \equiv \sum_{i=1}^n p_i \dot q^i(q^j, p_j, t) - L(q^j, \dot q^j(q^j, p_j, t), t)$

je to de facto zobecněná energie ⇒ pokud nezávisí na čase, pak je IP

Poté mají pohybové rovnice unikátní krásný tvar:

$$\frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$$

Hamiltonovy kanonické rovnice

⇒ 2n ODR 1. řádu

→ Hamiltonův a Lagrangeův popis je ekvivalentní, pokud $\det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot q^j \partial \dot q^k}\right) \neq 0$

$$H(q^j, p_j, t) = \sum_{i=1}^n p_i \dot q^i(q^k, p_k, t) - L(q^k, \dot q^i(q^k, p_k, t), t)$$

1) Důkaz přímo:

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial p_i}{\partial p_j}\dot q^i + p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j} - \frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j}\right]$$

$$= \sum_{i=1}^n \left[\delta^j_i \dot q^i + \cancel{p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j}} - \cancel{p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial p_j}}\right]$$

$$= \dot q^j = \frac{dq^j}{dt} \qquad \text{Q.E.D}$$

$$\frac{\partial H}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^n \left[p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j} - \frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j}\right] - \frac{\partial L}{\partial q^j}$$

$$= \sum_{i=1}^n \left[p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j} - p_i \frac{\partial \dot q^i}{\partial q^j}\right] - \frac{\partial L}{\partial q^j}$$

$$= -\frac{\partial L}{\partial q^j} \underset{\substack{\uparrow\\ \text{z LRII}}}{=} -\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q^j}\right) = -\frac{dp_j}{dt}$$

2) elegantně: z $\delta S = 0$

$$0 = \delta S = \delta\int_{t_1}^{t_2} L\, dt = \delta\int_{t_1}^{t_2}\left(\sum_j p_j \dot q^j - H\right)dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left(\dot q^j \delta p_j + p_j \delta \dot q^j - \frac{\partial H}{\partial q^j}\delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\delta p_j\right)dt$$

per partes pro izochronní variace

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left(\dot q^j \delta p_j - \dot p_j \delta q^j - \frac{\partial H}{\partial q^j}\delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\delta p_j\right)dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2}\sum_j\left[\left(\dot q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j}\right)\delta p_j - \left(\dot p_j + \frac{\partial H}{\partial q^j}\right)\delta q^j\right]dt$$

$\forall \delta p_j \quad \forall \delta q^j \quad \forall j$

⇒ $\dot q^j = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \dot p_j = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$

⇒ $\frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j} \qquad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}$

- Rozdílná geometrická interpretace:
  - L je na tečném bandlu konfigurační variety TQ ≡ rychlostní fázový prostor
  - H je na kotečném bandlu konfigurační variety T^*Q ≡ (hybnostní) fázový prostor

⇒ navzájem duální popisy → přechod odpovídá Legendreově transformaci

Harmonický oscilátor



$L = \frac{1}{2}m\dot x^2 - \frac{1}{2}kx^2$

$p = \frac{\partial L}{\partial \dot x} = m\dot x \to \dot x = \frac{p}{m} \to H = p\dot x - L$

⇒ $H = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{1}{2}kx^2$

HKR: $\frac{dp}{dt} = -kx \qquad \frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}$

$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m}\frac{dp}{dt} = -\frac{k}{m}x$

⇒ $\ddot x + \frac{k}{m}x = 0$

∼ $X = \frac{d}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{p}{m} \\ -kx \end{pmatrix}$ ⇒ fázový portrét

Nabitá částice

$L = \frac{1}{2}m\vec v^2 - e(\varphi - \vec v \cdot \vec A)$

$H = \frac{1}{2m}(\vec p - e\vec A)^2 + e\varphi$

Poissonovy závorky

- mějme 2 funkce na fázovém prostoru: $f(q^j, p_j, t)$ $\quad g(q^j, p_j, t)$

⇒ z nich vytvoříme novou funkci:

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^n\left(\frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial q^j}\right)$$

- má unikátní algebraické vlastnosti:

1) $\{f,g\} = -\{g,f\}$ antisymetrie
2) $\{\alpha f_1 + \beta f_2, g\} = \alpha\{f_1,g\} + \beta\{f_2,g\}$ bilinearita
3) $\{\{f,g\},h\} + \{\{g,h\},f\} + \{\{h,f\},g\} = 0$ Jacobiho identita

⇒ Je to Lieova algebra na fázovém prostoru

4) $\{f,f\} = 0$ důsledek antisymetrie
5) $\{fg,h\} = \{f,h\}g + f\{g,h\}$ Leibniz
6) $\frac{\partial}{\partial t}\{f,g\} = \{\frac{\partial f}{\partial t}, g\} + \{f, \frac{\partial g}{\partial t}\}$ derivace podle parametru

Fundamentální Poissonovy závorky

- za f a g vezmeme přímo proměnné fázového prostoru

$$\left.\begin{aligned} \{q^i, q^j\} &= 0 \\ \{p_i, p_j\} &= 0 \\ \{q^i, p_j\} &= \delta^i_j \end{aligned}\right. \Rightarrow \underbrace{\left(\begin{array}{c|c} 0 & -I \\ \hline I & 0 \end{array}\right)}_{2n}\Big\}\, 2n$$

⇒ symplektická matice $\omega_{\alpha\beta}$ $\quad \alpha, \beta \in \{1, \dots, 2n\}$

Poissonovy závorky a integrál pohybu

$f(q^j, p_j)$ je IP $\iff \frac{df}{dt} = 0$

⇒ platí identita: $\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$

Důkaz

$$\frac{df}{dt}(q^j(t), p_j(t), t) = \sum_{j=1}^n\left[\frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{dq^j}{dt} + \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{dp_j}{dt}\right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$= \sum_{j=1}^n\left[\frac{\partial f}{\partial q^j}\frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial H}{\partial q^j}\right] + \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$= \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

⇒ pro $f = f(q^j, p^j)$

f je IP $\iff \{f, H\} = 0$

⇒ pokud H nezávisí na čase, pak $\{H, H\} \equiv 0$ ⇒ H je IP

⇒ jsou-li f a g IP, pak $\{f, g\}$ je IP

Dk: Jacobiho identita a derivace podle parametru

Moment hybnosti

$L_i = \varepsilon_{ij}{}^k x^j p_k$

$\{x^i, L_j\} = \varepsilon^i{}_{jk} x^k \qquad \{p_i, L_j\} = \varepsilon_{ij}{}^k p_k$

$\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ij}{}^k L_k$

Kanonické transformace

- fázový prostor (q^j, p_j) dim 2n

→ jak mohu tyto proměnné měnit?

⇒ změna parametrizace T^*Q

→ změna q^j ovlivní p_j ⇒ kanonické transformace zachovávají fibrovanou strukturu

$$\begin{matrix} q^j \\ p_j \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} Q^j = Q^j(q^i, p_i, t) \\ \underbrace{P_j}_{\text{nové souřadnice}} = P_j\underbrace{(q^i, p_i, t)}_{\text{staré souřadnice}} \end{matrix}$$

Kanonická transformace je taková, která zachovává tvar HKR

- pro obecné transformace se HKR změní
- neboli $\exists H' = H'(Q^j, P_j, t)$ taková, že

$$\frac{dQ_j}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial P_j} \qquad \frac{dP_j}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial Q^j}$$

Hledejme podmínky kanoničnosti transformace:

- využijme nejednoznačnosti Lagrangeovy funkce:

Lagrangeova funkce $L + \frac{dF}{dt}$, kde F je libovolná hladká funkce, dává stejné pohybové rovnice LRII jako původní L:

$$\delta S' = \delta\int_{t_1}^{t_2}\left(L + \frac{dF}{dt}\right)dt = \delta S + \delta\int_{t_1}^{t_2}\frac{dF}{dt}dt =$$

$$= \delta S + \delta\left[F(t)\right]_{t_1}^{t_2} = \delta S + \delta \underset{\substack{\parallel\\0}}{\underbrace{F(t_2)}} - \delta \underset{\substack{\parallel\\0}}{\underbrace{F(t_1)}}$$

$$= \delta S$$

→ úloha s pevnými konci

- funkce F se nazývá generující funkce kanonických transformací
- máme 4 možnosti:

F závisí na staré < q, p; nové < Q, P

$F_1(q, Q)$
$F_2(q, P)$
$F_3(p, Q)$
$F_4(p, P)$

nyní lze odvodit podmínky kanoničnosti transformace pomocí $L \to L + \frac{dF_a}{dt}$ $\quad a \in \{1, \dots, 4\}$



generující funkce	podmínky kanoničnosti		podmínky integrability
$F_1(q^j, Q^j, t)$	$\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = +p_i$	$\frac{\partial F_1}{\partial Q^k} = -P_k$	$\frac{\partial p_i}{\partial Q^k} = -\frac{\partial P_k}{\partial q^i}$
$F_2(q^j, P_j, t)$	$\frac{\partial F_2}{\partial q^i} = +p_i$	$\frac{\partial F_2}{\partial P_k} = +Q^k$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_k} = \frac{\partial Q^k}{\partial q^i}$
$F_3(p_j, Q^j, t)$	$\frac{\partial F_3}{\partial p_i} = -q^i$	$\frac{\partial F_3}{\partial Q^k} = -P_k$	$\frac{\partial q^i}{\partial Q^k} = \frac{\partial P_k}{\partial p_i}$
$F_4(p_j, P_j, t)$	$\frac{\partial F_4}{\partial p_i} = -q^i$	$\frac{\partial F_4}{\partial P_k} = +Q^k$	$\frac{\partial q^i}{\partial P_k} = -\frac{\partial Q^k}{\partial p_i}$

2. sloupec

pro $F_1(q^j, Q^j, t)$: $\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = +p_i \qquad \frac{\partial F_1}{\partial Q^k} = -P_k$

2. sloupec ⇒ 3. sloupec:

$$\boxed{-\frac{\partial P_k}{\partial q^i}} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial q^i \partial Q^k} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^k \partial q^i} = \boxed{\frac{\partial p_i}{\partial Q^k}}$$

ale zároveň 3. sloupec ⇒ 2. sloupec

Důkaz si nechat!.

navíc: $H'(Q^j, P_j, t) = H(q^j, p_j, t) + \frac{\partial F_a}{\partial t}\Big|_{\text{po dosazení}}$

Vlastnosti kanonických transformací

- spojeny Legendreovou transformací:

F_1: $\quad F_2 = F_1 + P_i Q^i$

$\quad F_3 = F_1 - p_i q^i$

$\quad F_4 = F_1 + P_i Q^i - p_i q^i$

vyzkoušení:

$F_1(q, Q) \downarrow F_2(q, P)$ ⇒ dostanu $Q^i P_i$

$F_1(q, Q) \downarrow F_3(p, Q)$ ⇒ dostanu $-q^i p_i$

⇒ F_a jsou obecně ekvivalentní

- pozor ! někdy ne – např. identita $q^j = Q^j \quad p_j = P_j$

→ není F_1 a F_4, pouze F_2, F_3

- tvoří grupu (Lieovu grupu)

- hledání generující funkce odpovídá hledání potenciálu vektorového pole

Jak prakticky ověřovat kanoničnost?

nějaký vzorec z tabulky ⇒ fungují 2. a 3. sloupec?

pomocí $\{\cdot, \cdot\}$

Platí věta:

Transformace je kanonická $\iff \{Q^i, P_j\} = \delta^i_j$

postačí na zadání Q^j, P_j $\Leftarrow$ $\{Q^i, Q^j\} = 0$, $\{P_i, P_j\} = 0$

Př:

$Q = \alpha q + \beta p \qquad P = \gamma q + \delta p$ → lineární transformace

$\{Q, Q\} = 0$, $\{P, P\} = 0$ } díky antisymetrii

$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = \alpha\delta - \beta\gamma \overset{\text{obecně}}{\neq} 1$

→ většinou není kanonická transformace

→ jenom pokud $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$

- $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$
- objem fázového prostoru je invariantní vůči kanonickým transformacím

$$V' = \iint_\Omega dQ\,dP = \iint_\Omega \det\begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} dq\,dp =$$

$$= \iint_\Omega \underbrace{\{Q, P\}_{q,p}}_{=1} dq\,dp = \iint_\Omega dq\,dp = V$$

Hamiltonova-Jacobiho teorie

Stojí na 5 základních vztazích:

1) $\frac{\partial F_1}{\partial q^i} = p_i$ $\quad$ 2) $\frac{\partial F_1}{\partial Q^i} = -P_i$

3) $H'(Q^j, P_j, t) = H(q^j, p_j, t) + \frac{\partial F_1}{\partial t}$

4) $\frac{dQ^j}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial P_j}$ $\quad$ 5) $\frac{dP_j}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial Q^j}$

Uvažujme speciální generující funkci $S(q^j, Q^j, t) \equiv F_1$ (akční funkci) tak, aby $H'(Q^i, P_i, t) \equiv 0$

$H' = H + \frac{\partial S}{\partial t} \overset{\text{chci}}{\Rightarrow} H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$ Hamiltonova-Jacobiho rovnice

↑ rovnice pro S

$H(q^j, \frac{\partial S}{\partial q^j}, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$ = Parciální diferenciální rovnice pro $S(q^j, t)$

↕ p_j

"vlnová verze klasické mechaniky"

pro hmotný bod v potenciálu $V(x)$



→ směr ⊥ k S=konst $\quad H = \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + V(x)$

→ velikost určená $2m[E - V(\vec r)]$, tedy $V(\vec r)$

S=konst = "vlnoplochy"

⇒ $\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = 2m[E - V(x)]$ $\quad$ ansatz $\quad$ ↖ charakteristická Hamiltonova funkce

→ ve 3D

$$\underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2}_{(\nabla S)^2} = 2m[E - V(x, y, z)]$$

pak HKR jsou: $Q^j = \alpha_j$ … konst

$P_j = -\beta_j$ … konst $\quad$ ↑ zde zkus si

⇒ jak to vypadá v q^j a p_j

$\frac{\partial S}{\partial Q^i} = -P_i$

⇒ $\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \qquad S(q^j, \alpha_j, t)$

⇒ $q^j(\alpha_i, \beta_i, t)$ prostou inverzí

Př: Volný pád

① $H = T + V = \frac{1}{2m}p^2 + V(x) \qquad V(x) = -mgx$

② H-J rovnice:

$\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + V(x) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$ → rovnice pro $S(x, t)$

1 nelineární parciální ⇒ řešení trikem

H nezávisí na čase } hledáme ve tvaru

⇒ $S(x, t) = W(x) - Et$ $\quad$ ← konstanta (energie)

↖ charakteristická Hamiltonova funkce

⇒ $\frac{1}{2m}\left(\frac{dW}{dx}\right)^2 + V(x) = E$

$\frac{dW}{dx} = \sqrt{2m(E - V(x))}$

⇒ $W(x) = \int\sqrt{2m(E - V(x))}\,dx$

$V(x) = -mgx$

⇒ $W(x) = \int\sqrt{2m(E + mgx)}\,dx$

$= \frac{1}{3m^2g}\left[2m(E + mgx)\right]^{3/2} + C$

⇒ $S(t, x) = \frac{1}{3m^2g}\left[2m(E + mgx)\right]^{3/2} - Et$

nyní: $\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \to \frac{\partial S}{\partial E} = \beta_i$

⇒ $\frac{1}{mg}\left[2m(E + mgx)\right]^{1/2} - t = \beta$

⇒ $[\ \ ]^{1/2} = mg(t - \beta)$

$2(E + mgx) = mg^2(t - \beta)^2$

⇒ $E + mgx = \frac{1}{2}mg^2(t - \beta)^2$

$x(t) = \frac{1}{2}g(t - \beta)^2 - \frac{E}{mg}$ ☺