4a Transformace

úterý 23. ledna 2024 17:21

4a Reprezentace fyzikálních transformací

- operátory v QM neslouží pouze jako reprezentace fyzikálních pozorovatelných, ale např. unitární operátory vyjadřují transformace, které vedou k ekvivalentnímu popisu fyziky

Unitární operátory

- nejprve zkoumejme matematické vlastnosti unitárních operátorů

Transformace ortonormálních bází

- v separabilních $\mathcal{H}$ lze každý unitární operátor $\hat{U}$ zapsat jako $\hat{U} = \sum_i |\phi_i'\rangle\langle\phi_i|$,

kde $\{|\phi_i\rangle\}$ a $\{|\phi_i'\rangle\}$ jsou dvě ON báze $\mathcal{H}$.

$$\Rightarrow \quad \hat{U}^\dagger = \sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i'| = \hat{U}^{-1}$$

Ekvivalentní definice

(1) $\{|\phi_i\rangle\} \underset{\hat{U}^\dagger}{\overset{\hat{U}}{\rightleftarrows}} \{|\phi_i'\rangle\}$

(2) $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$

(3) $\langle\psi_1'|\psi_2'\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle$, kde $|\psi_\bullet'\rangle = \hat{U}|\psi_\bullet\rangle$

Vlastní hodnoty a vektory

- ze základních vlastností unitárních operátorů:

$$1 = \langle u|u\rangle = \langle u|\overset{\curvearrowleft}{\hat{U}^\dagger}\overset{\curvearrowright}{\hat{U}}|u\rangle = \langle \hat{U}u|\hat{U}u\rangle$$

$$= u^* u \langle u|u\rangle = |u|^2$$

$\Rightarrow$ $u = e^{i\varphi}$ ← vlastní čísla leží na jednotkové kružnici

- můžeme přejít $|u\rangle \mapsto |\varphi\rangle$

$$\langle \varphi|\varphi'\rangle = \langle \varphi|\hat{U}^\dagger \hat{U}|\varphi'\rangle = e^{-i\varphi} e^{i\varphi'} \langle \varphi|\varphi'\rangle$$

$\Rightarrow$ buď $e^{i(\varphi'-\varphi)} = 1$, nebo $\langle \varphi|\varphi'\rangle = 0$

$\Rightarrow$ pro $\varphi' \neq \varphi \mod 2\pi$ $\langle \varphi|\varphi'\rangle = 0$

Spektrální rozklad

→ lze psát $\hat{U} = \sum_j e^{i\varphi_j} \hat{P}_{\varphi_j}$

$$\hat{P}_{\varphi_j} = \sum_k |\varphi_j^{(k)}\rangle\langle \varphi_j^{(k)}|, \quad \text{kde} \quad \hat{P}_{\varphi_i}\hat{P}_{\varphi_j} = \delta_{ij}\hat{P}_{\varphi_i}$$

Operátorová exponenciála

- jakýkoliv unitární operátor lze vyjádřit jako operátorovou exponenciálu hermitovského operátoru

$$\hat{U} = e^{i\hat{A}}, \quad \text{kde} \quad \hat{A} = \hat{A}^\dagger$$

(a) exp $\Rightarrow$ unit

$$\hat{U}^\dagger = (e^{i\hat{A}})^\dagger = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\hat{A})^k}{k!} = e^{-i\hat{A}} = \hat{U}^{-1}$$

(6) unit => exp

$$\forall \hat{U} \equiv \sum_j e^{i\varphi_j} \hat{P}_{\varphi_j} \quad \Rightarrow \quad \hat{A} := \sum_j \varphi_j \hat{P}_{\varphi_j}$$

$$\Rightarrow \quad e^{i\hat{A}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \Big(\sum_j i\varphi_j \hat{P}_{\varphi_j} \Big)^k = \sum_j \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(i\varphi_j)^k}{k!} \hat{P}_{\varphi_j}$$

$$= \sum_j e^{i\varphi_j} \hat{P}_{\varphi_j} = \hat{U}$$

Teorie grup - speedrun

- grupy jsou esenciálním nástrojem pro popis symetrií

Grupa G

Grupa G je množina prvků $\{g\}$ uzavřených pod binární operací $\circ$ (grupové násobení):

$$g_1, g_2 \in G \quad \Rightarrow \quad (g_1 \circ g_2) \in G$$

s vlastnostmi:

(1) asociativita $\quad (g_1 \circ g_2) \circ g_3 = g_1 \circ (g_2 \circ g_3)$

(2) existence jednotkového prvku

$$\exists!\, e \in G : \forall g \in G : \quad e \circ g = g \circ e = g$$

(3) existence inverzního prvku

$$\forall g \in G \;\; \exists g^{-1} \in G : \quad g^{-1} \circ g = g \circ g^{-1} = e$$

-> komutativita není vyžadována

=> grupy s vlastností $\forall g_1, g_2 \in G : g_1 \circ g_2 = g_2 \circ g_1$

se nazývají Abelovské

Unitarní reprezentace

=> zobrazení $g \mapsto \hat{U}_g$, $g_1 \circ g_2 \mapsto \hat{U}_{g_1}\hat{U}_{g_2}$

- $\{\hat{U}_g\}$ je grupa, protože
  - uzavřenost: $(\hat{U}_2\hat{U}_1)^\dagger = \hat{U}_1^\dagger\hat{U}_2^\dagger = \hat{U}_1^{-1}\hat{U}_2^{-1} = (\hat{U}_2\hat{U}_1)^{-1}$
  - asociativita $(\hat{U}_1\hat{U}_2)\hat{U}_3 = \hat{U}_1(\hat{U}_2\hat{U}_3)$
  - jednotka $e \mapsto \hat{I} = \hat{I}^{-1} = \hat{I}^\dagger$
  - inverze $\hat{U} = e^{i\hat{A}} \Rightarrow \hat{U}^{-1} = e^{-i\hat{A}}$

Lieovy grupy

= grupy s elementy parametrizovanými N-dimenzionálním reálným vektorem parametrů $\vec{s}$

=> elementy grupy tvoří kontinuum

→ $G = \{g(\vec{s})\}_{\vec{s} \in \mathbb{R}^N}$

→ operace grupového násobení je definována:

$$g(\vec{s}_1) \circ g(\vec{s}_2) = g(\vec{s}_3) \qquad \vec{s}_3 = f(\vec{s}_1, \vec{s}_2)$$

$$g^{-1}(\vec{s}) = g(\vec{s}\,') \qquad \vec{s}\,' = h(\vec{s})$$

f, h jsou diferencovatelné funkce, f nemusí být nutně symetrická.

- unitární reprezentace Lieovy grupy $g(\vec{s}) \mapsto \hat{U}(\vec{s})$

N = 1

$$G = \{g(s)\}_{s \in \mathbb{R}} \mapsto \{\hat{U}(s)\}_{s \in \mathbb{R}}$$

- požadavky :

(1) výběr počátku $\hat{U}(0) = \hat{I}$

(2) lokální aditivita $\hat{U}(s+ds) = \hat{U}(s)\hat{U}(ds)$

$$\Leftarrow \quad f(s,ds) = s + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial s_2}}_{1} ds + \cdots$$

- unitární operátor lze vyjádřit pomocí rozvoje v parametru s:

$$\hat{U}(s) = \hat{I} + \frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 s + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \hat{U}}{\partial s^2}\Big|_0 s^2 + \cdots$$

$$\hat{U}(s)\hat{U}^\dagger(s) = \hat{I} + \underbrace{\left[\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 + \frac{\partial \hat{U}^\dagger}{\partial s}\Big|_0\right]}_{=0} s + \underbrace{\left[\cdots\right]}_{=0} s^2 + \cdots = \hat{I}$$

=> platí $\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 = i\hat{G}$, kde $\hat{G} = \hat{G}^\dagger$

=> máme podmínku

$$\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_s = \lim_{ds\to 0} \frac{\hat{U}(s+ds) - \hat{U}(s)}{ds} = \hat{U}(s)\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 = i\hat{U}(s)\hat{G}$$

-> získáváme nejobecnější řešení : $\hat{U} = e^{i\hat{G}s}$,

kde $\hat{G}$ je generátor grupy $\mathcal{G}$

=> grupa je Abelovská

$$\hat{U}(s_1)\hat{U}(s_2) = e^{i\hat{G}s_1}e^{i\hat{G}s_2} = e^{i\hat{G}(s_1+s_2)} = \hat{U}(s_1+s_2)$$

$$= \cdots = \hat{U}(s_2)\hat{U}(s_1)$$

N>1

$$\mathcal{G} \equiv \{g(\vec{s})\}_{\vec{s}\in\mathbb{R}^N} \mapsto \{\hat{U}(\vec{s})\}_{\vec{s}\in\mathbb{R}^N}$$

- analogicky získáme $\hat{U}(\vec{s}) = e^{i\vec{G}\cdot\vec{s}}$

→ $\vec{G} = \{\hat{G}_k\}_{k=1}^{N}$ je množina generátorů grupy

- platí $\hat{U}(\vec{s}) = e^{i\vec{G}\cdot\vec{s}} = e^{i\sum_{k=1}^{N}\hat{G}_k s_k} \neq \prod_{k=1}^{N} e^{i\hat{G}_k s_k}$

→ pokud $[\hat{G}_i, \hat{G}_j] \neq 0$ ⇒ grupa není nutně Abelovská

↖ může, nemusí

$$\Rightarrow \quad \hat{U}(\vec{s}_1)\hat{U}(\vec{s}_2) \neq \hat{U}(\vec{s}_1+\vec{s}_2) \neq \hat{U}(\vec{s}_2)\hat{U}(\vec{s}_1)$$

- v rozvoji lze psát:

$$\hat{U}(\vec{s}) = \hat{I} + i\hat{G}_j s_j - \frac{1}{2}\hat{G}_j\hat{G}_k s_j s_k + O(s^3)$$

⇒ pro $\hat{U}^{-1}(\vec{\delta})\hat{U}^{-1}(\vec{\varepsilon})\hat{U}(\vec{\delta})\hat{U}(\vec{\varepsilon}) = \hat{U}(\vec{\sigma})$

máme ve druhém řádu:


$\hat{U}^{-1}(\vec{\varepsilon})$
$\hat{U}(\vec{\delta})$
$\hat{U}^{-1}(\vec{\delta})$
$\hat{U}(\vec{\varepsilon})$
$\hat{U}(\vec{\sigma})$

$$(\hat{I} - i\hat{G}_j\varepsilon_j - \tfrac{1}{2}\hat{G}_j\hat{G}_k\varepsilon_j\varepsilon_k)$$
$$\cdot\,(\hat{I} - i\hat{G}_j\delta_j - \tfrac{1}{2}\hat{G}_j\hat{G}_k\delta_j\delta_k)$$
$$\cdot\,(\hat{I} + i\hat{G}_j\varepsilon_j - \tfrac{1}{2}\hat{G}_j\hat{G}_k\varepsilon_j\varepsilon_k)$$
$$\cdot\,(\hat{I} + i\hat{G}_j\delta_j - \tfrac{1}{2}\hat{G}_j\hat{G}_k\delta_j\delta_k)$$
$$= \hat{I} + \underbrace{(\hat{G}_m\hat{G}_n - \hat{G}_n\hat{G}_m)}_{[\hat{G}_m,\hat{G}_n]}\varepsilon_m\delta_n + O(\varepsilon^3)$$

Dále jelikož $\hat{U}(\vec{\sigma}) = \hat{I} + i\hat{G}_\ell\sigma_\ell + O(\sigma^2)$

$$\sigma_\ell = S_{mn\ell}\,\varepsilon_m\delta_n$$

⇒ celkově získáme

$$[\hat{G}_m, \hat{G}_n] = i S_{mn\ell}\,\hat{G}_\ell$$

Sume ≡ strukturní konstanty dané Lieovy grupy

Symetrie v QM

- nejsilnější koncept ve fyzice
- Weylova definice: Věc je symetrická, pokud existuje něco, co jí můžeš udělat a poté, co jsi skončil, tak vypadá stejně jako předtím.

Pasivní transformace

= transformace operátorů

$\hat{A} \mapsto \hat{A}'$ $\qquad$ $\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}$



Aktivní transformace

= transformace stavů

$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle$ $\qquad$ $|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle$



Symetrie sensu lato

≡ v širším smyslu

→ provedením pasivní i aktivní transformace se nic nezmění



(a) $\langle\psi'_1|\psi'_2\rangle = \langle\hat{U}\psi_1|\hat{U}\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\underbrace{\hat{U}^+\hat{U}}_{\hat{I}}|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle$

⇒ zachování skalárního součinu

(b) $\langle\psi'_1|\hat{A}|\psi'_2\rangle = \langle\hat{U}\psi_1|\hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}|\hat{U}\psi_2\rangle$

$= \langle\psi_1|\underbrace{\hat{U}^+\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{A}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle$

⇒ zachování maticových elementů

(c) $[\hat{A},\hat{B}] = i\hat{C}$

$[\hat{A}',\hat{B}'] = \hat{A}'\hat{B}' - \hat{B}'\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{B}\hat{U}^{-1} - \hat{U}\hat{B}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{A}\hat{U}^{-1}$

$= \hat{U}[\hat{A},\hat{B}]\hat{U}^{-1} = i\hat{U}\hat{C}\hat{U}^{-1} = i\hat{C}'$

⇒ zachování komutátoru

Symetrie sensu stricto

≡ v užším smyslu

→ konkrétní fyzikální systém je invariantní vůči transformaci $S \to S'$, pokud se jeho Hamiltonián nemění, i.e. $\hat{H}' = \hat{H}$

→ unitární transformace pomocí $\hat{U}$

$$\hat{H}' = \hat{U}\hat{H}\hat{U}^{-1} \overset{?}{=} \hat{H} \iff \hat{U}\hat{H}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}} = \hat{H}\hat{U}$$

$$\iff \hat{U}\hat{H} = \hat{H}\hat{U} \iff [\hat{U}, \hat{H}] = 0$$

- pokud $\{\hat{G}_j\}$ jsou generátory $\hat{U}$, pak

$$[\hat{G}_j, \hat{H}] = 0$$

Důsledky

(a) degenerace energetických hladin

pokud $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ a $\hat{H}$ je invariantní vůči $\hat{U}$,

pak $\hat{H}(\hat{U}|\psi\rangle) = \hat{E}(\hat{U}|\psi\rangle)$

→ i.e. pokud $\hat{U}|\psi\rangle \neq |\psi\rangle$, tak je hladina degenerovaná!

(b) zákony zachování ⟺ integrály pohybu