

# Skript Analysis I


Mitschrift der Vorlesung „Analysis I“ von Prof. Dr. Wilhelm Winter


Jannes Bantje

4. September 2014

Aktuelle Version verfügbar bei:



 **GitHub** (inklusive Sourcecode)  
<https://github.com/JaMeZ-B/latex-www>



 **Bittorrent Sync**  
B6WH2DISQ5QVYIRYIEZSF4ZR2IDVKPN3I

## Vorwort — Mitarbeit am Skript

Dieses Dokument ist eine Mitschrift aus der Vorlesung „Analysis I, WiSe 2012“, gelesen von Prof. Dr. Wilhelm Winter. Der Inhalt entspricht weitestgehend dem Tafelanschrieb. Für die Korrektheit des Inhalts übernehme ich keinerlei Garantie! Für Bemerkungen und Korrekturen – und seien es nur Rechtschreibfehler – bin ich sehr dankbar. Korrekturen lassen sich prinzipiell auf drei Wegen einreichen:

- Persönliches Ansprechen in der Uni, Mails an [j.bantje@wwu.de](mailto:j.bantje@wwu.de) (gerne auch mit annotieren PDFs)
- *Direktes* Mitarbeiten am Skript: Den Quellcode poste ich auf GitHub (siehe oben), also stehen vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Verfügung: Zum Beispiel durch Kommentare am Code über die Website und die Kombination Fork + Pull Request. Wer sich verdient macht oder ein Skript zu einer Vorlesung, die ich nicht besuche, beisteuern will, dem gewähre ich gerne auch Schreibzugriff.

Beachten sollte man dabei, dass dazu ein Account bei [github.com](https://github.com) notwendig ist, der allerdings ohne Angabe von persönlichen Daten angelegt werden kann. Wer bei GitHub (bzw. dem zugrunde liegenden Open-Source-Programm „git“) – verständlicherweise – Hilfe beim Einstieg braucht, dem helfe ich gerne weiter. Es gibt aber auch zahlreiche empfehlenswerte Tutorials im Internet.<sup>1</sup>

- *Indirektes* Mitarbeiten:  $\text{\TeX}$ -Dateien per Mail verschicken.

Dies ist nur dann sinnvoll, wenn man einen ganzen Abschnitt ändern möchte (zB. einen alternativen Beweis geben), da ich die Änderungen dann per Hand einbauen muss!

## Vorlesungshomepage

[http://wwwmath.uni-muenster.de/u/wilhelm.winter/wwinter/analysis\\_III.html](http://wwwmath.uni-muenster.de/u/wilhelm.winter/wwinter/analysis_III.html)

---

<sup>1</sup>zB. <https://try.github.io/levels/1/challenges/1>, ist auf Englisch, aber dafür interaktives LearningByDoing

# Inhaltsverzeichnis

<b>0 Mengen und Abbildungen</b>	<b>1</b>
0.1 Cantor über Mengen: . . . . .	1
0.2 Definition . . . . .	1
0.3 Definition . . . . .	1
0.4 Proposition (de Morgensche Regeln) . . . . .	2
0.5 Frage: Ist es wichtig, dass $S$ nicht leer ist? . . . . .	2
0.6 Definition: Seien $X, Y$ Mengen . . . . .	2
0.7 Definition . . . . .	2
0.8 Definition . . . . .	3
0.9 Proposition . . . . .	3
<b>1 Natürliche Zahlen und vollständige Induktion</b>	<b>4</b>
1.1 Definition . . . . .	4
1.2 Exkurs . . . . .	4
1.2.1 Axiom (Axiom der unendlichen Mengen) . . . . .	4
1.2.2 Satz . . . . .	4
1.2.3 Bemerkung . . . . .	4
1.3 Das Prinzip der vollständigen Induktion . . . . .	4
1.4 Beweis . . . . .	4
1.5 Beispiele . . . . .	5
1.6 Definition . . . . .	6
1.7 Proposition . . . . .	6
1.8 Satz . . . . .	6
1.8.1 Beweis . . . . .	7
1.9 Satz . . . . .	7
1.10 Der Binomische Lehrsatz . . . . .	7
1.10.1 Beweis . . . . .	8
<b>2 Angeordnete Körper</b>	<b>8</b>
2.1 Definition . . . . .	8
2.2 Bemerkung . . . . .	9
2.3 Beispiele . . . . .	9
2.4 Definition . . . . .	10
2.5 Bemerkungen . . . . .	10
2.6 Bemerkung . . . . .	11
2.7 Proposition: Bernoullische Ungleichung . . . . .	11
2.8 Definition . . . . .	12
2.9 Bemerkungen . . . . .	12
2.10 Proposition . . . . .	12
2.11 Beispiele . . . . .	13
2.12 Definition . . . . .	13
2.13 Definition Supremumsprinzip . . . . .	13
2.14 Bemerkungen . . . . .	13
2.15 Beispiele . . . . .	14
2.16 Definition und Satz . . . . .	14
2.17 Definition und Proposition . . . . .	14
2.18 Exkurs: Das Zahlensystem . . . . .	15

<b>3</b>	<b>Intervallschachtelungen</b>	<b>16</b>
3.1	Definition . . . . .	16
3.2	Satz (Intervallschachtelungsprinzip) . . . . .	16
3.3	Satz . . . . .	16
<b>4</b>	<b>Abzählbarkeit</b>	<b>18</b>
4.1	Definition . . . . .	18
4.2	Beispiele . . . . .	18
4.3	Satz . . . . .	19
<b>5</b>	<b>Folgen und Grenzwerte</b>	<b>19</b>
5.1	Definition . . . . .	19
5.2	Beispiele . . . . .	19
5.3	Definition . . . . .	20
5.4	Beispiele . . . . .	20
5.5	Bemerkung . . . . .	21
5.6	Proposition . . . . .	21
5.7	Proposition . . . . .	22
5.8	Beispiel . . . . .	23
5.9	Bemerkung . . . . .	23
<b>6</b>	<b>Vollständigkeit</b>	<b>24</b>
6.1	Definition . . . . .	24
6.2	Beispiele . . . . .	24
6.3	Satz von Bolzano-Weierstraß . . . . .	24
6.4	Bemerkung . . . . .	25
6.5	Definition . . . . .	25
6.6	Satz . . . . .	26
6.7	Beispiel . . . . .	26
6.8	Definition . . . . .	26
6.9	Bemerkung . . . . .	27
6.10	Satz . . . . .	27
6.11	Bemerkung . . . . .	27
<b>7</b>	<b>Reihen</b>	<b>28</b>
7.1	Definition . . . . .	28
7.2	Beispiel: geometrische Reihe . . . . .	28
7.3	Satz: Cauchy'sches Konvergenzkriterium . . . . .	28
7.4	Bemerkung . . . . .	28
7.5	Satz . . . . .	28
7.6	Beispiel: Harmonische Reihe . . . . .	29
7.7	Leibnizkriterium . . . . .	29
7.8	Beispiel . . . . .	30
7.9	Definition . . . . .	30
7.10	Proposition . . . . .	30
7.11	Majorantenkriterium . . . . .	31
7.12	Beispiel . . . . .	31
7.13	Satz: Quotientenkriterium . . . . .	32
7.14	Bemerkung . . . . .	32
7.15	Cauchyprodukt von Reihen . . . . .	32
7.16	Beispiele . . . . .	34

<b>8</b>	<b>Die Exponentialreihe</b>	<b>35</b>
8.1	Definition und Satz . . . . .	35
8.2	Satz: Funktionalgleichung von $\exp(\cdot)$ . . . . .	36
8.3	Corollar . . . . .	36
<b>9</b>	<b>Stetige Funktionen</b>	<b>36</b>
9.1	Definition . . . . .	36
9.2	Beispiele . . . . .	37
9.3	Defintion . . . . .	38
9.4	Beispiele . . . . .	38
9.5	Proposition . . . . .	38
9.6	Proposition . . . . .	39
9.7	Proposition . . . . .	39
9.8	Beispiel . . . . .	39
9.9	Bemerkung . . . . .	40
9.10	Satz: Zwischenwertsatz . . . . .	40
9.11	Beispiel . . . . .	40
9.12	Satz . . . . .	41
9.13	Definition . . . . .	41
9.14	Bemerkung . . . . .	41
9.15	Satz . . . . .	41
9.16	Definition . . . . .	42
9.17	Satz . . . . .	42
9.18	Bemerkung . . . . .	43
9.19	Beispiel . . . . .	43
9.20	Definition und Satz . . . . .	43
9.21	Definition und Proposition . . . . .	44
9.22	Bemerkung . . . . .	44
9.23	Satz . . . . .	45
9.24	Definition . . . . .	45
9.25	Beispiele . . . . .	45
<b>10</b>	<b>Die komplexen Zahlen</b>	<b>48</b>
10.1	Definition . . . . .	48
10.2	Definition . . . . .	48
10.3	Proposition . . . . .	49
10.4	Corollar . . . . .	49
10.5	Defintion . . . . .	50
10.6	Proposition . . . . .	50
10.7	Satz . . . . .	50
10.8	Definition . . . . .	50
10.9	Bemerkung . . . . .	51
10.10	Satz (Majorantenkriterium) . . . . .	51
10.11	Satz (Quotientenkriterium) . . . . .	51
10.12	Satz . . . . .	51
10.13	Satz . . . . .	52
10.14	Definition . . . . .	52
10.15	Bemerkung . . . . .	52
10.16	Satz . . . . .	52
10.17	geometrische Interpretation . . . . .	53

<b>11</b>	<b>Winkelfunktion</b>	<b>53</b>
11.1	Definition	53
11.2	Bemerkung	53
11.3	Proposition	53
11.4	Satz	54
11.5	Satz: Additionstheoreme	54
11.6	Corollar	55
11.7	Satz	55
11.8	Proposition	56
11.9	Proposition	57
11.10	Proposition	57
11.11	Definition und Satz	57
11.12	Bemerkung	57
11.13	Satz: Polarzerlegung	60
11.14	Bemerkung	61
11.15	Corollar	61
<b>12</b>	<b>Differentiation</b>	<b>62</b>
12.1	Definiton	62
12.2	Bemerkung	62
12.3	Beispiel	63
12.4	Satz	64
12.5	Beispiel	65
12.6	Satz	65
12.7	Beispiel	66
12.8	Satz (Kettenregel)	66
12.9	Beispiel	67
12.10	Definition	67
12.11	Beispiel	67
12.12	Definition	67
12.13	Satz	68
12.14	Bemerkung	68
12.15	Satz von Rolle	68
12.16	Mittelwertsatz	68
12.17	Korollar	69
12.18	Korollar	69
12.19	Satz (l'Hospital)	69
12.20	Beispiel	70
<b>13</b>	<b>Integration</b>	<b>70</b>
13.1	Definition	70
13.2	Bemerkung	71
13.3	Definition und Proposition	71
13.4	Proposition	72
13.5	Definition	73
13.6	Proposition	73
13.7	Definition	73
13.8	Proposition	74
13.9	Beispiel	74
13.10	Definition und Satz	74
13.11	Proposition	75
13.12	Bemerkung	76

13.13 Mittelwertsatz der Integralrechnung . . . . .	76
13.14 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung . . . . .	77
13.15 Bemerkung . . . . .	78
13.16 Beispiele . . . . .	78
13.17 Satz: Substitutionsregel . . . . .	79
13.18 Beispiel . . . . .	79
13.19 Satz: Partielle Integration . . . . .	80
13.20 Beispiel . . . . .	80
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>A</b>





## 0 Mengen und Abbildungen

### 0.1 Cantor über Mengen:

”Zusammenfassung vor bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung und unseres Denkens zu einem Ganzen”

### 0.2 Definition

(i) Teilmenge

$$A \subset B \quad \text{falls gilt} \quad x \in A \Rightarrow x \in B$$

(ii) Vereinigung

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \quad \text{oder} \quad x \in B\}$$

(iii) Durchschnitt

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \quad \text{und} \quad x \in B\}$$

(iv) Differenz

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \quad \text{und} \quad x \notin B\}$$

(v) Potenzmenge, Menge aller Teilmengen von A

$$\mathcal{P}(A) := \{C \mid C \subset A\}$$

(vi) kartesisches Produkt

$$A \times B := \{(x, y) \mid x \in A \quad \text{und} \quad y \in B\}$$

(vii)  $\emptyset$  sei die leere Menge

### 0.3 Definition

Sei S ein System von Mengen

(i)

$$\bigcup_{M \in S} M := \{x \mid x \in M \quad \text{für ein} \quad M \in S\}$$

(ii)

$$\bigcap_{M \in S} M := \{x \mid x \in M \quad \text{für jedes} \quad M \in S\}$$

alternativ: Sei  $S = (M_i)_{i \in I}$  für eine Indexmenge I

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x \mid x \in M_i \quad \text{für ein} \quad i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x \mid x \in M_i \quad \text{für jedes} \quad i \in I\}$$

## 0.4 Proposition (de Morgensche Regeln)

Sei  $X$  eine Menge und  $S \subset \mathcal{P}(X) \neq \emptyset$  ein nichtleeres System von Teilmengen. Dann gilt:

(i)

$$X \setminus \left( \bigcup_{M \in S} M \right) = \bigcap_{M \in S} (X \setminus M)$$

(ii)

$$X \setminus \left( \bigcap_{M \in S} M \right) = \bigcup_{M \in S} (X \setminus M)$$

Beweis:

(i)

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow x \in X \setminus \left( \bigcup_{M \in S} M \right) \\ &\Leftrightarrow x \in X \quad \text{und} \quad x \notin M \quad \text{für jedes} \quad M \in S \\ &\Leftrightarrow x \in X \setminus M \quad \text{für jedes} \quad M \in S \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{M \in S} (X \setminus M) \end{aligned}$$

(ii) Übung!!!

## 0.5 Frage: Ist es wichtig, dass $S$ nicht leer ist?

## 0.6 Definition: Seien $X, Y$ Mengen

Eine Abbildung  $f : X \rightarrow Y$  ist eine Vorschrift, welche jedem  $x \in X$  genau ein  $y \in Y$  zuordnet. Wir schreiben dann:

$$y = f(x) \quad \text{oder} \quad x \mapsto y$$

formaler: Eine Abbildung  $f : X \rightarrow Y$  ist eine Teilmenge  $f \subset X \times Y$  sodass gilt

$$\forall x \in X \quad \exists! y \in Y : (x, y) \in f$$

$\{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subset X \times Y$  heißt auch 'Graph von  $f$ '.

Seien  $X, Y, Z$  Mengen,  $f : X \rightarrow Y$   $g : Y \rightarrow Z$

Dann ist  $g \circ f : X \rightarrow Z$

## 0.7 Definition

Seien  $X, Y$  Mengen und  $f : X \rightarrow Y$  eine Abbildung,  $A \subset X, B \subset Y$  Teilmengen

(i)

$$f(A) := \{y \in Y \mid \exists x \in A : f(x) = y\}$$

In diesem Zusammenhang heißt  $f(A)$  auch 'Bild von  $A$  unter  $f$ '.

(ii)

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid \exists y \in B : f(x) = y\}$$

In diesem Zusammenhang heißt  $f^{-1}(B)$  auch 'Urbild von  $B$  unter  $f$ '.

## 0.8 Definition

Seien  $X, Y$  Mengen,  $f : X \rightarrow Y$  eine Abbildung

(i)  $f$  heißt injektiv, falls gilt:

$$x, x' \in X, f(x) = f(x') \implies x = x'$$

alternativ:

$$x, x' \in X, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$$

(ii)  $f$  heißt surjektiv, falls gilt:

$$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$$

alternativ:

$$f(X) = Y$$

(iii)  $f$  heißt bijektiv, falls  $f$  injektiv und surjektiv ist.

## 0.9 Proposition

Sei  $f : X \rightarrow Y$  bijektiv, dann existiert genau eine Umkehrabbildung (genau ein Inverses)  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  mit der Eigenschaft

$$f \circ f^{-1} = id_Y \quad \text{bzw.} \quad f^{-1} \circ f = id_X$$

wobei

$$id_Y : Y \rightarrow Y, y \mapsto y \quad \text{und} \quad id_X : X \rightarrow X, x \mapsto x$$

Beweis:

$$y \mapsto f^{-1}(y) := \text{dasjenige } x \in X \text{ mit } f(x) = y$$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ ist surjektiv : ein solches } x \text{ existiert} \\ f \text{ ist injektiv : es existiert höchstens ein solches } x \end{array} \right\} = f^{-1} \text{ ist wohldefiniert}$$

$$f \circ f^{-1}(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y \quad (\text{dasjenige } x \in X \text{ mit } f(x) = y)$$

Das heißt:  $\forall y \in Y \Rightarrow f \circ f^{-1} = id_Y$

Analog folgt daraus  $f^{-1} \circ f = id_X$

Sei nun  $g : Y \rightarrow X$  eine weitere Abbildung mit der Eigenschaft  $f \circ g = id_Y$  und  $g \circ f = id_X$ . Dann gilt

$$\forall y \in Y \quad f(g(y)) = y \quad \text{d.h. } g(y) \text{ ist dasjenige } x \in X \text{ mit } f(x) = y$$

$$\implies g(y) = f^{-1}(y) \Rightarrow g = f^{-1}$$

# 1 Natürliche Zahlen und vollständige Induktion

## 1.1 Definition

Wir definieren die Menge der natürlichen Zahlen als

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

## 1.2 Exkurs

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset \\ 1 &:= \{\emptyset\} \quad (\text{Potenzmenge der leeren Menge}) \\ 2 &:= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 &:= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset\{\emptyset\}\}\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

### 1.2.1 Axiom (Axiom der unendlichen Mengen)

Es existiert eine Menge  $N$  mit:

- (N1) Die Elemente von  $N$  sind Mengen
- (N2)  $\emptyset \in N$
- (N3)  $n \in N \implies n \cup \{n\} \in N$

### 1.2.2 Satz

Es existiert eine kleinste Menge, welche die Eigenschaften (N1), (N2), (N3) erfüllt. Diese Menge nennen wir die natürlichen Zahlen  $\mathbb{N}$ .

### 1.2.3 Bemerkung

Die Existenz unendlicher Mengen ist nicht trivial!

zum Vergleich: Die Menge aller Mengen  $\not\in$ .

## 1.3 Das Prinzip der vollständigen Induktion

Es sei  $(A(n))_{n \in \mathbb{N}}$  ein System von Aussagen. Es gelte:

- (IA)  $A(0)$  ist wahr
  - (IS)  $\forall n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ wahr} \implies A(n+1) \text{ wahr}$
- (IV)

Dann ist  $A(n)$  wahr für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

## 1.4 Beweis

1.3 ist äquivalent zu dem Satz 1.2.2

## 1.5 Beispiele

(i)  $A(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

- (IA):  $\sum_{k=1}^0 k = 0 = \frac{0(0+1)}{2} \implies A(0)$  ist wahr
- (IS): Sei  $A(n)$  wahr (IV)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} k &= \left( \sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) \\
 &\stackrel{(IV)}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\
 &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
 &= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \\
 &\implies A(n+1) \text{ ist wahr} \\
 &\implies \text{(IA) und (IS)} \\
 &\implies A(n) \text{ ist wahr für alle } n \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

(ii)  $A(n)$  Für alle  $x \neq 1$  gilt:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

(Summenformel für die geometrische Reihe)

- (IA):  $\sum_{k=0}^0 x^k = x^0 = 1 = \frac{1 - x^{0+1}}{1 - x} \implies A(0)$  ist wahr
- (IS): Sei  $A(n)$  wahr (IV)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{n+1} x^k &= \left( \sum_{k=0}^n x^k \right) + x^{n+1} \\
 &\stackrel{(IV)}{=} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} \\
 &= \frac{1 - x^{n+1} + (1 - x)x^{n+1}}{1 - x} \\
 &= \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1 - x} \\
 &= \frac{1 - x^{(n+1)+1}}{1 - x} \\
 &\implies A(n+1) \text{ ist wahr} \\
 &\implies A(n) \text{ ist wahr für alle } n \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

## 1.6 Definition

(i) Für  $n \in \mathbb{N}$  setzen wir:

$$n! := \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

$$(0! := \prod_{n=1}^0 k = 1 \quad \text{nach Konvention})$$

(ii) Für  $n, k \in \mathbb{N}$  setzen wir:

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \prod_{j=1}^k \frac{n-j+1}{j} \\ &= \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k} \\ &= \frac{\overbrace{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}^{=n!} (n-k)!}{\underbrace{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k}_{=k!} (n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

## 1.7 Proposition

(i)  $\binom{n}{k} = 0$  falls  $k > n$

(ii)  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{n-k}$  (falls  $k \geq 0$ )

(iii)  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$  falls  $k < n$

Beweise für (i) und (ii) schenken wir uns...

(iii)

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!k + (n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!(k+n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k} \end{aligned}$$

## 1.8 Satz

Die Anzahl der Anordnungen einer  $n$ -elementigen Menge ist  $n!$

Eine Anordnung der Menge  $\{x_1, \dots, x_n\}$  ist eine Bijektion  $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{x_1, \dots, x_n\}$

### 1.8.1 Beweis

- I.A.:  $n = 0$

Es gibt genau eine Abbildung  $\emptyset \rightarrow \emptyset$ , die sogenannte "leere Abbildung" (Abb.:  $f \subset \emptyset \times \emptyset = \emptyset$ ). Diese ist bijektiv.

$$0! = 1$$

(konkreter für  $n = 1$  existiert genau eine Bijektion  $\{1\} \rightarrow \{x_1\}$ )

- I.S.: Der Satz sei bewiesen für ein  $n \in \mathbb{N}$

Sei  $M := \{x_1, x_2, \dots, x_{n+1}\}$  eine Menge mit  $n + 1$  Elementen. Gesucht:

$$\#F \quad \text{Mächtigkeit von } F := \left\{ f : \{1, \dots, n+1\} \rightarrow \{x_1, \dots, x_{n+1}\} \mid f \text{ bijektiv} \right\}$$

Setze:  $F_k := \{f \in F \mid f(n+1) = x_k\}$  dann ist

$$\#F_k = \# \left\{ f : \{1, \dots, n\} \rightarrow M \setminus \{x_k\} \mid f \text{ bijektiv} \right\} \\ \stackrel{(\text{I.S.})}{=} n!$$

Außerdem gilt:  $F = \bigcup_{k=1, \dots, n+1} F_k$ , also:

$$\begin{aligned} \#F &= \sum_{k=1}^{n+1} \#F_k = \sum_{k=1}^{n+1} n! = \underbrace{n! + n! + \dots + n!}_{n+1} \\ &= (n+1)n! = (n+1)! \end{aligned}$$

### 1.9 Satz

Die Anzahl der  $k$ -elementigen Teilmengen einer  $n$ -elementigen Menge ist  $\binom{n}{k}$ . Insbesondere ist  $\binom{n}{k}$  ganzzahlig.

### 1.10 Der Binomische Lehrsatz

Für  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $n \in \mathbb{N}$  gilt:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Insbesondere:

Für  $y = x = 1$

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Für  $x = 1, y = -1$

$$0 = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

### 1.10.1 Beweis

- I.A.: ( $n = 0$ )

$$(x + y)^0 = 1 = \binom{0}{0} x^0 y^0 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} x^{0-k} y^k$$

- I.S.: Der Satz sei bewiesen für ein  $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} (x + y)^{n+1} &= (x + y)^n (x + y) \\ &\stackrel{(I.V.)}{=} \left( \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \right) \cdot (x + y) \\ &= \left( \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k+1} y^k \right) + \left( \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k+1} \right) \\ &= x^{n+1} + \left( \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k+1} y^k \right) + \left( \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k+1} \right) + y^{n+1} \\ &= x^{n+1} + \left( \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k+1} y^k \right) + \left( \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^{n-(k-1)} y^{(k-1)+1} \right) + y^{n+1} \\ &= x^{n+1} + \left( \sum_{k=1}^n \left( \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n-k+1} y^k \right) + y^{n+1} \\ &\stackrel{1.7(iii)}{=} x^{n+1} + \left( \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^{n-k+1} y^k \right) + y^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n-k+1} y^k \\ &\text{q.e.d.} \end{aligned}$$

## 2 Angeordnete Körper

### 2.1 Definition

Ein Körper  $(K, +, \cdot)$  ist eine Menge  $K$  mit Abbildungen ("Operationen")

$$\begin{aligned} + : K \times K &\longrightarrow K \\ (x, y) &\longmapsto x + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : K \times K &\longrightarrow K \\ (x, y) &\longmapsto x \cdot y \end{aligned}$$

sodass gilt:

- |      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| (A1) | $\forall x, y, z \in K : (x + y) + z = x + (y + z)$ | (Assoziativität)        |
| (A2) | $\forall x, y \in K : x + y = y + x$                | (Kommutativität)        |
| (A3) | $\exists 0 \in K : \forall x \in K : x + 0 = x$     | (Existenz der Null)     |
| (A4) | $\forall x \in K \exists -x \in K : x + (-x) = 0$   | (Existenz des Inversen) |



$\Rightarrow (K, +)$  ist eine abelsche Gruppe

$$(M1) \quad \forall x, y, z \in K \setminus \{0\} : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad (\text{Assoziativität})$$

$$(M2) \quad \forall x, y \in K \setminus \{0\} : x \cdot y = y \cdot x \quad (\text{Kommutativität})$$

$$(M3) \quad \exists 1 \in K \setminus \{0\} : \forall x \in K \setminus \{0\} : x \cdot 1 = x \quad (\text{Existenz der Eins})$$

$$(M4) \quad \forall x \in K \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in K : x \cdot x^{-1} = 1 \quad (\text{Existenz des Inversen})$$

$$(D1) \quad \forall x, y, z \in K : x(y + z) = xy + xz \quad (\text{Distributivität})$$

$\Rightarrow (K, \cdot)$  ist eine abelsche Gruppe

$\Rightarrow +$  und  $\cdot$  sind kompatibel

## 2.2 Bemerkung

(i)  $0, 1, -x, x^{-1}$  sind durch ihre Eigenschaften eindeutig bestimmt

(ii)  $\forall x \in K : -(-x) = x$   
 $\forall x \in K^* : (x^{-1})^{-1} = x \quad (K^* := K \setminus \{0\})$  da  $x^{-1}$  Element des Körpers ist

(iii)  $\forall x, y \in K : -(x + y) = (-x) + (-y) = -x - y$  (Subtraktion eingeführt)

(iv)  $\forall x \in K : x \cdot 0 = 0$

(v)  $\forall x, y \in K : x \cdot y = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0$

(vi)  $\forall x, y \in K : (-x) \cdot y = -(x \cdot y), \quad (-1)x = -x$

(vii)  $\forall x, y \in K : (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$

**Beweis:**

(i) Sei  $\bar{0} \in K$  ein Element mit:

$$(\bar{A3}) \quad \forall x \in K : \bar{0} + x = x$$

$$0 \underset{(\bar{A3})}{=} \bar{0} + 0 \underset{(\bar{A3})}{=} \bar{0}$$

## 2.3 Beispiele

(i)  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$

(ii)  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

(iii)  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$

(iv)  $\mathbb{F}_2 := \{0, 1\}$  mit <Tabellen>

(v)  $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{N}, +, \cdot)$  sind keine Körper  
 $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$  ist keine abelsche Gruppe  
 $(\mathbb{N}, +)$  ist keine abelsche Gruppe

## 2.4 Definition

Ein Körper  $(K, +, \cdot)$  heißt **angeordneter Körper**, falls eine Teilmenge  $K_+^* \subset K$  mit folgenden Eigenschaften existiert:

(01)

$$\forall x \in K^* : \begin{array}{l} \text{entweder } x \in K_+^* \\ \text{oder } -x \in K_+^* \\ \text{oder } x = 0 \end{array}$$

D.h.  $K^*$  ist eine disjunkte Vereinigung von  $K_+^*$  und  $\{-x \mid x \in K_+^*\}$

(02)

$$\forall x, y \in K_+^* : x + y \in K_+^*$$

(03)

$$\forall x, y \in K_+^* : x \cdot y \in K_+^*$$

$(K, +, \cdot)$  heißt **archimedisch angeordnet** falls zusätzlich gilt:

$$(A) \quad \forall x, y \in K_+^* : \exists n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \cdot x - y \in K_+^*$$

Wir schreiben

$$\begin{array}{ll} 0 < x, & \text{falls } x \in K_+^* \\ 0 \leq x, & \text{falls } x \in K_+^* \cup \{0\} =: K_+ \\ x < y, & \text{falls } y - x > 0 \\ x \leq y, & \text{falls } y - x \geq 0 \end{array}$$

## 2.5 Bemerkungen

Sei  $(K, +, \cdot, <)$  ein geordneter Körper. Dann gilt

$$(i) \quad < \text{ ist transitiv, d.h. } x < y < z \Rightarrow x < z$$

$$(ii) \quad 0 < x \Leftrightarrow -x < 0$$

$$(iii) \quad x < y \Rightarrow (\forall a \in K : x + a < y + a)$$

$$(iv) \quad x < y, \quad x' < y' \Rightarrow x + x' < y + y'$$

$$(v) \quad x < y, \quad 0 < a \Rightarrow ax < ay$$

$$(vi) \quad 0 < x < y, \quad 0 < a < b \Rightarrow 0 < ax < by$$

$$(vii) \quad x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$$

$$(viii) \quad 0 < x < y \Rightarrow 0 < y^{-1} < x^{-1}$$

$$(ix) \quad 0 < 1$$

**Beweis:** Übung!

## 2.6 Bemerkung

Sei  $(K, +, \cdot, <)$  ein angeordneter Körper.

Definiere: Abbildung  $\iota : \mathbb{N} \rightarrow K$  wie folgt

$$n \mapsto n_K$$

$$\iota(0) = 0_K$$

Falls  $\iota(n)$  definiert ist, so definiere:

$$\iota(\underbrace{(n+1)}_{\text{Nachfolger von } n \in K}) := \iota(n) \underbrace{+}_{\text{Addition in } K} \underbrace{1_K}_{\text{Eins in } K}$$

Es gilt  $\forall m, n \in \mathbb{N} : m \neq n \implies \iota(m) \neq \iota(n)$

(mit Induktion)

$\implies \iota$  ist injektiv

Außerdem gilt:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \iota(n) < \iota(n+1)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, x \in K : nx = \iota(n) \cdot x$$

$$(nx := \underbrace{x + x + x + \dots + x}_{n\text{-mal}})$$

**Beweis:** <Induktion>

## 2.7 Proposition: Bernoullische Ungleichung

Sei  $(K, +, \cdot, <)$  ein geordneter Körper. Dann gilt

$$\forall x > -1, n \in \mathbb{N} : \boxed{(1+x)^n \geq 1+nx}$$

$$(a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n\text{-mal}})$$

**Beweis:** Sei  $x \geq -1$ .

$$A(n) : (1+x)^n \geq 1+nx$$

I.A.

$$A(0) : (1+x)^0 = 1 = 1+0x$$

I.S.

Sei  $A(n)$  wahr.

$$\begin{aligned} A(n+1) : (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \\ &\geq (1+nx)(1+x) && \text{I.V. ; nach 2.5(v)} \\ &= 1+nx+x+nx^2 && nx^2 \geq 0 \text{ nach 2.5(vii)} \\ &\geq 1+nx+x \\ &= 1+(n+1)x \end{aligned}$$

$\implies A(n+1)$  ist wahr

$\implies A(n)$  ist wahr für alle  $n \in \mathbb{N}$

$x \geq -1$  war beliebig

## 2.8 Definition

Sei  $(K, +, \cdot, <)$  ein angeordneter Körper. Definiere den **Absolutbetrag**

$$|\cdot| : K \rightarrow K_+$$

durch

$$x \mapsto |x| := \begin{cases} x & , \text{ falls } x \geq 0 \\ -x & , \text{ falls } x < 0 \end{cases}$$

## 2.9 Bemerkungen

- (i)  $|x| \geq 0, |x| = 0 \iff x = 0, x \leq |x|$
- (ii)  $|-x| = |x|$
- (iii)  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- (iv)  $|x + y| \leq |x| + |y|$  ( $\Delta$ -Ungleichung) (Beweis durch Quadrieren)
- (v)  $|x + y| \geq ||x| - |y||$  (umgekehrte  $\Delta$ -Ungleichung)

**Beweis:** Übung! (iv) und (v)

## 2.10 Proposition

Sei  $(K, +, \cdot, \geq)$  ein archimedisch angeordneter Körper

- (i)  $\forall x \in K_+ \exists! n \in \mathbb{N} : n \leq x < n + 1$   
Wir schreiben  $[x]$  für dieses  $n$ . (Gauß-Klammer)
- (ii)  $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}^* : n^{-1} < \varepsilon$
- (iii) Sei  $b > 1. \forall L \in \mathbb{N} : \exists n \in \mathbb{N} : b^n > L$
- (iv) Sei  $0 < b < 1. \forall \varepsilon > 0 : \exists n \in \mathbb{N} : 0 < b^n < \varepsilon$

**Beweis:** (Widerspruchsbeweis)

- (i) Angenommen es gäbe kein solches  $n$ . Das heißt

$$\forall n \in \mathbb{N} : n > x \text{ oder } x \geq n + 1$$

Sei A(n):  $x \geq n$

I.A.

$$x \geq 0 \quad \checkmark \quad A(0) \text{ ist wahr}$$

I.S.

$$\begin{aligned} & \text{IV.} \\ & x \geq n \\ & \Rightarrow n \not> x \\ & \text{nach Annahme} \Rightarrow x \geq n + 1 \end{aligned}$$

Also ist A(n + 1) wahr

$$\implies \forall n : x \geq n \not\Leftarrow \implies \text{Annahme war falsch} \quad \square$$

## 2.11 Beispiele

- (i)  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$  sind archimedisch angeordnet
- (ii)  $\mathbb{F}_2, \mathbb{C}$  nicht angeordnet wegen  $1 + 1 = 0$ , bzw.  $i^2 = -1 \not\geq 0$

## 2.12 Definition

Sei  $(K, +, \cdot, <)$  ein angeordneter Körper,  $M \subset K$  eine Teilmenge.

- (i)  $s \in K$  heißt obere (untere) Schranke für  $M$ , falls gilt:

$$\forall x \in M : x \leq s \quad (\forall x \in M : x \geq s)$$

- (ii)  $M$  heißt nach oben (unten) beschränkt, falls es eine obere (untere) Schranke besitzt.  $M$  heißt beschränkt:  $M$  besitzt eine obere und untere Schranke

- (iii)  $s \in K$  heißt **Supremum** von  $M$

$$\sup M = s$$

falls  $s$  die kleinste obere Schranke für  $M$  ist, d.h.

- a)  $s$  ist obere Schranke für  $M$
- b) falls  $s'$  weitere obere Schranke für  $M$  ist, so gilt  $s \leq s'$

.

$s \in K$  heißt **Infimum** von  $M$

$$\inf M = s$$

falls  $s$  die größte untere Schranke für  $M$  ist, d.h.

- a)  $s$  ist untere Schranke für  $M$
- b) falls  $s'$  weitere untere Schranke für  $M$  ist, so gilt  $s \geq s'$

## 2.13 Definition Supremumsprinzip

Ein angeordneter Körper heißt vollständig angeordnet, falls jede nach oben beschränkte Teilmenge ein Supremum besitzt.

## 2.14 Bemerkungen

- (i) Auch wenn  $\sup M$  existiert, gilt nicht immer  $\sup M \in M$  (gilt analog für  $\inf M$ )
- (ii) Wenn  $\sup M$  ( $\inf M$ ) existiert, so ist es eindeutig bestimmt (2.12 (iii)b))
- (iii) Jede nach oben beschränkte Teilmenge besitzt ein Supremum  
 $\Leftrightarrow$   
 jede nach unten beschränkte Teilmenge besitzt ein Infimum  
 Übung! Multiplikation mit  $-1$

## 2.15 Beispiele

Sei  $K$  archimedisch angeordnet.

Aus 2.6 folgt  $\mathbb{N} \subset K$

$$M := \{n^{-1} \mid n \in \mathbb{N}\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\} \subset K_+^*$$

$M$  ist beschränkt: 0 ist untere Schranke, denn  $x^{-1} > 0$  für alle  $x \in K_+^*$  (2.5 (viii))

1 ist obere Schranke, denn  $1 \leq n$  für alle  $n \in \mathbb{N}^*$ , also  $1 \geq 1^{-1} \geq n^{-1}$  für alle  $n \in \mathbb{N}^*$

**Beweis Infimum:**

$$\inf M = 0 \quad (2.12 \text{ (iii) a}) \quad \checkmark$$

2.12(iii) b) :

Sei  $s'$  weitere untere Schranke von  $M$ . Falls  $s' > 0$ , so existiert nach 2.10(ii) ein  $n \in \mathbb{N}^*$  mit  $M \ni n^{-1} < s'$

$$\Rightarrow s' \text{ ist keine untere Schranke} \quad \nexists$$

$$\Rightarrow s' \leq 0$$

**Beweis Supremum**

$$\sup M = 1 \longrightarrow \text{trivial!}$$

## 2.16 Definition und Satz

Es existiert ein (bis auf **Isomorphie** eindeutig bestimmter) vollständig angeordneter Körper; diesen nennen wir  $\mathbb{R}$ .

Eindeutigkeit bis auf Isomorphie:

Sei  $K$  ein weiterer vollständig angeordneter Körper. Dann existiert eine Bijektion

$$\begin{aligned} \alpha : K &\rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } \alpha(0_K) = 0_{\mathbb{R}} \\ \alpha(1_K) &= 1_{\mathbb{R}} \\ \alpha(x +_K y) &= \alpha(x) +_{\mathbb{R}} \alpha(y) \\ \alpha(x \cdot_K y) &= \alpha(x) \cdot_{\mathbb{R}} \alpha(y) \\ x <_K y &\Rightarrow \alpha(x) <_{\mathbb{R}} \alpha(y) \end{aligned}$$

$$\alpha\left(\sup_{\text{mit } <_K} M\right) = \sup_{\text{mit } <_{\mathbb{R}}} \alpha(M)$$

ohne Beweis  $\square$

## 2.17 Definition und Proposition

Wir definieren die rationalen Zahlen

$$\mathbb{Q} := \{m \cdot n^{-1}, -m \cdot n^{-1} \mid m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*\} \subset \mathbb{R}$$

Diese bilden einen archimedisch angeordneten Körper.

Wir definieren die ganzen Zahlen

$$\mathbb{Z} := \{n, -n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$$

## 2.18 Exkurs: Das Zahlensystem

$\mathbb{N}$ ↓	jedes Element $n$ hat einen <u>Nachfolger</u> $n + 1$
$\mathbb{Z}$ ↓	Hinzufügen von additiven Inversen
$\mathbb{Q}$ ↓	Hinzufügen von multiplikativen Inversen
$\mathbb{R}$ ↓	Hinzufügen von Suprema beschränkter Mengen
$\mathbb{C}$	Hinzufügen von Lösungen algebraischer Gleichungen (zB $x^2 = -1$ )

### 3 Intervallschachtelungen

#### 3.1 Definition

Für  $a < b \in \mathbb{R}$  setze

$[a, b]$	$:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	abgeschlossenes Intervall
$(a, b)$	$:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	offenes Intervall
$[a, b)$	$:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	nach rechts halboffenes Intervall
$(a, b]$	$:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	nach links halboffenes Intervall

#### 3.2 Satz (Intervallschachtelungsprinzip)

Sei  $[a_n, b_n], n \in \mathbb{N}$  Intervalle mit

- (i)  $\forall n \in \mathbb{N} [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$
- (ii)  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : b_{n_0} - a_{n_0} < \varepsilon$

Dann existiert genau ein  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$

**Beweis:**

- (i)  $\Rightarrow [a_m, b_m] \subset [a_n, b_n]$  falls  $m \geq n$   
 $\Rightarrow a_m \leq b_n$  für alle  $m, n \in \mathbb{N}$   
 $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : b_n$  ist obere Schranke für  $A := \{a_m \mid m \in \mathbb{N}\}$  (\*)  
 $\Rightarrow A$  ist nach oben beschränkt  
Aus dem Supremumsprinzip folgt:  $\sup A \in \mathbb{R}$  existiert  
 $\Rightarrow \sup A \leq b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$   
 $\Rightarrow a_n \leq \sup A \leq b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$   
 $\Rightarrow \sup A \in [a_n, b_n]$  für alle  $n \in \mathbb{N}$   
 $\Rightarrow x = \sup A \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$
- (ii) Falls  $s, s' \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$  mit  $s < s'$  so existiert  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit:

$$b_{n_0} - a_{n_0} < s' - s \quad \underbrace{s' - s}_{\varepsilon} > 0$$

Andererseits gilt:

$$s', s \in [a_{n_0}, b_{n_0}] \Rightarrow s' - s \leq b_{n_0} - a_{n_0} < s' - s \quad \text{⚡}$$

#### 3.3 Satz

Sei  $0 < x \in \mathbb{R}$  und  $k \in \mathbb{N}^*$ .

Dann existiert genau ein  $0 < y \in \mathbb{R}$  mit  $y^k = x$ . Wir schreiben auch  $y = x^{\frac{1}{k}} = \sqrt[k]{x}$

**Beweis:**

**A.** Für  $x = 1$  setze  $y := 1$



**B.** Sei nun  $x > 1$ **B.1** Wir konstruieren induktiv

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots \quad \text{und} \quad b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$$

Setze nun  $a_0 := 1, b_0 := x$

Falls nun  $1 \leq a_n < b_n$  mit  $a_n^k \leq x \leq b_n^k$  bereits konstruiert sind, definiere  $a_{n+1}, b_{n+1} \in \mathbb{R}$  wie folgt:

$$a_{n+1} := \begin{cases} a_n, & \text{falls } \left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)^k \geq x \\ \left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)^k, & \text{falls } \left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)^k < x \end{cases}$$

$$b_{n+1} := \begin{cases} \frac{a_n+b_n}{2}, & \text{falls } \left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)^k \geq x \\ b_n, & \text{falls } \left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)^k < x \end{cases}$$

Dann gilt:

$$a_{n+1}^k \leq x < b_{n+1}^k$$

und

$$1 \leq a_{n+1} < b_{n+1}$$

Induktion liefert  $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$

Nach Konstruktion gilt für alle  $n \in \mathbb{N}$ :

$$(i) \quad a_n^k \leq x \leq b_n^k \quad \text{und} \quad 1 \leq a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$$

$$(ii) \quad b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1}) = \frac{1}{2} \frac{1}{2}(b_{n-2} - a_{n-2}) = \dots = \frac{1}{2^n}(x - 1)$$

**B.2** Sei  $\varepsilon > 0$ . Nach 2.10 (iv) existiert

$$n_0 \in \mathbb{N} \text{ mit } \frac{1}{2^{n_0}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n_0} < \frac{\varepsilon}{x-1}$$

$$\stackrel{(ii)}{\implies} b_{n_0} - a_{n_0} = \frac{1}{2^{n_0}} \cdot (x-1) < \varepsilon$$

$$\stackrel{3.2}{\implies} \exists! y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$$

$$\implies y^k \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n^k, b_n^k]$$

**B.3** Wegen (i) gilt auch  $a_n^k \leq a_{n+1}^k < b_{n+1}^k \leq b_n^k$ , also

$$[a_{n+1}^k, b_{n+1}^k] \subseteq [a_n^k, b_n^k]$$

Weiter gilt:

$$\begin{aligned} b_n^k - a_n^k &= (b_n - a_n)(b_n^{k-1} + b_n^{k-2}a_n + \dots + b_na_n^{k-2} + a_n^{k-1}) \\ &\leq (b_n - a_n) \cdot k \cdot x^{k-1} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n (x-1) \cdot k \cdot x^{k-1} \end{aligned}$$

Sei  $\varepsilon' > 0$ . Nach 2.10(iv) existiert  $n_1 \in \mathbb{N}$  mit  $\left(\frac{1}{2}\right)^{n_1} < \frac{\varepsilon'}{(x-1)kx^{k-1}}$ , also  $b_{n_1}^k - a_{n_1}^k < \varepsilon'$

$$\stackrel{3.2}{\implies} \exists! x' \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n^k, b_n^k]$$

B.1(i)

$$\implies x' = x$$

(B.2)

$$\implies y^k = x' = x$$

C. Der Fall  $x < 1$  folgt aus  $1 < \tilde{x} < \frac{1}{x}$

D. Falls  $0 < y < y' \in \mathbb{R}$ , so gilt auch  $0 < y^k < y'^k$ , also ist  $y$  mit  $y^k = x$  eindeutig.

## 4 Abzählbarkeit

### 4.1 Definition

Sei  $M \neq \emptyset$  eine Menge.

- $M$  heißt **abzählbar**, falls eine Surjektion  $\mathbb{N} \rightarrow M$  existiert
- $M$  heißt **abzählbar unendlich**, falls  $M$  abzählbar und nicht endlich ist
- $M$  heißt **überabzählbar**, falls  $M$  nicht abzählbar ist


( $M$  ist endlich  $\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}$  und Bijektion  $\{1, \dots, n\} \rightarrow M$ )

### 4.2 Beispiele

(i)  $\mathbb{N}$  ist abzählbar, denn


$\text{id} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  ist surjektiv

(ii)  $\mathbb{Z}$  ist abzählbar



definiert eine Surjektion  $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

(iii)  $\mathbb{Q}$  ist abzählbar



definiert eine Surjektion  $\beta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$

(Dieses  $\beta$  ist nicht injektiv, kann aber zu Bijektion modifiziert werden. Wie?)

(iv) Allgemein zeigt man:

Eine abzählbare Vereinigung von abzählbaren Mengen ist abzählbar

$$A_0, A_1, A_2, \dots \text{ abzählbarer Mengen} \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ abzählbar}$$

### 4.3 Satz

$\mathbb{R}$  ist nicht abzählbar.

**Beweis:** Angenommen es gäbe eine Surjektion  $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Wir konstruieren Intervalle  $[a_n, b_n]$  wie folgt:

**I.A.** Wähle  $a_0 := \alpha(0) + 1, b_0 := \alpha(0) + 2$ . Dann

$$\alpha(0) \notin [a_0, b_0] \text{ und } b_0 - a_0 = 1 = \left(\frac{1}{3}\right)^0$$

**I.S.** Seien  $a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq \dots \leq b_1 \leq b_0$  bereits konstruiert mit:

$$\alpha(n) \notin [a_n, b_n] \text{ und } b_n - a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Dann sei  $[a_{n+1}, b_{n+1}]$  das erste Drittel von  $[a_n, b_n]$ , das  $\alpha(n+1)$  nicht enthält.

In Formeln:

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] := \begin{cases} [a_n, a_n + (\frac{1}{3})^{n+1}], & \text{falls } \alpha(n+1) \notin [a_n, a_n + (\frac{1}{3})^{n+1}] \\ [a_n + (\frac{1}{3})^{n+1}, a_n + \frac{2}{3^{n+1}}], & \text{falls } \alpha(n+1) \in [a_n, a_n + (\frac{1}{3})^{n+1}] \\ [a_n + \frac{2}{3^{n+1}}, b_n], & \text{falls } \alpha(n+1) = a_n + (\frac{1}{3})^{n+1} \end{cases}$$

Dann gilt  $\alpha(n+1) \notin [a_{n+1}, b_{n+1}]$ ,  $b_{n+1} - a_{n+1} = (\frac{1}{3})^{n+1}$  und  $a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$

Nach dem Intervallschachtelungsprinzip (Satz 3.2) existiert genau ein  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$

Dann gilt  $x = \alpha(n)$  für ein  $n \in \mathbb{N}$  ( $\alpha$  ist surjektiv nach Annahme), aber

$$x = \alpha(n) \notin [a_n, b_n] \quad \text{⚡}$$

## 5 Folgen und Grenzwerte

Im Folgenden schreiben wir  $\mathbb{K}$  für  $\mathbb{Q}$  oder  $\mathbb{R}$

### 5.1 Definition

Eine Folge in  $\mathbb{K}$  ist eine Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ . Wir schreiben oft

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} \text{ oder } (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$$

wobei  $a_n = a(n)$  ist.

$$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

ist die der Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  unterliegende Menge. Wir fassen auch  $(a_{n_0}, a_{n_0+1}, a_{n_0+2}, \dots)$  als Folge auf  $(a_n)_{n \geq n_0}$

### 5.2 Beispiele

- (i)  $a_n = a$  für alle  $n \in \mathbb{N} \rightsquigarrow (a, a, a, a, \dots)$

(ii)  $a_n = \frac{1}{n+1} \rightsquigarrow (\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$

(iii) Fibonacci-Zahlen  
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  rekursiv definiert durch

$$\begin{aligned} a_0 &:= 1 & a_1 &:= 1 \\ a_{n+1} &:= a_n + a_{n-1} \\ &\rightsquigarrow (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots) \end{aligned}$$

(iv)  $a_n = \frac{n}{2^n} \rightsquigarrow (0, \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{8}, \frac{4}{16}, \dots)$

(v)  $a_n = (-1)^n \rightsquigarrow (1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots)$

### 5.3 Definition

Sei  $a_n$  eine Folge in  $\mathbb{K}$  und sei  $a \in \mathbb{K}$

(i) Wir sagen  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **konvergiert** gegen  $a$ ,

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$$

(ii)  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **divergiert**, falls sie gegen kein  $a \in \mathbb{K}$  konvergiert

(iii)  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **divergiert bestimmt gegen unendlich** (bzw.  $-\infty$ )

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

falls gilt

$$\forall L \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : a_n \underset{(<)}{>} L$$

(iv)  $(a_n)_n$  heißt nach oben (nach unten) beschränkt, falls  $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  nach oben (nach unten) beschränkt ist.

### 5.4 Beispiele

(i)  $a_n = a$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , dann gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $n_0 := 0$ . Für  $n \geq n_0$  gilt

$$|a_n - a| = |a - a| = 0 < \varepsilon$$

(ii)  $a_n = \frac{1}{n+1} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{a_n} = 0$

Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$ . Für  $n \geq n_0$  gilt

$$\left| \frac{1}{n+1} - 0 \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

- (iii)  $(a_n)_n$  Fibonacci-Zahlen ( $a_0 = a_1 = 0, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$ ).  
 Dann gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ .

Induktion liefert  $a_n \geq n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Zu  $L \in \mathbb{K}$  wähle  $n_0$  größer als  $L$ . Dann gilt für  $n \geq n_0$

$$a_n \geq n \geq n_0 > L$$

- (iv)  $(a_n)_n = \frac{n}{2^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$

Nach Blatt 2, Aufgabe 3a gilt  $n^2 < 2^n \quad \forall n \geq 4$

Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $n_0 > \max(4, \frac{1}{\varepsilon})$ . Für  $n \geq n_0$  gilt

$$\left| \frac{n}{2^n} - 0 \right| = \frac{n}{2^n} = \underbrace{\frac{n^2}{2^n}}_{\leq 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{n}}_{\leq \frac{1}{n_0}} \leq 1 \cdot \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

- (v)  $(a_n)_n = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  divergiert

Für jedes  $a \in \mathbb{K}$  gilt  $|(-1)^n - a| \geq 1$  oder  $|(-1)^{n+1} - a| \geq 1$ ,  
 weil  $|(-1)^n - (-1)^{n+1}| = 2$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad \forall n_0 \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq n_0 : |(-1)^n - a| \geq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \neg \left( \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : |(-1)^n - a| < \varepsilon \right)$$

## 5.5 Bemerkung

Jede konvergente Folge ist beschränkt, aber nicht jede beschränkte Folge ist konvergent.

### Beweis:

1. Sei  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , dann existiert  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a| < 1$  für alle  $n \geq n_0$

Sei  $L := \max \{|a_0|, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0}|, 1 + |a|\}$ . Dann gilt:

$$|a_n| \leq L \text{ für } n < n_0$$

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq 1 + |a| \leq L \text{ für } n \geq n_0 \text{ also}$$

$$-L \leq a_n < L \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

2. Beispiel 5.4(v)

## 5.6 Proposition

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge in  $\mathbb{K}$ . Falls  $(a_n)_n$  gegen  $a \in \mathbb{K}$  konvergiert und gegen  $a' \in \mathbb{K}$  konvergiert, so gilt  $a = a'$  (Dies rechtfertigt die Schreibweise  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ )

**Beweis:** Falls  $a \neq a'$  setze  $\varepsilon := \frac{|a-a'|}{2} > 0$

Wegen  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$  existiert  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a| < \varepsilon$  für  $n \geq n_0$

Wegen  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a'$  existiert  $n'_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a'| < \varepsilon$  für  $n \geq n'_0$

Für  $\bar{n} := \max(n_0, n'_0)$  gilt dann

$$|a - a'| = |a - a_{\bar{n}} + a_{\bar{n}} - a'| \leq |a - a_{\bar{n}}| + |a_{\bar{n}} - a'| < \varepsilon + \varepsilon = |a - a'| \quad \text{⚡}$$

## 5.7 Proposition

Seien  $(a_n)_n, (b_n)_n$  konvergierende Folgen in  $\mathbb{K}$  und seien  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ .

- (i) Dann konvergieren die Folgen  $(\lambda a_n + \mu b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \mu \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

sowie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

( $\Rightarrow$  konvergente Folgen ( $=: C$ ) bilden einen Vektorraum)

$$C \rightarrow \mathbb{R} \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ ist linear}$$

- (ii) Falls  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ , so existiert ein  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $b_n \neq 0$  für alle  $n \geq n_0$  und für die Folge  $(\frac{a_n}{b_n})_{n \geq n_0}$  gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$$

### Beweis:

- (i) Wir zeigen nur die Formel für das Produkt:

Sei  $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  und  $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ .

Nach 5.5 sind  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  beschränkt. Das heißt

$$L > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} : |a_n|, |b_n| \leq L$$

Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann existieren  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a|, |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2L}$  falls  $n \geq n_0$   
Dann gilt für  $n \geq n_0$

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n(b_n - b) + (a_n - a)b| \\ &\leq |a_n| \cdot |b_n - b| + |a_n - a| \cdot |b| \\ &< L \cdot \frac{\varepsilon}{2L} + \frac{\varepsilon}{2L} \cdot L \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

□

- (ii) Sei wieder  $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, 0 \neq b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

Sei  $L > 0$  wie eben, also  $|a_n| \leq L$  für alle  $n \in \mathbb{N}$

Da  $b \neq 0$  existiert  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|b_n - b| \leq \frac{|b|}{2}$  für alle  $n \geq n_0$ , also

$$|b_n| = |b + b_n - b| \geq |b| - |b_n - b| = \frac{|b|}{2} \geq 0 \quad \text{für } n \geq n_0$$

Sei nun  $\varepsilon > 0$ . Dann existiert  $n_1 \in \mathbb{N}$  mit

$$|a_n - a| < \frac{|b|\varepsilon}{4} \text{ und } |b_n - b| < \frac{|b|^2}{4L}\varepsilon \text{ falls } n \geq n_1$$

Dann gilt für  $n \geq n_0, n_1$

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| &= \left| \frac{a_nb - b_na}{b_nb} \right| \\ &< 2 \frac{|a_nb - b_na|}{|b|^2} \\ &\leq 2 \frac{|a_nb - ab| + |ab - b_na|}{|b|^2} \\ &\leq \frac{2}{|b|^2} \left( \underbrace{|a_n - a| \cdot |b|}_{\frac{|b|\varepsilon}{4}} + |a| \cdot \underbrace{|b_n - b|}_{\frac{|b|^2}{4L}\varepsilon} \right) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

## 5.8 Beispiel

Sei  $c_n = \frac{4n^3+n}{n^3+n^2+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Für  $n \geq 1$  gilt:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{4 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}} \approx \frac{a_n}{b_n} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} c_n &= \frac{4}{1} = 4 \end{aligned}$$

## 5.9 Bemerkung

Seien  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}$  konvergent mit  $a_n \leq b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

**Aber:**  $a_n < b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  impliziert **nicht(!)**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Beweis: Falls

$$b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n < a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Dann existiert  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit

$$|a_n - a|, |b_n - b| < \frac{a-b}{2} \text{ falls } n \geq n_0$$

Dann folgt aus

$$\begin{aligned} |a_n - a| &< \frac{a-b}{2} \\ \Rightarrow a - a_n &< \frac{a-b}{2} \\ \Rightarrow a - \frac{a-b}{2} &< a_n \end{aligned}$$

folgender Widerspruch:

$$a_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} = b + \frac{a-b}{2} > b_n \quad \text{!}$$

## 6 Vollständigkeit

### 6.1 Definition

- (i) Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$  eine Folge und sei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$  eine Folge mit

$$n_0 < n_1 < n_2 < \dots$$

Dann heißt  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  eine **Teilfolge** von  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- (ii)  $a \in \mathbb{K}$  heißt **Häufungspunkt** von  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , falls  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Teilfolge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  mit

$$a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$$

besitzt.

### 6.2 Beispiele

- (i)  $(2k)_{k \in \mathbb{N}}$  ist Teilfolge von  $(n)_{n \in \mathbb{N}}$

- (ii)  $(1, -1, 1, -1, 1, \dots)$  besitzt Teilfolgen

$$(1, 1, 1, 1, \dots), (-1, -1, -1, -1, \dots), (-1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, \dots) \dots$$

### 6.3 Satz von Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in  $\mathbb{R}$  besitzt einen Häufungspunkt.

Beweis: Sei  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  beschränkt, dann existieren  $A, B \in \mathbb{R}$  mit

$$A \leq c_n \leq B \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

1. Wir konstruieren induktiv

$$a_0, a_1, a_2, \dots \in \mathbb{R} \text{ und } b_0, b_1, b_2, \dots \in \mathbb{R}$$

mit

- (i)  $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k]$  für alle  $k \in \mathbb{N}$
- (ii)  $b_k - a_k \leq 2^{-k} \cdot (B - A)$  für alle  $k \in \mathbb{N}$
- (iii)  $[a_k, b_k]$  enthält unendlich viele Glieder der Folge  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$

#### Induktionsanfang

Setze:

$$a_0 := A \quad b_0 := B$$

dann gelten (ii) und (iii)

#### Induktionsschritt

Seien  $a_0, \dots, a_k$  und  $b_0, \dots, b_k$  mit (i), (ii), (iii) bereits konstruiert. Setze:

$$a_{k+1} := \begin{cases} a_k, & \text{falls unendlich viele Glieder von } (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } [a_k, \frac{a_k+b_k}{2}] \text{ liegen} \\ \frac{a_k+b_k}{2}, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$b_{k+1} := \begin{cases} \frac{a_k+b_k}{2}, & \text{falls unendlich viele Glieder von } (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } [a_k, \frac{a_k+b_k}{2}] \text{ liegen} \\ b_k, & \text{sonst} \end{cases}$$



$\Rightarrow [a_{k+1}, b_{k+1}]$  erfüllt (i), (ii), (iii)

Wegen (i) und (ii) gilt nach Satz 3.2 (Intervallschachtelungsprinzip)

$$\exists! c \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} [a_k, b_k]$$

2. Wir definieren induktiv die Teilfolge  $(c_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  mit  $c_{n_k} \in [a_k, b_k]$  für alle  $k \in \mathbb{N}$

### Induktionsanfang

$n_0 := 0$ , dann  $c_{n_0} = c_0 \in [A, B] = [a_0, b_0]$

### Induktionsschritt

Seien  $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k \in \mathbb{N}$  mit

$$c_{n_l} \in [a_l, b_l] \text{ für } l = 0, \dots, k$$

bereits definiert.

$[a_{k+1}, b_{k+1}]$  enthält unendlich viele Folgenglieder der Folge  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , also existiert  $N > n_k$  mit

$$c_N \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$$

Setze  $n_{k+1} := N$

3.  $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{n_k} = c$

Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $k_0 \in \mathbb{N}$  so groß, dass  $2^{-k_0}(B - A) < \varepsilon$ . Für  $k \geq k_0$  gilt dann:

$$c_{n_k}, c \in [a_k, b_k]$$

Also gilt:

$$|c_{n_k} - c| \leq b_k - a_k < 2^{-k}(B - A) < \varepsilon$$

## 6.4 Bemerkung

Man kann zeigen:

Bolzano-Weierstraß + Archimedisches Axiom  $\Leftrightarrow$  Ordnungsvollständigkeit

## 6.5 Definition

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  heißt (streng) **monoton wachsend**, falls gilt

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \text{bzw.} \quad a_n < a_{n+1}$$

Eine Folge heißt  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$  heißt (streng) **monoton fallend**, falls gilt

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \text{bzw.} \quad a_n > a_{n+1}$$

Eine Folge heißt **monoton**, falls sie monoton wachsend oder fallend ist.

## 6.6 Satz

Jede beschränkte monotone Folge in  $\mathbb{R}$  konvergiert.

### **Beweis:**

Sei o.E.d.A.  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  monoton wachsend und beschränkt.

Aus 6.3 folgt  $\Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  besitzt eine konvergente Teilfolge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a \in \mathbb{R}$$

Es genügt zu zeigen:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Sei  $\varepsilon > 0$ .

$$\exists K \in \mathbb{N} : |a_{n_k} - a| < \varepsilon \quad \text{falls } k \geq K$$

Setze  $N := n_K$ . Sei nun  $n \geq N$

$$\exists K' \geq K \in \mathbb{N} : n_{K'} \geq n \geq N = n_K$$

wegen Monotonie gilt

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_{n_K} = a_N \leq a_n \leq a_{n_{K'}} \\ \Rightarrow |a - a_n| \leq \max \{ |a - a_{n_K}|, |a - a_{n_{K'}}| \} < \varepsilon \quad \square \end{aligned}$$

## 6.7 Beispiel

Sei  $k \in \mathbb{N}^*, x \in \mathbb{R}_+^*$  und  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  wie im Beweis von 3.3

$$[a_n, b_n], n \in \mathbb{N} \text{ war Intervallschachtelung mit } \sqrt[k]{x} \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$$

$[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist monoton wachsend und beschränkt, also konvergent. Man zeigt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt[k]{x} \quad \text{wie in Aufgabe 4, Blatt 3}$$

Außerdem gilt

$$\begin{aligned} |\sqrt[k]{x} - a_n| &\leq b_n - a_n \\ &= \frac{1}{2}n(x - 1) \quad (\text{für } x > 1) \end{aligned}$$

$\leadsto$  3.3 liefert Methode,  $\sqrt[k]{x}$  zu approximieren und den Fehler abzuschätzen.

## 6.8 Definition

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  heißt **Cauchy-Folge**, falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq n_0 : |a_m - a_n| < \varepsilon$$

(Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $n_0 \in \mathbb{N}$ , sodass gilt: wann immer  $m, n \geq n_0$ , so gilt  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ )

## 6.9 Bemerkung

Jede konvergente Folge ist Cauchy

**Beweis:**

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergent mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

Sei  $\varepsilon > 0$ . Da  $(a_n)$  konvergiert, existiert ein  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit :

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{falls } n \geq n_0$$

Falls  $n, m \geq n_0$  gilt:

$$|a_m - a_n| < |a_m - a| + |a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

## 6.10 Satz

$\mathbb{R}$  ist vollständig, das heißt jede Cauchy-Folge konvergiert

**Beweis:**

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  Cauchy

1.  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist beschränkt (warum?)
2. 6.3  $\Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  besitzt konvergente Teilfolge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$
3. Es genügt zu zeigen  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$   
 Sei  $\varepsilon > 0$ .

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ist Cauchy} \Rightarrow \exists \bar{n}_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq \bar{n}_0 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$a_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a \Rightarrow \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$n_k \rightarrow \infty \Rightarrow \exists k_1 \geq k_0 : n_{k_1} \geq \bar{n}_0$$

Falls  $n \geq n_0$ , so gilt:

$$|a_n - a| \leq \underbrace{|a_n - a_{n_{k_1}}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{|a_{n_{k_1}} - a|}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon$$

## 6.11 Bemerkung

- (i) Sei  $k \in \mathbb{N}^*$  und  $x$  eine Primzahl  
 Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  wie in 3.3 (bzw. 6.7), dann:

$$\begin{aligned} (a_n)_{n \in \mathbb{N}} &\subset \mathbb{Q} \\ \Rightarrow a_n &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{x} \\ \Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}} &\text{ ist Cauchy} \end{aligned}$$

**Aber:**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \sqrt[k]{x} \notin \mathbb{Q} \\ \Rightarrow &\text{ in } \mathbb{Q} \text{ konvergiert nicht jede Cauchy-Folge} \end{aligned}$$

- (ii) Vollständigkeit + archimedisches Axiom  $\Leftrightarrow$  Ordnungsvollständigkeit

## 7 Reihen

### 7.1 Definition

Sei  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  eine Folge. Wir definieren die Folge der Partialsummen  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  durch:

$$s_n := \sum_{k=0}^n a_k$$

Falls  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert, bezeichnen wir oft auch den Limes mit  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ .

$(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  wird ebenfalls mit  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  bezeichnet.

### 7.2 Beispiel: geometrische Reihe

Sei  $|x| < 1$  und  $a_k := x^k$

$$s_n = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - x}$$

### 7.3 Satz: Cauchy'sches Konvergenzkriterium

Sei  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  eine Folge reeller Zahlen.  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  konvergiert genau dann, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > m > N : \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| < \varepsilon$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergiert} &\Leftrightarrow (s_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ist Cauchy (da in } \mathbb{R}) \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq m \geq N : |s_n - s_m| < \varepsilon \quad \square \end{aligned}$$

### 7.4 Bemerkung

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergiert} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Beweis:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \underbrace{\left| \sum_{k=n}^n a_k \right|}_{|a_n| = |a_n - 0|} < \varepsilon \quad \square$$

### 7.5 Satz

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  eine Folge.

Dann gilt: Die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.

Beweis: Es gilt:

$$s_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} a_k = \sum_{k=0}^n a_k + a_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$$

$\Rightarrow (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist monoton wachsend

$(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist beschränkt  $\stackrel{6.6}{\Rightarrow} (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert

$\Leftarrow$  ist klar (warum?)  $\square$

## 7.6 Beispiel: Harmonische Reihe

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1}$  divergiert

$$s_{2^n} = \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} = (1) + \left(\frac{1}{2}\right)^{\geq \frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)^{\geq \frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)^{\geq \frac{1}{2}} + \dots + \left(\sum_{k=2^{n-1}+1}^{2^n} \frac{1}{k}\right)^{\geq \frac{1}{2}} \geq (n+1) \cdot \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  nicht beschränkt  $\stackrel{7.5}{\Rightarrow}$  Divergenz

## 7.7 Leibnizkriterium

Sei  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  monoton fallend mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ . Dann konvergiert  $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot a_k$

**Beweis:** Für  $n \in \mathbb{N}$  setze  $s_n := \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} s_{2n+2} - s_{2n} &= -a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq 0 \\ s_{2n+3} - s_{2n+1} &= a_{2n+2} - a_{2n+3} \geq 0 \\ s_{2n+1} - s_{2n} &= -a_{2n+1} \leq 0 \end{aligned}$$

Nebenrechnung:

$$\begin{aligned} s_{2n+2} - s_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n+2} (-1)^k \cdot a_k - \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \cdot a_k \\ &= \sum_{k=2n+1}^{2n+2} (-1)^k \cdot a_k \\ &= (-1)^{2n+1} \cdot a_{2n+1} + (-1)^{2n+2} \cdot a_{2n+2} \\ &= -a_{2n+1} + a_{2n+2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow (s_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  ist monoton fallend

$\Rightarrow (s_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  ist monoton wachsend

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad s_1 \leq s_3 \leq \dots \leq s_{2n+1} \leq s_{2n} \leq \dots \leq s_4 \leq s_2 \leq s_0$$

$\Rightarrow (s_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (s_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  sind beschränkt  
 $\xrightarrow{6.6} (s_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (s_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  konvergieren, sei

$$S := \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} \quad S' := \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1}$$

Es gilt  $S = S'$ , da

$$S - S' = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \overbrace{(s_{2n} - s_{2n+1})}^{=a_{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 0$$

Noch zu zeigen:  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S$

Sei  $\varepsilon > 0$ .  $\exists N, N' \in \mathbb{N}$  mit:

$$\begin{aligned} \text{falls } n \geq N & : |s_{2n} - S| < \varepsilon \\ \text{falls } n \geq N' & : |s_{2n+1} - S| < \varepsilon \end{aligned}$$

Setze  $\bar{N} := \max(2N, 2N' + 1)$ , dann gilt, falls  $m \geq \bar{N}$

$$|s_m - S| < \varepsilon$$

□

## 7.8 Beispiel

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1}$$

sind konvergent. Wir werden sehen, dass die Werte dieser Reihen  $\ln 2$  bzw.  $\frac{\pi}{4}$  sind.

## 7.9 Definition

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  **konvergiert absolut**, falls  $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$  konvergiert

## 7.10 Proposition

Absolute Konvergenz  $\Rightarrow$  Konvergenz  
 $\nLeftarrow$

**Beweis:**  $\Rightarrow$

Sei  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  absolut konvergent. Sei  $\varepsilon > 0$ . Nach dem Cauchy-Kriterium (7.3) existiert ein  $N \in \mathbb{N}$  mit

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m}^n |a_k| < \varepsilon \quad \text{falls } n > m > N$$

Wieder nach dem Cauchy-Kriterium konvergiert  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ .

**Beweis:**  $\nLeftarrow$

$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$  konvergiert, aber konvergiert nicht absolut, denn

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| (-1)^{k+1} \frac{1}{k} \right| = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k}$$

divergiert (harmonische Reihe)

## 7.11 Majorantenkriterium

Seien  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  und  $(c_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}_+$  Folgen mit

$$|a_k| < c_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Falls  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$  konvergiert, so konvergiert  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  absolut. Es gilt

$$\left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} c_k$$

**Beweis:**

Sei  $\varepsilon > 0$ .

$$\exists N \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=m}^n c_k \right| < \varepsilon \quad \text{falls } n > m > N$$

Aber

$$\sum_{k=m}^n |a_k| \leq \sum_{k=m}^n c_k \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergiert}$$

$$n \rightarrow \infty \quad \begin{array}{ccccc} \left| \sum_{k=0}^n a_k \right| & \leq & \sum_{k=0}^n |a_k| & \leq & \sum_{k=0}^n c_k \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| & \leq & \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| & \leq & \sum_{k=0}^{\infty} c_k \end{array}$$

Bemerkung: (5.9)

$$d_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} D, \quad e_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E, \quad 0 \leq d_n \leq e_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow D \leq E$$

□

## 7.12 Beispiel

Für  $s \in \mathbb{Q}$  gilt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \begin{cases} \text{konvergiert} & , \text{ falls } s > 1 \\ \text{divergiert} & , \text{ falls } s < 1 \end{cases}$$

$$(s = \frac{p}{q} \quad x^s = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p} = (\sqrt[q]{x})^p \text{ mit } p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^*)$$

Fall "s > 1":

$s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^s}$  Falls  $2^l - 1 \geq k$ , so gilt:

$$\begin{aligned} s_k &\leq s_{2^l-1} = 1 + \left( \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} \right) + \dots + \left( \frac{1}{(2^{l-1})^s} + \dots + \frac{1}{(2^l-1)^s} \right) \\ &\leq 1 + \frac{2^1}{2^s} + \dots + \frac{2^{l-1}}{(2^{l-1})^s} \\ &= (2^{1-s})^0 + (2^{1-s})^1 + \dots + (2^{1-s})^{l-1} \\ &= \sum_{k=0}^{l-1} (2^{1-s})^k \stackrel{(0 < 2^{1-s} < 1)}{=} \frac{1 - (2^{1-s})^l}{1 - 2^{1-s}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 2^{1-s}} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  Konvergenz von  $s_k$ , denn  $s_{2^l-1}$  konvergiert nach dem Majorantenkriterium

Fall „ $s < 1$ “:

$$\begin{aligned} s_k &= 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots + \frac{1}{k^s} \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k} \end{aligned}$$

(kontrapositives Majorantenkriterium)

□

### 7.13 Satz: Quotientenkriterium

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^*$  eine Folge. Falls  $0 \leq \theta < 1$  existiert mit  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \theta$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , so konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  absolut.

**Beweis:**

Induktion liefert  $|a_n| \leq |a_0| \cdot \theta^n$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Es gilt

$$\left( \sum_{n=0}^k |a_n| \right) \leq \sum_{n=0}^k |a_0| \cdot \theta^n = |a_0| \sum_{n=0}^k \theta^n \xrightarrow{k \rightarrow \infty} |a_0| \frac{1}{1 - \theta}$$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |a_0 \theta^n|$  ist konvergente Majorante für  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

□

### 7.14 Bemerkung

in 7.13 genügt es, wenn ein  $n_0 \in \mathbb{N}$  existiert mit  $a_n \neq 0$  und  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \theta$  für alle  $n \geq n_0$ .

### 7.15 Cauchyprodukt von Reihen

Seien  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  absolut konvergent. Setze

$$c_n := \sum_{k=0}^n a_{n-k} \cdot b_k$$



Dann konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  absolut und es gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

**Beweis:**

Setze:

$$A := \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad B := \sum_{n=0}^{\infty} b_n \quad S_m := \sum_{n=0}^m c_n \quad D_m := \left( \sum_{n=0}^m a_n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^m b_n \right)$$

Es gilt  $\lim_{m \rightarrow \infty} D_m = A \cdot B$ . Zu zeigen:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (D_m - S_m) = 0$$

Es gilt

$$D_m = \sum_{\substack{0 \leq i \leq m \\ 0 \leq j \leq m}} a_i b_j = \sum_{i+j \leq m} a_i b_j$$

Weiter gilt

$$S_m = \sum_{n=0}^m \left( \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k \right) = \sum_{n=0}^m \left( \sum_{i+j=n} a_i b_j \right) = \sum_{i+j \leq m} a_i b_j$$

Also

$$D_m - S_m = \sum_{(i,j) \in \Delta_m} a_i b_j$$

$$\text{mit } \Delta_m := \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i, j \leq m, i + j > m\}$$

Setze

$$E_m := \left( \sum_{n=0}^m |a_n| \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^m |b_n| \right) = \sum_{i,j \leq m} |a_i| \cdot |b_j|$$


$\Rightarrow$  Zu  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $m_0 \in \mathbb{N}$  mit  $|E_m - E_{m_0}| < \varepsilon$  falls  $m \geq m_0$

$\Rightarrow (E_m)_{m \in \mathbb{N}}$  konvergiert

Setze nun:

$$\Gamma_m := \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i, j \leq m\} \setminus \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i, j \leq m_0\}$$

Falls nun  $m > 2m_0$ , so gilt  $\Delta_m \subset \Gamma_m$



Es folgt

$$E_m - E_{m_0} = \sum_{(i,j) \in \Gamma_m} |a_i \cdot b_j|$$

Es folgt

$$\begin{aligned} |D_m - S_m| &= \left| \sum_{(i,j) \in \Delta_m} a_i \cdot b_j \right| \\ &\leq \sum_{(i,j) \in \Delta_m} |a_i \cdot b_j| \\ &\leq \sum_{(i,j) \in \Gamma_m} |a_i \cdot b_j| \\ &< \varepsilon \quad \text{falls } m > 2m_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (D_m - S_m) = 0$$

Absolute Konvergenz von  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ :

$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$  wird majorisiert durch  $\sum_{n=0}^{\infty} \bar{c}_n$ , wo

$$\bar{c}_n := \sum_{k=0}^n |a_{n-k} \cdot b_k|$$

Aber  $\sum_{n=0}^{\infty} \bar{c}_n$  konvergiert, wie eben gesehen

□

## 7.16 Beispiele

(i)  $\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{n^2}{2^n}}_{=: a_n}$  konvergiert

Für  $n \geq 3$  gilt

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{(n+1)^2 2^n}{2^{n+1} n^2} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^2 \leq \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{3} \right)^2 = \underbrace{\frac{8}{9}}_{:=\theta} < 1$$

Quotientenkriterium  $\Rightarrow$  Konvergenz

(ii) Für  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  gilt:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n}{n+1} < 1$$

aber  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  divergiert

(iii) Aber:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  konvergiert, obwohl

$$\left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \frac{n^2}{(n+1)^2} < 1 \text{ mit } \frac{n^2}{(n+1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

## 8 Die Exponentialreihe

### 8.1 Definition und Satz

Für jedes  $x \in \mathbb{R}$  konvergiert die Exponentialreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

absolut. Den Limes bezeichnen wir mit  $\exp(x)$ . Wir setzen

$$e := \exp(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Falls  $N \in \mathbb{N}$  und  $|x| < \frac{N}{2} + 1$  gilt

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right| \leq 2 \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}$$

#### **Beweis:**

- Klar für  $x = 0$
- Für  $x \neq 0$  und  $n \geq 2|x|$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \frac{|x|}{n+1} \leq \frac{1}{2}$$

Quotientenkriterium  $\Rightarrow$  absolute Konvergenz

#### • **Restgliedabschätzung**

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!} \\ &= \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \left( 1 + \frac{|x|}{N+2} + \frac{|x|^2}{(N+2)(N+3)} + \frac{|x|^3}{(N+2)(N+3)(N+4)} + \dots \right) \\ &\leq \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \left( 1 + \frac{|x|}{N+2} + \frac{|x|^2}{(N+2)^2} + \frac{|x|^3}{(N+2)^3} + \dots \right) \\ &= \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{|x|}{N+2} \right)^k \\ &\leq \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2} \right)^k \\ &= \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \end{aligned}$$

□

## 8.2 Satz: Funktionalgleichung von $\exp(\cdot)$

Für  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt

$$\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$$

**Beweis:**

$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  und  $\exp(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!}$  konvergieren absolut. Es gilt

$$c_n := \sum_{k=0}^n \frac{x^{n-k}}{(n-k)!} \cdot \frac{y^k}{k!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \underbrace{\frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}}_{\binom{n}{k}} x^{n-k} \cdot y^k \stackrel{1.10}{=} \frac{1}{n!} \cdot (x + y)^n$$

Also

$$\exp(x + y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x + y)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \stackrel{7.15}{=} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \right) = \exp(x) \cdot \exp(y)$$

## 8.3 Corollar

Für  $x \in \mathbb{R}$  gilt  $\exp(-x) = \exp(x)^{-1}$  und  $\exp(x) > 0$ .

Für  $k \in \mathbb{Z}$  gilt  $\exp(k) = e^k$

**Beweis:**

•

$$\exp(x) \cdot \exp(-x) \stackrel{8.2}{=} \exp(x - x) = \exp(0) = 1$$

$$\Rightarrow \exp(-x) = \exp(x)^{-1}$$

$$\text{Für } x \geq 0 \text{ gilt } \exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \geq 1 > 0$$

$$\text{Für } x < 0 \text{ gilt } \exp(-x) > 0, \text{ also auch } \exp(x) = \exp(-x)^{-1} > 0$$

• Für  $k = 0$  gilt  $\exp(0) = 1 = e^0$ .

Induktion: Für  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$\begin{aligned} \exp(k + 1) &= \exp(k) \cdot \exp(1) \\ &= \exp(k) \cdot e \\ &= e^k \cdot e = e^{k+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \exp(k) = e^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\exp(-k) = (\exp(k))^{-1} = (e^k)^{-1} = e^{-k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$


## 9 Stetige Funktionen

### 9.1 Definition

Sei  $D \subset \mathbb{R}$ . Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion.  $f$  heißt stetig in  $x_0 \in D$ , falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in D : (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

$f$  heißt **stetig**, falls  $f$  stetig ist in  $x_0$  ist für jedes  $x_0 \in D$ .



## 9.2 Beispiele

(i)  $\text{id} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist stetig.

Sei  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Setze  $\delta := \varepsilon$ . Falls  $|x - x_0| < \delta$ , so gilt

$$|\text{id}(x) - \text{id}(x_0)| = |x - x_0| < \delta = \varepsilon$$

(ii)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2$  ist stetig.

Sei  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Setze  $\delta := \min\{1, \frac{\varepsilon}{2|x_0|+1}\}$ .

Sei nun  $x \in \mathbb{R}$  mit  $|x - x_0| < \delta$ . Dann

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |x^2 - x_0^2| = |x - x_0| \cdot |x + x_0| \\ &\leq |x - x_0| \cdot (|x - x_0| + 2|x_0|) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2|x_0|+1} (1 + 2|x_0|) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

(iii)  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \sqrt{x}$  ist stetig

Sei  $x_0 \in \mathbb{R}_+$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Setze  $\delta := \frac{\varepsilon^2}{2}$ . Sei nun  $x \in \mathbb{R}_+$  mit  $|x - x_0| < \delta$ .  
 Falls  $x \geq x_0$  gilt, dann

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)|^2 &= |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}|^2 \\ &= |x - \sqrt{xx_0} - \sqrt{xx_0} + x_0| \\ &\leq |x - \sqrt{xx_0}| + |\sqrt{xx_0} - x_0| \\ &= x - \sqrt{x}\sqrt{x_0} + \sqrt{x}\sqrt{x_0} - x_0 \\ &\leq x - \sqrt{x_0}\sqrt{x_0} + \sqrt{x}\sqrt{x} - x_0 \\ &= x - x_0 + x - x_0 \\ &\leq 2 \cdot |x - x_0| \\ &\leq 2 \cdot \delta \\ &= 2 \cdot \frac{\varepsilon^2}{2} = \varepsilon^2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$  Ebenso für  $x < x_0$

□

$$(iv) f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x > \sqrt{2} \\ -1, & \text{falls } x < \sqrt{2} \end{cases} \text{ ist stetig.}$$

Beweis: Übung!

$$(v) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{falls } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \text{ ist in keinem Punkt stetig.}$$

(vi)  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist stetig.

Übung!

### 9.3 Definition

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$  heißt **Lipschitz stetig**, falls  $L \in \mathbb{R}_+$  existiert mit:

$$\forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

### 9.4 Beispiele

(i)  $x \mapsto ax + b$  ist Lipschitz mit  $L = |a|$

(ii)  $x \mapsto |x|$  ist Lipschitz mit  $L = 1$

(iii)  $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \sqrt{x}$  ist Lipschitz für  $a > 0$ . Ist nicht Lipschitz für  $a = 0$

(iv)  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2$  ist nicht Lipschitz.

Aber:  $g|_{[a,b]}$  ist Lipschitz

$$g|_{[a,b]} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2$$

(v) Lipschitz stetig  $\Rightarrow$  stetig ( $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ )

### 9.5 Proposition

Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\bar{x} \in D$ .

Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i)  $f$  ist stetig in  $\bar{x}$

(ii) für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{x}$  gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\bar{x})$$

**Beweis:** (i)  $\Rightarrow$  (ii)

Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$  eine Folge mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{x}$ . Sei  $\varepsilon > 0$ .

$f$  ist stetig in  $\bar{x} \Rightarrow \exists \delta > 0$  mit

$$|x - \bar{x}| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon$$

$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}$  mit  $|x_n - \bar{x}| < \delta \quad \forall n \geq N$ . Dann gilt für  $n \geq N$

$$|x_n - \bar{x}| < \delta \xrightarrow{(*)} |f(x_n) - f(\bar{x})| < \varepsilon \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\bar{x})$$

(ii)  $\Rightarrow$  (i)Angenommen:  $f$  ist nicht stetig in  $\bar{x}$ . Das heißt

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 : \exists x \in D : |x - \bar{x}| < \delta \quad \text{und} \quad |f(x) - f(\bar{x})| \geq \varepsilon$$

Es folgt

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in D : |x_n - \bar{x}| < \frac{1}{n+1} \quad \text{und} \quad |f(x_n) - f(\bar{x})| \geq \varepsilon$$

Dann gilt:

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}, \text{ aber } f(x_n) \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\bar{x})$$

Wir haben gezeigt:  $\neg(\text{i}) \Rightarrow \neg(\text{ii})$ , also  $(\text{ii}) \Rightarrow (\text{i})$  □

## 9.6 Proposition

Seien  $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$  stetig in  $\bar{x} \in D$ . Dann sind  $f + g$  und  $f \cdot g$  stetig in  $\bar{x}$ . Falls  $h(x) \neq 0$  für alle  $x \in D$ , so ist  $\frac{f}{h}$  stetig in  $\bar{x}$ .

**Beweis:**Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$  mit  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}$ . Dann gilt

$$\begin{array}{ccc} (f+g)(x_n) = f(x_n) + g(x_n) & \xrightarrow{n \rightarrow \infty} & f(\bar{x}) + g(\bar{x}) = (f+g)(\bar{x}) \\ & \downarrow & \\ & f, g \text{ stetig} & \\ & 9.5 \text{ (i)} \Rightarrow \text{(ii)} & \\ & \text{Prop 5.7} & \end{array}$$

 $9.5 \text{ (ii)} \Rightarrow \text{(i)} \quad f + g \text{ stetig in } \bar{x}. \text{ Ebenso } f \cdot g \text{ und } \frac{f}{h}$ 
□

## 9.7 Proposition

Seien  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, g : E \rightarrow \mathbb{R}$  Funktionen mit  $E \supset f(D)$ . Falls  $f$  stetig in  $\bar{x} \in D$  und  $g$  stetig ist in  $f(\bar{x}) \in E$ , dann gilt  $g \circ f$  ist stetig in  $\bar{x}$ .

**Beweis:**Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in D$  eine Folge mit  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}$ .

$$f \text{ stetig in } \bar{x} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\bar{x})$$

Wir haben jetzt:

$$(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \subset E \quad f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\bar{x})$$

Es folgt:

$$g \text{ stetig in } f(\bar{x}) \Rightarrow g(f(x_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(f(\bar{x})) = (g \circ f)(\bar{x})$$

$$\parallel$$

$$(g \circ f)(x_n)$$

□

## 9.8 Beispiel

Eine Polynom  $p$  ist eine Funktion der Form

$$x \mapsto p(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 \dots + \alpha_n x^n$$

wo  $\alpha_i \in \mathbb{R}$  (Dann  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ )

- (i) Polynome sind stetig auf  $\mathbb{R}$
- (ii) Seien  $p, q$  Polynome  $D := \{x \in \mathbb{R} \mid q(x) \neq 0\}$   
Dann ist  $\frac{p}{q}$  stetig auf  $D$  ( $\frac{p}{q}$  heißt rationale Funktion)

## 9.9 Bemerkung

” $\varepsilon$ - $\delta$ -Definition” von Stetigkeit lässt sich geometrisch interpretieren.

## 9.10 Satz: Zwischenwertsatz

Sei  $a \leq b$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig.

Zu jedem  $\gamma$  zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$  existiert ein  $c \in [a, b]$  mit  $f(c) = \gamma$

### Beweis:

O.E.d.A sei  $f(a) \leq \gamma \leq f(b)$ . Setze  $[a_0, b_0] := [a, b]$  dann gilt  $\gamma \in [f(a_0), f(b_0)]$ .

Seien  $[a_n, b_n]$  bereits konstruiert mit

- (i)  $\gamma \in [f(a_n), f(b_n)]$
- (ii)  $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$  und  $b_n - a_n = 2^{-n}(b - a)$

Dann gilt

$$\gamma \in [f(a_n), f(b_n)] \subset \left[ f(a_n), f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \right] \cup \left[ f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right), f(b_n) \right]$$

Setze

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] := \begin{cases} \left[ a_n, \frac{a_n + b_n}{2} \right], & \text{falls } \gamma \in \left[ f(a_n), f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \right] \\ \left[ \frac{a_n + b_n}{2}, b_n \right], & \text{sonst} \end{cases}$$

Induktion  $\leadsto$  Intervallschachtelung  $[a_n, b_n] n \in \mathbb{N}$  mit

$$\exists c \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$$

Außerdem  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$  und  $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$

$$f \text{ ist stetig} \implies f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(c) \wedge f(b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(c)$$

$f(a_n) \leq \gamma \leq f(b_n)$  für  $n \in \mathbb{N}$

$$\implies f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq \gamma \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(c)$$

$\implies \gamma = f(c)$

□

## 9.11 Beispiel

Jedes Polynom ungeraden Grades besitzt eine Nullstelle.



## 9.12 Satz

Sei  $a \leq b$ . Jede stetige Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  nimmt ihr Maximum und ihr Minimum an.

D.h. es gibt  $s, t \in [a, b]$  mit

$$\begin{aligned} f(s) &= \sup \{f(x) \mid x \in [a, b]\} \\ f(t) &= \inf \{f(x) \mid x \in [a, b]\} \end{aligned}$$

### Beweis:

Setze

$$M := \sup \{f(x) \mid x \in [a, b]\} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

( $M = \infty$  falls  $\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$  nicht nach oben beschränkt ist)

Dann existiert eine Folge  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$  mit  $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M$  (warum?)

$\Rightarrow$  es existiert eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$  mit  $f(x_n) = y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M$

Nach Bolzano-Weierstraß  $\Rightarrow x_n$  besitzt konvergente Teilfolge  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ .

Sei  $s := \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ . Es gilt  $a \leq x_{n_k} \leq b$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ . Also muss gelten:

$$\Rightarrow a \leq \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \leq b$$

$$\Rightarrow s \in [a, b]$$

$$f \text{ stetig} \Rightarrow M = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}\right) = f(s)$$

$f \leadsto -f$  ergibt Aussage für das Minimum

□

## 9.13 Definition

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist gleichmäßig stetig, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in D : (|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon)$$

## 9.14 Bemerkung

$$\text{gleichmäßig stetig} \xRightarrow{\neq} \text{stetig}$$

### Beweis:

“( $\Rightarrow$ )” ist trivial

“( $\Leftarrow$ )”:

$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \frac{1}{x}$  ist stetig. Sei  $\varepsilon = 1$ . Sei  $\delta > 0$ . Wähle  $n \in \mathbb{N}^*$  mit  $|\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}| < \delta$ . Dann

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{2n}\right) \right| = |n - 2n| = n \geq \varepsilon$$

□

## 9.15 Satz

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig

$$\Rightarrow f \text{ ist gleichmäßig stetig}$$

### Beweis:

Annahme:  $f$  ist nicht gleichmäßig stetig, dann

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 : \exists x, x' \in D : |x - x'| < \delta \wedge |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon$$

Zu  $\delta = \frac{1}{n+1}$  existieren  $x_n, x'_n \in [a, b]$  mit  $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n+1}$  und  $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon$

$\leadsto$  Folgen  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (x'_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$

Bolzano-Weierstraß  $\leadsto$  konvergente Teilfolgen  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  und  $(x'_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ . Dann gilt

$$\bar{x} := \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x'_{n_k} \in [a, b]$$

$f$  stetig  $\Rightarrow$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}\right) = f(\bar{x}) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x'_{n_k}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k})$$

$$\Rightarrow |f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \not\Leftarrow \text{ zu } |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon$$

□

**Korrektur:** Wähle zuert Teilfolge  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  mit  $(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \bar{x}$ .  $(x'_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$  besitzt konvergente Teilfolge  $(x'_{n_{k_l}})_{l \in \mathbb{N}}$ , die auch gegen  $\bar{x}$  konvergiert.

## 9.16 Definition

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$  heißt (streng) monoton wachsend, falls gilt

$$x, x' \in D, x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x') \quad (\Rightarrow f(x) < f(x'))$$

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$  heißt (streng) monoton fallend, falls gilt

$$x, x' \in D, x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x') \quad (\Rightarrow f(x) > f(x'))$$

## 9.17 Satz

Sei  $a \leq b, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und streng monoton wachsend (oder auch streng monoton fallend).

Dann ist  $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$  (bzw.  $f : [a, b] \rightarrow [f(b), f(a)]$ ) bijektiv und die Umkehrabbildung  $f^{-1}$  ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend bzw. streng monoton fallend.

### Beweis:

Sei  $f$  O.E.d.A streng monoton wachsend.

$f$  injektiv: trivial (aufgrund der strengen Monotonie)

$f$  surjektiv:

$$a < x < b \Rightarrow f(a) < f(x) < f(b)$$

$$\Rightarrow f([a, b]) \subset [f(a), f(b)]$$

$$\text{nach dem Zwischenwertsatz gilt } f([a, b]) = [f(a), f(b)]$$

$\Rightarrow f$  ist bijektiv

Sei nun  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$  die Umkehrfunktion von  $f$ .

$f^{-1}$  ist streng monoton wachsend: klar (warum?)

**Beweis der Stetigkeit von  $f^{-1}$  (Widerspruchsbeweis)**

Angenommen  $f^{-1}$  ist nicht stetig. Dann existiert  $\bar{y} \in [f(a), f(b)]$  und eine Folge  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [f(a), f(b)]$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \bar{y}$ , aber  $f^{-1}(y_n) \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} f^{-1}(\bar{y})$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \text{ und Teilfolge } (y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \text{ mit } |f^{-1}(y_{n_k}) - f^{-1}(\bar{y})| \geq \varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

(Negation 9.5 (ii))

Nach Bolzano-Weierstraß existiert eine Teilfolge der Teilfolge  $f^{-1}((y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}})$

$$f^{-1}(y_{n_{k_l}})_{l \in \mathbb{N}}$$

mit

$$\lim_{l \rightarrow \infty} f^{-1}(y_{n_{k_l}}) = \bar{x} \quad \text{für ein } \bar{x} \in [a, b]$$

Dann gilt:  $|f^{-1}(y_{n_{k_l}}) - f^{-1}(\bar{y})| \geq \varepsilon$  also auch  $|\bar{x} - f^{-1}(\bar{y})| \geq \varepsilon$ . Andererseits gilt:

$$\bar{y} = \lim_{l \rightarrow \infty} y_{n_{k_l}} = \lim_{l \rightarrow \infty} f \circ f^{-1}(y_{n_{k_l}}) \stackrel{f \text{ stetig}}{=} f\left(\lim_{l \rightarrow \infty} f^{-1}(y_{n_{k_l}})\right) = f(\bar{x})$$

also auch

$$f^{-1}(\bar{y}) = f^{-1}(f(\bar{x})) = \bar{x} \quad \text{⚡}$$

□

**9.18 Bemerkung**

Allgemeiner gilt: Sei  $I \subset \mathbb{R}$  ein Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und streng monoton wachsend (streng monoton fallend). Dann ist  $f(I)$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow f(I)$  ist bijektiv.  $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$  ist wieder streng monoton wachsend (streng monoton fallend) und stetig.

**Beweis:**

Übung Blatt 4 Aufgabe 1

**9.19 Beispiel**

Sei  $k \in \mathbb{N}^*$ , dann ist  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad x \mapsto x^k$  streng monoton wachsend (Bemerkung 2.5(vi) + Induktion)

$$\Rightarrow \exists \text{ stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion } f^{-1} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$$

Wegen Eindeutigkeit der  $k$ -ten Wurzel gilt

$$f^{-1}(y) = \sqrt[k]{y} \quad (\text{vergleiche Satz 3.3})$$

**9.20 Definition und Satz**

$\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$  besitzt eine stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion  $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ . Es gilt

$$\ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y) \quad \text{für } x, y \in (0, \infty)$$

**Beweis:**

$\exp$  ist stetig und streng monoton wachsend nach Übung.

$\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$  ist surjektiv nach Zwischenwertsatz (warum?)

9.17/9.18  $\Rightarrow$  Umkehrfunktion  $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und streng monoton wachsend

$$\begin{aligned}\ln(x \cdot y) &= \ln \left( \exp(\ln(x)) \cdot \exp(\ln(y)) \right) \\ &= \ln(\exp(\ln x + \ln y)) \\ &= \ln x + \ln y\end{aligned}$$

□

## 9.21 Definition und Proposition

Für  $a > 0$  setzen wir

$$a^x := \exp(x \cdot \ln a) \quad x \in \mathbb{R}$$

Es gilt  $a^{x+y} = a^x \cdot a^y, x, y \in \mathbb{R}$ . Für  $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  stimmt die Definition mit der früheren überein, das heißt

$$\exp\left(\frac{p}{q} \cdot \ln a\right) = \sqrt[q]{a^p}$$

**Beweis:**

(i)

$$\begin{aligned}a^{x+y} &= \exp((x+y) \ln a) \\ &= \exp(x \ln a + y \ln a) \\ &= \exp(x \ln a) \cdot \exp(y \ln a) \\ &= a^x \cdot a^y\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}\left(\exp\left(\frac{p}{q} \ln a\right)\right)^q &= \exp\left(\underbrace{\frac{p}{q} \ln a + \frac{p}{q} \ln a + \dots + \frac{p}{q} \ln a}_{q\text{-mal}}\right) \\ &= \exp(p \cdot \ln a) \\ &= a^p \\ \exp\left(\frac{p}{q} \ln a\right) &= \sqrt[q]{a^p}\end{aligned}$$

wegen Eindeutigkeit der  $q$ -ten Wurzel

□

## 9.22 Bemerkung

(i) Für  $a > 0$  gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$

(ii)

$$\begin{aligned}(a^x)^y &= a^{xy} \\ a^x b^x &= (ab)^x \\ (a^{-1})^x &= a^{-x} \\ \ln a^x &= x \cdot \ln a \quad a, b > 0 \quad x, y \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

**Beweis:**

(i)

$$a^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} \cdot \ln a\right) \xrightarrow[\text{exp stetig}]{n \rightarrow \infty} \exp(0) = 1$$

(ii) Übung

**9.23 Satz**

Sei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig mit  $f(x+y) = f(x) \cdot f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$ . Dann gilt

$$f \underbrace{\equiv}_\text{genau äquivalent} 0 \quad (f(x) = 0 \quad \forall x)$$

oder

$$f(x) = a^x \text{ mit } a = f(1) > 0$$

**9.24 Definition**

Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion,  $a \in [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$  ein Punkt, so dass eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$  existiert mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

Sei  $b \in [-\infty, +\infty]$

(i) Wir schreiben  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$  falls gilt:

$$\text{Für jede Folge } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \text{ mit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ gilt } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$$

(ii) Wir schreiben  $\lim_{x \searrow a} f(x) = b$ , falls gilt

$$\text{Für jede Folge } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \cap (a, \infty) \text{ mit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ gilt } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$$

(falls eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \cap (a; \infty)$  existiert mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ )

(iii) Analog für  $\lim_{x \nearrow a} f(x) = b$

**9.25 Beispiele**

(i) Für  $k \in \mathbb{N}$  gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^k} = \infty \quad \left( \frac{e^x}{x^k} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \right)$$

Für  $x > 0$  gilt

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} > \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \quad \text{also} \quad \frac{e^x}{x^k} > \frac{x}{(k+1)!} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$$

Genauer: Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset (0, \infty)$  eine Folge mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ . Zu zeigen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{x_n}}{x_n^k} = \infty$$

Sei  $K \in \mathbb{R}$ . Wähle  $N \in \mathbb{N}$  so, dass  $x_n \geq K \cdot (k+1)!$  falls  $n \geq N$ . Dann gilt

$$\frac{e^{x_n}}{x_n^k} > \frac{x_n}{(k+1)!} \geq K \quad \text{falls } n \geq N$$

□

(ii) Für  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^k e^{-x} = 0 \quad \xrightarrow{x \neq 0} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{e^x}{x^k} \right)^{-1} = 0$$

Es gilt

$$\lim_{x \searrow 0} x^k e^{\frac{1}{x}} = 0$$

da (Substitution  $y_n := \frac{1}{x_n}$ )

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \left( \left( \frac{1}{y} \right)^k \cdot e^y \right) = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{e^y}{y^k} = \infty$$

(iii)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$ ,  $\lim_{x \searrow 0} \ln x = -\infty$

$\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ist streng monoton wachsend

Falls  $x > e^K$ , so gilt  $\ln x > \ln(e^K) = K$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$$

$$\lim_{x \searrow 0} \ln x = \lim_{y \rightarrow \infty} \ln \frac{1}{y} = \lim_{y \rightarrow \infty} \ln y^{-1} = \lim_{y \rightarrow \infty} -\ln y = -\lim_{y \rightarrow \infty} \ln y = -\infty$$

(iv) Für  $\alpha > 0$  gilt  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$

Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset (0, \infty)$  eine Folge mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ . Dann

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{x_n^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln x_n) x_n^{-\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha \ln x_n) x_n^{-\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha \ln x_n) e^{-\alpha \ln x_n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(v)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$$|e^x - (1 - x)| \leq |x^2|, \text{ falls } |x| \leq \frac{3}{2}$$

Also:

$$\begin{aligned} \left| \frac{e^x - (1 + x)}{x} \right| &\leq |x|, \text{ falls } 0 < |x| \leq \frac{3}{2} \\ \left| \frac{e^x - (1 + x)}{x} \right| &= \left| \frac{e^x - 1}{x} - 1 \right| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{e^x - 1}{x} - 1 \right| = 0 \end{aligned}$$

(vi) Für  $\alpha > 0$  gilt  $\lim_{x \searrow 0} x^\alpha = 0$

Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset (0, \infty)$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \ln x_n \stackrel{(iii)}{=} -\infty$$

Nach (ii) gilt (mit  $k = 0$ )

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} e^y = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$$

$$\text{Also: } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\alpha \ln x_n} = 0$$

Mit  $0^\alpha = 0$  erhalten wir eine stetige Funktion  $[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^\alpha$

## 10 Die komplexen Zahlen

### 10.1 Definition

(i) Wir definieren

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

mit Operationen  $+, \cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben durch

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2)\end{aligned}$$

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$  bildet einen Körper mit  $0_{\mathbb{C}} = (0, 0)$ ,  $1_{\mathbb{C}} = (1, 0)$  und

$$(x, y)^{-1} = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right), \quad \text{falls } (x, y) \neq 0_{\mathbb{C}}$$

(ii) Die Abbildung  $\mathbb{R} \rightarrow \{x, 0 \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C} \quad x \mapsto (x, 0)$  ist ein Isomorphismus. Mit dieser Identifikation und  $i := (0, 1)$  schreiben wir  $(x, y) = x + i \cdot y$

(iii) Es gilt  $i^2 = -1$

(iv) Wir definieren  $\operatorname{Re}(x + iy) := x$ ,  $\operatorname{Im}(x + iy) := y$ .  
Es gilt  $z = z' \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \wedge \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z')$ . Außerdem gilt

$$z = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z), \quad \text{für } z \in \mathbb{C}$$

(v) Für  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  definieren wir das **komplex Konjugierte**

$$\bar{z} := x - iy$$

Das heißt  $\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)$ . Es gilt daher

- a)  $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$
- b)  $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
- c)  $\overline{\bar{z}} = z$
- d)  $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- e)  $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

(vi) Wir definieren  $|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_+$  durch  $|z| := \sqrt{z \cdot \bar{z}}$   
(falls  $z = x + iy$ , dann  $z \bar{z} = x^2 + y^2 \geq 0$ )  
(Für  $z \in \mathbb{R}$  stimmen die Definitionen überein.)

Es gilt

- a)  $|z| \geq 0$ ,  $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- b)  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- c)  $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

Das heißt  $\mathbb{C}$  ist mit  $|\cdot|$  ein **bewerteter Körper**

Beweis: Übung!

### 10.2 Definition

Eine Folge  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  konvergiert gegen  $z \in \mathbb{C}$ , falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |z_n - z| < \varepsilon \text{ falls } n \geq N$$



### 10.3 Proposition

$(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert  $\Leftrightarrow (\operatorname{Re}(z_n))_{n \in \mathbb{N}}, (\operatorname{Im}(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$  konvergieren

In diesem Fall gilt  $\operatorname{Re}(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\operatorname{Re}(z_n)) \quad \operatorname{Im}(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\operatorname{Im}(z_n))$

**Beweis:**

Sei  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  Folge, sei  $z_n = x_n + iy_n, n \in \mathbb{N}$

” $\Rightarrow$ ”

Sei  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n =: z = x + iy$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Sei  $N \in \mathbb{N}$ , so dass gilt

$$|z_n - z| < \varepsilon \text{ falls } n \geq N$$

Dann gilt

$$|x_n - x| = |\operatorname{Re}(z_n - z)| \leq |z_n - z| < \varepsilon$$

$$|y_n - y| = |\operatorname{Im}(z_n - z)| \leq |z_n - z| < \varepsilon$$

---

Nebenrechnung:

$$|\operatorname{Re}(w)| \leq |w| \quad |w| = \sqrt{w\bar{w}} = \sqrt{\operatorname{Re}(w)^2 + \operatorname{Im}(w)^2} \geq \sqrt{\operatorname{Re}(w)^2} = |\operatorname{Re}(w)|$$


---

” $\Leftarrow$ ”

Sei  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =: x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n =: y$ . Setze  $z := x + iy$ . Sei  $\varepsilon > 0$ . Sei  $N \in \mathbb{N}$  so dass

$$|x_n - x|, |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ falls } n \geq N$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} |z_n - z| &= |(x_n - x) + i(y_n - y)| \\ &\leq |x_n - x| + |i(y_n - y)| \\ &= |x_n - x| + \underbrace{|i|}_{=1} \cdot |y_n - y| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \text{falls } n \geq N \end{aligned}$$

□

### 10.4 Corollar

Seien  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}, (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  Folgen mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n =: w$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n =: z, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

Dann konvergieren  $(\lambda w_n + \mu z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (w_n \cdot z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\overline{w_n})_{n \in \mathbb{N}}$  und es gilt

(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda w_n + \mu z_n) = \lambda \cdot w + \mu \cdot z$

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n \cdot z_n = w \cdot z$

(c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{w_n} = \overline{w}$

Falls  $z_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$  und  $z \neq 0$ , so gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{w_n}{z_n} = \frac{w}{z}$

**Beweis:**

$$\overline{w_n} = \underbrace{\operatorname{Re}(w_n)}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(w)} + i \underbrace{(-\operatorname{Im} w_n)}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\operatorname{Im}(w)}$$

$$10.3 \Rightarrow \bar{w}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(w) + i \cdot (-\operatorname{Im}(w)) = \bar{w}$$

Rest: Übung! □

## 10.5 Definition

$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  heißt Cauchyfolge, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |z_n - z_m| < \varepsilon \text{ falls } n, m \geq N$$

## 10.6 Proposition

$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  ist Cauchy  $\Leftrightarrow (\operatorname{Re} z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\operatorname{Im} z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sind Cauchy

**Beweis:**

Analog zu 10.3 (benutze wieder:

$$|w| \leq |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w| \leq |w| + |w|$$

## 10.7 Satz

$\mathbb{C}$  ist vollständig, d.h. jede Cauchy-Folge konvergiert.

**Beweis:**

$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  Cauchy  $\Rightarrow$  10.6

$(\operatorname{Re} z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\operatorname{Im} z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}$  sind Cauchy

$\mathbb{R}$  vollständig  $\Rightarrow (\operatorname{Re} z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\operatorname{Im} z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergieren

10.3  $\Rightarrow (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert □

## 10.8 Definition

Sei  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  eine Folge.

a) Wir schreiben  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  für die Folge  $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$  der Partialsummen

$$s := \sum_{n=0}^k z_n$$

im Falle der Konvergenz bezeichnet  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  auch den Limes.

b)  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  konvergiert absolut, falls  $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$  konvergiert

## 10.9 Bemerkung

absolute Konvergenz  $\Rightarrow$  Konvergenz

**Beweis:**

Wie 7.10

□

## 10.10 Satz (Majorantenkriterium)

Sei  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  und  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}_+$  Folgen mit

$$|z_n| \leq c_n \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

Falls  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  konvergiert, so konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  absolut und es gilt

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} z_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |z_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

**Beweis:**

wie 7.11

## 10.11 Satz (Quotientenkriterium)

Sei  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}^*$  eine Folge. Falls  $0 \leq \theta < 1$  existiert mit

$$\left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| \leq \theta \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

so konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  absolut.

**Beweis:**

wie 7.13

## 10.12 Satz

Für jedes  $z \in \mathbb{C}$  konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$  absolut. Den Limes bezeichnen wir mit  $\exp(z)$ .

Falls  $N \in \mathbb{N}$  und  $|z| \leq \frac{N}{2} + 1$ , so gilt

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \leq \frac{2 \cdot |z|^{N+1}}{(N+1)!}$$

Außerdem gilt  $\exp(\bar{z}) = \overline{\exp(z)}$

**Beweis:**

Konvergenz und Restgliedabschätzung wie in 8.1

Konjugation: benutze:

$$\sum_{n=0}^k \frac{(\bar{z})^n}{n!} = \sum_{n=0}^k \frac{\overline{(z^n)}}{n!} = \overline{\sum_{n=0}^k \frac{z^n}{n!}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \exp(\bar{z}) = \overline{\exp(z)}$$

### 10.13 Satz

Für  $w, z \in \mathbb{C}$  gilt

$$\exp(w + z) = \exp(w) \cdot \exp(z)$$

**Beweis:**

Wie 8.2 (einschließlich Cauchy-Produkt von Reihen)

□

### 10.14 Definition

Sei  $D \subset \mathbb{C}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  eine Funktion,  $z_0 \in D$ .  $f$  heißt stetig in  $z_0$ , falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in D : (|z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon)$$

$f$  heißt stetig, falls  $f$  stetig ist in jedem Punkt von  $D$  ist.

### 10.15 Bemerkung

Stetigkeit in  $z_0$  lässt sich auch mit Hilfe von Folgen charakterisieren.  
(Übung!)

### 10.16 Satz

$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  ist stetig.

**Beweis:**


$\exp(z) \exp(-z) = \exp(0) = 1$  für alle  $z \in \mathbb{C}$ .  $\Rightarrow \forall z \in \mathbb{C} : \exp(z) \neq 0$ . Sei  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Sei  $\varepsilon > 0$ .

Sei  $\delta := \min \left\{ 2, \frac{\varepsilon}{|\exp(z_0)| \cdot 2} \right\}$ . Für  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z - z_0| < \delta$  gilt:

$$\begin{aligned} |\exp(z) - \exp(z_0)| &= |\exp(z_0) \cdot (\exp(z - z_0) - 1)| \\ &\leq |\exp(z_0)| \cdot |\exp(z - z_0) - 1| \\ &\leq |\exp(z_0)| \cdot |r_2(z - z_0)| \\ &\leq |\exp(z_0)| \cdot 2|z - z_0| \\ &< |\exp(z_0)| \cdot 2\delta \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

## 10.17 geometrische Interpretation



jetzt:  $z = e^{ix} := \exp(ix)$  Dann

$$\begin{aligned}
 |e^{ix}| &= \sqrt{e^{ix} \overline{e^{ix}}} \\
 &= \sqrt{e^{ix} e^{-ix}} \\
 &= \sqrt{e^{ix} e^{-ix}} = e^0 = 1
 \end{aligned}$$

## 11 Winkelfunktion

### 11.1 Definition

Wir definieren Funktionen

- (i)  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \operatorname{Re}(e^{ix})$
- (ii)  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \operatorname{Im}(e^{ix})$

### 11.2 Bemerkung

- (i)  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$  (Euler'sche Formel)
- (ii)  $\cos x, \sin x \in [-1, 1]$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , da  $|\operatorname{Re}(e^{ix})|, |\operatorname{Im}(e^{ix})| \leq |e^{ix}| = 1$

### 11.3 Proposition

$\forall x \in \mathbb{R} :$

- (i)  $\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$
- (ii)  $\sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$
- (iii)  $\cos(-x) = \cos x$

$$(iv) \sin(-x) = -\sin x$$

$$(v) \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

**Beweis:**

(ii)

$$\begin{aligned} z - \bar{z} &= \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z) - (\operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)) \\ &= 2i \operatorname{Im}(z) \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \cos(-x) &= \operatorname{Re}(e^{-ix}) \stackrel{10.12}{=} \operatorname{Re}(\overline{e^{ix}}) \\ &= \operatorname{Re}(e^{ix}) \\ &= \cos x \end{aligned}$$

(v)

$$\begin{aligned} \cos^2 x + \sin^2 x &= (\operatorname{Re}(e^{ix}))^2 + (\operatorname{Im}(e^{ix}))^2 \\ &= |e^{ix}|^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

## 11.4 Satz

$\cos, \sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$  sind stetig.

**Beweis:**

Sei  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben.  $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  ist stetig, daher existiert  $\delta > 0$ , so dass gilt:

$$z \in \mathbb{C}, |z - ix_0| < \delta \implies |\exp(z) - \exp(ix_0)| < \varepsilon$$

Sei  $x \in \mathbb{R}$  ein Punkt mit  $|x - x_0| < \delta$ . Dann gilt:

$$|\underbrace{ix}_{z} - ix_0| = |i| \cdot |x - x_0| = |x - x_0| < \delta$$

und wir erhalten

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos x_0| &= |\operatorname{Re}(e^{ix}) - \operatorname{Re}(e^{ix_0})| \\ &= |\operatorname{Re}(e^{ix} - e^{ix_0})| \\ &\leq |e^{ix} - e^{ix_0}| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

[bzw. mit 11.3]

□

## 11.5 Satz: Additionstheoreme

$\forall x, y \in \mathbb{R} :$

$$\begin{aligned} \cos(x + y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ \sin(x + y) &= \cos x \sin y + \sin x \cos y \end{aligned}$$

**Beweis:**

$$\begin{aligned} \cos(x + y) + i \sin(x + y) &= e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy} \\ &= (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) \\ &= \cos x \cos y - \sin x \sin y + i(\cos x \sin y + \sin x \cos y) \end{aligned}$$

## 11.6 Corollar

$\forall x, y \in \mathbb{R} :$

$$\begin{aligned}\sin x - \sin y &= 2 \cos \left( \frac{x+y}{2} \right) \sin \left( \frac{x-y}{2} \right) \\ \cos x - \cos y &= -2 \sin \left( \frac{x+y}{2} \right) \sin \left( \frac{x-y}{2} \right)\end{aligned}$$

### **Beweis:**

Setze  $u := \frac{x+y}{2}$ ,  $v := \frac{x-y}{2}$ , dann

$$x = u + v \quad , \quad y = u - v$$

$$\begin{aligned}\sin x - \sin y &= \sin(u+v) - \sin(u-v) \\ &= \cos u \sin v + \sin u \cos v - (\sin u \cos(-v) + \cos u \sin(-v)) \\ &= 2 \cos u \sin v \\ &= 2 \cos \left( \frac{x+y}{2} \right) \sin \left( \frac{x-y}{2} \right)\end{aligned}$$

## 11.7 Satz

Für  $x \in \mathbb{R}$  gilt:

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \pm \dots$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \pm \dots$$

Die Reihen konvergieren absolut.

Weiter gilt

$$\begin{aligned}\cos x &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + r_{2n+2}(x) \\ \sin x &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + r_{2n+3}(x)\end{aligned}$$

wobei  $|r_m(x)| \leq \frac{|x|^m}{m!}$  falls  $|x| \leq m+1$ ,  $m = 2n+2, 2n+3$

### **Beweis:**

- absolute Konvergenz:  
 $\exp(x)$  ist Majorante

□

•

$$\begin{aligned}
 \cos x &= \operatorname{Re}(e^{ix}) = \operatorname{Re} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(ix)^k}{k!} \right) \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \left( \sum \dots + \sum \dots \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^n \frac{i^{2k} x^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^n \frac{i^{2k+1} x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \operatorname{Re} \left( \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}}_{\in \mathbb{R}} \right) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right)
 \end{aligned}$$

ebenso für  $\sin x$

• Restglied:

$$\begin{aligned}
 |r_{2n+2}(x)| &= \left| \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \right| \\
 &= \left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \right| \cdot |1 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots|
 \end{aligned}$$

wo  $0 \leq a_k = a_{k-1} \frac{x^2}{(2n+2k+1)(2n+2k+2)} \Big|_{|x| \leq 2n+2+1} \leq a_{k-1}$ , mit  $k \geq 1$  (durch simples Anstarren!)

Es gilt

$$0 \leq \underbrace{(1 - a_1)}_{\geq 0} + \underbrace{a_2 - a_3}_{\geq 0} + \underbrace{a_4 - a_5}_{\geq 0} + \dots \leq 1$$

Es folgt

$$|r_{2n+2}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}, \quad m = 2n+3 \text{ analog}$$

□

## 11.8 Proposition

$$\cos(2) \leq -\frac{1}{3}$$

**Beweis:**

$$\cos(2) = 1 - \frac{2^2}{2} + r_4(2) = -1 + r_4(2)$$



$$|r_4(2)| \leq \frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3} \Rightarrow \cos(2) \leq -\frac{1}{3}$$

□

## 11.9 Proposition

$$\forall x \in (0, 2] : \sin x > 0$$

### Beweis:

$$\sin x = x + r_3(x)$$

$$|r_3(x)| < \frac{|x|^3}{3!} = |x| \frac{|x|^2}{3 \cdot 2} < |x| \Rightarrow \sin x > 0$$

## 11.10 Proposition

$\cos$  ist auf  $[0, 2]$  streng monoton fallend.

### Beweis:

Sei  $0 \leq y \leq x \leq 2$ .

$$\begin{aligned} \cos x - \cos y &= -2 \underbrace{\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)}_{>0} \underbrace{\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)}_{>0} < 0 \\ &\Rightarrow \cos \text{ auf } [0, 2] \text{ streng monoton fallend} \end{aligned}$$

## 11.11 Definition und Satz

$\cos$  hat in  $(0, 2)$  genau eine Nullstelle. Das Zweifache dieser Nullstelle nennen wir  $\pi$ .

### Beweis:

$$\cos(0) = \operatorname{Re}(e^{i0}) = 1, \quad \cos(2) < -\frac{1}{3}$$

$$\cos \text{ stetig} \Rightarrow \exists \text{ Nullstelle in } (0, 2)$$

$$\cos \text{ ist streng monoton fallend} \Rightarrow \exists! \text{ Nullstelle}$$

□

## 11.12 Bemerkung

- (i)
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
  - $e^{i\pi} = -1$  (Eulersche Identität)
  - $e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i$
  - $e^{2\pi i} = 1$

### Beweis:

(i)

$$\operatorname{Re}(e^{i\frac{\pi}{2}}) = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad |e^{i\frac{\pi}{2}}| = 1 \Rightarrow \operatorname{Im}(e^{i\frac{\pi}{2}})^2 = 1$$

$$\operatorname{Im}(e^{i\frac{\pi}{2}}) = \sin \frac{\pi}{2} > 0 \text{ Rest: Funktionalgleichung}$$

(ii) •  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$

•  $\sin(x + 2\pi) = \sin x$

da  $e^{ix} = e^{i(x+2\pi)}$

•  $\cos(x + \pi) = -\cos x$

•  $\sin(x + \pi) = -\sin x$

da  $e^{ix} = -e^{i(x+\pi)}$

•  $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$

•  $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$

da

$$\begin{aligned} \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= e^{i(x+\frac{\pi}{2})} \\ &= e^{ix} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{ix} \cdot i = (\cos x + i \sin x) \cdot i \\ &= -\sin x + i \cos x \end{aligned}$$

Es genügt daher, das Verhalten von  $\cos$  auf  $[0, \frac{\pi}{2}]$  zu kennen.

(iii) Für die Nullstellen gilt

$$\{x \in \mathbb{R} \mid \cos x = 0\} = \left\{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid \sin x = 0\} = \{k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

**Beweis:**

$$\begin{aligned} 0 &= \cos \frac{\pi}{2} = -1^k \cos\left(\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi\right) \\ &\Rightarrow \text{für } k \in \mathbb{Z} \text{ ist } \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \text{ Nullstelle von } \cos \end{aligned}$$

11.11  $\Rightarrow \cos$  hat keine Nullstellen in  $[0, \frac{\pi}{2})$

$$\cos x = \cos(-x) \Rightarrow \cos \text{ hat keine Nullstelle in } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$\cos(x + k \cdot \pi) = (-1)^k \cos x \Rightarrow \cos$  hat keine Nullstellen in  $(k \cdot \pi - \frac{\pi}{2}, k \cdot \pi + \frac{\pi}{2})$ . Nullstellen von  $\sin$  analog.

(iv)

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : \quad \underbrace{e^{ix} = 1}_{\Leftrightarrow \sin x = 0 \text{ und } \cos x \geq 0} &\Leftrightarrow x = k \cdot 2\pi \text{ für ein } k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

(v)  $\cos$  ist auf dem  $[0, \pi]$  streng monoton fallend und auf  $[\pi, 2\pi]$  streng monoton wachsend.

$\sin$  ist auf  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  streng monoton wachsend und auf  $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$  streng monoton fallend.

**Beweis:**cos streng monoton fallend auf  $[0, \frac{\pi}{2}]$  nach 11.11

$$\cos x = -\cos(x - \pi) = - \underbrace{\cos(\pi - x)}_{\substack{\text{streng monoton wachsend auf } [\frac{\pi}{2}, \pi] \\ \text{streng monoton fallend auf } [\frac{\pi}{2}, \pi]}}$$

$$\cos x \begin{cases} \geq 0, & x \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \leq 0, & x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

 $\Rightarrow$  cos streng monoton fallend auf  $[0, \pi]$ 

□

$$\cos 0 = 1 \quad \cos \pi = -1 \quad \sin -\frac{\pi}{2} = -1 \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

stetig auf Intervallen


 $\Rightarrow \cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  besitzt stetige Umkehrfunktion

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$


 $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$  besitzt stetige Umkehrfunktion

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

(vi)



### 11.13 Satz: Polarzerlegung



Jedes  $0 \neq z \in \mathbb{C}$  lässt sich eindeutig in der Form

$$z = r \cdot e^{i\varphi} \quad , \quad r > 0 \quad , \quad \varphi \in [0, 2\pi)$$

schreiben. Insbesondere gilt: Die Abbildung

$$[0, 2\pi) \rightarrow \{z \mid |z| = 1\} \subset \mathbb{C}$$

ist bijektiv.

#### **Beweis:**

Setze  $r := |z|$  und  $w := \frac{z}{r}$ , dann  $|w| = \left|\frac{z}{r}\right| = \frac{|z|}{r} = 1$  und  $\operatorname{Re}(w) \in [-1, 1]$ . Setze

$$\varphi := \begin{cases} \arccos(\operatorname{Re}(w)) \in [0, \pi], & \text{falls } \operatorname{Im}(w) \geq 0 \\ \arccos(-\operatorname{Re}(w)) + \pi \in (\pi, 2\pi), & \text{falls } \operatorname{Im}(w) < 0 \end{cases}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} &= \cos \varphi + i \sin \varphi \\ &= \begin{cases} \operatorname{Re}(w) + i \operatorname{Im}(w), & \text{falls } \varphi \in [0, \pi], \operatorname{Im} w \geq 0 \\ \operatorname{Re}(w) + i \operatorname{Im}(w), & \text{falls } \varphi \in (\pi, 2\pi), \operatorname{Im}(w) < 0 \end{cases} \\ &= w \end{aligned}$$

Nebenrechnung:

$$\cos(\arccos(-\operatorname{Re}(w)) + \pi) = -\cos(\arccos(-\operatorname{Re}(w))) = -(-\operatorname{Re}(w)) = \operatorname{Re} w$$

$$\Rightarrow r \cdot e^{i\varphi} = r \cdot w = z$$

Eindeutigkeit: Sei  $z = r \cdot e^{i\varphi} = s \cdot e^{i\psi}$ , wo  $r, s > 0$  und  $\varphi, \psi \in [0, 2\pi)$

$$\Rightarrow r = |r| \cdot |e^{i\varphi}| = |z| = |s| \cdot |e^{i\psi}| = s$$

$$1 = \frac{z\bar{z}}{r \cdot s} = e^{i\varphi} \cdot e^{-i\psi} = e^{i(\varphi - \psi)}$$

$$\varphi - \psi \stackrel{11.12}{=} k \cdot 2\pi \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}, \varphi, \psi \in [0, 2\pi) \Rightarrow k = 0 \Rightarrow \varphi = \psi$$

□

### 11.14 Bemerkung

$z = r \cdot e^{i\varphi}, w = s \cdot e^{i\psi}$  dann

$$z \cdot w = r \cdot s \cdot e^{i(\varphi+\psi)}$$

”Beträge multiplizieren, Winkel addieren”

### 11.15 Corollar

Für  $n \in \mathbb{N}^*$  besitzt die Gleichung  $z^n = 1$  genau  $n$  Lösungen,  $e^{i\frac{2\pi k}{n}}, k = 0, 1, \dots, n-1$

**Beweis:**

$e^{i\frac{2\pi k}{n}}$  ist Lösung für  $k = 0, 1, \dots, n-1$ . Sei nun  $z$  eine Lösung. Dann  $z = re^{i\varphi}$ ,  $r = |z| = 1$ .

$$1 = z^n = e^{i\varphi n} \Rightarrow \varphi \cdot n = k \cdot 2\pi \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{2\pi k}{n} \text{ für eine } k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k \leq n-1$$

## 12 Differentiation

### 12.1 Definition

Sei  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion und  $\bar{x} \in D$  ein Punkt, so dass eine Folge in  $D$  mit Limes  $\bar{x}$  existiert.

$f$  heißt differenzierbar in  $\bar{x}$  falls der Limes

$$f'(\bar{x}) := \lim_{\substack{x \rightarrow \bar{x} \\ x \in D \setminus \{\bar{x}\}}} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \in \mathbb{R}$$

existiert.  $f'(\bar{x})$  heißt Ableitung von  $f$  im Punkt  $\bar{x}$ , wir schreiben auch

$$\frac{df}{dx}(\bar{x}) \quad , \quad Df(\bar{x})$$

d.h. für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \setminus \{\bar{x}\}$  mit  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}$ , konvergiert

$$\left( \frac{f(x_n) - f(\bar{x})}{x_n - \bar{x}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$


gegen ein und denselben Grenzwert.

### 12.2 Bemerkung

- (i) Falls  $D \subset \mathbb{R}$  ein echtes Intervall ist, so existiert für jedes  $\bar{x} \in D$  eine Folge in  $D$  mit Limes  $\bar{x}$ .
- (ii) Falls  $f$  in  $\bar{x}$  differenzierbar ist, so gilt

$$f'(\bar{x}) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0 \\ (\bar{x}+h \in D)}} \frac{f(\bar{x}+h) - f(\bar{x})}{h}$$

(iii)



- (iv)  $D, f, \bar{x}$  wie in 12.1  
 $f$  differenzierbar in  $\bar{x}$ , genau dann, wenn  $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$  existiert mit

a)  $\varphi$  ist stetig in  $\bar{x}$

b)  $f(x) = f(\bar{x}) + (x - \bar{x})\varphi(x)$ ,  $x \in D$

**Beweis:**

$\Leftarrow$  Übung!

$\Rightarrow$  Übung mit

$$\varphi(x) := \begin{cases} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}}, & \text{falls } x \in D \setminus \{\bar{x}\} \\ f'(\bar{x}), & \text{falls } x = \bar{x} \end{cases}$$

### 12.3 Beispiel

- (i)  $f(x) = x^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) ist auf  $\mathbb{R}$  differenzierbar.

$n \in \mathbb{N}^*$ :

$$\frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} = \frac{x^n - \bar{x}^n}{x - \bar{x}} = x^{n-1} + x^{n-2}\bar{x} + \dots + x\bar{x}^{n-2} + \bar{x}^{n-1}$$

$$x \rightarrow \bar{x}: \quad n \cdot \bar{x}^{n-1}$$

$n = 0$ :

$$\frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} = \frac{1 - 1}{x - \bar{x}} = 0 \rightarrow 0$$

- (ii)  $f(x) = e^x$

$$\frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{h} = \frac{e^{\bar{x}+h} - e^{\bar{x}}}{h} = e^{\bar{x}} \cdot \frac{e^h - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} e^{\bar{x}} \quad \text{wegen 9.25 (v)}$$

- (iii)  $f(x) = x^{-1}$  ist auf  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  differenzierbar

$$\begin{aligned} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{h} &= \frac{1}{h} \left( \frac{1}{\bar{x} + h} - \frac{1}{\bar{x}} \right) \\ &= \frac{1}{h} \frac{\bar{x} - (\bar{x} + h)}{(\bar{x} + h)\bar{x}} \\ &= -\frac{1}{(\bar{x} + h)\bar{x}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{\bar{x}^2} = f'(\bar{x}) \end{aligned}$$

- (iv)  $f(x) = \sin x$

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\sin h}{h} - 1 &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\sin h - h}{h} \\ &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{h + r_3(h) - h}{h} \\ &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{r_3(h)}{h} = 0 \end{aligned}$$

Restgliedabschätzung:

$$\left| \frac{r_3(h)}{h} \right| = \frac{|r_3(h)|}{|h|} \leq \frac{\frac{|h|^3}{3!}}{|h|} = \frac{|h|^2}{6} \quad \text{für } |h| \leq 4$$

Es folgt (mit den Additionstheoremen 11.6)

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\sin(\bar{x} + h) - \sin(\bar{x})}{h} &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{2 \cos\left(\frac{\bar{x} + h + \bar{x}}{2}\right) \sin\left(\frac{\bar{x} + h - \bar{x}}{2}\right)}{h} \\ &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \cos\left(\frac{\bar{x} + h + \bar{x}}{2}\right) \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\sin\left(\frac{\bar{x} + h - \bar{x}}{2}\right)}{\frac{h}{2}} \\ &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \cos\left(\bar{x} + \frac{h}{2}\right) \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos(\bar{x}) \cdot 1 = \cos \bar{x} = \sin'(\bar{x})\end{aligned}$$

(v) Analog:  $\cos'(\bar{x}) = -\sin(\bar{x})$ ,  $\bar{x} \in \mathbb{R}$

## 12.4 Satz

$f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $\bar{x} \in D$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Dann sind  $\lambda f + \mu g$  und  $f \cdot g$  differenzierbar in  $\bar{x}$  und

$$\begin{aligned}(\lambda \cdot f + \mu \cdot g)'(\bar{x}) &= \lambda \cdot f'(\bar{x}) + \mu \cdot g'(\bar{x}) \\ (f \cdot g)'(\bar{x}) &= f'(\bar{x}) \cdot g(\bar{x}) + f(\bar{x}) \cdot g'(\bar{x})\end{aligned}$$

Falls  $g(x) \neq 0$  für alle  $x \in D$ , so ist  $\frac{f}{g}$  in  $\bar{x}$  differenzierbar mit

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(\bar{x}) = \frac{f'(\bar{x})g(\bar{x}) - f(\bar{x})g'(\bar{x})}{g(\bar{x})^2}$$

**Beweis:**

$$\begin{aligned}&\frac{(\lambda \cdot f + \mu \cdot g)(\bar{x} + h) - (\lambda \cdot f + \mu \cdot g)(\bar{x})}{h} \\ &= \lambda \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{h} + \mu \frac{g(\bar{x} + h) - g(\bar{x})}{h} \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} \lambda f'(\bar{x}) + \mu g'(\bar{x})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{(fg)(\bar{x} + h) - (fg)(\bar{x})}{h} &= \frac{f(\bar{x} + h)g(\bar{x} + h) - f(\bar{x})g(\bar{x})}{h} \\ &= \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{h} \cdot g(\bar{x} + h) + f(\bar{x}) \cdot \frac{g(\bar{x} + h) - g(\bar{x})}{h} \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(\bar{x}) \cdot g(\bar{x}) + f(\bar{x})g'(\bar{x})\end{aligned}$$

Haben benutzt:  $g$  ist stetig in  $\bar{x}$  nach Übung. (nach 12.2(iv) gilt

$$g(x) = g(\bar{x}) + (x - \bar{x})\varphi(x)$$

mit  $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$  stetig in  $\bar{x}$ )

$$\begin{aligned}\frac{\frac{f}{g}(\bar{x} + h) - \frac{f}{g}(\bar{x})}{h} &= \frac{1}{g(\bar{x} + h)g(\bar{x})} \left( \frac{(f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}))g(\bar{x})}{h} - \frac{f(\bar{x})(g(\bar{x} + h) - g(\bar{x}))}{h} \right) \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{g(\bar{x})^2} \cdot (f'(\bar{x}) \cdot g(\bar{x}) - f(\bar{x})g'(\bar{x}))\end{aligned}$$



## 12.5 Beispiel

(i)  $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$

$$f'(x) = \frac{0 \cdot x^n - 1 \cdot n \cdot x^{n-1}}{(x^n)^2} = -n \cdot x^{n-1-2n} = -nx^{-n-1}$$

also  $\frac{dx^k}{dx} = kx^{k-1}$  für alle  $k \in \mathbb{Z}$

(ii)  $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\tan'(x) = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

## 12.6 Satz

$I \subset \mathbb{R}$  echtes Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und streng monoton. Sei  $g : f(I) \rightarrow I$  die Umkehrfunktion (9.18).

Falls  $f$  in  $\bar{x} \in I$  differenzierbar ist mit  $f'(\bar{x}) \neq 0$ , so ist  $g$  in  $f(\bar{x}) \in f(I)$  differenzierbar mit

$$g'(f(\bar{x})) = \frac{1}{f'(\bar{x})}$$

Falls also  $f$  in  $I$  differenzierbar ist mit  $f'(x) \neq 0$  für alle  $x \in I$ , so ist  $g$  differenzierbar in  $f(I)$  und

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}, \quad y \in f(I)$$

### **Beweis:**

Wollen:

$$\lim_{\substack{y \rightarrow f(\bar{x}) \\ y \neq f(\bar{x})}} \frac{g(y) - g(f(\bar{x}))}{y - f(\bar{x})}$$

Sei  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset f(I) \setminus \{f(\bar{x})\}$  eine Folge mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = f(\bar{x}) =: \bar{y}$ .

$g$  ist stetig nach 9.18, also

$$\bar{x} = g \circ f(\bar{x}) = g(\bar{y}) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n)$$

$g(y_n) \neq g(\bar{y})$  da  $g$  bijektiv

$$\begin{aligned} g'(f(\bar{x})) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(y_n) - g(\bar{y})}{y_n - \bar{y}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{y_n - \bar{y}}{g(y_n) - g(\bar{y})}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{f(g(y_n)) - f(g(\bar{y}))}{g(y_n) - g(\bar{y})}} \\ &= \frac{1}{f'(g(\bar{y}))} \\ &= \frac{1}{f'(\bar{x})} \end{aligned}$$

□

## 12.7 Beispiel

(i)  $\ln'(y) = \frac{1}{\exp(\ln(y))} = \frac{1}{y}$

(ii) Für  $y \in (-1, 1)$  gilt

$$\arcsin'(y) = \frac{1}{\sin'(\arcsin y)} = \frac{1}{\cos(\underbrace{\arcsin y}_{\in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})})} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin y)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

Nebenrechnung  $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ :

$$\cos(x) = |\cos(x)| = \sqrt{\cos^2(x)} = \sqrt{1 - \sin^2(x)}$$

(iii)  $\arctan : (-\infty, \infty) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$   
Umkehrfunktion von  $\tan$ . (Übung!)

$$\arctan'(y) = \frac{1}{1 + y^2}$$

## 12.8 Satz (Kettenregel)

Seien  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  Funktionen mit  $f(D) \subset E$ . Falls  $f$  in  $\bar{x} \in D$  und  $g$  in  $f(\bar{x}) \in E$  differenzierbar sind, so ist  $g \circ f$  differenzierbar in  $\bar{x}$  und es gilt

$$(g \circ f)'(\bar{x}) = g'(f(\bar{x})) \cdot f'(\bar{x})$$

### Beweis:

Sei  $\bar{y} := f(\bar{x})$ . Definiere  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$\varphi(y) := \begin{cases} \frac{g(y) - g(\bar{y})}{y - \bar{y}}, & \text{falls } y \neq \bar{y} \\ g'(\bar{y}), & \text{falls } y = \bar{y} \end{cases}$$

Dann ist  $\varphi$  stetig in  $\bar{y}$  und es gilt

$$g(y) - g(\bar{y}) = \varphi(y) \cdot (y - \bar{y}) \quad , y \in E$$

Wir erhalten

$$\begin{aligned} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(\bar{x})}{x - \bar{x}} &= \frac{g(f(x)) - g(f(\bar{x}))}{x - \bar{x}} \\ &= \varphi(f(x)) \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow \bar{x}} \underbrace{\varphi(f(\bar{x}))}_{\substack{f \text{ stetig in } \bar{x} \\ \varphi \text{ stetig in } f(\bar{x})}} \cdot f'(\bar{x}) = g'(f(\bar{x})) \cdot f'(\bar{x}) \end{aligned}$$

□

## 12.9 Beispiel

(i)  $a \in \mathbb{R} \quad f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^a = \exp(a \ln x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \exp'(a \ln x) \cdot \frac{d(a \ln x)}{dx} \\ &= \exp(a \ln x) \cdot a \cdot x^{-1} \\ &= ax^{a-1} \end{aligned}$$

(ii) allgemein:

$$\frac{d e^{f(x)}}{dx} = f'(x) e^{f(x)}$$

## 12.10 Definition

Sei  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  in  $D$  differenzierbar. Dann ist  $f': D \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion.

Falls  $f'$  in  $D$  differenzierbar ist, so heißt  $f$  in  $D$  **zweimal differenzierbar** und  $f''(x) := (f')'(x)$ . Wir schreiben auch  $D^2 f(x)$ ,  $\frac{d^2 f}{dx^2}(x)$ ,  $f^{(2)}(x)$ .

$f$  heißt  **$k$ -mal differenzierbar** in  $D$ , falls  $f$   $(k-1)$ -mal differenzierbar ist und  $f^{(k-1)}$  differenzierbar ist.

$$f^{(k)}(x) := \left( f^{(k-1)} \right)'(x), \quad D^k f(x), \quad \frac{d^k f}{dx^k}(x)$$

$f$  heißt  **$\infty$ -oft differenzierbar** oder **glatt**, falls  $f$   $k$ -mal differenzierbar ist für jedes  $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

## 12.11 Beispiel

Polynome,  $e^x$ ,  $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$ , ... sind glatt.

$$f(x) := \begin{cases} x^2, & \text{falls } x > 0 \\ -x^2, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

ist 1-mal differenzierbar, aber nicht 2-mal denn  $f'(x) = 2|x|$

## 12.12 Definition

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$  hat in  $\bar{x} \in D$  ein **lokales Maximum (Minimum)**, falls ein  $\varepsilon > 0$  existiert, so dass

$$f(x) \underset{(\geq)}{\leq} f(\bar{x}) \quad \forall x \in D \cap (\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)$$

D.h.

$$f|_{D \cap (\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)}$$

besitzt Maximum (Minimum) in  $\bar{x}$ .

### 12.13 Satz

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  besitze in  $\bar{x} \in (a, b)$  ein lokales **Extremum** (d.h. Maximum oder Minimum) und sei in  $\bar{x}$  differenzierbar. Dann gilt  $f'(\bar{x}) = 0$ .

**Beweis:**

O.E.d.A besitzt  $f$  in  $\bar{x}$  ein lokales Maximum.

Dann existiert ein  $\varepsilon > 0$  so, dass  $f(x) \leq f(\bar{x})$  für alle  $x \in (\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)$ . Es folgt

$$\begin{aligned} 0 &\geq \underbrace{\lim_{\substack{x \searrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}}}_{f'(\bar{x})} = \lim_{\substack{x \searrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \\ &= \lim_{\substack{x \nearrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

□

### 12.14 Bemerkung

$f'(\bar{x}) = 0$  ist notwendig, aber nicht hinreichend für Existenz eines lokalen Extremums.

zB  $f(x) = x^3$ ,  $f'(0) = 0$

### 12.15 Satz von Rolle

Sei  $a < b$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig mit  $f(a) = f(b)$ . Sei  $f$  in  $(a, b)$  differenzierbar.

Dann existiert  $\bar{x} \in (a, b)$  mit  $f'(\bar{x}) = 0$

**Beweis:**

Trivial falls  $f$  konstant. Andernfalls existiert ein  $x_0 \in (a, b)$  mit  $f(x_0) > f(a)$  oder  $f(x_0) < f(a) = f(b)$ .  $f$  stetig auf  $[a, b]$  besitzt also Maximum und Minimum (nach 9.12). O.E. sei das Maximum von  $f$  größer als  $f(x_0) > f(a) = f(b)$ . Das Maximum werde in  $\bar{x} \in (a, b)$  angenommen.

$\Rightarrow f$  hat in  $\bar{x} \in (a, b)$  ein lokales Maximum.

$\Rightarrow f'(\bar{x}) = 0$

### 12.16 Mittelwertsatz

Sei  $a < b$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Sei  $f$  in  $(a, b)$  differenzierbar. Dann existiert ein  $\bar{x} \in (a, b)$  mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\bar{x})$$


**Beweis:**

Definiere:  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x - a)$ . Dann ist  $F$  stetig auf  $[a, b]$  und differenzierbar auf  $(a, b)$ . Außerdem gilt  $F(a) = f(a) = F(b)$ .

$\Rightarrow$   
Rolle

$$\exists \bar{x} \in (a, b) \text{ mit } f'(\bar{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = F'(\bar{x}) = 0$$

□



### 12.17 Korollar

Sei  $a < b$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig auf  $[a, b]$ , differenzierbar auf  $(a, b)$  mit  $f'(x) = 0$  für alle  $x \in (a, b)$ . Dann ist  $f$  konstant.

**Beweis:**

Für  $a \leq x < y \leq b$  gilt

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\bar{x}) = 0 \Rightarrow f(y) = f(x)$$

für ein  $\bar{x} \in (x, y)$

□

### 12.18 Korollar

Sei  $\lambda \in \mathbb{R}$  und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar mit  $f'(x) = \lambda \cdot f(x)$ . Dann gilt

$$f(x) = f(0) \cdot e^{\lambda \cdot x}$$

**Beweis:**

Setze:  $F(x) := f(x) \cdot e^{-\lambda x}$ , dann ist  $F$  differenzierbar mit

$$F'(x) = f'(x) \cdot e^{-\lambda x} + f(x)(-\lambda e^{-\lambda x}) = 0$$

$\Rightarrow F$  ist konstant mit

$$f(x) \cdot e^{-\lambda x} = F(x) = F(0) = f(0)$$

Multiplizieren mit  $e^{-\lambda x}$

□

### 12.19 Satz (l'Hospital)

Seien  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar und  $g'(x) \neq 0$  für alle  $x \in (a, b)$ . Es gelte entweder

a)  $\lim_{x \searrow a} f(x) = \lim_{x \searrow a} g(x) = 0$

b)  $\lim_{x \searrow a} f(x) = \lim_{x \searrow a} g(x) = \infty$

Falls  $\lim_{x \searrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert, so auch  $\lim_{x \searrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  und

$$\lim_{x \searrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \searrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Ebenso für  $\lim_{x \nearrow b} \dots$

Eine Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes. liefert

$$\frac{f}{g}$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(b) - g(a)}{b - a}} = \frac{f'(\bar{x})}{g'(\bar{x})}$$

## 12.20 Beispiel

(i)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha x}}{x}$  für  $\alpha > 0$  Bedingung b) von obigem Satz

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\alpha \cdot e^{\alpha x}}{1} = \infty$$

$$\alpha, \beta > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{e^{\frac{\alpha}{\beta} x}}{x} \right)^\beta = \infty$$

ebenso:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha x}}{|p(x)|}, \quad a > 0, \quad p \text{ ein Polynom}$$

(ii)

$$\begin{aligned} \lim_{x \searrow 0} x \ln(x) &= \lim_{x \searrow 0} -\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ &= -\lim_{x \searrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \searrow 0} x = 0 \end{aligned}$$

Folgerung:

$$\lim_{x \searrow 0} x^x = \lim_{x \searrow 0} e^{x \ln x} = \exp \left( \lim_{x \searrow 0} x \ln x \right) = e^0 = 1$$


## 13 Integration

### 13.1 Definition

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt **Treppenfunktion**, falls eine Zerlegung

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

existiert, sodass für jedes  $k = 1, \dots, n$   $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$  konstant ist.



$$\mathcal{T}([a, b]) := \{ \text{Treppenfunktionen auf } [a, b] \}$$

### 13.2 Bemerkung

$\mathcal{T}([a, b])$  ist ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

**Beweis:**

$f, g \in \mathcal{T}([a, b])$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \quad \text{Zerlegung für } f$$

$$a = y_0 < y_1 < \dots < y_m = b \quad \text{Zerlegung für } g$$

Dann existiert eine Zerlegung

$$a = z_0 < z_1 < \dots < z_q = b$$

so dass für jedes  $l \in \{1, \dots, q\}$   $k \in \{1, \dots, n\}$  und  $r \in \{1, \dots, m\}$  existieren mit  $(z_{l-1}, z_l) \subset (x_{k-1}, x_k) \cap (y_{r-1}, y_r)$ .

$$\{x_0, \dots, x_n\} \cup \{y_0, \dots, y_m\} = \underbrace{\{z_0, \dots, z_q\}}_{\text{aufsteigend}}$$

Dann ist aber  $(\lambda f + \mu g)|_{(z_{l-1}, z_l)} = \lambda f|_{(z_{l-1}, z_l)} + \mu g|_{(z_{l-1}, z_l)}$  konstant. □

### 13.3 Definition und Proposition

Sei  $f \in \mathcal{T}([a, b])$ . Wir definieren das Integral

$$\int_a^b f(x) \, dx := \sum_{k=1}^n \gamma_k \cdot (x_k - x_{k-1}),$$

wo

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

Eine Zerlegung ist, so dass

$$f|_{(x_{k-1}, x_k)} \equiv \gamma_k, \quad k \in \{1, \dots, n\}$$

$\int_a^b f(x) \, dx$  ist unabhängig von der Zerlegung für  $f$

**Beweis:**

Sei  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  bzw  $a = y_0 < y_1 < \dots < y_m = b$  Zerlegungen für  $f$  mit  $f|_{(x_{k-1}, x_k)} \equiv \gamma_k$  bzw  $g|_{(y_{r-1}, y_r)} \equiv \delta_r$ .

Sei  $a = z_0 < z_1 < \dots < z_q = b$  eine Zerlegung, so dass für jedes  $l \in \{1, \dots, q\}$   $k_l \in \{1, \dots, n\}$  und  $r_l \in \{1, \dots, m\}$  existieren mit

$$(z_{l-1}, z_l) \subset (x_{k_l-1}, x_{k_l}) \cap (y_{r_l-1}, y_{r_l})$$

$$\{z_0, \dots, z_q\} \supset \{x_1, \dots, x_n\} \cup \{y_0, \dots, y_m\}$$

Dann gilt

$$\{1, \dots, q\} = \bigcup_{k=1}^n \{l \mid k_l = k\}$$

also auch

$$\bigcup_{\{l \mid k_l = k\}} [z_{l-1}, z_l] = [x_{k-1}, x_k]$$

und

$$\sum_{\{l \mid k_l = k\}} (z_l - z_{l-1}) = x_k - x_{k-1}$$

Setze:  $\zeta_l := \gamma_{k_l} (= \delta_{r_l})$

$$\begin{aligned} \sum_{l \in \{1, \dots, q\}} \zeta_l (z_l - z_{l-1}) &= \sum_{k \in \{1, \dots, n\}} \sum_{\{l \mid k_l = k\}} \zeta_l (z_l - z_{l-1}) \\ &= \sum_{k \in \{1, \dots, n\}} \left( \sum_{\{l \mid k_l = k\}} \gamma_{k_l} (z_l - z_{l-1}) \right) \\ &= \sum_{k \in \{1, \dots, n\}} \left( \sum_{\{l \mid k_l = k\}} \gamma_k (z_l - z_{l-1}) \right) \\ &= \sum_{k \in \{1, \dots, n\}} \gamma_k \cdot \sum_{\{l \mid k_l = k\}} (z_l - z_{l-1}) \\ &= \sum_{k \in \{1, \dots, n\}} \gamma_k \cdot (x_k - x_{k-1}) \end{aligned}$$

$$\text{Ebenso: } \sum_{l \in \{1, \dots, q\}} \zeta_l (z_l - z_{l-1}) = \sum_{r \in \{1, \dots, m\}} \delta_r (y_r - y_{r-1})$$

□

### 13.4 Propostion

$f, g \in \mathcal{T}([a, b])$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

(i)

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x) dx = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx + \mu \cdot \int_a^b g(x) dx$$

(ii)

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq (b-a) \cdot \sup \{ |f(x)| \mid x \in [a, b] \}$$

(iii)

$$f \leq g \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$



**Beweis:**

Sei  $a = z_0 < \dots < z_n = b$  Zerlegung für  $f$  und  $g$  (wie 13.3) mit  $f|_{z_{k-1}, z_k} \equiv \gamma_k$  bzw  $g|_{z_{k-1}, z_k} \equiv \delta_k$

(i)

$$\begin{aligned} \int_a^b (\lambda f + \mu g)(x) dx &= \sum_{k=1}^n (\lambda \gamma_k + \mu \delta_k) \cdot (z_k - z_{k-1}) \\ &= \lambda \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n \gamma_k \cdot (z_k - z_{k-1})}_{=\int_a^b f(x) dx} + \mu \underbrace{\sum_{k=1}^n \delta_k \cdot (z_k - z_{k-1})}_{=\int_a^b g(x) dx} \end{aligned}$$

(ii) analog

(iii) analog

**13.5 Definition**

Sei  $M$  eine Menge. Für  $f : M \rightarrow \mathbb{K}$  beschränkt definieren wir

$$\|f\|_{\infty, M} := \sup \left\{ |f(x)| \mid x \in M \right\} \in \mathbb{R}_+$$

Wir schreiben oft auch  $\|f\|_{\infty}$

**13.6 Proposition**

$\|\cdot\|_{\infty}$  ist eine **Norm**, d.h.

(i)  $\|f\|_{\infty} \geq 0$  und  $\|f\|_{\infty} = 0$  genau dann wenn  $f = 0$ (ii)  $\|\lambda \cdot f\|_{\infty} = |\lambda| \cdot \|f\|_{\infty}$ (iii)  $\|f + g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}$ **Beweis:** (iii)

$$\begin{aligned} \sup\{|(f + g)(x)| \mid x \in M\} &= \sup\{|f(x) + g(x)| \mid x \in M\} \\ &\leq \sup\{|f(x)| + |g(x)| \mid x \in M\} \\ &\leq \sup\{|f(x)| + |g(y)| \mid x, y \in M\} \\ &= \sup\{|f(x)| \mid x \in M\} + \sup\{|g(y)| \mid y \in M\} \\ &= \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} \end{aligned}$$

Rest Eigenschaften von  $|\cdot|$

□

**13.7 Definition**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt **Regelfunktion**, falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists g \in \mathcal{T}([a, b]) : \|f - g\|_{\infty} < \varepsilon$$

$$\mathcal{R}([a, b]) := \{\text{Regelfunktionen auf } [a, b]\}$$

### 13.8 Proposition

Für  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sind äquivalent:

- (i)  $f \in \mathcal{R}([a, b])$
- (ii)  $\forall \bar{x} \in [a, b]$  existiert  $\lim_{\substack{x \searrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} f(x)$  und  
 $\forall \bar{x} \in (a, b]$  existiert  $\lim_{\substack{x \nearrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} f(x)$

**Beweis:** (Skizze) (ii)  $\Rightarrow$  (i)

Annahme  $f \notin \mathcal{R}([a, b])$ . Finde  $\varepsilon > 0$  und Intervallschachtelung  $[a_n, b_n], n \in \mathbb{N}$  mit  $\Delta g \in \mathcal{T}([a_n, b_n])$  mit  $\left\| f|_{[a_n, b_n]} - g \right\|_{\infty, [a_n, b_n]} < \varepsilon$

$$\Rightarrow \exists \bar{x} \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$$

Wegen (ii) existiert  $N \in \mathbb{N}$  mit

$$\begin{aligned} \left| f(t) - \lim_{\substack{x \nearrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} f(x) \right| &< \varepsilon, \quad t \in [a_N, \bar{x}) \\ \left| f(t) - \lim_{\substack{x \searrow \bar{x} \\ x \neq \bar{x}}} f(x) \right| &< \varepsilon, \quad t \in (\bar{x}, b_N] \end{aligned} \quad \text{⚡ zu IVS}$$

(i)  $\Rightarrow$  (ii) Übung!

### 13.9 Beispiel

- (i)  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig  $\Rightarrow f \in \mathcal{R}([a, b])$
- (ii)  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monoton  $\Rightarrow f \in \mathcal{R}([a, b])$   
 Übung!
- (iii)  $\chi_{[0,1] \cap \mathbb{Q}} \notin \mathcal{R}([a, b])$ , wo

$$\chi_{[0,1] \cap \mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Übung!

### 13.10 Definition und Satz

Für  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  definieren wir

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx$$

wo  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T}([a, b])$  eine Folge ist mit

$$\|g_n - f\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Insbesondere existiert der Limes und hängt nicht von der Wahl der Folge  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ab. Weiter gilt:

$$\int_b^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx \quad \int_a^a f(x) dx := 0$$

**Beweis:**

Sei  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T}([a, b])$  mit  $\|g_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  (warum existiert  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ?).

Setze  $I_n := \int_a^b g_n(x) dx$ , dann ist  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  Cauchyfolge: Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $N \in \mathbb{N}$  so, dass  $\|g_n - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2 \cdot (b-a)}$  falls  $n \geq N$ . Dann gilt für  $n, m \geq N$ :

$$\begin{aligned} |I_n - I_m| &= \left| \int_a^b g_n(x) dx - \int_a^b g_m(x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b (g_n - g_m)(x) dx \right| && \text{nach 13.4(i)} \\ &\leq \|g_n - g_m\|_\infty (b-a) && 13.4.(ii) \\ &\leq (\|g_n - f\|_\infty + \|f - g_m\|_\infty) (b-a) \\ &< 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \varepsilon \end{aligned}$$

$\Rightarrow (I_n)$  konvergiert, also existiert  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx$ .

Sei nun  $(h_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T}([a, b])$  weitere Folge mit  $(\star) \quad \|h_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . Setze  $J_n := \int_a^b h_n(x) dx$ .

$$(g_0, h_0, g_1, h_1, \dots)$$

erfüllt auch  $(\star)$ .

$$\leadsto (I_0, J_0, I_1, J_1, \dots) \text{ konvergiert}$$

$\Rightarrow (I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergieren gegen denselben Limes. □

### 13.11 Proposition

$f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

(i)

$$\int_a^b (\lambda \cdot f + \mu \cdot g)(x) dx = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$$

(ii)

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq (b-a) \cdot \|f\|_\infty$$

(iii)

$$f \leq g \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

**Beweis:**

Seien  $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T}([a, b])$  mit  $\|d_n - f\|_\infty, \|e_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

(i) Dann gilt

$$\|\lambda \cdot d_n + \mu \cdot e_n - (\lambda \cdot f + \mu \cdot g)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\begin{aligned} \int_a^b (\lambda f + \mu g)(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (\lambda d_n + \mu e_n)(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \lambda \cdot \int_a^b d_n(x) dx + \mu \cdot \int_a^b e_n(x) dx \right) \\ &= \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx + \mu \cdot \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

### 13.12 Bemerkung

$a < b < c$ ,  $f \in \mathcal{R}([a, c])$ . Dann gilt  $f|_{[a, b]} \in \mathcal{R}([a, b])$ ,  $f|_{[b, c]} \in \mathcal{R}([b, c])$  und

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

#### Beweis:

Klar für Treppenfunktionen, damit auch für Limites. □

### 13.13 Mittelwertsatz der Integralrechnung

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $g \in \mathcal{R}([a, b])$ ,  $g \geq 0$ . Dann existiert  $\bar{x} \in [a, b]$  mit :

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\bar{x}) \cdot \int_a^b g(x) dx$$

Insbesondere (für  $g \equiv 1$ ) existiert  $\bar{x} \in [a, b]$  mit

$$\int_a^b f(x) dx = f(\bar{x}) \cdot (b - a)$$

#### Beweis:

Setze

$$\begin{aligned} M &:= \sup \{ f(x) \mid x \in [a, b] \} = \max \{ f(x) \mid x \in [a, b] \} \\ m &:= \inf \{ f(x) \mid x \in [a, b] \} = \min \{ f(x) \mid x \in [a, b] \} \end{aligned}$$

Dann gilt: (benutze:  $m \cdot g(x) \leq f(x)g(x)$  und  $f(x)g(x) \leq M \cdot g(x)$ )

$$\begin{aligned} m \cdot \int_a^b g(x) dx &= \int_a^b m \cdot g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \\ &\leq \int_a^b M g(x) dx \\ &= M \cdot \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \cdot \int_a^b g(x) dx$$

$$m = \min \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$$

$$\Rightarrow \exists x_{\min} \in [a, b] : f(x_{\min}) = m \text{ und } \exists x_{\max} \in [a, b] : f(x_{\max}) = M$$

$$\text{ZWS} \Rightarrow \exists \bar{x} \in [a, b] : F(\bar{x}) = \mu$$

□

### 13.14 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei  $I$  ein echtes Intervall,  $a \in I$  und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Wir definieren  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$F(t) := \int_a^t f(x) dx$$

(i)  $F$  ist **Stammfunktion** von  $f$ , d.h.  $F$  ist differenzierbar auf  $I$  mit  $F'(t) = f(t)$  für alle  $t \in I$ .

(ii) Ist  $G : I \rightarrow \mathbb{R}$  weitere Stammfunktion von  $f$ , so gilt

$$F(t) = G(t) - G(a) =: G(x) \Big|_a^t$$

für alle  $t \in I$

#### **Beweis:**

Sei  $t_0 \in I$ . Für  $t_0 < t \in I$  gilt

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(t) - F(t_0)}{t - t_0} - f(t_0) \right| &= \frac{|F(t) - F(t_0) - f(t_0)(t - t_0)|}{t - t_0} \\ &= \frac{\left| F(t) - F(t_0) - \int_{t_0}^t f(t_0) dx \right|}{t - t_0} \\ &= \frac{\left| \int_a^t f(x) dx - \int_a^{t_0} f(x) dx - \int_{t_0}^t f(t_0) dx \right|}{t - t_0} \\ &= \frac{\left| \int_a^{t_0} f(x) dx + \int_{t_0}^t f(x) dx - \int_a^{t_0} f(x) dx - \int_{t_0}^t f(t_0) dx \right|}{t - t_0} \\ &= \frac{\left| \int_{t_0}^t f(x) dx - \int_{t_0}^t f(t_0) dx \right|}{t - t_0} \\ &= \frac{\left| \int_{t_0}^t (f(x) - f(t_0)) dx \right|}{t - t_0} \\ &\leq \frac{\sup \{|f(x) - f(t_0)| \mid x \in [t_0, t]\} \cdot (t - t_0)}{t - t_0} \\ &\xrightarrow{t \searrow t_0} 0 \end{aligned}$$

ebenso für  $t_0 > t \in I$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \neq t_0}} \frac{F(t) - F(t_0)}{t - t_0} = f(t_0)$$

beweis (ii)

$$(G - F)'(t) = f(t) - f(t) = 0 \forall t$$

$\Rightarrow G - F$  konstant (Korollar 12.17)

$$G - F \equiv G(a) - F(a) = G(a)$$

□

### 13.15 Bemerkung

Der Satz lässt sich auch für Regelfunktionen formulieren mit  $\lim_{x \nearrow x_0} \dots$  und  $\lim_{x \searrow x_0} \dots$

### 13.16 Beispiele

(i)  $-1 \neq s \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} \Big|_a^b \left( = \frac{b^{s+1} - a^{s+1}}{s+1} \right)$$

wir schreiben auch

$$\int x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + c$$

**Beweis:**

Sei  $f(t) = t^s$ , dann ist  $G(t) := \frac{t^{s+1}}{s+1}$  Stammfunktion, denn  $G'(t) = f(t)$ . Also gilt

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) = G(x) \Big|_a^b$$

(ii) Für  $s = -1$  gilt ( $0 < a < b$ )

$$\int_a^b x^{-1} dx = \ln(x) \Big|_a^b$$

denn

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} = x^{-1} \quad \text{für } x > 0$$

( $a < b < 0$ )

$$\int_a^b x^{-1} dx = \ln(-x) \Big|_a^b$$

da

$$\frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{-x} (-1) = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

Wir schreiben auch

$$\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$$

(iii)

$$\int \exp(x) dx = \exp(x) + C$$

(iv)

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

(v)

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

(vi)  $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$ 

$$\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan(x) \Big|_a^b$$

### 13.17 Satz: Substitutionsregel

$I, [a, b] \subset \mathbb{R}$  Intervalle.  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $g : [a, b] \rightarrow I$  stetig differenzierbar (d.h.  $g'$  existiert und ist stetig). Dann gilt

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx$$

#### Beweis:

Sei  $G : I \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ , d.h.  $G'(t) = f(t)$  für  $t \in I$ .

$$\begin{aligned} (G \circ g)'(t) &= G'(g(t)) \cdot g'(t) \\ &= f(g(t)) \cdot g'(t) \end{aligned}$$

 $\Rightarrow$ 

$$\begin{aligned} \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= (G \circ g)(x) \Big|_a^b = G(g(b)) - G(g(a)) \\ &= G(x) \Big|_{g(a)}^{g(b)} = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx \end{aligned}$$

□

### 13.18 Beispiel

(i)

$$\int_a^b f(x + \lambda) dx = \int_{a+\lambda}^{b+\lambda} f(x) dx$$

(ii)

$$\int_a^b f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_{a^2}^{b^2} f(x) dx$$

(iii)  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$  ist stetig differenzierbar  $0 \notin [a, b]$

$$\int_a^b \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln |g(x)| \Big|_a^b$$

Insbesondere  $(-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2})$

$$\int_a^b \tan x dx = \int_a^b \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = - \int_a^b \frac{\cos'(x)}{\cos(x)} = - \ln(\cos(x)) \Big|_a^b$$

### 13.19 Satz: Partielle Integration

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

**Beweis:**

Für  $F := f \cdot g$  gilt

$$f(x)g(x) \Big|_a^b = \int_a^b F'(x) = \int_a^b f(x)g'(x) + \int_a^b f'(x)g(x)$$

### 13.20 Beispiel


(i)

$$\int_a^b \ln x \cdot 1 dx = x \cdot \ln(x) \Big|_a^b - \int_a^b \frac{x}{x} dx = x \cdot \ln(x) \Big|_a^b - x \Big|_a^b = x \cdot \ln(x) - 1 \Big|_a^b$$

(ii)

$$\int_0^1 x^n (1-x)^m dx = \frac{n! \cdot m!}{(n+m+1)!}$$

(iii) Betrachte  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = \sqrt{1-t^2}$





Für  $b \in [0, 1)$  gilt

$$\begin{aligned}
 \int_0^b f(x) dx &= \int_0^b f(x) \cdot 1 dx \\
 &= f(x) \cdot x \Big|_0^b - \int_0^b x f'(x) dx \\
 &= \sqrt{1-x^2} \cdot x \Big|_0^b - \int_0^b x(-2x) \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \sqrt{1-b^2} b + \int_0^b \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \sqrt{1-b^2} b + \int_0^b \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int_0^b \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^b \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 \int_0^b f(x) dx &= \sqrt{1-b^2} b + \int_0^b \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int_0^b \sqrt{1-x^2} dx
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}
 2 \cdot \int_0^b \sqrt{1-x^2} dx &= \sqrt{1-b^2} b + \int_0^b \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \sqrt{1-b^2} b + \arcsin(x) \Big|_0^b \\
 &\xrightarrow{b \rightarrow 1} 0 + \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$



## Abbildungsverzeichnis