



WESTFÄLISCHE  
WILHELMS-UNIVERSITÄT  
MÜNSTER



FACHBEREICH 10  
MATHEMATIK UND  
INFORMATIK

# **Skript Analysis 2**

**Mitschrift der Vorlesung „Analysis 2“ von Prof. Ebert**

Tim Keil

25. April 2015

## Vorwort — Mitarbeit am Skript

Dieses Dokument ist eine Mitschrift aus der Vorlesung „Analysis 2, SoSe 2015“, gelesen von Prof. Ebert. Der Inhalt entspricht weitestgehend dem Tafelanschrieb. Für die Korrektheit des Inhalts übernehme ich keinerlei Garantie! Für Bemerkungen und Korrekturen – und seien es nur Rechtschreibfehler – bin ich sehr dankbar. Korrekturen bitte durch persönliches Ansprechen oder per Mail an [keil.menden@web.de](mailto:keil.menden@web.de).

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Normierte und metrische Räume</b>	<b>1</b>
I.1. Der $\mathbb{R}^n$	1
I.1.1. Das Skalarprodukt	1
I.1.2. Die $l^2$ -Norm	2
I.2. Euklidische und normierte Vektorräume	2
I.2.1. Euklidischer Vektorraum	2
I.2.2. Beispiel euklidischer Vektorraum	2
I.2.3. Norm	2
I.2.4. Cauchy-Schwarz-Ungleichung	3
I.2.5. Beispiele für Normen auf $\mathbb{R}$	4
I.2.6. Äquivalenz von Normen	4
I.2.7. Beispiel Äquivalente Normen	4
I.3. Metrische Räume	5
I.3.1. Abstand	5
I.3.2. Metrik	5
I.3.3. Konvergenz im metrischen Raum	5
I.3.4. Beispiel Metrik	6
I.3.5. Cauchyfolge im metrischen Raum	7
I.3.6. Vollständigkeit	7
I.3.7. Satz	7
I.3.8. Stetigkeit	8
I.3.9. Satz	8
I.3.10. Satz	8
I.3.11. Beispiele	8
I.3.12. Lipschitz-stetig	9
I.3.13. Beispiel Lipschitz-stetig	9
I.3.14. Satz	9
I.3.15. Korollar:	10
I.3.16. Operatornorm	10
I.4. Topologische Grundbegriffe	11
I.4.1. $\varepsilon$ -Ball	11
I.4.2. Innerer Punkt, Umgebung	11
I.4.3. Offen, Abgeschlossen	11
I.4.4. Beispiel	12
I.4.5. Satz	12
I.4.6. Satz	14
I.4.7. Satz	14
I.4.8. Beispiel	15
I.5. Kompaktheit	15
I.5.1. Satz von Bolzano-Weierstraß im $\mathbb{R}^n$	16
I.5.2. Definition	16
I.5.3. Beispiel:	16
I.5.4. Satz	17
I.5.5. Satz von Heine-Borel	18
I.5.6. Satz	18
I.5.7. Satz vom Minimum und Maximum	18

# I. Normierte und metrische Räume

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \rightarrow$  Normierte Vektorräume  $\rightarrow$  Metrische Räume

## I.1. Der $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R} \right\}$$

Der  $\mathbb{R}^n$  ist ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n) = n$ .

Sei

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i\text{-ter Eintrag}$$

$(e_1, \dots, e_n)$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}^n$  und heißt **Standardbasis**.

Ist  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ , so gilt  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

### I.1.1. Definition

Das **Skalarprodukt** auf  $\mathbb{R}^n$  ist die Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

mit

$$x = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{R}$$

es gilt:

**(S1)** (Bilinearität)  $\forall x_0, x_1, y_0, y_1 \in \mathbb{R}^n \forall a, b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \langle x_0 + x_1, y_0 + y_1 \rangle &= \langle x_0, y_0 \rangle + \langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_1, y_0 \rangle + \langle x_0, y_1 \rangle \\ \langle ax_0, by_0 \rangle &= ab \langle x_0, y_0 \rangle \end{aligned}$$

**(S2)** (Symmetrie)  $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$  gilt  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

**(S3)** (positive Definitheit)  $\forall x \in \mathbb{R}^n$  gilt  $\langle x, x \rangle \geq 0$  und  $\langle x, x \rangle = 0$  nur dann, wenn  $x = 0$

Desweiteren gilt  $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} := \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$  (Kronecker-Symbol)

Ist

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in \mathbb{R}^n \quad (x_i \in \mathbb{R})$$

so ist

$$\begin{aligned} \langle x, e_j \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, e_j \right\rangle \stackrel{(S1)}{=} \sum_{i=1}^n x_i \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \delta_{ij} = x_j \\ \Rightarrow x &= \sum_{j=1}^n \langle x, e_j \rangle e_j \end{aligned}$$

### I.1.2. Definition

Sei  $x \in \mathbb{R}^n$ . Die  $l^2$ -Norm von  $x$  ist die Zahl

$$\|x\|_2 := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Schreibweise manchmal auch:  $\|x\|_2 = \|x\|$

## I.2. Euklidische und normierte Vektorräume

### I.2.1. Definition

Sei  $V$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Ein **Skalarprodukt** auf  $V$  ist eine Abbildung  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , welche die Axiome S1, S2, S3 erfüllt.

Ein **euklidischer Vektorraum** ist ein Paar  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ .  $V$  ist ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ist Skalarprodukt auf  $V$ .

Ist  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein euklidischer Vektorraum, so ist die durch  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  induzierte Norm definiert als

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \quad v \in V$$

### I.2.2. Beispiele

- $\mathbb{R}^n$  mit Standardskalarprodukt
- Die Abbildung

$$\begin{aligned} \mathbb{C} \times \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (z, w) &\mapsto \operatorname{Re}(\bar{z} \cdot w) \end{aligned}$$

ist ein Skalarprodukt. Die induzierte Norm ist der Absolutbetrag.

### I.2.3. Definition

Sei  $V$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Eine **Norm** auf  $V$  ist eine Abbildung  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}, v \mapsto \|v\|$  mit

$$(N1) \quad \|v\| \geq 0 \quad \forall v \in V$$

$$(N2) \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

$$(N3) \quad \|av\| = |a| \cdot \|v\| \quad \forall v \in V, a \in \mathbb{R}$$

$$(N4) \quad \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad \forall v, w \in V \quad (\text{Dreiecksungleichung})$$

Ein normierter Vektorraum ist ein Paar  $(V, \|\cdot\|)$  bestehend aus einem  $\mathbb{R}$ -VR  $V$  und einer Norm auf  $V$ .

**I.2.4. Satz**

Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein euklidischer Vektorraum. Für  $v \in V$  setze  $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$   
 Dann gilt:

1.  $\|\cdot\|$  ist eine Norm auf  $V$
2.  $\forall v, w \in V$  gilt die **Cauchy-Schwarz-Ungleichung**:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

**Beweis:**

$$1. \text{ N1: } \|v\| = \sqrt{\underbrace{\langle v, v \rangle}_{\geq 0}} \geq 0$$

$$\text{N2: } \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = 0 \Rightarrow \langle v, v \rangle = 0 \stackrel{\text{S3}}{\Rightarrow} v = 0$$

$$\text{N3: } a \in \mathbb{R}, v \in V$$

$$\|av\| = \sqrt{\langle av, av \rangle} \stackrel{\text{S1}}{=} \sqrt{a^2 \langle v, v \rangle} = \sqrt{a^2} \sqrt{\langle v, v \rangle} = |a| \|v\|$$

2. CS-Ungleichung ist trivial, wenn  $w = 0$

Ann.:  $w \neq 0$ : Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$\begin{aligned} f(t) &= \langle v + tw, v + tw \rangle \\ &= \langle v, v \rangle + 2t \langle v, w \rangle + t^2 \langle w, w \rangle \\ &= \|v\|^2 + 2t \underbrace{\langle v, w \rangle}_{\in \mathbb{R}} + t^2 \|w\|^2 \end{aligned}$$

aus S3 folgt  $f(t) \geq 0$ .  $f$  ist Polynom

$$\begin{aligned} f'(t) &= 0 \Leftrightarrow t_0 = -\frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} \\ f''(t) &= 2\|w\|^2 > 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$  nimmt bei  $t_0$  globales Minimum an

$$\begin{aligned} 0 \leq f(t_0) &= \|v\|^2 - \frac{2\langle v, w \rangle^2}{\|w\|^2} + \frac{\langle v, w \rangle^2}{\|w\|^4} \|w\|^2 = \|v\|^2 - \frac{\langle v, w \rangle^2}{\|w\|^2} \\ &\Rightarrow \frac{\langle v, w \rangle^2}{\|w\|^2} \leq \|v\|^2 \\ &\Rightarrow \langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \|w\|^2 \\ &\Rightarrow |\langle v, w \rangle| = \sqrt{\langle v, w \rangle^2} \leq \sqrt{\|v\|^2 \|w\|^2} = \|v\| \cdot \|w\| \end{aligned}$$

□

Schließlich können wir N4 zeigen:

N4:

$$\begin{aligned}\|v+w\|^2 &= \langle v+w, v+w \rangle \\ &\stackrel{S1}{=} \|v\|^2 + 2\langle v, w \rangle + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\| + 2|\langle v, w \rangle| + \|w\|^2 \\ &\stackrel{CS}{\leq} \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2 \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2\end{aligned}$$

Wurzel ziehen zeigt N4

□

### I.2.5. Weitere Beispiele für Normen auf $\mathbb{R}$

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \quad x_i \in \mathbb{R}$$

- $l^1$ -Norm  $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- $l^\infty$ -Norm  $\|x\|_\infty = \max \{|x_i| \mid i = 1, \dots, n\}$
- Ist  $p \in [1, \infty)$ , so ist die  $l^p$ -Norm

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (\text{Beweis Schwer})$$

### I.2.6. Definition

$V$   $\mathbb{R}$ -VR,  $\|\cdot\|_0, \|\cdot\|_1$  Normen auf  $V$ . Die Normen  $\|\cdot\|_0, \|\cdot\|_1$  heißen **äquivalent**, falls  $C, c > 0$  existieren, so dass für alle  $v \in V$  gilt:

$$c\|v\|_0 \leq \|v\|_1 \leq C\|v\|_0$$

#### Bemerkung:

Das ist eine Äquivalenzrelation

- **Reflexiv:** klar
- **Symmetrie:**

$$\begin{aligned}c\|v\|_0 &\leq \|v\|_1 \leq C\|v\|_0 \\ \Rightarrow \frac{1}{c}\|v\|_1 &\leq \|v\|_0 \leq \frac{1}{C}\|v\|_1\end{aligned}$$

- **Transitiv:**

$$\begin{aligned}c\|v\|_0 &\leq \|v\|_1 \leq C\|v\|_0 \quad \text{und} \quad d\|v\|_1 \leq \|v\|_2 \leq D\|v\|_1 \quad (C, c, D, d > 0) \\ \Rightarrow cd\|v\|_0 &\leq CD\|v\|_0\end{aligned}$$

### I.2.7. Beispiel

Die  $l^1, l^2$  und  $l^\infty$ -Norm auf  $\mathbb{R}^n$  sind äquivalent und zwar gilt:

$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty \quad (\text{Beweis Übung})$$

### I.3. Metrische Räume

#### I.3.1. Definition

$(V, \|\cdot\|)$  normierter Vektorraum,  $v, w \in V$

Der **Abstand** von  $v$  und  $w$  ist

$$d(v, w) := \|v - w\|$$

#### I.3.2. Definition

Sei  $X$  eine Menge

Eine **Metrik** (oder Abstandsfunktion) ist eine Abbildung  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto d(x, y)$ , sodass gilt:

$$(M1) \quad \forall x, y \in X : \quad d(x, y) \geq 0$$

$$(M2) \quad \forall x, y \in X : \quad d(x, x) = 0 \quad \text{und} \quad d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$$

$$(M3) \quad \forall x, y \in X : \quad d(x, y) = d(y, x)$$

$$(M4) \quad \forall x, y, z \in X : \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (\text{Dreiecksungleichung})$$

Ein **Metrischer Raum** ist ein Paar  $(X, d)$ ,  $X$  Menge,  $d$  Metrik auf  $X$

**Beispiele:**

- Ist  $(V, \|\cdot\|)$  normierter Vektorraum, so ist durch  $d(v, w) := \|v - w\|$  eine Metrik auf  $V$  gegeben.

$$\begin{aligned} v, w, u \in V \quad d(v, u) &= \|v - u\| = \|v - w + w - u\| \\ &\stackrel{\Delta\text{-Ungl.}}{\leq} \|v - w\| + \|w - u\| \\ &= d(v, w) + d(w, u) \end{aligned}$$

**Unterbeispiel:**

$V = \mathbb{R}$ . Dann ist  $x \mapsto |x|$  eine Norm auf  $\mathbb{R}$  und die induzierte Metrik auf  $\mathbb{R}$  ist  $d(x, y) = \|x - y\|$

- $(X, d_X)$  metrischer Raum  $Y \subseteq X$  Teilmenge. Dann ist  $(Y, d_Y)$  ein metrischer Raum, wobei für  $y_0, y_1 \in Y$  gilt, dass  $d_Y(y_0, y_1) := d_X(y_0, y_1)$   
Vereinbarung: Ist  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  eine Teilmenge, so ist  $X$  immer mit der durch das Standardskalarprodukt induzierte Metrik versehen. (es sei denn, etwas anderes ist gesagt)

#### Konvergenz

Erinnerung (Ana I):  $(x_n)_n$  Folge in  $\mathbb{R}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |x - x_n| < \varepsilon$$

#### I.3.3. Definition

$(X, d)$  metrischer Raum,  $(x_n)_n$  Folge in  $X$  (d.h. eine Abbildung  $x : \mathbb{N} \rightarrow X$ )  $y \in X$ . Dann Konvergiert die Folge  $(x_n)_n$  gegen  $y \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \, d(x_n, y) < \varepsilon$

Äquivalent: Die Folge (in  $\mathbb{R}$ )  $d(x_n, y)$  ist eine Nullfolge.



### I.3.4. Beispiel

$X = \mathbb{R}^n$  mit Metrik, die durch  $l^1$ - $l^2$ - oder  $l^\infty$ - Norm induziert wird. Folge  $k \mapsto x(k) \in \mathbb{R}^n$ .

$$x(k) = \sum_{i=1}^n x_i(k) e_i \quad e_i \text{ Standard-Basisvektor} \quad x_i(k) \in \mathbb{R} \quad x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Dann sind äquivalent

1. für alle  $i = 1, \dots, n$  gilt  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i(k) = x_i$
2.  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_1 = 0$
3.  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_2 = 0$
4.  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_\infty = 0$

**Beweis:**

1  $\rightarrow$  2:

$$\|x(k) - x\|_1 := \sum_{i=1}^n \underbrace{|x_i(k) - x_i|}_{\xrightarrow{(wg\ 1)} 0} \rightarrow 0$$

2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4: Benutze Ungleichungen ( $y \in \mathbb{R}^n$ )

$$\|y\|_\infty \leq \|y\|_2 \leq \|y\|_1 \leq n \cdot \|y\|_\infty$$

also

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_1 &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_2 &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_\infty &= 0 \end{aligned}$$

4  $\rightarrow$  1:

$$\|x(k) - x\|_\infty = \max\{|x_i(k) - x_i| \mid i = 1, \dots, n\} \Rightarrow \text{für alle } i: |x_i(k) - x_i| \leq \|x(k) - x\|_\infty$$

Also

$$\left[ \|x(k) - x\|_\infty \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \right] \quad \Rightarrow \quad [\forall i = 1, \dots, n \quad |x_i(k) - x_i| \rightarrow 0]$$

$\Rightarrow$  1)

□

**Bemerkung:**

$X$  metrischer Raum  $(x_n)_n, (y_n)_n$  Folgen in  $X$   $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$

$$\Rightarrow d(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \quad (\text{Blatt 2, Aufgabe 2})$$

Daraus folgt:

Ist  $(x_n)_n$  Folge in  $X$  und gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  sowie  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x'$  dann ist  $x = x'$

Denn

$$\begin{aligned} d(x, x') &= \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{d(x_n, x_n)}_{=0} = 0 \\ &\stackrel{(M2)}{\Rightarrow} x = x' \end{aligned}$$

□

**1.3.5. Definition**

Sei  $(X, d)$  metrischer Raum und  $(x_n)_n$  Folge in  $X$ . Dann heißt  $(x_n)_n$  **Cauchyfolge**, falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

**Bemerkung:**

$(X, d)$  metrischer Raum  $(x_n)_n$  Folgen in  $X$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X$ .

Dann ist  $(x_n)_n$  Cauchyfolge, denn

Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $n_0$ , sodass

$$\forall n \geq n_0 d(x, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Falls  $n, m \geq n_0$

$$d(x_n, y_n) \leq \underbrace{d(x_n, x)}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{d(x, y_n)}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon$$

**1.3.6. Definition**

$(X, d)$  metrischer Raum. Dann heißt  $X$  **vollständig**, falls jede Cauchy-Folge  $(x_n)_n$  in  $X$  gegen ein  $x \in X$  konvergiert (Ana I)

**Bsp:**

$(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ .  $x_n = \frac{1}{n}$  Folge in  $X$  ist Cauchyfolge.

$(x_n)_n$  konvergiert nicht in  $X$ , denn der einzig möglicher Grenzwert (0) liegt nicht in  $X$ .

**1.3.7. Satz**

$\mathbb{R}^n$ , mit der durch die Norm  $\|\cdot\|_p$   $p = 1, 2, \infty$  induzierten Metrik ist vollständig

**Beweis:**

$p = \infty$ : Sei  $x(k)$   $l^\infty$ -Cauchyfolge in  $\mathbb{R}^n$ . Dann gilt für  $i = 1, \dots, n$ :

$$|x_i(k) - x_i(l)| \leq \|x(k) - x(l)\|_\infty$$

Da  $(x(k))_k$   $l^\infty$ -Cauchyfolge, ist  $(x_i(k))_k$  eine Cauchyfolge in  $\mathbb{R}$  für alle  $1 \leq i \leq n$

Nach dem Cauchy-Kriterium aus Analysis I sind die Folgen  $(x_i(k))_k$  Konvergent.  $x_i = \lim_{k \rightarrow \infty} x_i(k) \in \mathbb{R}$

$$x := \sum_{i=1}^n x_i e_i \in \mathbb{R}^n$$

Dann gilt

$$\|x(k) - x\|_\infty = \max\{\underbrace{|x_i(k) - x_i|}_{\rightarrow 0} \mid i = 1, \dots, n\} \rightarrow 0$$

also

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_\infty = 0$$

$p = 2$ :  $x(k)$   $l^2$ -Cauchyfolge, weil  $\|x(k) - x(l)\|_\infty \leq \|x(k) - x(l)\|_2$

Ist  $(x_k)_k$  eine  $l^\infty$ -Cauchyfolge, so gibt es ein  $x \in \mathbb{R}^n$  mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_\infty = 0$$

$$\Rightarrow \|x(k) - x\|_2 \leq n \cdot \underbrace{\|x(k) - x\|_\infty}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0$$

$p = 1$ : Analog zum Fall  $p = 1$ , benutze  $\|y\|_\infty \leq \|y\|_1 \leq n \cdot \|y\|_\infty$

□

### I.3.8. Definition

Seien  $(X, d_X)$  und  $(Y, d_Y)$  metrische Räume und  $f : X \rightarrow Y$  eine Abbildung sowie  $x \in X$ .

(i)  $f$  heißt  $\varepsilon$ - $\delta$ -**stetig** (oder **stetig**) bei  $x$ , wenn gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x' \in X \text{ mit } d_X(x, x') < \delta \text{ gilt: } d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

(ii)  $f$  heißt **folgenstetig** in  $x : \Leftrightarrow$  Ist  $(x_n)_n$  eine Folge in  $X$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ , so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$$

$f$  ist stetig (folgenstetig) auf  $X$ , wenn  $f$  stetig (folgenstetig) bei  $x$  ist für alle  $x \in X$ .

### I.3.9. Satz

$f$  stetig in  $x \Leftrightarrow f$  folgenstetig in  $x$

**Beweis**

wie in Analysis I, wird bald nachgeliefert

### I.3.10. Satz

$(X, d_X)$ ,  $(Y, d_Y)$ ,  $(Z, d_Z)$  metrische Räume.

$$f : X \rightarrow Y \quad g : Y \rightarrow Z \quad x \in X$$

Falls  $f$  stetig bei  $x$  und stetig bei  $f(x)$  so ist  $g \circ f$  stetig bei  $x$ .

**Beweis:**

Siehe Analysis I

### I.3.11. Beispiele

$$\mu : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \mu(x, y) := xy \quad (\text{Multiplikation})$$

$$\alpha : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \alpha(x, y) := x + y \quad (\text{Addition})$$

$$q : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad q(x, y) := \frac{x}{y} \quad (\text{Division})$$

sind auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig.

**Beweis:**

z. B.  $q$ :  $q$  ist folgenstetig, denn:

Sei  $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$  (d.h.  $y \neq 0$ ) und  $(x_n, y_n)$  Folge in  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$  mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (x, y)$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \neq 0 \\ \Rightarrow q(x_n, y_n) = \frac{x_n}{y_n} \xrightarrow{\text{Grenzwertsätze}} \frac{x}{y} = q(x, y) \\ \Rightarrow q \text{ ist folgenstetig} \end{aligned}$$

$\alpha, \mu$  analog. □

**Bsp:**Sei  $X$  metrischer Raum,  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  stetig $\Rightarrow$  Die Funktion

$$(f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \mapsto (f(x), g(x)) \in \mathbb{R}^2$$

ist stetig.

Denn,  $(x_n)_n$  Folge in  $X$ ,  $x_n \rightarrow x \in X$ 

$$\Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x) \text{ und } g(x_n) \rightarrow g(x) \quad (f, g \text{ stetig})$$

$$\stackrel{\text{Tatsache}}{\Rightarrow} (f, g)(x_n) = (f(x_n), g(x_n)) \rightarrow (f(x), g(x)) \in \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow (f, g) \text{ stetig}$$

Betrachte Kompositionen

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{(f,g)} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\mu} & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (f(x), g(x)) & \mapsto & f(x)g(x) \\ & & \Rightarrow \underbrace{\mu}_{\text{stetig}} \circ \underbrace{(f,g)}_{\text{stetig}} = fg \\ & & & \underbrace{\hspace{1cm}}_{\Rightarrow \text{stetig}} & \end{array}$$

 $\Rightarrow$  Produkte stetiger Funktionen sind wieder stetig**Analog**

Summen Quotienten stetiger Funktionen sind stetig

**I.3.12. Definition** $(X, d_X), (Y, d_Y)$  metrische Räume  $f : X \rightarrow Y$  heißt **Lipschitz-stetig** : $\Leftrightarrow \exists L \geq 0$ , so dass gilt:

$$\forall x, x' \in X : \quad d_Y(f(x), f(x')) \leq L d_X(x, x')$$

**Bem:**ist  $f$  Lipschitz-stetig, so ist  $f$  stetig:sei  $\varepsilon > 0$  Wähle  $\delta$ , so dass  $\delta L \leq \varepsilon$ 

Dann:

$$\text{Ist } d_X(x, x') < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x')) \leq L \cdot d_X(x, x') < \delta L \leq \varepsilon \quad \Rightarrow f \text{ stetig.}$$

**I.3.13. Beispiel**Betrachte  $\mathbb{R}^n$  mit der durch die  $l^p$ -Normen induzierten Metrik  $p \in \{1, 2, \infty\}$ Dann gilt: Sind  $p, q \in \{1, 2, \infty\}$ , so ist

$$\text{id} : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_q)$$

Lipschitz-stetig.

**Grund:** $\forall x \in \mathbb{R}^n$ 

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_\infty$$

**I.3.14. Satz**Jede lineare Abbildung  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  ist Lipschitz-stetig.

**Beweis:**

Aus LA I ist bekannt:

Es gibt genau ein  $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ , so dass  $f(x) = Ax \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n)$

$$\text{M}_{m,n}(\mathbb{R}) = \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$$

**Beh:**

$\exists L = L_A$ , so dass für alle  $x \in \mathbb{R}^n$  gilt

$$\|Ax\|_2 \leq L\|x\|_2$$

Es gilt

$$\|Ax\|_2 \leq \|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^m |(Ax)_i| = \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right|$$

nach Cauchy-Schwarz gilt:

$$\left| \sum_{j=1}^n y_j z_j \right| = |\langle y, z \rangle| \stackrel{\text{CS}}{\leq} \|y\|_2 \cdot \|z\|_2 = \left( \sum_{j=1}^m y_j^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{j=1}^m z_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Also

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \left| \sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \right| \leq \left( \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \underbrace{\left( \sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}}_{\|x\|_2} \\ &\Rightarrow \|Ax\|_2 \leq \sum_{i=1}^m \left( \left( \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|_2 \right) = \sum_{i=1}^m \underbrace{\left( \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}}_{=L} \|x\|_2 \end{aligned}$$

□

**I.3.15. Korollar:**

$A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$

Dann ist

$$\|A\| := \sup_{\|x\|_2 \leq 1} \|Ax\|_2 < \infty$$

**Beweis:**

Ist  $L \geq 0$  mit  $\|Ax\|_2 \leq L \cdot \|x\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

so gilt für  $\|x\| \leq 1$ :  $\|Ax\|_2 \leq L$

$$\Rightarrow \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|_2 \leq L < \infty$$

□

**I.3.16. Definition**

Die Zahl  $\|A\|$  heißt **Operatornorm** von  $A$

Es gilt: Die Operatornorm ist eine Norm auf dem  $\mathbb{R}$ -VR  $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$  (Übung)

Es gibt keine einfache Formel für  $\|A\|$

## I.4. Topologische Grundbegriffe

### I.4.1. Definition

$(X, d)$  sei metrischer Raum,  $\varepsilon > 0$  und  $x \in X$ . Der  $\varepsilon$ -**Ball** in  $X$  um  $x$  ist

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$$

in  $\mathbb{R}$ :

$$B_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$$

### I.4.2. Definition

$(X, D)$  metrischer Raum  $Y \subseteq X, x \in X$

1.  $x$  heißt **innerer Punkt** von  $Y$

$$\exists \delta > 0 \text{ mit } B_\delta(x) \subseteq Y$$

In diesem Fall heißt eine **Umgebung** von  $x$  in  $X$

2.  $x \in X$  heißt **Berührungspunkt** von  $Y$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists y \in Y \text{ mit } d(x, y) < \varepsilon$$

(Äquivalent:  $\forall \varepsilon > 0 \quad B_\varepsilon(x) \cap Y \neq \emptyset$ )

$$\bar{y} = \{x \in X \mid x \text{ innerer Punkt von } Y\}$$

$$\overset{\circ}{y} = \{x \in X \mid x \text{ ist Berührungspunkt von } Y\}$$

### I.4.3. Definition

1.  $(X, d)$  metrischer Raum,  $Y \subseteq X$ . Dann heißt  $Y$  **offen** in  $X \Leftrightarrow$  jedes  $x \in Y$  ist innerer Punkt von  $Y$   
 $(\Leftrightarrow \forall x \in Y \exists \delta > 0 : B_\delta \subseteq Y)$
2.  $Y$  heißt **abgeschlossen** in  $X : \Leftrightarrow$  Das Komplement  $X - Y$  ist offen in  $X$

**Bsp:**

$X = \mathbb{R}$

1. Offene Intervalle  $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$  sind offen in  $\mathbb{R}$ , denn

$$\begin{aligned} x \in (a, b), \delta = \min\{x - a, b - x\} > 0 \\ \Rightarrow (x - \delta, x + \delta) \subseteq (a, b) \end{aligned}$$

2. Abgeschlossene Intervalle  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$  sind abgeschlossen:

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \setminus [a, b] &= (-\infty, a) \cup (b, +\infty) \\ \Rightarrow (x - \delta, x + \delta) &\subseteq \mathbb{R} \setminus [a, b] \\ \Rightarrow x > b &\text{ innerer Punkt von } \mathbb{R} \setminus [a, b] \\ \text{analog } x < a &\text{ ist innerer Punkt von } \mathbb{R} \setminus [a, b] \\ \Rightarrow \mathbb{R} \setminus [a, b] &\text{ offen in } \mathbb{R} \Rightarrow [a, b] \text{ abgeschlossen in } \mathbb{R} \end{aligned}$$

**Warnung:**

Offenheit ist eine Eigenschaft von Teilmengen metrischer Räum, nicht der Mengen selber. 'Y offen' sinnlos!  
! 'Y offen in X' sinnvoll! Analog für Abgeschlossen  
 $X = \mathbb{R}^2$

$$Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$$

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0, 0 < x < 1\}$$

Y offen in Z

Y nicht offen in X

**I.4.4. Beispiel**

X metrischer Raum,  $x \in X, \varepsilon > 0$ . Dann ist  $B_\varepsilon^X(x)$  offen in X

**Beweis:**

zu zeigen: für jedes  $y \in B_\varepsilon(x) \exists \delta > 0 : B_\delta(y) \subseteq B_\varepsilon(x)$

$$d(x, y) < \varepsilon \Rightarrow \exists \delta > 0 : d(x, y) + \delta < \varepsilon$$

Beh:  $B_\delta(y) \subseteq B_\varepsilon(x)$

Das ist wahr, denn

$$z \in B_\delta(y) \Rightarrow d(y, z) < \delta$$

Ferner:

$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < \delta + d(y, x) < \varepsilon, \text{ d.h. } z \in B_\varepsilon(x)$$

**I.4.5. Satz**

Es sei  $(X, d)$  metrischer Raum.

Dann gilt:

1.  $\emptyset$  und X sind offen in X
2. Falls  $U_0, U_1$  offen in X sind, so auch  $U_0 \cap U_1$
3. Falls  $(U_i)_{i \in I}$  eine durch I induzierte Familie von Teilmengen von X ist, so ist  $\bigcup_{i \in I} U_i$  offen in X  
'beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen'
4.  $\emptyset, X$  sind abgeschlossen in X
5.  $A_0, A_1$  abgeschlossen in X, dann ist  $A_0 \cup A_1$  abgeschlossen in X
6.  $(A_i)_{i \in I}, A_i$  abgeschlossen in X, so ist  $\bigcap_{i \in I} A_i$  abgeschlossen in X

**Beweis:**

1.  $\emptyset \subseteq X$  offen trivial  
 $X \subseteq X$  offen trivial

2. Sei  $x \in U_0 \cap U_1$  Dann existieren Bälle

$$B_{\varepsilon_1}^X(x) \subseteq U_1 \quad B_{\varepsilon_0}^X(x) \subseteq U_0$$

Wähle nun  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_0, \varepsilon_1\} > 0$

$$\Rightarrow B_\varepsilon(x) \subseteq U_0 \cap U_1$$

$$\Rightarrow x \text{ innerer Punkt von } U_0 \cap U_1$$

3. Sei  $x \in \bigcup_{i \in I} U_i \subseteq X$

$$\Rightarrow \exists i \in I : x \in U_i, \text{ weil } U_i \subseteq X \text{ offen, gibt es } \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subseteq U_i.$$

Aber

$$U_i \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i, \text{ daher: } B_\varepsilon(x) \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$$

- 4.

$$\emptyset = X \setminus \underbrace{X}_{\text{offen nach 1)}} \Rightarrow \emptyset \text{ abgeschlossen in } X$$

$$X = X \setminus \underbrace{\emptyset}_{\text{offen}} \Rightarrow X \subseteq X \text{ abgeschlossen}$$

- 5.

$$X \setminus (A_0 \cup A_1) = \underbrace{(X \setminus A_0)}_{\text{offen in } X} \cap \underbrace{(X \setminus A_1)}_{\text{offen in } X}$$

$$\Rightarrow A_0 \cup A_1 \subseteq X \text{ abgeschlossen}$$

- 6.

$$X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} \underbrace{X \setminus A_i}_{\text{offen in } X}$$

$$\Rightarrow \bigcap_{i \in I} A_i \text{ abgeschlossen in } X$$

**Bemerkung:**

Beliebige Durchschnitte offener Mengen sind i.A. nicht offen

**Beispiel:**

$$U_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \text{ ist offen in } \mathbb{R}$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \{0\} \text{ ist nicht offen in } \mathbb{R}$$



#### I.4.6. Satz

$X$  metrischer Raum,  $Y \subseteq X$ . Dann sind Äquivalent:

1.  $Y \subseteq X$  abgeschlossen in  $X$
2. Für jede Folge  $(y_n)$  mit  $y_n \subseteq Y$ , welche in  $X$  konvergiert, gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \in Y$$

**Beweis:**

**Vorbemerkung:**

$y \in X$  ist genau dann ein Berührungspunkt von  $Y \subseteq X$ , wenn es eine Folge  $(y_n)_n$  gibt mit  $(y_n) \in Y$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$

**Beweis der Vorbemerkung:**

" $\Leftarrow$ ": Ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \quad y_n \in Y$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n : d(y, y_n) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 y_n \in B_\varepsilon(y) \cap Y \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow y \text{ ist Berührungspunkt von } Y$$

" $\Rightarrow$ ":

$y$  Berührungspunkt von  $Y$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists y' \in Y : d(y, y') < \varepsilon$$

Wähle für  $n \in \mathbb{N}$  ein  $y_n \in Y$  mit  $d(y, y_n) < \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{y_n}_{\in Y} = y$$

□

**Beweis des Satzes:**

Sei 1) nicht erfüllt. Dann:

$$\Leftrightarrow Y \subseteq X \text{ nicht abgeschlossen in } X$$

$$\Leftrightarrow X \setminus Y \text{ nicht offen in } X$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in X \setminus Y, y \text{ kein innerer Punkt von } X \setminus Y$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in X \setminus Y, \forall \varepsilon > 0 \quad B_\varepsilon(y) \not\subseteq X \setminus Y$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in X \setminus Y, \forall \varepsilon > 0 \quad B_\varepsilon(y) \cap Y \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in X \setminus Y, y \text{ ist Berührungspunkt von } Y$$

$$\stackrel{\text{Vorbem.}}{\Leftrightarrow} \exists \text{ Folge } y_n \text{ in } Y, y_n \rightarrow y \notin Y$$

und dazu ist Äquivalent, dass 2) nicht erfüllt ist.

□

#### I.4.7. Satz

$(X, d_X), (Y, d_Y)$  metrischer Räume,  $f : X \rightarrow Y$  Abbildung. Dann sind Äquivalent:

1.  $f$  ist folgenstetig.
2. Für jede abgeschlossene Teilmenge  $A \subseteq Y$  ist  $f^{-1}(A) \subseteq X$  abgeschlossen.
3. Für jede offene Teilmenge  $U \subseteq Y$  ist  $f^{-1}(U)$  offen in  $X$
4.  $f$  ist  $\varepsilon$ - $\delta$ -stetig

**Beweis:**1  $\Rightarrow$  2: Sei  $f$  folgenstetig,  $A \subseteq Y$  abgeschlossen.zu zeigen: (wegen I.4.7) ist  $x_n \in f^{-1}(A)$  und  $x_n \rightarrow x$ , so gilt  $x \in f^{-1}(A)$ 

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow \underbrace{f(x_n)}_{\in A} \rightarrow \underbrace{f(x)}_{\in A} \quad (f \text{ ist folgenstetig})$$

$$A \subseteq Y \text{ abgeschlossen} \Rightarrow f(x) \in A$$

$$\Rightarrow x \in f^{-1}(A)$$

2  $\Rightarrow$  3:

$$U \subseteq Y \text{ offen} \Rightarrow Y \setminus U \subseteq Y \text{ abgeschlossen}$$

$$\stackrel{2)}{\Rightarrow} f^{-1}(Y \setminus U) \subseteq X \text{ abgeschlossen.}$$

$$f^{-1}(Y \setminus U) = X \setminus f^{-1}(U) \Rightarrow f^{-1}(U) \subseteq X \text{ offen}$$

3  $\Rightarrow$  4: Sei  $x \in X$ ,  $\varepsilon > 0$ 

$$\Rightarrow B_\varepsilon^Y(f(x)) \subseteq Y \text{ offen in } Y$$

$$\stackrel{3)}{\Rightarrow} f^{-1}(B_\varepsilon^Y(f(x))) \subseteq X \text{ offen}$$

$$\stackrel{\text{def. offen}}{\Rightarrow} \exists \delta > 0 \ B_\delta^X(x) \subseteq f^{-1}(B_\varepsilon^Y(f(x)))$$

Das heißt: ist  $x' \in X$  mit  $d(x, x') < \delta$ 

$$\Rightarrow d(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

4  $\Rightarrow$  1: Sei  $f$   $\varepsilon$ - $\delta$ -stetig und  $(x_n)_n$  Folge in  $x$ .  $x_n \rightarrow x \in X$ . Dann gilt  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ , denn:Sei  $\varepsilon > 0$ 

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 : x' \in X \ d(x, x') < \delta$$

$$\Rightarrow d(f(x), f(x')) < \varepsilon \Rightarrow \text{weil } x_n \rightarrow x : \exists n_0 : \forall n \geq n_0 : d(x, x_n) < \delta$$

$$\Rightarrow \exists n_0 : \forall n \geq n_0 : d(f(x), f(x_n)) < \varepsilon \text{ d.h. } f(x_n) \rightarrow f(x)$$

**I.4.8. Beispiel** $(V, \|\cdot\|)$  normierter Vektorraum

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig, denn } \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

Also sind die Mengen (für  $x \in V$ ,  $r \geq 0$ )

$$\{y \in V \mid \|x - y\| \leq r\} \subseteq V \text{ und } \{y \in V \mid \|x - y\| = r\} \subseteq V$$

abgeschlossen.

**I.5. Kompaktheit****Erinnerung: Satz von Bolzano-Weierstraß**'Jede beschränkte Folge in  $\mathbb{R}$  besitzt eine konvergente Teilfolge'

- $\rightarrow$  Cauchy-Konvergenzkriterium

- → Satz vom Minimum und Maximum (Wenn  $f : A \rightarrow B$  stetig, dann gilt:  $f$  nimmt Minimum und Maximum an)
- → Mittelwertsatz der Differentialrechnung
- → Satz:  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig  $\Rightarrow f$  ist gleichmäßig stetig.  
 $\Rightarrow$  stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar

### I.5.1. Satz von Bolzano-Weierstraß im $\mathbb{R}^n$

Jede beschränkte Folge in  $\mathbb{R}^n$  besitzt eine konvergente Teilfolge.

**Beweis:**

Sei  $(x(k))_k$  Folge in  $\mathbb{R}^n$ ,  $\|x(k)\|_2 \leq C \quad \forall k$ .

$x_i(k) \quad i = 1, \dots, n$  Komponenten

$$\Rightarrow \underbrace{|x_i(k)|}_{\text{Folge in } \mathbb{R}} \leq \|x(k)\|^2 \leq C$$

Nach Bolzano-Weierstraß gibt es eine Teilfolge  $(x(k_l))_l$  von  $x(k)$ , so dass  $x_1(k_l)$  (in  $\mathbb{R}$ ) Konvergiert. Nenne

$$x(1, l) = x(k_l)$$

1. Komponente	2. Komponente	$n$ -te Komponente
$x(k_1) = x(1, 1)$	$x(2, 1)$	$x(n, 1)$
$x(k_2) = x(1, 2)$	$x(2, 2)$	$x(n, 2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Teilfolge $(x(1, k))_k$	$(x_1(1, k))_k$	Konvergiert
Teilfolge $(x(2, k))_k$	$(x_2(2, k))_k$	Konvergiert
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Teilfolge $(x(n, k))_k$	$(x_n(n, k))_k$	Konvergiert

$\Rightarrow$  Alle Komponentenfolgen von  $(x(n, k))_k$  konvergieren

$\Rightarrow (x(n, k))_k$  ist Konvergent

□

### I.5.2. Definition

Ein metrischer Raum  $X$  heißt **folgenkompakt**, falls für jede Folge  $(x_n)_n$  in  $X$  eine konvergente Teilfolge hat.

Eine Teilmenge  $Y \subseteq X$  eines metrischen Raumes heißt folgenkompakt, falls jede Folge in  $(y_n)_n$  in  $Y$  eine (in  $Y$ !) konvergente Teilfolge besitzt.

( $\Leftrightarrow Y$  mit der von  $X$  eingeschränkten Metrik, ist folgenkompakt)

### I.5.3. Beispiel:

1.  $[a, b]$  folgenkompakt

2.  $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq C\}$  ist folgenkompakt:  $(x_k)_k$  Folge in  $X$

$$\stackrel{I.5.1}{\Rightarrow} \exists \text{ TF } x_k \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$$

aber  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  ist abgeschlossen, also  $x \in X$

3.  $(0, 1), (0, 1]$  nicht folgenkompakt (betrachte Folge  $(\frac{1}{n})_n$ )  
 4.  $\mathbb{R}$  nicht folgenkompakt (Die Folge  $(n)_n$  hat keine Konvergente TF)  
 5.  $\mathbb{Q} \cap [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$  nicht folgenkompakt.

Ist  $x \in [0, 1]$ , so gibt es eine Folge  $x_n \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$  mit  $x_n \rightarrow x$

Dann hat  $x_n$  keine in  $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$  konvergente Teilfolge (falls  $x$  irrational)

#### I.5.4. Satz

$X$  metrischer Raum

1. Ist  $X$  folgenkompakt, so ist  $X$  vollständig
2.  $X$  folgenkompakt,  $Y \subseteq X$  abgeschlossen  $\Rightarrow Y$  folgenkompakt
3.  $Y \subseteq X$ ,  $Y$  folgenkompakt  $\Rightarrow Y \subseteq X$  abgeschlossen

**Beweis:**

1. Sei  $(x_n)_n$  Cauchyfolge in  $X$

$X$  folgenkompakt  $\Rightarrow$  es gibt konvergente Teilfolge  $x_{n_k} \rightarrow x \in X$

**Beh.**

$$x_n \rightarrow x$$

Denn

$$d(x, x_n) \leq d(x, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_n)$$

Sei  $\varepsilon > 0$  Wähle  $n_0 \quad \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}$

Wähle  $k : n_k \geq n_0$

$$\text{für } n \geq n_k \quad d(x, x_n) \leq \underbrace{d(x, x_{n_k})}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{d(x_{n_k}, x)}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon$$

2. Sei  $(y_n)_n$  Folge in  $Y \subseteq X$

$X$  folgenkompakt  $\Rightarrow \exists$  TF  $y_{n_k}$ , welche gegen ein  $x \in X$  konvergiert

Weil  $Y \subseteq X$  abgeschlossen, gilt

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} \in Y \quad \Rightarrow \quad (y_{n_k})_k \text{ ist in } Y \text{ konvergent}$$

$\Rightarrow Y$  folgenkompakt

3. zu zeigen: Ist  $(y_n)_k$  Folge in  $Y$ .  $y_n \rightarrow x \in X \Rightarrow x \in Y$   
 $(y_n)$  ist Cauchyfolge.  
 Nach 1) ist  $Y$  vollständig, dh  $\exists z \in Y : y_n \rightarrow z$

$$\Rightarrow x = z, \text{ daher } x \in Y$$

### 1.5.5. Satz von Heine-Borel

Eine Teilmenge  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  ist folgenkompakt  $\Leftrightarrow X$  ist beschränkt und abgeschlossen in  $\mathbb{R}^n$

**Beweis:**

' $\Rightarrow$ ': Sei  $X$  folgenkompakt. Dann folgt aus 1.5.4 3):  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  abgeschlossen

Wäre  $X$  nicht beschränkt, dann gäbe es zu jedem  $n \in \mathbb{N}$  ein  $x_n \in X$  mit  $\|x\|_2 \geq n$

Die Folge  $(x_n)$  kann dann keine konvergente Teilfolge enthalten, also kann  $X$  nicht folgenkompakt sein!

' $\Leftarrow$ ': Sei  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  beschränkt und abgeschlossen

Sei  $(x_n)_n$  Folge in  $X$ .

Die Folge  $(x_n)_n$  ist beschränkt.

$$\stackrel{I.5.1}{\Rightarrow} \text{es gibt konvergente Teilfolge } x_{n_k} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$$

Weil  $X$  abgeschlossen in  $\mathbb{R}^n$ , ist  $x \in X$

$$\Rightarrow X \text{ folgenkompakt}$$

□

**Beispiele:**

▪  $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\} \subseteq \mathbb{R}^n$       abgeschlossene Einheitskugel

▪  $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^n$       Einheitssphäre

$\Rightarrow D^n, S^{n-1}$  folgenkompakt, denn  $D^n, S^{n-1}$  beschränkt und:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} & f(x) &= \|x\|_2 & f &\text{ stetig} \\ D^n &= f^{-1}(\underbrace{[0, 1]}_{\text{abg. in } \mathbb{R}}) & S^{n-1} &= f^{-1}(\underbrace{\{1\}}_{\text{abg. in } \mathbb{R}}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow D^n, S^{n-1}$  abgeschlossen

### 1.5.6. Satz

$X, Y$  metrische Räume,  $f: X \rightarrow Y$  stetig. Sei  $X$  folgenkompakt

$$\Rightarrow f(X) \subseteq Y \text{ ist folgenkompakt}$$

**Beweis:**

Sei  $y_n$  Folge in  $f(X)$

$$\forall n \exists x_n \in X \text{ mit } f(x_n) = y_n$$

$(x_n)_n$  Folge in  $X$

$$X \text{ folgenkompakt} \Rightarrow \exists \text{ konvergente Teilfolge } x_{n_k} \rightarrow x \in X$$

$$f \text{ stetig} \Rightarrow y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) \in f(X)$$

Damit folgt die Behauptung

□

### 1.5.7. Satz vom Minimum und Maximum

$X$  folgenkompakt,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  stetig.

Dann existieren  $x_{\min}, x_{\max} \in X$ , so dass für alle  $x \in X$  gilt:

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq x_{\max}$$

**Beweis:**

$f(X) \subseteq \mathbb{R}$  ist folgenkompakt (Satz I.5.6)

Nach I.5.5 ist  $f(X) \subseteq \mathbb{R}$  abgeschlossen und beschränkt.

Seien  $c, C \in \mathbb{R}$  definiert durch

$$\begin{aligned} c &:= \inf f(x) \\ C &:= \sup f(x) \end{aligned}$$

Dann sind nach Ana I  $c, C$  Berührungspunkte um  $f(x)$

$$f(x) \text{ abgeschlossen} \Rightarrow c, C \in f(x)$$

Wähle nun  $x_{\min}, x_{\max} \in X$  mit

$$f(x_{\min}) = c, f(x_{\max}) = C$$

□