

# Skript Einführung in die Funktionalanalysis


Mitschrift der Vorlesung „Einführung in die Funktionalanalysis“ von  
Prof. Dr. Wilhelm Winter


Jannes Bantje

9. Februar 2015

Aktuelle Version verfügbar bei:




 **GitHub** (inklusive Sourcecode)  
<https://github.com/JaMeZ-B/latex-wwu>



 **Bittorrent Sync**  
B6WH2DISQ5QVYIRYIEZSF4ZR2IDVKPN3I




 **sciebo** die Campuscloud  
LaTeX-Freigabe

## Vorwort — Mitarbeit am Skript

Dieses Dokument ist eine Mitschrift aus der Vorlesung „Einführung in die Funktionalanalysis, WiSe 2014“, gelesen von Prof. Dr. Wilhelm Winter. Der Inhalt entspricht weitestgehend dem Tafelanschrieb. Für die Korrektheit des Inhalts übernehme ich keinerlei Garantie! Für Bemerkungen und Korrekturen – und seien es nur Rechtschreibfehler – bin ich sehr dankbar. Korrekturen lassen sich prinzipiell auf drei Wegen einreichen:

- Persönliches Ansprechen in der Uni, Mails an ✉ [j.bantje@wwu.de](mailto:j.bantje@wwu.de) (gerne auch mit annotieren PDFs)
- *Direktes* Mitarbeiten am Skript: Den Quellcode poste ich auf GitHub (siehe oben), also stehen vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Verfügung: Zum Beispiel durch Kommentare am Code über die Website und die Kombination Fork + Pull Request. Wer sich verdient macht oder ein Skript zu einer Vorlesung, die ich nicht besuche, beisteuern will, dem gewähre ich gerne auch Schreibzugriff.


Beachten sollte man dabei, dass dazu ein Account bei [github.com](https://github.com)  notwendig ist, der allerdings ohne Angabe von persönlichen Daten angelegt werden kann. Wer bei GitHub (bzw. dem zugrunde liegenden Open-Source-Programm „git“) – verständlicherweise – Hilfe beim Einstieg braucht, dem helfe ich gerne weiter. Es gibt aber auch zahlreiche empfehlenswerte Tutorials im Internet.<sup>1</sup>

- *Indirektes* Mitarbeiten:  $\text{\TeX}$ -Dateien per Mail verschicken.

Dies ist nur dann sinnvoll, wenn man einen ganzen Abschnitt ändern möchte (zB. einen alternativen Beweis geben), da ich die Änderungen dann per Hand einbauen muss! Ich freue mich aber auch über solche Beiträge!

## Vorlesungshomepage




<https://wwwmath.uni-muenster.de/u/wilhelm.winter/wwinter/funktionalanalysis.html> 

## Anmerkung

Innerhalb dieser Mitschrift wird man öfter den Ausdruck „Warum?“ finden. Dies sind vom Dozenten bewusst weggelassene Details, die zu verstärktem Mitdenken beim Lesen animieren sollen. Oftmals sind dies schon aus vorherigen Semestern bekannte Sachverhalte. Nur an wenigen Stellen habe ich die fehlenden Details hinzugefügt.

---

<sup>1</sup>zB. <https://try.github.io/levels/1/challenges/1> , ist auf Englisch, aber dafür interaktives LearningByDoing

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Metrische Räume und der Satz von Baire</b>	<b>1</b>
1.1. Definition: Metrischer Raum	1
1.2. Definition: Offen, abgeschlossen und Abschluss	1
1.3. Definition: Stetigkeit, gleichmäßige Stetigkeit, Isometrie	1
1.4. Definition: Cauchy-Folge und Vollständigkeit	1
1.5. Satz: Existenz einer eindeutigen Vervollständigung metrischer Räume	2
1.6. Definition: Raum der beschränkten, stetigen Abbildungen	3
1.7. Bemerkung: $d_{W,X}$ als Metrik auf $C(W, X)$	4
1.8. Proposition: $X$ vollständig $\Rightarrow C_b(W, X)$ und $C(W, X)$ vollständig	4
1.9. Proposition über eine Folge von Bällen	4
1.10. Satz von Baire	5
1.11. Bemerkungen zum Satz von Baire	6
1.12. Corollar: Satz der gleichmäßigen Beschränktheit	6
<b>2. Normierte Räume, Hahn-Banach Sätze</b>	<b>7</b>
2.1. Definition: Topologischer Vektorraum	7
2.2. Proposition: Unterräume topologischer Vektorräume sind topologische Vektorräume	7
2.3. Proposition: Normierte Vektorräume sind topologische Vektorräume	7
2.4. Proposition: Stetigkeit einer linearen Abbildung zwischen topologischen Vektorräumen	7
2.5. Definition: Stetige Funktionale und Operatoren	8
2.6. Bemerkung: Vektorraumstruktur auf $\mathcal{L}(X, Y)$ , Algebrastruktur auf $\mathcal{L}(X, X)$	8
2.7. Proposition: Stetigkeit linearer Abbildungen mittels Normabschätzung	8
2.8. Definition: Operatornorm	8
2.9. Proposition: $\mathcal{L}(X, Y)$ ist ein normierter Raum mit der Operatornorm	9
2.10. Definition: Normierte $\mathbb{K}$ -Algebra	9
2.11. Beispiele für normierte Algebren	9
2.12. Proposition: Norm auf dem Produkt normierter Räume	9
2.13. Proposition und Definition: Norm auf dem Quotientenraum	10
2.14. Definition: Banachraum und Banachalgebra	10
2.15. Beispiel für eine Banachalgebra	10
2.16. Proposition: Produkte und Quotienten von Banachräumen	11
2.17. Definition: Sublineare Abbildung	11
2.18. Beispiele für sublineare Abbildungen	11
2.19. Proposition: Die sublinearen Abbildungen $\mathcal{S}(X)$ sind nach unten induktiv geordnet	11
2.20. Proposition: Minimale Elemente in $\mathcal{S}(X)$ sind genau die lineare Abbildungen	12
2.21. Satz von Hahn-Banach	13
2.22. Satz (Hahn-Banach): Existenz einer linearen Fortsetzung (mit sublinearer Schranke)	13
2.23. Satz (Hahn-Banach): Existenz einer linearen Fortsetzung (mit Halbnorm)	13
2.24. Satz (Hahn-Banach): Existenz einer stetigen linearen Fortsetzung	13
2.25. Definition: Konvexe Teilmenge eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums, konvexe Hülle	14
2.26. Satz (Hahn-Banach): Existenz einer linearen Fortsetzung (mit konvexer Teilmenge)	14
2.27. Satz (Hahn-Banach): Existenz einer linearen Fortsetzung (zwei konvexe Teilmengen)	15
<b>3. Operatoren zwischen Banachräumen, Satz von der offenen Abbildung</b>	<b>16</b>
3.1. Proposition: $Y$ vollständig $\Rightarrow \mathcal{L}(X, Y)$ ist vollständig	16
3.2. Corollar: Dualraum vollständig und $\mathcal{L}(X, X)$ ist Banachalgebra, falls $X$ Banachraum	16
3.3. Definition und Proposition: Lineare Isometrie $\iota_X: X \rightarrow X^{**}$ (kanonische Inklusion)	17
3.4. Definition und Proposition: Die transponierte Abbildung	17
3.5. Satz: Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit für Banachräume	18

3.6.	Corollar über Beschränktheit einer Teilmenge eines normierten Raumes . . . . .	18
3.7.	Corollar über Beschränktheit einer Teilmenge von $\mathcal{L}(X, Z)$ . . . . .	19
3.8.	Satz: Prinzip der offenen Abbildung . . . . .	19
3.9.	Corollar: Satz von der inversen Abbildung . . . . .	20
3.10.	Corollar: Gleichheit von Topologien von Banachräumen, wenn $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ . . . . .	20
3.11.	Corollar: Wenn $X = X_1 \oplus X_2$ , so ist $X$ isomorph zu $X_1 \times X_2$ . . . . .	20
<b>4.</b>	<b><math>L^p</math>-Räume und der Satz von Riesz-Fischer</b>	<b>21</b>
4.1.	Erinnerung: $L^1(\mu)$ ist ein Banachraum . . . . .	21
4.2.	Beispiele für $L^1$ -Räume mit Lebesgue-Maß und Zählmaß . . . . .	21
4.3.	Definition und Proposition: Der Raum $L^p(\mu)$ . . . . .	21
4.4.	Proposition: Spezialfall der Youngschen Ungleichung . . . . .	22
4.5.	Satz: Höldersche Ungleichung . . . . .	22
4.6.	Satz: Minkowskische Ungleichung . . . . .	23
4.7.	Corollar: $L^p(\mu)$ ist ein normierter Vektorraum für $1 \leq p < \infty$ . . . . .	23
4.8.	Definition und Proposition: Der normierte Raum $L^\infty(\mu)$ und . . . . .	23
4.9.	Beispiele für $L^p$ -Räume . . . . .	24
4.10.	Proposition: Lineare Isometrie $\iota_p: L^p(\mu) \rightarrow L^q(\mu)^*$ . . . . .	24
4.11.	Satz von Riesz-Fischer . . . . .	24
<b>5.</b>	<b>Schwache Topologien, Reflexivität</b>	<b>26</b>
5.1.	Definition: Schwache Topologie . . . . .	26
5.2.	Bemerkungen zu schwachen Topologie . . . . .	26
5.3.	Proposition: Die schwache Topologie ist Hausdorffsch . . . . .	26
5.4.	Proposition: Äquivalenz zu schwacher Konvergenz . . . . .	26
5.5.	Corollar: Schwach konvergente Netze sind beschränkt . . . . .	27
5.6.	Beispiel: Konvergenz impliziert schwache Konvergenz, aber nicht umgekehrt . . . . .	27
5.7.	Proposition: Elemente aus $\mathcal{L}(X, Y)$ sind auch stetig bezüglich schwachen Topologie . . . . .	27
5.8.	Definition: Die $w^*$ -Topologie auf $X^*$ . . . . .	27
5.9.	Bemerkungen zur $w^*$ -Topologie auf $X^*$ . . . . .	28
5.10.	Satz (Banach-Alaoglu) . . . . .	28
5.11.	Erinnerung: separabel, 1. abzählbar, 2. abzählbar . . . . .	29
5.12.	Satz: Metrisierbarkeit von $\overline{B_{X^*}}(0, 1)$ bezüglich der $w^*$ -Topologie . . . . .	29
5.13.	Definition: Reflexiver normierter Raum . . . . .	30
5.14.	Proposition: Abgeschlossene Unterräume von reflexiven Banachräumen sind reflexiv . . . . .	30
5.15.	Proposition: Für Banachräume gilt: $X$ reflexiv $\iff X^*$ reflexiv . . . . .	31
5.16.	Satz: Einheitskugel eines Banachraumes $X$ liegt $w^*$ -dicht in Einheitskugel von $X^{**}$ . . . . .	31
5.17.	Corollar: $f \in \overline{B_{X^{**}}}(0, 1)$ lässt sich auf endlich vielen $\varphi_i$ als Einsetzung auffassen . . . . .	32
5.18.	Satz: Äquivalenzen zu: $X$ ist reflexiv . . . . .	33
5.19.	Bemerkung: $X$ separabel, wenn $X^*$ separabel, Reflexivität von Banachräumen . . . . .	33
<b>6.</b>	<b>Gleichmäßig konvexe Räume, noch einmal <math>L^p</math></b>	<b>34</b>
6.1.	Definition und Proposition: Gleichmäßig konvexer Raum . . . . .	34
6.2.	Beispiel für gleichmäßig konvexe Räume . . . . .	34
6.3.	Definition und Proposition: Gleichmäßig konvexe Räume sind strikt konvex . . . . .	35
6.4.	Proposition über strikt konvexe Teilmenge $W$ , $a \in X$ und $\inf_{y \in W} \ a - y\ $ . . . . .	35
6.5.	Bemerkung über Folge mit $\limsup_n \ x_n\  \leq 1$ in einem gleichmäßig konvexen Raum . . . . .	36
6.6.	Proposition: Jensensche Ungleichung . . . . .	36
6.7.	Proposition: Zwei Abschätzungen für die $p$ -Norm in $L^p(\mu)$ . . . . .	36
6.8.	Satz: Für $1 < p < \infty$ ist $L^p(\mu)$ gleichmäßig konvex . . . . .	37
6.9.	Satz: Gleichmäßig konvexe Banachräume sind reflexiv . . . . .	37
6.10.	Corollar: $L^p(\mu)$ ist für $1 < p < \infty$ reflexiv. . . . .	38

6.11. Satz: Isometrischer Isomorphismus $\iota_p: L^p(\mu) \rightarrow L^q(\mu)^*$ . . . . .	38
6.12. Bemerkung zur Gültigkeit von Satz 6.11 für $p \in \{1, \infty\}$ . . . . .	38
<b>7. Hilberträume und selbstadjungierte Operatoren</b> . . . . .	<b>39</b>
7.1. Definition: Hermitesche Form, Skalarprodukt . . . . .	39
7.2. Bemerkung: Einfache Eigenschaften von hermiteschen Formen . . . . .	39
7.3. Beispiele für hermitesche Formen . . . . .	39
7.4. Proposition (Cauchy-Schwarz-Ungleichung) . . . . .	39
7.5. Proposition: Ein Skalarprodukt definiert eine Norm . . . . .	40
7.6. Bemerkungen über Cauchy-Schwarz und die Stetigkeit von $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . . . . .	40
7.7. Proposition: Zusammenhang Norm $\leftrightarrow$ Skalarprodukt mit dem Parallelogrammgesetz . . . . .	40
7.8. Bemerkung: Polarisierungsidentität . . . . .	41
7.9. Definition: Prä-Hilbertraum und Hilbertraum . . . . .	41
7.10. Proposition: Die Vervollständigung eines Prä-Hilbertraumes ist ein Hilbertraum . . . . .	42
7.11. Proposition: Isometrischer Isomorphismus $\kappa: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^*$ . . . . .	42
7.12. Corollar: Hilberträume sind reflexiv . . . . .	43
7.13. Definition: Orthogonal, Orthonormalsystem und Hilbertraumbasis . . . . .	43
7.14. Bemerkung: Satz von Pythagoras, Vergleich Hilbertraumbasis mit Vektorbasis . . . . .	43
7.15. Proposition: Für einen abgeschlossenen Unterraum $\mathcal{H}_0$ gilt $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_0^\perp$ . . . . .	44
7.16. Definition: Summierbare Familie (in einem Hilbertraum) . . . . .	44
7.17. Proposition: Charakterisierungen von Summierbarkeit . . . . .	44
7.18. Proposition: Linearität von unendlichen Summen und Verträglichkeit Skalarprodukt . . . . .	45
7.19. Proposition: Kriterium für die Summierbarkeit orthogonaler Vektoren . . . . .	45
7.20. Proposition: Besselsche Ungleichung und Parsevalsche Gleichung . . . . .	46
7.21. Definition und Proposition: Summe von Hilberträumen . . . . .	46
7.22. Satz über Äquivalenzen zu: $\{x_i\}_{i \in I}$ ist eine Hilbertraumbasis . . . . .	46
7.23. Bemerkungen zu Hilbertraumbasen und Mächtigkeit deren Mächtigkeit . . . . .	47
7.24. Beispiele für Basen von Hilberträumen . . . . .	47
7.25. Definition und Proposition: Der zu $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ adjungierte Operator $T^*$ . . . . .	47
7.26. Proposition: Darstellung der Operatornorm durch $\inf$ und $\sup$ für Hilberträume . . . . .	48
7.27. Proposition: Abschätzung von $ \langle y, Tx \rangle + \langle Ty, x \rangle $ . . . . .	48
7.28. Definition: Selbstadjungierter Operator . . . . .	49
7.29. Bemerkung: Operatornorm von selbstadjungierten Operatoren als ein Infimum . . . . .	49
7.30. Proposition: Charakterisierung von selbstadjungiert im komplexen Fall . . . . .	49
7.31. Definition und Proposition: Partielle Ordnung auf den selbstadjungierten Operatoren . . . . .	50
7.32. Satz: Konvergenz monoton wachsendes, beschränktes Netz selbstadjungierter Operatoren . . . . .	50
<b>8. Kompakte Operatoren und ein Spektralsatz</b> . . . . .	<b>51</b>
8.1. Definition: Spektrum eines Banachraumes . . . . .	51
8.2. Bemerkung zum Zusammenhang von Spektralwerten und Eigenwerten . . . . .	51
8.3. Proposition: Bijektivität von Operatoren in einer Umgebung eines bijektiven Operators . . . . .	51
8.4. Corollar: Die Resolventenmenge von $T \in \mathcal{L}(X)$ ist offen in $\mathbb{K}$ . . . . .	51
8.5. Satz: Die Resolventenabbildung ist lokal durch eine Potenzreihe gegeben . . . . .	51
8.6. Satz: Für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ist $\sigma(T)$ nichtleer, kompakt und $\sigma(T) \subset \{z \in \mathbb{C} \mid  z  \leq \ T\ \}$ . . . . .	52
8.7. Definition und Proposition: Kompakte Operatoren . . . . .	52
8.8. Bemerkung zu kompakten Operatoren . . . . .	52
8.9. Proposition: Die Menge der kompakten Operatoren ist ein abgeschlossenes Ideal in $\mathcal{L}(X)$ . . . . .	53
8.10. Satz: Diagonalisierbarkeit selbstadjungierter, kompakter Operatoren . . . . .	53
8.11. Corollar: Approximierbarkeit kompakter Operatoren und $\mathcal{K}(\mathcal{H})$ ist selbstadjungiert . . . . .	54

<b>9. Fredholm-Operatoren. Ein Index</b>	<b>55</b>
9.1. Definition: Fredholm-Operator und Fredholm-Index . . . . .	55
9.2. Satz (Fredholm-Riesz) . . . . .	55
9.3. Satz . . . . .	55
9.4. Corollar . . . . .	56
9.5. Beispiele . . . . .	57
<b>10. Ausblick</b>	<b>58</b>
10.1. Frage . . . . .	58
10.2. Beispiel . . . . .	58
<b>A. Anhang</b>	<b>59</b>
A.1. Vierecksungleichung . . . . .	59
A.2. Abschluss einer konvexen Menge ist konvex . . . . .	59
A.3. Beweis von Aufgabe 2 von Blatt 7 . . . . .	59
A.4. Beweis der Aussagen aus 7.31 . . . . .	60
A.5. Ausführlicher Beweis zu 8.3 mit Neumann-Reihen (Aufgabe 2 von Blatt 5) . . . . .	60
<b>Index</b>	<b>A</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>C</b>
<b>Todo list</b>	<b>C</b>

# 1. Metrische Räume und der Satz von Baire

## 1.1. Definition

Ein **metrischer Raum** ist ein Paar  $(X, d)$ , wobei  $X$  eine Menge und  $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$  ist, sodass

- 1)  $d(x, y) = 0 \iff x = y \quad \forall x, y \in X$
- 2)  $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in X$
- 3)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \forall x, y, z \in X$

## 1.2. Definition

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum

- Eine Teilmenge  $U \subseteq X$  heißt **offen**, falls für jedes  $x \in U$  ein  $\varepsilon > 0$  existiert, so dass

$$B(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\} \subset U$$

- Eine Teilmenge  $A \subset X$  heißt **abgeschlossen**, falls  $X \setminus A$  offen ist (als Teilmenge von  $X$ ).
- $\mathcal{T}_X := \{U \subset X \mid U \text{ offen im obigen Sinne}\}$  ist die von der Metrik induzierte Topologie auf  $X$ .
- Falls  $W \subset X$  eine Teilmenge ist, dann bezeichnet  $\overline{W}$  den **Abschluss** von  $W$ , d.h. die kleinste abgeschlossene Teilmenge von  $X$ , die  $W$  enthält. Es gilt

$$\overline{W} = \bigcap_{A \subset X \text{ abg., } W \subset A} A$$

Für metrische Räume ist dies äquivalent zu

$$\overline{W} = \left\{ x \in X \mid \exists (x_n)_n \subset W : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \right\} \quad (\text{warum?})$$

## 1.3. Definition

Eine Abbildung  $f: X \rightarrow Y$  zwischen zwei metrischen Räumen  $(X, d_X)$  und  $(Y, d_Y)$  heißt

- **stetig in**  $x \in X$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x' \in X : d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$
- **stetig**, falls  $f$  in jedem Punkt  $x \in X$  stetig ist.  
(Äquivalent: Für jede offene Menge  $V$  in  $Y$  ist  $f^{-1}(V)$  offen in  $X$ )
- **gleichmäßig stetig**, falls  $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X : d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$ .
- $f$  heißt **Isometrie**, falls  $\forall x, x' \in X : d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$ .
- $f$  heißt **isometrischer Isomorphismus**, falls  $f$  bijektiv und isometrisch ist.

automatisch injektiv  
und stetig  
 $f^{-1}$  auch

## 1.4. Definition

Eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  in einem metrischen Raum  $(X, d)$  heißt **Cauchy-Folge**, falls

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, k > N : d(x_n, x_k) < \varepsilon.$$

$(X, d)$  heißt **vollständig**, falls jede Cauchy-Folge in  $X$  konvergiert.

## 1.5. Satz

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Dann existiert ein vollständiger metrischer Raum  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  und eine Isometrie  $\iota: X \hookrightarrow \tilde{X}$ , sodass  $\overline{\iota(X)} = \tilde{X}$  (d.h.  $\iota(X)$  ist dicht in  $\tilde{X}$ ).  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  heißt **Vervollständigung** von  $(X, d)$  und ist eindeutig bis auf isometrische Isomorphie.

### Beweis

**Eindeutigkeit:** Angenommen,  $(\hat{X}, \hat{d})$  ist ein weiterer vollständiger metrischer Raum und  $\kappa: X \rightarrow \hat{X}$  eine Isometrie mit  $\overline{\kappa(X)} = \hat{X}$ . Definiere  $\gamma: \hat{X} \rightarrow \tilde{X}$  wie folgt: Falls  $y \in \hat{X}$ , wähle eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  in  $X$ , sodass  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \kappa(x_n)$ . Setze nun

$$\gamma(y) := \lim_{n \rightarrow \infty} \iota(x_n) \in \tilde{X}$$

Der Grenzwert existiert, da  $\tilde{X}$  vollständig ist. Zu zeigen:  $\gamma$  ist ein wohldefinierter isometrischer Isomorphismus.

**Wohldefiniertheit:**  $(\kappa(x_n))_n$  ist konvergent, also auch Cauchy. Da  $\kappa$  eine Isometrie ist, muss  $(x_n)_n$  auch eine Cauchyfolge in  $X$  sein. Nun ist aber auch  $\iota$  eine Isometrie und somit  $(\iota(x_n))_n$  eine Cauchyfolge in  $\tilde{X}$ . Da  $\tilde{X}$  vollständig ist, existiert also obiger Grenzwert.

Wir müssen außerdem zeigen, dass die Definition nicht von der Wahl der Folge abhängt: Angenommen  $(x'_n)_n$  ist eine weitere Folge, sodass  $\kappa(x'_n) \rightarrow y$ . Sei  $z \in \tilde{X}$  der Grenzwert dieser Folge unter  $\iota$ . Dann folgt  $\gamma(y) = z$  aus

$$\tilde{d}(\gamma(y), z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\iota(x_n), \iota(x'_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(\kappa(x_n), \kappa(x'_n)) = \hat{d}(y, y) = 0$$

**Isometrie:** Analog zu obiger Rechnung folgt für  $z, z' \in \hat{X}$  und Folgen  $(x_n)_n, (x'_n)_n$  mit  $\kappa(x_n) \rightarrow z$  und  $\kappa(x'_n) \rightarrow z'$

$$\tilde{d}(\gamma(z), \gamma(z')) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\iota(x_n), \iota(x'_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(\kappa(x_n), \kappa(x'_n)) = \hat{d}(z, z')$$

**Bijektivität:** Eine Umkehrabbildung lässt sich leicht konstruieren, indem man in obiger Konstruktion die Rollen von  $\hat{X}$  und  $\tilde{X}$  vertauscht.

**Existenz: Konstruktion von  $(\tilde{X}, \tilde{d})$ :** Setze  $Y := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid (x_n)_n \text{ ist Cauchy-Folge in } X\}$ . Definiere

$$(x_n)_n \sim (x'_n)_n : \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = 0$$

$\sim$  ist eine Äquivalenzrelation auf  $Y$ . Definiere nun  $\tilde{X} := Y/\sim$  und  $\tilde{d}: \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow [0, \infty)$  durch

$$\tilde{d}([(x_n)_n], [(x'_n)_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n)$$

$\tilde{d}$  ist eine wohldefinierte Abbildung, d.h. falls  $[(x_n)_n] = [(y_n)_n]$  und  $[(x'_n)_n] = [(y'_n)_n]$ , dann erhalten wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n). \quad (\text{leichte Übung})$$

Weiter ist  $(d(x_n, x'_n))_n$  eine Cauchy-Folge in dem vollständigen Raum  $[0, \infty)$  und somit konvergent: Sei nun  $\varepsilon > 0$ . Dann existiert ein  $N \in \mathbb{N}$ , sodass  $d(x_n, x_m) \leq \frac{\varepsilon}{2}$  und  $d(x'_n, x'_m) \leq \frac{\varepsilon}{2}$  für alle  $n, m \geq N$ . Dann gilt nach der Vierecksungleichung (siehe Anhang A.1)

$$|d(x_n, x'_n) - d(x_m, x'_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(x'_n, x'_m) \leq \varepsilon$$

Also existiert der Grenzwert und  $\tilde{d}$  ist wohldefiniert.



**Einbettung von  $X$ :** Definiere nun  $\iota: X \rightarrow \tilde{X}$  durch  $x \mapsto [(x, x, x, \dots)] \in \tilde{X}$ .  $\iota$  ist Isometrie, da

$$\tilde{d}(\iota(x), \iota(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y) = d(x, y)$$

Sei nun  $[(x_n)_n] \in \tilde{X}$  und  $\varepsilon > 0$ . Da  $(x_n)_n$  eine Cauchy-Folge ist, gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$ , sodass für alle  $n, m \geq N$  gilt  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ . Dann gilt

$$\tilde{d}(\iota(x_N), [(x_n)_n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_N, x_n) < \varepsilon$$

Damit hat  $\iota$  ein dichtes Bild.

**Vollständigkeit von  $(\tilde{X}, \tilde{d})$ :** Sei  $(\bar{x}^m)_m$  eine Cauchyfolge in  $\tilde{X}$ .

$\bar{x} \in \tilde{X}$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists M(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m, m' > M : \tilde{d}(\bar{x}^m, \bar{x}^{m'}) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Wenn  $\bar{x}^m = [(x_n^m)_n]$  und  $\bar{x}^{m'} = [(x_n^{m'})_n]$ , dann gilt also für alle  $m, m' > M(\varepsilon)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_n^{m'}) < \frac{\varepsilon}{3} \quad [*]$$

Für alle  $m$  ist  $(x_n^m)_n$  eine Cauchyfolge, also gilt

$$\forall m : \exists N(m) : \forall n, n' \geq N(m) : d(x_n^m, x_{n'}^m) < \frac{1}{m} \quad [**]$$

Setze nun  $z_n := x_{N(n)}^n$ . Behauptung:  $(z_n)_n$  ist eine Cauchyfolge. Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann gilt für  $n, m > N = \max\{M(\varepsilon), \frac{3}{\varepsilon}\}$  für ein  $k > N(m), N(n)$

$d(z_n, z_m)$  ist unabhängig von  $k$ , also kann man  $k$  beliebig groß wählen

$$d(z_n, z_m) = d(x_{N(n)}^n, x_{N(m)}^m) \leq \underbrace{d(x_{N(n)}^n, x_k^n)}_{[*] \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N} \leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{d(x_k^n, x_k^m)}_{[*] \leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{d(x_k^m, x_{N(m)}^m)}_{[*] \leq \frac{1}{m} < \frac{1}{N} \leq \frac{\varepsilon}{3}} < \varepsilon$$

$\implies (z_n)_n$  ist eine Cauchyfolge, also

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N_z(\varepsilon) : \forall n, m > N_z(\varepsilon) : d(z_n, z_m) < \varepsilon \quad [\#]$$

Es bleibt zu zeigen:  $\lim_{m \rightarrow \infty} \bar{x}^m = [(z_n)_n]$ . Sei dazu  $\varepsilon > 0$ . Dann gilt für  $m \geq \max\{\frac{2}{\varepsilon}, N_z(\varepsilon)\}$

$$\tilde{d}(\bar{x}^m, [(z_n)_n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_{N(n)}^n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \underbrace{d(x_n^m, x_{N(m)}^m)}_{[*] \leq \frac{1}{m} \leq \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{d(x_{N(m)}^m, x_{N(n)}^n)}_{=d(z_m, z_n) \stackrel{[\#]}{<} \frac{\varepsilon}{2}} \right) < \varepsilon$$

Also gilt  $\bar{x}^m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} [(z_n)_n]$  und  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  ist vollständig.  $\square$

## 1.6. Definition

Sei  $(W, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum und  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Sei

$$C_b(W, X) := \{f: W \rightarrow X \mid f \text{ stetig und beschränkt}\}$$

versehen mit der Metrik  $d_{W,X}$ , die definiert ist durch

$$d_{W,X}(f, g) = \sup_{t \in W} d(f(t), g(t))$$

## 1.7. Bemerkung

Auf  $C(W, X) = \{f: W \rightarrow X \text{ stetig}\}$  ist  $d_{W,X}$  eine **erweiterte Metrik**, d.h. der Wert  $\infty$  ist möglich.  $\tilde{d}_{W,X} := \min\{1, d_{W,X}\}$  ist dann eine „echte“ Metrik auf  $C(W, X)$ .

## 1.8. Proposition

Falls  $X$  vollständig ist, dann sind  $C_b(W, X)$  und  $C(W, X)$  vollständig (bezüglich  $d_{W,X}$  bzw.  $\tilde{d}_{W,X}$ ).

### Beweis

Sei  $(f_n)_n$  eine Cauchy-Folge in  $C_b(W, X)$ , also

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N : \sup_{t \in W} d(f_n(t), f_m(t)) < \varepsilon$$

Also ist  $(f_n(t))_n$  für alle  $t$  eine Cauchyfolge in  $X$ . Da  $X$  vollständig ist, existiert ein  $x_t \in X$  sodass  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_t$ . Definiere also  $f(t) := x_t$  punktweise.

**$f$  ist Grenzwert:** Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$ , sodass für alle  $k, l \geq N$  gilt  $d_{W,X}(f_k, f_l) < \varepsilon$ , da  $(f_n)_n$  Cauchy ist. Für  $n \geq N$  gilt nun  $d_{W,X}(f, f_n) \leq \varepsilon$ , da

$$\sup_{t \in W} d(f(t), f_n(t)) = \sup_{t \in W} \lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k(t), f_n(t)) \leq \varepsilon$$

**$f$  ist stetig:** Sei  $\varepsilon > 0$  und  $t \in W$ . Wir finden ein  $N \in \mathbb{N}$  mit  $d_{W,X}(f, f_N) < \frac{\varepsilon}{3}$ . Da  $f_N$  stetig ist in  $t$ , existiert eine offene Umgebung  $U$  von  $t$ , sodass  $d(f_N(t), f_N(s)) < \frac{\varepsilon}{3}$  für alle  $s \in U$ . Es folgt

$$d(f(t), f(s)) \leq d(f(t), f_N(t)) + d(f_N(t), f_N(s)) + d(f_N(s), f(s)) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Damit ist  $f$  stetig in  $t \in W$ , also auch auf ganz  $W$ , da  $t$  beliebig war.

**$f$  ist beschränkt:** Seien  $x, y \in W$ . Sei  $c > 0$ . Finde  $N \in \mathbb{N}$ , sodass  $d_{W,X}(f, f_N) < c$ . Dann gilt

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f_N(x)) + d(f_N(x), f_N(y)) + d(f_N(y), f(y)) < 2c + d(f_N(x), f_N(y)) < \infty$$

da  $f_N$  beschränkt ist.  $\square$

## 1.9. Proposition

Sei  $(X, d)$  ein vollständiger metrischer Raum und  $(\overline{B}(x_n, \varepsilon_n))_{n \in \mathbb{N}}$  mit  $\overline{B}(x_{n+1}, \varepsilon_{n+1}) \subseteq \overline{B}(x_n, \varepsilon_n)$  und  $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . Dann existiert genau ein Punkt in  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}(x_n, \varepsilon_n)$ .

### Beweis

**Existenz:** Behauptung: Die Folge der Mittelpunkte  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist eine Cauchy-Folge: Sei  $\varepsilon > 0$ . Finde  $N \in \mathbb{N}$ , sodass  $\varepsilon_n \leq \varepsilon$  für alle  $n \geq N$ . Dann gilt für alle  $n \geq m \geq N$

$$d(x_n, x_m) \leq \varepsilon_m \leq \varepsilon,$$

da  $x_n \in \overline{B}(x_m, \varepsilon)$  ist. Da  $X$  vollständig ist, existiert ein  $x \in X$  mit  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ .

**Behauptung:**  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}(x_n, \varepsilon_n)$ . Wähle dazu ein  $N \in \mathbb{N}$ . Dann ist  $(x_n)_{n \geq N}$  eine Cauchy-Folge in  $\overline{B}(x_N, \varepsilon_N)$ .  $\overline{B}(x_N, \varepsilon_N)$  ist ein abgeschlossener Teilraum von  $X$  und somit vollständig. Also ist  $x \in \overline{B}(x_N, \varepsilon_N)$ . Da  $N$  beliebig war, gilt  $x \in \overline{B}(x_n, \varepsilon_n)$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$ .

**Eindeutigkeit:** Es seien  $x, y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}(x_n, \varepsilon_n)$ , also  $x, y \in \overline{B}(x_n, \varepsilon_n)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Dann gilt

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) \leq 2 \cdot \varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

für jedes  $n \in \mathbb{N}$  und somit  $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ .  $\square$

## 1.10. Satz von Baire<sup>2</sup>

Es gelten folgende äquivalente Formulierungen:

- a) Sei  $(X, d)$  ein vollständiger metrischer Raum und  $A_0, A_1, \dots$  eine Folge abgeschlossener Teilmengen. Falls  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  eine offene Kugel enthält, so auch eines der  $A_n$ .
- b) In einem vollständigen metrischen Raum hat eine abzählbare Vereinigung von abgeschlossenen Mengen ohne innere Punkte keine inneren Punkte.
- c) In einem vollständigen metrischen Raum ist ein abzählbarer Durchschnitt von dichten offenen Mengen wieder dicht.

### Beweis

Zunächst die Äquivalenz:

**a)  $\Rightarrow$  b):** Klar, da b) Kontraposition von a) ist.

**b)  $\Rightarrow$  c):** Für  $n \in \mathbb{N}$  sei  $U_n \subseteq X$  offen und dicht. Dann ist  $X \setminus U_n \subseteq X$  abgeschlossen und hat keine inneren Punkte. Aus b) folgt nun, dass

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X \setminus U_n = X \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

keine inneren Punkte hat. Also ist  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$  dicht in  $X$ .

**c)  $\Rightarrow$  a):** Ebenso (Zeige: Keines der  $A_n$  enthält offene Kugel  $\Rightarrow \bigcup_n A_n$  enthält keine offene Kugel).

Wir wollen nun a) durch Widerspruch beweisen, d.h. wir nehmen an, dass gilt: Jede offene Kugel schneidet  $X \setminus A_k$  für jedes  $k \in \mathbb{N}$ . Dazu wollen wir Folgen  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset X$ ,  $(\varepsilon_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, 1]$  finden mit

$$(i) \quad \varepsilon_k < \frac{1}{k+1},$$

$$(ii) \quad \overline{B}(x_{k+1}, \varepsilon_{k+1}) \subset (X \setminus A_k) \cap B(x_k, \varepsilon_k) \subset \overline{B}(x_k, \varepsilon_k),$$

$$(iii) \quad \overline{B}(x_k, \varepsilon_k) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

für  $k \in \mathbb{N}$ . Dann gilt

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \stackrel{(iii)}{\supset} \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \overline{B}(x_k, \varepsilon_k) \stackrel{(ii)}{\subset} \bigcap_{k \in \mathbb{N}} (X \setminus A_k) \cap B(x_k, \varepsilon_k) \subset \bigcap_{k \in \mathbb{N}} X \setminus A_k = X \setminus \left( \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \right)$$

Aber wegen (i) und (ii) existiert nach Proposition 1.9 ein  $x \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \overline{B}(x_k, \varepsilon_k)$ .  $\nmid$

Wir suchen also eine Abbildung  $\bar{c}: \mathbb{N} \rightarrow X \times (0, 1]$ ,  $k \mapsto (x_k, \varepsilon_k)$  mit (i),(ii),(iii) für  $k \in \mathbb{N}$ . Wir setzen


$$P_m := \left\{ c: \{0, \dots, m\} \rightarrow X \times (0, 1] \mid \begin{array}{l} (i),(iii) \text{ gilt für } k \in \{0, \dots, m\}, \\ (ii) \text{ gilt für } k \in \{0, \dots, m-1\} \end{array} \right\}$$

$$P_\infty := \{ c: \mathbb{N} \rightarrow X \times (0, 1] \mid (i),(ii),(iii) \text{ gilt für } k \in \mathbb{N} \}$$

Die Menge  $P := (\bigcup_{m \in \mathbb{N}} P_m) \cup P_\infty$  ist partiell geordnet bezüglich „ $\prec$ “:

$$c \prec c' : \iff m \leq m' \text{ und } c'|_{\{0, \dots, m\}} = c, \text{ bzw. } c' = c \text{ falls } m = m' = \infty$$

$P$  ist nicht leer, denn nach Voraussetzung existiert  $(x_0, \varepsilon_0)$  mit  $0 < \varepsilon_0 < 1$  und  $\overline{B}(x_0, \varepsilon_0) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ , d.h.  $(0 \mapsto (x_0, \varepsilon_0)) \in P_0$ . Jede total geordnete Teilmenge  $\emptyset \neq \Gamma$  von  $P$  besitzt eine obere Schranke:

<sup>2</sup>nach René Louis Baire, [https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9\\_Louis\\_Baire](https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Louis_Baire) 

- Falls  $\Gamma$  ein  $c \in P_\infty$  enthält, so ist  $c$  obere Schranke (Warum?).
- Ebenso falls  $\Gamma$  ein  $c \in P_{\bar{m}}$  enthält und  $\Gamma \cap P_{m'} = \emptyset$  für alle  $\bar{m} < m' \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ .
- Falls  $\Gamma \subset \bigcup_{\mathbb{N}} P_m$ , aber  $\Gamma \not\subset \bigcup_{m \leq \bar{m}} P_m$  für jedes  $\bar{m}$ , so definieren wir eine obere Schranke in  $P_\infty$  durch Einschränkung (Wie genau?).

Mit dem Lemma von Zorn folgt, dass  $P$  ein maximales Element  $\bar{c}$  besitzt. Wir müssen noch zeigen, dass  $\bar{c} \in P_\infty$  wie gewünscht:

Falls  $\bar{c} \in P_m$  für ein  $m \in \mathbb{N}$ , so gilt nach Annahme, dass  $(X \setminus A_m) \cap B(x_m, \varepsilon_m) \neq \emptyset$ . Dann existiert aber  $(x_{m+1}, \varepsilon_{m+1}) \in X \times (0, 1]$  mit  $\varepsilon_{m+1} < \frac{1}{m+2}$  und

$$\overline{B}(x_{m+1}, \varepsilon_{m+1}) \subset (X \setminus A_m) \cap B(x_m, \varepsilon_m),$$

da  $(X \setminus A_m) \cap B(x_m, \varepsilon_m)$  offen ist. Definiere  $\bar{c} : \{0, \dots, m+1\} \rightarrow X \times (0, 1]$  durch

$$k \mapsto \begin{cases} (x_k, \varepsilon_k), & \text{falls } k = m+1 \\ \bar{c}(k), & \text{falls } k \in \{0, \dots, m\} \end{cases},$$

dann gilt  $\bar{c} \prec \bar{c} \in P_{m+1}$  im Widerspruch zur Maximalität von  $\bar{c}$ . □

### 1.11. Bemerkungen

- (i) Die Aussage gilt auch für lokalkompakte Hausdorffräume. (Übung, Blatt 2, Aufgabe 2)
- (ii) Tatsächlich genügt eine schwächere Form des Auswahlaxioms (DC); das abzählbare Auswahlaxiom jedoch nicht.
- (iii) Falls  $X$  **separabel** ist (d.h. falls eine abzählbare dichte Teilmenge von  $X$  existiert), dann lässt sich der Satz auch ohne (AC) beweisen. (Übung, Blatt 2, Aufgabe 1)

### 1.12. Corollar: Satz der gleichmäßigen Beschränktheit

Sei  $(X, d)$  ein vollständiger metrischer Raum. Sei  $F \subset C(X, \mathbb{R})$  eine Menge, die **punktweise gleichmäßig beschränkt** ist, d.h. für jedes  $x \in X$  existiert  $K_x \in \mathbb{R}$ , sodass

$$|f(x)| \leq K_x \quad \forall f \in F.$$

Dann existieren  $\emptyset \neq U \subset X$  offen und  $K \in \mathbb{R}$  so, dass

$$|f(x)| \leq K \quad \forall x \in U, f \in F$$

#### Beweis

Definiere für  $n \in \mathbb{N}$

$$X \supset A_n := \{x \in X \mid |f(x)| \leq n \quad \forall f \in F\} = \bigcap_{f \in F} f^{-1}([-n, n])$$

Also sind die  $A_n \subset X$  abgeschlossen. Es ist  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = X$ , wegen der Voraussetzung von punktwiser gleichmäßiger Beschränktheit. Da  $X$  eine nichtleere, offene Teilmenge  $U$  enthält, existiert nach dem Satz von Baire ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $U \subset A_n$ . □

## 2. Normierte Räume, Hahn-Banach Sätze

### 2.1. Definition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit einer Topologie  $\mathcal{T}$ . Wir sagen,  $X$  ist ein **topologischer Vektorraum**, falls Addition und Skalarmultiplikation stetig sind:

$$\begin{aligned} +: X \times X &\rightarrow X, & (x, y) &\mapsto x + y \\ \cdot: \mathbb{K} \times X &\rightarrow X, & (\lambda, x) &\mapsto \lambda \cdot x \end{aligned}$$

### 2.2. Proposition

Sei  $X$  ein topologischer  $\mathbb{K}$ -Vektorraum und  $Y \subset X$  ein Untervektorraum. Dann sind  $Y$  und  $\overline{Y}$  topologische Vektorräume mit der Unterraumtopologie.

#### Beweis

- Klar für  $Y$ .
- Zu zeigen:  $\overline{Y}$  ist ein Untervektorraum. Seien  $x_0, y_0 \in \overline{Y}$  und sei  $U$  eine offene Menge in  $X$  mit  $x_0 + y_0 \in U$ . Dann existieren offene Mengen  $V, W$  von  $X$  mit  $x_0 \in V, y_0 \in W$  und  $V + W \subset U$ , da die Addition stetig ist. Da  $x_0 \in \overline{Y}$  und  $x_0 \in V$ , existiert  $x_1 \in Y$  mit  $x_1 \in V$ . Analog existiert  $y_1 \in Y$  mit  $y_1 \in W$ . Daher ist  $x_1 + y_1 \in Y \cap U$ . Da  $U$  eine beliebige offene Umgebung um  $x_0 + y_0$  ist, folgt  $x_0 + y_0 \in \overline{Y}$ .

Skalarmultiplikation genauso. □

### 2.3. Proposition

Ein normierter Vektorraum  $(X, \|\cdot\|)$  ist ein topologischer Vektorraum bezüglich der von  $\|\cdot\|$  induzierten Topologie.

#### Beweis

Es gilt

$$\|(x + y) - (x' + y')\|_X \leq \|x - x'\|_X + \|y - y'\|_X$$

Daher ist  $+: X \times X \rightarrow X$  gleichmäßig stetig bezüglich der Norm  $\|(z, z')\|_{X \times X} := \|z\|_X + \|z'\|_X$  auf  $X \times X$ . Ähnlich folgt

$$\|\lambda x - \lambda' x'\|_X = \|\lambda(x - x') + (\lambda - \lambda')x'\|_X \leq |\lambda| \cdot \|x - x'\|_X + |\lambda - \lambda'| \cdot \|x'\|_X$$

Daher ist  $\cdot: \mathbb{K} \times X \rightarrow X$  stetig, denn falls  $(\lambda_i)_{i \in I}$  ein Netz in  $\mathbb{K}$  und  $(x_i)_{i \in I}$  ein Netz in  $X$  ist mit  $\lambda_i \rightarrow \lambda$ ,  $x_i \rightarrow x$ , dann gilt  $\lambda_i x_i \rightarrow \lambda x$ , also  $\|\lambda_i x_i - \lambda x\|_X \rightarrow 0$ . □

### 2.4. Proposition

Seien  $X, Y$  topologische Vektorräume,  $T: X \rightarrow Y$  linear. Dann sind äquivalent:

- (1)  $T$  ist stetig.
- (2)  $T$  ist stetig in 0.
- (3)  $T$  ist stetig in einem Punkt  $\bar{x}$ .

### Beweis

(1)  $\Rightarrow$  (2)  $\Rightarrow$  (3) ist klar. Wir zeigen (3)  $\Rightarrow$  (1):

Für  $y \in X$  definiere  $L_y: X \rightarrow X, x \mapsto y + x$ . Dann ist  $L_y$  bijektiv und stetig. Da auch  $L_{-y}$  stetig ist, ist  $L_y$  ein Homöomorphismus. Sei nun  $T$  in  $\bar{x}$  stetig. Sei  $x_0 \in X$ . Wir zeigen:  $T$  ist stetig in  $x_0$ . Setze  $y := \bar{x} - x_0$ . Dann ist

$$T(x_0) = T(x_0 + y - y) = T(-y) + T(x_0 + y) = L_{T(-y)} \circ T \circ L_y(x_0)$$

Da  $L_y(x_0) = \bar{x}$ ,  $T$  stetig in  $\bar{x}$  ist und  $L_y, L_{T(-y)}$  stetig sind, ist somit  $T$  stetig in  $x_0$ .  $\square$

## 2.5. Definition

Für topologische Vektorräume  $X, Y$  definieren wir

$$\mathcal{L}(X, Y) = \{T: X \rightarrow Y \mid T \text{ linear und stetig}\}$$

Wir schreiben  $X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$  für den **Dualraum** von  $X$ . Die Elemente von  $X^*$  heißen (stetige) **Funktionale**.<sup>3</sup> Die Elemente von  $\mathcal{L}(X, X)$  heißen (stetige) **Operatoren** auf  $X$ .

## 2.6. Bemerkung

$\mathcal{L}(X, Y)$  und  $\mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = X^*$  sind Vektorräume, wobei die Vektorraumstruktur punktweise definiert ist.  $\mathcal{L}(X, X)$  ist sogar eine Algebra mittels Komposition.

## 2.7. Proposition

Seien  $X, Y$  normierte Vektorräume,  $T: X \rightarrow Y$  linear. Dann ist  $T$  stetig genau dann, wenn ein  $\mu \geq 0$  existiert, sodass

$$\|T(x)\|_Y \leq \mu \cdot \|x\|_X \quad \forall x \in X$$

Ein stetiger Operator zwischen normierten Vektorräumen heißt deswegen auch **beschränkt**.

### Beweis

„ $\Leftarrow$ “: Klar: Wenn  $x_n \rightarrow 0$ , dann  $T(x_n) \rightarrow 0$ , denn  $\|T(x_n)\| \leq \mu \|x_n\| \rightarrow 0$ . Also ist  $T$  stetig in 0 und nach 2.4 überall stetig.

„ $\Rightarrow$ “: Angenommen  $T$  ist stetig. Dann setzen wir

$$\mu := \sup \left\{ \frac{1}{\|x\|_X} \cdot \|T(x)\|_Y \mid x \in X \setminus \{0\} \right\}$$

Falls  $\mu = \infty$ , dann existieren  $x_n \in X$  mit  $\frac{1}{\|x_n\|_X} \cdot \|T(x_n)\|_Y \geq n$ . Betrachte  $x'_n := \frac{1}{n \cdot \|x_n\|_X} \cdot x_n$ , dann  $\|x'_n\| = \frac{1}{n}$ , also  $x'_n \rightarrow 0$ . Aber es gilt  $T(x'_n) \not\rightarrow 0$ , denn

$$\|T(x'_n)\|_Y = \frac{1}{n \cdot \|x_n\|_X} \cdot \|T(x_n)\|_Y \geq 1$$

für alle  $n$  im Widerspruch zur Stetigkeit von  $T$ . Also  $\mu < \infty$ .  $\square$

## 2.8. Definition

Seien  $X, Y$  normierte Vektorräume,  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ . Die **Norm** (oder **Operatornorm**) von  $T$  ist

$$\|T\| = \sup \left\{ \frac{1}{\|x\|_X} \cdot \|T(x)\|_Y \mid x \in X \setminus \{0\} \right\} = \sup \left\{ \|T(x)\|_Y \mid x \in X \text{ mit } \|x\|_X = 1 \right\}$$

Nach 2.7 ist  $\|T\| < \infty$  und  $\|Tx\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X$  für alle  $x \in X$ .

<sup>3</sup>Aus der linearen Algebra:  $X^* = \text{Hom}(X, \mathbb{K}) = \{T: X \rightarrow \mathbb{K} \mid T \text{ linear}\}$ . Die Elemente von  $X^*$  heißen Funktionale.

## 2.9. Proposition

Seien  $X, Y$  normierte Räume, betrachte  $\mathcal{L}(X, Y)$  mit  $\|\cdot\|$ . Dann ist  $\mathcal{L}(X, Y)$  ein normierter Raum.

**Beweis**

- $\|T\| \geq 0$  für alle  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ .

- Es gilt

$$\begin{aligned} \|T\| = 0 &\iff \forall x \in X, \|x\|_X = 1 : \|Tx\|_Y = 0 \iff \forall x \in X, \|x\|_X = 1 : Tx = 0 \\ &\iff \forall x \in X : Tx = 0 \iff T = 0 \end{aligned}$$

- Sei  $\lambda \in \mathbb{K}, T \in \mathcal{L}(X, Y)$ . Dann gilt

$$\|\lambda \cdot T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|\lambda \cdot T(x)\|_Y = \sup_{\|x\|_X=1} |\lambda| \cdot \|Tx\|_Y = |\lambda| \cdot \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y = |\lambda| \cdot \|T\|$$

- Seien  $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(X, Y)$  und  $x \in X$  mit  $\|x\|_X = 1$ . Dann gilt

$$\|(T_1 + T_2)(x)\|_Y = \|T_1x + T_2x\|_Y \leq \|T_1x\|_Y + \|T_2x\|_Y$$

Damit folgt weiter

$$\begin{aligned} \|T_1 + T_2\| &= \sup_{\|x\|_X=1} \|(T_1 + T_2)(x)\|_Y \leq \sup_{\|x\|_X=1} (\|T_1x\|_Y + \|T_2x\|_Y) \\ &\leq \sup_{\|x\|_X=1} \sup_{\|x'\|_X=1} (\|T_1x\|_Y + \|T_2x'\|_Y) = \|T_1\| + \|T_2\| \end{aligned}$$

□

## 2.10. Definition

Eine  $\mathbb{K}$ -Algebra  $A$  heißt **normiert**, falls  $A$  mit einer Norm  $\|\cdot\|$  versehen ist, so dass  $(A, \|\cdot\|)$  ein normierter Vektorraum ist und folgende Ungleichung gilt

$$\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\| \quad \forall a, b \in A$$

Falls  $A$  **unital** ist, d.h. es existiert ein Einselement  $1_A$ , dann gilt  $\|1_A\| \leq 1$ . Wenn  $\|1_A\| < 1$ , dann ist  $\|1_A\| = \|1_A \cdot 1_A\| \leq \|1_A\| \cdot \|1_A\| \Rightarrow \|1_A\| = 0$ . Also  $1_A = 0$  und damit  $A = \{0\}$ .

## 2.11. Beispiele

- $C(\Omega, \mathbb{K})$ , wobei  $\Omega$  ein kompakter Hausdorffraum und die Multiplikation punktweise ist. Betrachte die Norm  $\|\cdot\|_\infty$ . Für  $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$  gilt dann  $\|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \cdot \|g\|_\infty$
- $\mathcal{L}(X, X)$  für einen normierten Raum  $X$  mit  $\|\cdot\|$ , denn für  $S, T \in \mathcal{L}(X, X)$  gilt

$$\|ST\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|S(T(x))\|_X \leq \sup_{\|x\|_X=1} (\|S\| \cdot \|Tx\|_X) = \|S\| \cdot \|T\|.$$

## 2.12. Proposition

Seien  $X, Y$  normierte Räume. Dann ist  $X \times Y$  ein normierter Raum mit

$$\|(x, y)\|_1 := \|x\|_X + \|y\|_Y \quad \text{für } (x, y) \in X \times Y$$

$$\text{oder } \|(x, y)\|_\infty := \max\{\|x\|_X, \|y\|_Y\}$$

Beide Normen sind äquivalent.

**Beweis**

Übung!

□

## 2.13. Proposition und Definition

Sei  $X$  ein normierter Raum und  $Y \subseteq X$  ein abgeschlossener Unterraum. Dann ist  $X/Y = \{x + Y \mid x \in X\}$  ein normierter Raum mit

$$\|x + Y\|_{X/Y} := \inf\{\|x + y\|_X \mid y \in Y\}$$

Die Quotientenabbildung  $q: X \rightarrow X/Y, x \mapsto x + Y$  ist stetig und linear. Weiter ist  $\|q\| \leq 1$  und  $q$  offen, d.h. bildet offene Mengen in  $X$  auf offene Mengen in  $X/Y$  ab.

### Bemerkung

Daraus folgt, dass Normtopologie und Quotiententopologie auf  $X/Y$  gleich sind.

### Beweis

a)  $X/Y$  ist ein Vektorraum mit  $(x + Y) + (x' + Y) = (x + x') + Y$ .

b) Sei  $\bar{x} = x + Y \in X/Y$ . Es gilt

- $\|\bar{x}\| \geq 0$  ist klar für alle  $\bar{x} \in X/Y$
- Angenommen  $\|\bar{x}\|_{X/Y} = 0$ , d.h.  $\inf_{y \in Y} \|x + y\|_X = 0$ . Also existiert eine Folge  $(y_n)_n \subset Y$  mit  $\|x + y_n\|_X \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -x$ . Also ist  $-x$  und damit auch  $x$  in  $Y$ , da  $Y$  abgeschlossen ist. Damit ist  $\bar{x} = 0$

c) Sei  $0 \neq \lambda \in \mathbb{K}, x \in X$ . Dann gilt

$$\|\lambda \cdot \bar{x}\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|\lambda x + y\|_X = \inf_{y \in Y} \|\lambda x + \lambda y\|_X = \inf_{y \in Y} |\lambda| \cdot \|x + y\|_X = |\lambda| \cdot \|\bar{x}\|_{X/Y}$$

d) Seien  $\bar{x}, \bar{y} \in X/Y$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \|\bar{x} + \bar{y}\|_{X/Y} &= \inf_{z \in Y} \|x + y + z\|_X = \inf_{z, z' \in Y} \|x + y + z + z'\|_X \leq \inf_{z, z' \in Y} (\|x + z\|_X + \|y + z'\|_X) \\ &= \|\bar{x}\|_{X/Y} + \|\bar{y}\|_{X/Y} \end{aligned}$$

Damit ist  $\|\cdot\|_{X/Y}$  eine Norm auf  $X/Y$ .

e) Die Linearität von  $q$  ist klar. Es gilt  $\|\bar{x}\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|x + y\|_X \leq \|x\|_X$ . Also

$$\|q\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|q(x)\|_{X/Y} \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|x\|_X = 1$$

f) Zu zeigen:  $q$  ist offen. Sei  $x \in X, \varepsilon > 0$ . Betrachte die offene Kugel  $B(x, \varepsilon) \subset X$ . Wir zeigen  $B(\bar{x}, \varepsilon) \subset q(B(x, \varepsilon))$ . Sei also  $\bar{z} = z + Y$  in  $B(\bar{x}, \varepsilon)$ . Dann gilt  $\|\bar{x} - \bar{z}\|_{X/Y} < \varepsilon$ , worauf folgt

$$\inf_{y \in Y} \|x - z + y\|_X < \varepsilon$$

$\Rightarrow$  es existiert  $y \in Y : \|x - z + y\|_X < \varepsilon$ . Es gilt  $\bar{z} = \overline{z - y} \in q(B(x, \varepsilon))$ , da  $z - y \in B(x, \varepsilon)$ .

Sei  $V \subset X$  offen, zeige  $q(V) \subset X/Y$  offen. Für  $x \in V$  finde  $\varepsilon > 0$ , sodass  $B(x, \varepsilon) \subset V$ . Dann folgt  $B(\bar{x}, \varepsilon) \subseteq q(B(x, \varepsilon)) \subseteq q(V)$ .  $\square$

## 2.14. Definition

Ein **Banachraum** ist ein vollständiger, normierter Raum. Eine **Banachalgebra** ist eine vollständige normierte Algebra.

## 2.15. Beispiel

$C(\Omega, \mathbb{K})$ , wobei  $\Omega$  ein kompakter Hausdorffraum ist, ist eine Banachalgebra.



## 2.16. Proposition

Produkte und Quotienten (nach abgeschlossenen Unterräumen) von Banachräumen sind wieder Banachräume.

### Beweis

**Produkt**  $X \times Y$ : Es gilt  $\|(x, y)\|_\infty = \max\{\|x\|, \|y\|\}$ . Sei  $((x_n, y_n))_n \subset X \times Y$  eine Cauchyfolge. Dann sind  $(x_n)_n$  und  $(y_n)_n$  Cauchyfolgen und es gilt  $x_n \rightarrow x$  und  $y_n \rightarrow y$  und somit auch  $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$ .

**Quotient**  $X/Y$ : Sei  $X$  ein Banachraum und  $Y \subseteq X$  ein abgeschlossener Unterraum. Falls  $\bar{x}, \bar{y} \in X/Y$ , so existiert  $y' \in Y$ , sodass  $\bar{y} = \overline{y'}$  und

$$\|x - y'\|_X \leq 2 \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|_{X/Y}$$

Sei nun  $(\bar{x}_n)_n$  eine Cauchyfolge in  $X/Y$ . Es gibt eine Teilfolge  $(\bar{x}_{n_k})_k$ , sodass

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|\bar{x}_{n_{k-1}} - \bar{x}_{n_k}\|_{X/Y} < \infty$$

Falls  $(\bar{x}_{n_k})_k$  konvergiert, dann auch  $(\bar{x}_n)_n$ . Wir dürfen also ohne Einschränkungen annehmen, dass bereits  $\sum_{n=1}^{\infty} \|\bar{x}_{n-1} - \bar{x}_n\|_{X/Y} < \infty$  gilt. Wähle  $x'_1 \in \bar{x}_1$ . Wähle induktiv  $x'_n \in X$  mit

$$\|x'_{n-1} - x'_n\|_X \leq 2 \cdot \|\bar{x}_{n-1} - \bar{x}_n\|_{X/Y}$$

und  $x'_n \in \bar{x}_n$ . Dann gilt  $\sum_{n=1}^{\infty} \|x'_{n-1} - x'_n\|_X < \infty$ . Daher ist  $(x'_n)_n$  eine Cauchyfolge in  $X$ . Also existiert  $x \in X$  mit  $x_n \rightarrow x$ . Dann gilt auch  $\bar{x}_n \rightarrow \bar{x}$ .  $\square$

## 2.17. Definition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Eine Abbildung  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  heißt **sublinear**, falls gilt:


- (i)  $\varphi(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \varphi(x)$ , für  $x \in X$ ,  $\lambda \in [0, \infty)$
- (ii)  $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y)$ , für  $x, y \in X$ .

Setze  $\mathcal{S}(X) := \{\varphi: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi \text{ sublinear}\}$ .  $\mathcal{S}(X)$  ist partiell geordnet mit

$$\varphi \leq \psi : \iff \varphi(x) \leq \psi(x), \quad x \in X$$

## 2.18. Beispiele

- (i) Halbnormen, also nicht positiv-definite Normen, sind sublinear.
- (ii) Folgende Abbildung  $X \rightarrow \mathbb{R}$  ist sublinear  
Benutze  $0 = \varphi(0) = \varphi(x - x) \leq \varphi(x) + \varphi(-x)$ .



## 2.19. Proposition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.  $\mathcal{S}(X)$  ist nach unten **induktiv geordnet**, d.h. jede nichtleere total geordnete Teilmenge besitzt eine untere Schranke.

### Beweis

Sei  $\emptyset \neq (\varphi_i)_I \subseteq \mathcal{S}(X)$  total geordnet. Setze  $\varphi(x) := \inf_{i \in I} \varphi_i(x)$ , dann gilt

$$-\varphi_i(-x) \leq \varphi_i(x) \implies -\varphi(-x) \leq \varphi(x) \leq \varphi_i(x) < \infty$$

ebenso  $-\varphi(x) \leq \varphi(-x) \leq \varphi_i(-x)$  für  $x \in X, i \in I$ . Insbesondere gilt  $-\infty < \varphi(x) < \infty, x \in X$ . Die Sublinearität von  $\varphi$  und  $\varphi \leq \varphi_i, i \in I$  sind klar (Warum?).  $\square$

## 2.20. Proposition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $\varphi \in \mathcal{S}(X)$ . Dann ist  $\varphi$  in  $\mathcal{S}(X)$  minimal genau dann, wenn  $\varphi$  linear ist.

### Beweis

" $\Leftarrow$ ": Sei  $\psi \leq \varphi$  mit  $\psi$  sublinear und  $\varphi$  linear. Dann folgt  $\psi(x) \leq \varphi(x)$  und  $\psi(-x) \leq \varphi(-x)$  für  $x \in X$ .

$$\implies -\psi(x) \leq \psi(-x) \leq \varphi(-x) = -\varphi(x)$$

Daraus folgt  $\varphi(x) \leq \psi(x)$  und somit muss  $\varphi = \psi$  gelten. Also ist  $\varphi$  minimal.

" $\Rightarrow$ ": Sei  $\varphi \in \mathcal{S}(X)$  minimal. Zu  $\bar{x} \in X$  definiere  $\varphi_{\bar{x}}: X \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$\varphi_{\bar{x}}(x) := \inf_{\lambda \geq 0} \left( \varphi(x + \lambda \cdot \bar{x}) - \lambda \cdot \varphi(\bar{x}) \right)$$

Es gilt  $\varphi_{\bar{x}}(x) \in (-\infty, \infty)$ , denn für  $x \in X, \lambda \geq 0$  ist

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda \cdot \bar{x}) &= \varphi(x + \lambda \cdot \bar{x} - x) \leq \varphi(x + \lambda \cdot \bar{x}) + \varphi(-x) \\ \iff -\varphi(\lambda \cdot \bar{x}) &\geq -\varphi(-x) - \varphi(x + \lambda \cdot \bar{x}) \\ \iff -\varphi(-x) &\leq \varphi(x + \lambda \cdot \bar{x}) - \lambda \cdot \varphi(\bar{x}) \stackrel{2.17(ii)}{\leq} \varphi_{\bar{x}}(x) \end{aligned}$$

$\varphi_{\bar{x}}$  ist sublinear:

(i) Sei  $\mu > 0$ . Dann gilt für  $x \in X$ .

$$\begin{aligned} \varphi_{\bar{x}}(\mu \cdot x) &= \inf_{\lambda \geq 0} \left( \varphi(\mu \cdot x + \lambda \cdot \bar{x}) - \lambda \cdot \varphi(\bar{x}) \right) = \inf_{\lambda \geq 0} \mu \cdot \left( \varphi\left(x + \frac{\lambda}{\mu} \cdot \bar{x}\right) - \frac{\lambda}{\mu} \cdot \varphi(\bar{x}) \right) \\ &= \mu \cdot \inf_{\lambda' \geq 0} \left( \varphi(x + \lambda' \cdot \bar{x}) - \lambda' \cdot \varphi(\bar{x}) \right) \\ &= \mu \cdot \varphi_{\bar{x}}(x) \end{aligned}$$

$\varphi_{\bar{x}}(0 \cdot x) = 0$  ist klar.

(ii) Zu  $x, y \in X, \varepsilon > 0$  wähle  $\lambda_x, \lambda_y \geq 0$  mit

$$\begin{aligned} \varphi_{\bar{x}}(x) &\geq \varphi(x + \lambda_x \cdot \bar{x}) - \lambda_x \cdot \varphi(\bar{x}) - \varepsilon \\ \varphi_{\bar{x}}(y) &\geq \varphi(y + \lambda_y \cdot \bar{x}) - \lambda_y \cdot \varphi(\bar{x}) - \varepsilon \end{aligned}$$

Setze  $\lambda := \lambda_x + \lambda_y$ , dann gilt

$$\begin{aligned} \varphi_{\bar{x}}(x) + \varphi_{\bar{x}}(y) &\geq \varphi(x + \lambda_x \cdot \bar{x}) + \varphi(y + \lambda_y \cdot \bar{x}) - \lambda \cdot \varphi(\bar{x}) - 2\varepsilon \\ &\geq \varphi(x + y + \lambda \cdot \bar{x}) - \lambda \cdot \varphi(\bar{x}) - 2\varepsilon \\ &\geq \varphi_{\bar{x}}(x + y) - 2\varepsilon \end{aligned} \quad (\text{nach Definition})$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, gilt  $\varphi_{\bar{x}}(x) + \varphi_{\bar{x}}(y) \geq \varphi_{\bar{x}}(x + y)$ . Also ist  $\varphi_{\bar{x}}$  sublinear.

$\varphi_{\bar{x}} \leq \varphi$  ist klar mit  $\lambda = 0$ . Da  $\varphi$  minimal ist, folgt  $\varphi_{\bar{x}} = \varphi$ . Wir erhalten

$$\varphi(x) + 1 \cdot \varphi(\bar{x}) \leq \varphi(x + 1 \cdot \bar{x}) \stackrel{\text{sublinear}}{\leq} \varphi(x) + 1 \cdot \varphi(\bar{x})$$

für jedes  $x, \bar{x} \in X$ . Also ist  $\varphi$  additiv und somit linear.  $\square$

## 2.21. Satz von Hahn-Banach

Sei  $X$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $\varphi \in \mathcal{S}(X)$ . Dann existiert  $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\psi \leq \varphi$ .

*$X$  ist nicht zwangsweise endlich-dimensional!*

### Beweis

Sei  $\mathcal{S}_\varphi := \{\varphi' \in \mathcal{S}(X) \mid \varphi' \leq \varphi\} \ni \varphi$ . Nach Proposition 2.19 ist  $\mathcal{S}(X)$  und damit auch  $\mathcal{S}_\varphi$  nach unten induktiv geordnet. Nach dem Lemma von Zorn enthält  $\mathcal{S}_\varphi$  ein minimales Element  $\psi$ .  $\psi$  ist auch minimal in  $\mathcal{S}(X)$  (Warum?). Also ist  $\psi$  linear nach Proposition 2.20.  $\square$

Wichtige Folgerungen: Fortsetzungs- und Trennungssätze.

## 2.22. Satz

Sei  $X$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  sublinear. Sei  $Y \subset X$  ein linearer Unterraum und  $\psi: Y \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\psi \leq \varphi|_Y$ . Dann existiert  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\bar{\psi}|_Y = \psi$  und  $\bar{\psi} \leq \varphi$ .

### Beweis

Definiere  $\tilde{\varphi}: X \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $\tilde{\varphi}(x) := \inf_{y \in Y} (\varphi(x - y) + \psi(y))$ ,  $x \in X$ . Es gilt  $0 \leq \varphi(x + y - x - y) \leq \varphi(x - y) + \varphi(-x) + \varphi(y)$ , womit folgt

$$\varphi(x - y) + \psi(y) \geq \varphi(-y) - \varphi(-x) - \psi(-y) \geq -\varphi(-x) > -\infty \quad \forall x \in X, y \in Y$$

Also ist  $\tilde{\varphi}$  wohldefiniert. Analog zu 2.20 folgt, dass  $\tilde{\varphi}$  sublinear ist. Nach dem Satz von Hahn-Banach (2.21) existiert ein  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\bar{\psi} \leq \tilde{\varphi} \leq \varphi$ . Es bleibt nur  $\bar{\psi}|_Y = \psi$  zu zeigen.

Für  $y_0 \in Y$  gilt  $\tilde{\varphi}(y_0) = \inf_{y \in Y} (\varphi(y_0 - y) + \psi(y))$  und somit folgt  $\tilde{\varphi}|_Y \leq \psi$  mittels  $y = y_0$ . Weiter folgt aus 2.20, dass  $\psi$  minimal in  $\mathcal{S}(Y)$  ist. Also muss insgesamt gelten:

$$\bar{\psi}|_Y \leq \tilde{\varphi}|_Y \leq \psi \implies \bar{\psi} = \psi|_Y \quad \square$$

## 2.23. Satz

Sei nun  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum und  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  eine Halbnorm. Sei  $Y \subset X$  ein Untervektorraum und  $\psi: Y \rightarrow \mathbb{K}$  linear mit  $|\psi(y)| \leq p(y)$  für  $y \in Y$ . Dann existiert  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{K}$  linear mit  $\bar{\psi}|_Y = \psi$  und

$$|\bar{\psi}(x)| \leq p(x) \quad \text{für } x \in X$$

### Beweis

Sei zunächst  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ .  $p$  ist sublinear und es gilt  $\psi \leq p|_Y$ . Nach 2.22 existiert eine lineare Fortsetzung  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\bar{\psi} \leq p$ . Es gilt auch

$$-\bar{\psi}(x) = \bar{\psi}(-x) \leq p(-x) = p(x) \implies |\bar{\psi}(x)| \leq p(x) \quad \text{für } x \in X$$

Sei nun  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . Definiere  $\psi_1 := \operatorname{Re}(\psi): Y \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann ist  $\psi_1$   $\mathbb{R}$ -linear (warum?). Es gilt  $|\psi_1(y)| \leq |\psi(y)| \leq p(y)$ ,  $y \in Y$ . Es existiert also ein  $\mathbb{R}$ -lineares  $\bar{\psi}_1: X \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$\bar{\psi}_1(y) = \psi_1(y), \quad y \in Y \quad \text{und} \quad |\bar{\psi}_1(x)| \leq p(x), \quad x \in X$$

Definiere jetzt  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{C}$  durch  $\bar{\psi}(x) := \bar{\psi}_1(x) - i \cdot \bar{\psi}_1(i \cdot x)$ ,  $x \in X$ . Dann ist  $\bar{\psi}$   $\mathbb{C}$ -linear (warum?). Weiter gilt  $\bar{\psi}(y) = \psi(y)$  für  $y \in Y$ . ( $\operatorname{Re}(\bar{\psi}|_Y) = \operatorname{Re}(\psi)$  und  $\bar{\psi}|_Y$  und  $\psi$  sind beide  $\mathbb{C}$ -linear). Zu  $x \in X$  wähle  $\lambda \in \mathbb{C}$  mit  $|\lambda| = 1$  und

$$|\bar{\psi}(x)| = \lambda \cdot \bar{\psi}(x) = \bar{\psi}(\lambda \cdot x) = \bar{\psi}_1(\lambda \cdot x) \leq p(\lambda \cdot x) = |\lambda| \cdot p(x) = p(x) \quad \square$$

## 2.24. Satz

Sei  $X$  ein normierter  $\mathbb{K}$ -Vektorraum,  $Y \subset X$  ein Unterraum und  $\psi: Y \rightarrow \mathbb{K}$  linear und stetig. Dann existiert eine stetige, lineare Fortsetzung  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{K}$  mit  $\|\bar{\psi}\|_{\mathcal{L}(X, \mathbb{K})} = \|\psi\|_{\mathcal{L}(Y, \mathbb{K})}$ .

### Beweis

Definiere eine Halbnorm durch  $p(x) := \|x\| \cdot \|\psi\|$ . Wegen 2.7 gilt  $|\psi(x)| \leq p(x)$ , also besitzt  $\psi$  nach Satz 2.23 eine lineare Fortsetzung  $\bar{\psi}$  mit  $|\bar{\psi}(x)| \leq p(x) = \|\psi\| \cdot \|x\|$ ,  $x \in X$ . Es folgt  $\|\bar{\psi}\| \leq \|\psi\| \cdot \|\psi\| \leq \|\bar{\psi}\|$  ist trivial, da  $\psi|_Y = \bar{\psi}$ .  $\square$

### 2.25. Definition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Sei  $M \subset X$  eine Teilmenge.  $M$  heißt **konvex**, falls für  $a, b \in M$ ,  $\lambda \in [0, 1]$  gilt

$$(1 - \lambda) \cdot a + \lambda \cdot b \in M$$

Ist  $X$  ein topologischer Vektorraum und  $M \subset X$  konvex, so ist auch  $\overline{M}$  konvex.<sup>4</sup> Ist  $N \subset X$  eine beliebige Teilmenge, so definieren wir die **konvexe Hülle** von  $N$  durch

$$\text{conv}(N) := \bigcap_{\substack{N \subset M \subset X \\ M \text{ konvex}}} M$$

$\text{conv}(N)$  ist konvex. (warum?)

### 2.26. Satz

Sei  $X$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum,  $\emptyset \neq M \subset X$  konvex,  $\varphi \in \mathcal{S}(X)$ . Dann existiert  $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\psi \leq \varphi$  und

$$\inf_{y \in M} \varphi(y) = \inf_{y \in M} \psi(y) \quad [*]$$

### Beweis

Setze  $\mu := \inf_{y \in M} \varphi(y)$ . Falls  $\mu = -\infty$ , so folgt die Behauptung aus dem Satz von Hahn-Banach 2.21. [\*] ist dann trivialerweise erfüllt. Sei also  $\mu \in \mathbb{R}$ . Definiere  $\tilde{\varphi}: X \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$\tilde{\varphi}(x) := \inf_{y \in M, \lambda \geq 0} (\varphi(x + \lambda \cdot y) - \lambda \cdot \mu), \quad x \in X$$

Es gilt  $\varphi(x + \lambda \cdot y) - \lambda \cdot \mu \geq -\varphi(-x)$  für  $x \in X, y \in M, \lambda \geq 0$  (siehe 2.20). Also ist  $\tilde{\varphi}(x) \geq -\varphi(-x) > -\infty$  und  $\tilde{\varphi}$  somit wohldefiniert.  $\tilde{\varphi}$  ist sublinear:

(i)  $\tilde{\varphi}(\gamma \cdot x) = \gamma \cdot \tilde{\varphi}(x)$ , für  $x \in X, \gamma \geq 0$ , wie in 2.22.

(ii) Seien  $x, z \in X$  und  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $y_x, y_z \in M$ ,  $\lambda_x, \lambda_z \geq 0$  mit

$$\tilde{\varphi}(x) \geq \varphi(x + \lambda_x \cdot y_x) - \lambda_x \cdot \mu - \varepsilon \quad \text{und} \quad \tilde{\varphi}(z) \geq \varphi(z + \lambda_z \cdot y_z) - \lambda_z \cdot \mu - \varepsilon$$

Es folgt

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(x) + \tilde{\varphi}(z) &\geq \varphi(x + z + \lambda_x \cdot y_x + \lambda_z \cdot y_z) - (\lambda_x + \lambda_z) \cdot \mu - 2\varepsilon \\ &= \varphi\left(x + z + (\lambda_x + \lambda_z) \cdot \underbrace{\left(\frac{\lambda_x}{\lambda_x + \lambda_z} \cdot y_x + \frac{\lambda_z}{\lambda_x + \lambda_z} \cdot y_z\right)}_{\in M}\right) - (\lambda_x + \lambda_z) \cdot \mu - 2\varepsilon \\ &\geq \tilde{\varphi}(x + z) - 2\varepsilon \end{aligned}$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, gilt  $\tilde{\varphi}(x) + \tilde{\varphi}(z) \geq \tilde{\varphi}(x + z)$  für alle  $x, z \in X$ .

Nach Hahn-Banach (2.21) existiert  $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\psi \leq \tilde{\varphi} \leq \varphi$ . Für  $y \in M$  gilt

$$-\psi(y) = \psi(-y) \leq \tilde{\varphi}(-y) \leq \varphi(-y + 1 \cdot y) - 1 \cdot \mu = -\mu$$

also  $\mu \leq \psi(y) \leq \varphi(y)$ , woraus [\*] folgt.  $\square$

<sup>4</sup>für normierte Vektorräume siehe Anhang A.2

## 2.27. Satz

Sei  $X$  ein normierter  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $A, B \subset X$  nichtleere konvexe Teilmengen mit

$$\text{dist}(A, B) := \inf\{\|a - b\| \mid a \in A, b \in B\} > 0$$

Dann existiert  $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und linear mit  $\psi(A) \cap \psi(B) = \emptyset$ .

### Beweis

$A - B := \{a - b \mid a \in A, b \in B\} \subset X$  ist konvex. (Warum?) Nach Satz 2.26 existiert, da Normen sublinear sind,  $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$  linear mit  $\psi \leq \|\cdot\|$ , und

$$0 < \text{dist}(A, B) = \inf_{y \in A - B} \|y\| = \inf_{y \in A - B} \psi(y) = \inf_{a \in A} \psi(a) - \sup_{b \in B} \psi(b). \quad \square$$

### 3. Operatoren zwischen Banachräumen. Die Sätze von der offenen Abbildung und vom abgeschlossenen Graphen

#### 3.1. Proposition

Seien  $X, Y$  normierte Vektorräume,  $Y$  vollständig. Dann ist  $\mathcal{L}(X, Y)$  vollständig bezüglich  $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(X, Y)}$ .

##### Beweis

Sei  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}(X, Y)$  eine Cauchy-Folge bezüglich  $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(X, Y)}$ . Für  $x \in X$  ist dann auch  $(T_n x)_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$  Cauchy bezüglich  $\|\cdot\|_Y$  (Warum?)<sup>5</sup>. Da  $Y$  ein Banachraum ist, folgt  $T_n x \rightarrow y$  für ein  $y \in Y$ . Wir definieren  $T: X \rightarrow Y$  durch

$$T(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$$

für  $x \in X$ .  $T$  ist linear: Klar, da die  $T_n$  linear sind.  $T$  ist stetig:  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist Cauchy, also auch  $(\|T_n\|)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  eine Cauchyfolge, da wegen der umgekehrten Dreiecksungleich gilt

$$|\|T_n\| - \|T_m\|| \leq \|T_n - T_m\| \leq \varepsilon$$

Dann existiert  $C \geq 0$  mit  $\|T_n\|_{\mathcal{L}(X, Y)} \leq C$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , also gilt  $\|Tx\|_Y \leq C \cdot \|x\|_X$ ,  $x \in X$ , woraus  $\|T\|_{\mathcal{L}(X, Y)} \leq C$  und die Stetigkeit von  $T$  folgt. Also ist  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ .

Wir müssen nun noch zeigen, dass  $(T_n)_n \rightarrow T$  in der Operatornorm gilt. Da  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Cauchyfolge ist, existiert für  $\varepsilon > 0$  ein  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $\|T_n - T_m\|_{\mathcal{L}(X, Y)} < \frac{\varepsilon}{2}$  für  $n, m \geq n_0$ . Insbesondere gilt

$$\|(T_n - T_m)(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\|_{\mathcal{L}(X, Y)} \cdot \|x\|_X < \frac{\varepsilon}{2} \cdot \|x\|_X$$

für  $n, m \geq n_0$ ,  $x \in X$ . Weiter gilt

$$\begin{aligned} \|(T_n - T)(x)\|_Y &\leq \|(T_n - T_m)(x)\|_Y + \|(T_m - T)(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\|_X + \|(T_m - T)x\|_Y \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \|x\|_X + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \|x\|_X = \varepsilon \cdot \|x\|_X \end{aligned}$$

für  $n, m \geq n_0$  und  $m$  groß genug,  $x \in X$ . Damit folgt nun  $\|T_n - T\|_{\mathcal{L}(X, Y)} \leq \varepsilon$  für  $n \geq n_0$ , also  $T_n \rightarrow T$  bezüglich  $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(X, Y)}$ .  $\square$

#### 3.2. Corollar

- (i) Der Dualraum  $X^*$  eines normierten  $\mathbb{K}$ -Vektorraumes  $X$  ist vollständig.
- (ii) Falls  $\{0\} \neq X$  ein Banachraum ist, so ist  $\mathcal{L}(X, X)$  eine Banachalgebra.

##### Beweis

- (i)  $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$  und  $\mathbb{K}$  ist vollständig. Wende 3.1 an.
- (ii)  $\mathcal{L}(X, X)$  ist ein Banachraum nach 3.1.  $\mathcal{L}(X, X)$  ist eine normierte Algebra:
  - Es gilt  $\|\text{id}_X\|_{\mathcal{L}(X, X)} = 1$
  - Für  $S, T \in \mathcal{L}(X, X)$ ,  $x \in X$  gilt

$$\|(S \circ T)(x)\|_X \leq \|S\| \cdot \|Tx\|_X \leq \|S\| \cdot \|T\| \cdot \|x\|_X$$

Also ist  $\|S \circ T\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$ .  $\square$

<sup>5</sup>mit  $\|T_n x - T_m x\|_Y \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\|_X$

### 3.3. Definition und Proposition

Sei  $X$  ein normierter Raum. Definiere  $\iota_X: X \rightarrow X^{**} (= (X^*)^*)$  durch

$$x \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(x))$$

für  $x \in X$ . Die Abbildung  $\iota_X$  ist eine lineare Isometrie.

#### Beweis

**Wohldefiniertheit:** Die Linearität von  $\iota_X(x)$  ist klar. Mit

$$|\iota_X(x)(\varphi)| = |\varphi(x)| \leq \|\varphi\|_{X^*} \cdot \|x\|_X = \|x\|_X \cdot \|\varphi\|_{X^*}$$

folgt  $\|\iota_X(x)\|_{X^{**}} \leq \|x\|_X$ , also ist  $\iota_X(x)$  stetig.

$\iota_X$  ist linear: Für  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ ,  $x, y \in X$ ,  $\varphi \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = X^*$  gilt

$$\begin{aligned} \iota_X(\alpha \cdot x + \beta \cdot y)(\varphi) &= \varphi(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) = \alpha \cdot \varphi(x) + \beta \cdot \varphi(y) = \alpha \cdot \iota_X(x)(\varphi) + \beta \cdot \iota_X(y)(\varphi) \\ &= (\alpha \cdot \iota_X(x) + \beta \cdot \iota_X(y))(\varphi) \end{aligned}$$

**Isometrie:** Es bleibt zu zeigen:  $\|\iota_X(x)\|_{X^{**}} \geq \|x\|_X$  für  $0 \neq x \in X$ . Sei  $Y := \mathbb{K} \cdot x$  und  $\psi: Y \rightarrow \mathbb{K}$  gegeben durch  $\psi(\alpha \cdot x) := \alpha \cdot \|x\|_X$ . Dann ist  $Y \subset X$  ein linearer Unterraum und  $\psi$  linear mit  $\|\psi\| = 1$ . Nach Satz 2.24 existiert nun  $\bar{\psi}: X \rightarrow \mathbb{K}$  linear mit  $\bar{\psi}(x) = \psi(x) = \|x\|_X$  und  $\|\bar{\psi}\| = \|\psi\| = 1$ . Es gilt

$$\|\iota_X(x)\|_{X^{**}} \geq |\iota_X(x)(\bar{\psi})| = |\bar{\psi}(x)| = \|x\|_X \quad \square$$

### 3.4. Definition und Proposition

Seien  $X, Y$  normierte Räume. Definiere eine Abbildung  $\cdot^{\text{tr}}: \mathcal{L}(X, Y) \rightarrow \mathcal{L}(Y^*, X^*)$  durch  $T \mapsto T^{\text{tr}} = (\varphi \mapsto \varphi \circ T)$ .  $\cdot^{\text{tr}}$  ist eine lineare Isometrie und das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_X} & X^{**} \\ \downarrow T & & \downarrow T^{\text{tr tr}} = (T^{\text{tr}})^{\text{tr}} \\ Y & \xrightarrow{\iota_Y} & Y^{**} \end{array}$$

kommutiert für jedes  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ . Für  $\iota_{X^*}: X^* \rightarrow X^{***}$  und  $\iota_X^{\text{tr}}: X^{***} \rightarrow X^*$  gilt

$$\iota_X^{\text{tr}} \circ \iota_{X^*} = \text{id}_{X^*}$$

#### Beweis

(i) Für  $T, S \in \mathcal{L}(X, Y)$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ ,  $\varphi \in Y^*$  gilt

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot T + \beta \cdot S)^{\text{tr}}(\varphi) &= \varphi \circ (\alpha \cdot T + \beta \cdot S) \stackrel{\text{linear}}{=} \alpha \cdot (\varphi \circ T) + \beta \cdot (\varphi \circ S) = \alpha \cdot T^{\text{tr}}(\varphi) + \beta \cdot S^{\text{tr}}(\varphi) \\ &= (\alpha \cdot T^{\text{tr}} + \beta \cdot S^{\text{tr}})(\varphi) \end{aligned}$$

Damit ist  $\cdot^{\text{tr}}$  eine lineare Abbildung.

(ii) Für  $x \in X$ ,  $\psi \in Y^*$  gilt  $(\iota_Y \circ T)(x) = \psi(T(x))$ . Weiter gilt dann

$$\begin{aligned} (T^{\text{tr tr}} \circ \iota_X(x))(\psi) &= ((T^{\text{tr}})^{\text{tr}} \circ \iota_X(x))(\psi) = (\iota_X(x) \circ T^{\text{tr}})(\psi) = \iota_X(x)(T^{\text{tr}}(\psi)) \\ &= T^{\text{tr}}(\psi)(x) = \psi \circ T(x) \\ &= \iota_Y(T(x))(\psi) \end{aligned}$$

$\Rightarrow T^{\text{tr tr}} \iota_X(x) = \iota_Y(T(x)) = \iota_Y \circ T(x)$ . Also  $T^{\text{tr tr}} \circ \iota_X = \iota_Y \circ T$  und das Diagramm kommutiert.

(iii) Es ist  $|(T^{\text{tr}}\psi)(x)| = |\psi \circ T(x)| \leq \|\psi\|_{Y^*} \cdot \|Tx\|_Y \leq \|\psi\|_{Y^*} \cdot \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \cdot \|x\|_X$ . Also ist  $\|T^{\text{tr}}\psi\|_{X^*} \leq \|\psi\|_{Y^*} \cdot \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$  und damit folgt

$$\|T^{\text{tr}}\|_{\mathcal{L}(Y^*,X^*)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$$

Ebenso ist  $\|T^{\text{tr tr}}\|_{\mathcal{L}(X^{**},Y^{**})} \leq \|T^{\text{tr}}\|_{\mathcal{L}(Y^*,X^*)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$ . Andererseits gilt  $\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq \|T^{\text{tr tr}}\|_{\mathcal{L}(X^{**},Y^{**})}$  nach 3.3 und da das Diagramm kommutiert (Warum?).

$$\Rightarrow \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq \|T^{\text{tr}}\|_{\mathcal{L}(Y^*,X^*)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$$

also ist  $\cdot^{\text{tr}}$  eine Isometrie.

(iv) Für  $\varphi \in X^*$ ,  $x \in X$  gilt

$$(\iota_X^{\text{tr}} \circ \iota_{X^*}(\varphi))(x) = (\iota_{X^*}(\varphi) \circ \iota_X)(x) = \iota_X(x)(\varphi) = \varphi(x)$$

$$\Rightarrow \iota_X^{\text{tr}} \circ \iota_{X^*}(\varphi) = \varphi, \text{ also erhalten wir } \iota_X^{\text{tr}} \circ \iota_{X^*} = \text{id}_{X^*}.$$

□

### 3.5. Satz: Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit für Banachräume

Sei  $X$  ein Banachraum und  $Y$  ein normierter Raum. Sei  $M \subset \mathcal{L}(X, Y)$ , sodass die Menge

$$\left\{ x \mapsto \|Tx\|_Y \mid T \in M \right\} \subset C(X, \mathbb{R})$$

**punktwise gleichmäßig beschränkt** ist, d.h. für  $x \in X$  existiert  $C_x \geq 0$  mit  $\|Tx\|_Y \leq C_x$ ,  $T \in M$ . Dann existiert  $C \geq 0$  mit  $\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq C$ ,  $T \in M$ .

#### Beweis

Nach Corollar 1.12 (Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit für metrische Räume) existieren eine offene Kugel  $\emptyset \neq B(x_0, \varepsilon) \subset X$  und  $K \geq 0$  mit  $\|Tx\|_Y \leq K$  für  $x \in B(x_0, \varepsilon)$ ,  $T \in M$ . Für  $x \in X$  mit  $\|x\| \leq 1$  gilt

$$\begin{aligned} \|Tx\|_Y &= \frac{2}{\varepsilon} \cdot \left\| T\left(\frac{\varepsilon}{2} \cdot x\right) \right\|_Y = \frac{2}{\varepsilon} \cdot \left\| T\left(\frac{\varepsilon}{2} \cdot x + x_0 - x_0\right) \right\|_Y \\ &\leq \frac{2}{\varepsilon} \cdot \left( \left\| T\left(\underbrace{\frac{\varepsilon}{2} \cdot x + x_0}_{\in B(x_0, \varepsilon)}\right) \right\|_Y + \left\| T\left(\underbrace{x_0}_{\in B(x_0, \varepsilon)}\right) \right\|_Y \right) \\ &\leq \frac{2}{\varepsilon} (K + K) = \frac{4K}{\varepsilon} \end{aligned}$$

Es folgt  $\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \leq \frac{4K}{\varepsilon} =: C$ , also haben wir die gesuchte Konstante gefunden. □

### 3.6. Corollar

Sei  $Z$  ein normierter Raum und  $N \subset Z$  eine Teilmenge, so dass gilt: Für alle  $\varphi \in Z^*$  existiert  $C_\varphi \geq 0$  mit  $|\varphi(z)| \leq C_\varphi$ ,  $z \in N$ . Dann ist  $N$  beschränkt.

#### Beweis

$\iota_Z: Z \rightarrow Z^{**}$  ist eine Isometrie nach 3.3. Wende Satz 3.5 an mit

$$X = Z^*$$

$$Y = \mathbb{K}$$

$$M = \iota_Z(N) \subset Z^{**} = \mathcal{L}(Z^*, \mathbb{K})$$

Für  $\varphi \in X = Z^*$  existiert  $C_\varphi \geq 0$  mit  $|T\varphi| = |\iota_Z(z)(\varphi)| = |\varphi(z)| \leq C_\varphi$ , wo  $T = \iota_Z(z) \in M$  für ein  $z \in N$ . Nach 3.5 folgt: Es existiert ein  $C \geq 0$  mit  $\|z\|_Z = \|\iota_Z(z)\|_{Z^{**}} \leq C$ ,  $z \in N$ . □

Vergleiche 1.12, diese Aussage ist deutlich stärker! Dies verdanken wir in erster Linie der Linearität der betrachteten Abbildungen.



### 3.7. Corollar

Sei  $X$  ein Banachraum und  $Z$  ein normierter Raum.  $M \subset \mathcal{L}(X, Z)$  eine Teilmenge, so dass gilt: Für alle  $\varphi \in Z^*$  und  $x \in X$  existiert  $C_{x,\varphi} \geq 0$  mit

$$|\varphi(Tx)| \leq C_{x,\varphi}, \quad T \in M$$

Dann ist  $M$  beschränkt.

#### Beweis

Für jedes  $x \in X$  folgt aus Corollar 3.6 mit  $N := \{T(x) \mid T \in M\}$ , dass  $N$  beschränkt ist. Es folgt, dass  $\{x \mapsto \|T(x)\| \mid T \in M\}$  punktweise gleichmäßig beschränkt ist. Mit Satz 3.5 folgt:  $M$  ist beschränkt.  $\square$

### 3.8. Satz: Prinzip der offenen Abbildung

Seien  $X, Y$  Banachräume,  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  surjektiv. Dann ist  $T$  offen, d.h. für eine offene Menge  $U \subset X$  ist  $T(U) \subset Y$  offen.

#### Beweis

(i) Sei  $0 \in W \subset X$  offen, dann existiert  $\emptyset \neq V \subset Y$  offen mit  $V \subset \overline{T(W)}$ :

$0 \in W \subset X \Rightarrow B(0, \varepsilon) \subset W$  für ein  $\varepsilon > 0$ . Dann gilt

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} n \cdot B(0, \varepsilon) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} n \cdot W$$

Aus der Surjektivität von  $T$  folgt  $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} n \cdot T(W) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} n \cdot \overline{T(W)}$ . Nach dem Satz von Baire (1.10) folgt: Ein  $n \cdot \overline{T(W)}$  enthält eine nichtleere offene Teilmenge, also auch  $\overline{T(W)}$ .

(ii) Sei  $0 \in M \subset X$  offen, dann ist  $0$  ein innerer Punkt von  $\overline{T(M)}$ :

Die Abbildung  $X \times X \rightarrow X, (x_1, x_2) \mapsto x_1 - x_2$  ist stetig.<sup>6</sup>  $\Rightarrow$  es gibt  $0 \in W \subset X$  offen mit

$$W - W = \{x_1 - x_2 \mid x_1, x_2 \in W\} \subset M$$

Es folgt

$$\overline{T(M)} \supset \overline{T(W - W)} = \overline{T(W) - T(W)} \stackrel{(\text{Warum?})}{\supset} \overline{T(W)} - \overline{T(W)} \stackrel{(i)}{\supset} V - V$$

für  $\emptyset \neq V$  offen in  $Y$  wie in (i). Aber  $0 \in V - V = \bigcup_{y \in V} \{y\} - V$  ist offen in  $Y$ . Also ist  $0$  ein innerer Punkt von  $\overline{T(M)}$ .

(iii) Ist  $0 \in N \subset X$  offen, so existiert  $0 \in Z \subset Y$  offen mit  $Z \subset T(N)$ :

Sei  $\varepsilon_0 > 0$ . Wähle  $\varepsilon_i > 0, 1 \leq i \in \mathbb{N}$  mit  $\sum_{i=1}^{\infty} \varepsilon_i < \varepsilon_0$ . Nach (ii) gilt: Zu  $\varepsilon_i, i \in \mathbb{N}$  existiert ein  $\delta_i > 0$  mit

$$B_Y(0, \delta_i) \subset \overline{T(B_X(0, \varepsilon_i))}.$$

Es gilt  $\delta_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$ . Sei nun  $y \in B_Y(0, \delta_0) =: Z$ . Dann gilt  $y \in \overline{T(B_X(0, \varepsilon_0))}$ , also existiert  $x_0 \in B_X(0, \varepsilon_0)$  mit  $\|y - T(x_0)\|_Y < \delta_1$ . Folglich existiert  $x_1 \in B_X(0, \varepsilon_1)$  mit  $\|y - T(x_0) - T(x_1)\|_Y < \delta_2$ . Per Induktion folgt

$$\exists x_i \in B_X(0, \varepsilon_i) \text{ mit } \left\| y - \sum_{j=0}^i T(x_j) \right\|_Y < \delta_{i+1}, \quad i \in \mathbb{N}$$

$\sum_{i \in \mathbb{N}} x_i$  konvergiert in  $X$  und  $\left\| \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i \right\|_X < 2 \cdot \varepsilon_0$ , es gilt  $T(\sum_{i \in \mathbb{N}} x_i) = y$ . Es folgt

$$Z = B_Y(0, \delta_0) \subset T(B_X(0, 2 \cdot \varepsilon_0)) \subset T(N)$$

<sup>6</sup>Banachräume sind topologische Vektorräume

mit  $W$  als Urbild einer offenen Umgebung der  $0$  in  $M$

(iv) Sei  $U \subset X$  offen. Dann ist  $T(U) \subset Y$  offen:

Zu  $x \in U$  existiert  $0 \in N \subset X$  offen mit  $x + N \subset U$ , also  $T(x) + T(N) \subset T(U)$ . Nach (iii) existiert  $0 \in Z \subset Y$  offen mit  $Z \subset T(N)$ , also  $T(x) + Z \subset T(U)$ . Aber  $T(x) \in T(x) + Z$  ist offen in  $Y$  und  $T(U)$  ist Umgebung von  $T(x)$ .  $x \in U$  war beliebig, also ist  $T(U)$  offen.  $\square$

### 3.9. Corollar: Satz von der inversen Abbildung

Seien  $X, Y$  Banachräume,  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  bijektiv. Dann gilt  $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$ , d.h.  $T$  ist ein Homöomorphismus.

#### Beweis

Nach Satz 3.8 ist  $T$  offen und somit ist  $T^{-1}$  stetig.  $\square$

### 3.10. Corollar

Sei  $X$  ein Vektorraum und seien  $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$  zwei Topologien auf  $X$ , die durch Banachraumnormen  $\|\cdot\|_1$  und  $\|\cdot\|_2$  induziert sind. Falls  $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ , so gilt bereits  $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2$ .

#### Beweis

$\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2 \Rightarrow (X, \mathcal{T}_2) \xrightarrow{\text{id}_X} (X, \mathcal{T}_1)$  ist stetig und bijektiv, also ist  $\text{id}_X$  nach 3.9 ein Homöomorphismus.  $\square$

### 3.11. Corollar

Sei  $X$  ein Banachraum mit abgeschlossenen Teilräumen  $X_1, X_2$ , sodass  $X_1 \cap X_2 = \{0\}$  und  $X = X_1 + X_2$ . Dann sind  $X$  und  $X_1 \times X_2$  als topologische Vektorräume isomorph.

#### Beweis

Die Abbildung  $X_1 \times X_2 \rightarrow X, (x_1, x_2) \mapsto x_1 + x_2$  ist linear und bijektiv. Sie ist stetig, wegen

$$\|x_1 + x_2\|_X \leq \|x_1\|_X + \|x_2\|_X = \|(x_1, x_2)\|_{1, X_1 \times X_2}$$

Mit Corollar 3.9 folgt die Behauptung.  $\square$

## 4. $L^p$ -Räume und der Satz von Riesz-Fischer

### 4.1. Erinnerung

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein **Maßraum**.<sup>7</sup> Eine Abbildung  $f: X \rightarrow (-\infty, \infty]$  heißt **messbar**, falls  $f^{-1}(E) \in \Sigma$  gilt für  $E \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$  (Borelmengen<sup>8</sup>). Eine Abbildung  $s: X \rightarrow (-\infty, \infty]$  heißt **einfach**, falls  $s(X)$  endlich ist. Für  $f: X \rightarrow [0, \infty]$  messbar setzen wir

$$\int f \, d\mu := \sup \left\{ \int s \, d\mu \mid s \text{ einfach, messbar mit } 0 \leq s \leq f \right\}$$

Für  $f: X \rightarrow (-\infty, \infty]$  messbar setze  $\int f \, d\mu := \int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu$ , falls  $\int f_- \, d\mu < \infty$ . Betrachte

$$\mathcal{L}^1(\mu) := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ messbar} \mid \int |f| \, d\mu < \infty \right\}$$

mit der Halbnorm  $\|f\|_1 := \int |f| \, d\mu$ . Setze nun  $\mathcal{N}^1 := \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ messbar} \mid \int |f| \, d\mu = 0\}$ .  $L^1(\mu)$  ist ein topologischer Vektorraum (Topologie induziert durch  $\|\cdot\|_1$ ) und  $\mathcal{N}^1 \subset \mathcal{L}^1(\mu)$  ist ein abgeschlossener Untervektorraum. Definiere

$$L^1(\mu) := \mathcal{L}^1(\mu) / \mathcal{N}^1$$

$\|\cdot\|_1$  induziert eine wohldefinierte Norm auf  $L^1(\mu)$  – die wir auch wieder mit  $\|\cdot\|_1$  bezeichnen – via

$$\|f + \mathcal{N}^1\|_1 := \|f\|_1, \quad f \in \mathcal{L}^1(\mu) \quad (\text{Übung})$$

$(L^1(\mu), \|\cdot\|_1)$  ist ein Banachraum (siehe Analysis III, 9.23).

### 4.2. Beispiele

- (i)  $L^1(\mathbb{R}^n) := L^1(\mathbb{R}^n, \Lambda, \lambda)$ , wobei  $\Lambda$  die Lebesgue-messbaren Mengen sind und  $\lambda$  das Lebesgue-Maß ist.
- (ii)  $\ell^1(\mathbb{N}) := L^1(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \delta) = \{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid \sum |f(n)| < \infty\}$ , wobei  $\delta$  das Zählmaß<sup>9</sup> ist.

### 4.3. Definition und Proposition

Ähnlich wie oben definieren wir für einen Maßraum  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^p(\mu) &:= \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ messbar} \mid \int |f|^p \, d\mu < \infty \right\} \\ \mathcal{N}^p &:= \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ messbar} \mid \int |f|^p \, d\mu = 0 \right\} \end{aligned}$$

$\mathcal{L}^p(\mu)$  und  $\mathcal{N}^p$  sind Vektorräume. Wir setzen wieder

$$L^p(\mu) := \mathcal{L}^p(\mu) / \mathcal{N}^p$$

Definiere  $\|\cdot\|_p: \mathcal{L}^p(\mu) \rightarrow [0, \infty)$  durch  $\|f\|_p := (\int |f|^p \, d\mu)^{1/p}$ .  $\|\cdot\|_p$  induziert wieder eine Abbildung  $\|\cdot\|_p: L^p(\mu) \rightarrow [0, \infty)$  via  $\|f + \mathcal{N}^p\|_p := \|f\|_p$  für  $f \in \mathcal{L}^p$ .

<sup>7</sup> $X$  Menge,  $\Sigma$  eine  $\sigma$ -Algebra auf  $X$ ,  $\mu$  Maß

<sup>8</sup> $\sigma$ -Algebra, die von den offenen Intervallen mit rationalen Endpunkten aufgespannt wird, siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Borelsche\\_σ-Algebra](https://de.wikipedia.org/wiki/Borelsche_%C3%83-Algebra)

<sup>9</sup>siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Zählmaß\\_\(Maßtheorie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Zählmaß_(Maßtheorie))

### Beweis

$\mathcal{L}^p(\mu)$  ist Vektorraum: Für  $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$  und  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 \int |\alpha \cdot f + \beta \cdot g|^p d\mu &\leq \int (|\alpha \cdot f| + |\beta \cdot g|)^p d\mu \leq \int (2 \cdot \sup\{|\alpha \cdot f|, |\beta \cdot g|\})^p d\mu \\
 &\leq \int (2^p \cdot \sup\{|\alpha \cdot f|^p, |\beta \cdot g|^p\}) d\mu \\
 &\leq \int 2^p \cdot (|\alpha \cdot f|^p + |\beta \cdot g|^p) d\mu < \infty
 \end{aligned}$$

$\mathcal{N}^p$  ist Vektorraum: Wie obige Ungleichung, dann Linearität des Integrals anwenden.

$\|\cdot\|_p$  wohldefiniert auf  $L^p(\mu)$ : Übung (Blatt 6, Aufgabe 3). □

### 4.4. Proposition

Für  $\alpha, \beta \geq 0, p, q > 1$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  gilt die folgende Ungleichung

$$\alpha \cdot \beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q} \quad [\#]$$

Dies ist ein Spezialfall der Youngschen Ungleichung, [Wikipedia-Link](#) .

### Beweis

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \iff p + q = pq \iff (p-1)(q-1) = 1 \iff p(q-1) = q \iff q(p-1) = p$$

Falls  $\beta = \alpha^{p-1}$ , so gilt  $\alpha \cdot \beta = \alpha^p$  und

$$\frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q} = \frac{\alpha^p}{p} + \frac{(\alpha^{p-1})^q}{q} = \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\alpha^p}{q} = \alpha^p = \alpha \cdot \beta$$

Also gilt in diesem Fall Gleichheit in [#]. Für festes  $\alpha \geq 0$  betrachte  $f_\alpha: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  gegeben durch  $f_\alpha(\beta) := \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q} - \alpha \cdot \beta$ . Dann ist  $f_\alpha$  stetig auf  $[0, \infty)$  und differenzierbar auf  $(0, \infty)$ . Es gilt  $f'_\alpha(\beta) = \beta^{q-1} - \alpha$  und weiter

$$f'_\alpha(\beta) = 0 \iff \beta^{q-1} = \alpha \iff \beta = \alpha^{p-1}$$

Es ist  $f''_\alpha(\alpha^{p-1}) \geq 0$ , also hat  $f_\alpha$  bei  $\beta = \alpha^{p-1}$  ein lokales Minimum. Es gilt  $f_\alpha(\alpha^{p-1}) = 0 \leq f_\alpha(0)$ , also hat  $f_\alpha$  bei  $\beta = \alpha^{p-1}$  ein globales Minimum. Damit ist [#] bewiesen. □

### 4.5. Satz: Höldersche Ungleichung

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum. Seien  $p, q \geq 1$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ,  $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ ,  $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$ . Dann gilt  $f \cdot g \in \mathcal{L}^1(\mu)$  und

$$\|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

Die entsprechenden Aussagen gelten dann auch für  $L^p(\mu)$ ,  $L^q(\mu)$  und  $L^1(\mu)$ .

**Beweis**

Klar, falls  $\|f\|_p = 0$  oder  $\|g\|_q = 0$  (Warum?). Sei also  $\|f\|_p, \|g\|_q \neq 0$ . Nach Proposition 4.4 gilt für  $x \in X$

$$0 \leq \underbrace{\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}}_{=\alpha} \cdot \underbrace{\frac{|g(x)|}{\|g\|_q}}_{=\beta} \leq \underbrace{\frac{1}{p} \cdot \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}}_{\text{integrierbar}}$$

messbar

Es ist  $|f|^p, |g|^q \in \mathcal{L}^1(\mu)$ , also folgt aus obiger Ungleichung  $\frac{|f \cdot g|}{\|f\|_p \cdot \|g\|_q} \in \mathcal{L}^1(\mu)$ . Weiter gilt nun

$$\frac{\int |f \cdot g| d\mu}{\|f\|_p \cdot \|g\|_q} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{\int |f|^p d\mu}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{\int |g|^q d\mu}{\|g\|_q^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Es folgt also  $\int |f \cdot g| d\mu \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ . □

**4.6. Satz: Minkowskische Ungleichung**

Für  $1 < p < \infty$ ,  $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$  (bzw.  $L^p(\mu)$ ) gilt die **Minkowski-Ungleichung**

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

**Beweis**

Sei  $\|f + g\|_p > 0$  (sonst ist die Aussage trivial). Es gilt

$$|f + g|^p = |f + g|^{p-1} \cdot |f + g| \leq |f + g|^{p-1} \cdot (|f| + |g|)$$

Sei  $q > 1$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Es gilt  $|f + g|^{p-1} \in \mathcal{L}^q(\mu)$ , da  $|f + g|^{(p-1)q} = |f + g|^p \in \mathcal{L}^1(\mu)$ . Nach der Hölderschen Ungleichung 4.5 gilt

$$\begin{aligned} \int |f + g|^p d\mu &\leq \int |f + g|^{p-1} |f| d\mu + \int |f + g|^{p-1} |g| d\mu \leq \|f\|_p \cdot \left\| |f + g|^{p-1} \right\|_q + \|g\|_p \cdot \left\| |f + g|^{p-1} \right\|_q \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \cdot \left( \int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \cdot \left( \int |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Nach Umstellen der Ungleichung gilt also

$$\left( \int |f + g|^p d\mu \right)^{1 - \frac{1}{q}} = \left( \int |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$
□

**4.7. Corollar**

$L^p(\mu)$  ist ein normierter Vektorraum für  $1 \leq p < \infty$ .

**4.8. Definition und Proposition**

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^\infty(\mu) &:= \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ messbar} \mid \exists C \geq 0 : |f| \leq C \text{ fast überall}\} \\ \mathcal{N}^\infty &:= \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid f = 0 \text{ fast überall}\} \end{aligned}$$

Wir definieren  $L^\infty(\mu) := \mathcal{L}^\infty(\mu)/\mathcal{N}^\infty$ . Wir definieren eine Halbnorm auf  $\mathcal{L}^\infty(\mu)$  durch

$$\|f\|_\infty := \inf \{C \mid |f| \leq C \text{ fast überall}\}$$

Dies induziert wieder eine Norm auf  $L^\infty(\mu)$  durch  $\|f + \mathcal{N}^\infty\|_\infty := \|f\|_\infty$ . Damit ist  $(L^\infty(\mu), \|\cdot\|_\infty)$  ein normierter Vektorraum. Für  $f \in L^1(\mu)$ ,  $g \in L^\infty(\mu)$  gilt die Höldersche Ungleichung  $\|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty$ , also gilt  $f \cdot g \in L^1(\mu)$ .

**Beweis**

Übung!

□

## 4.9. Beispiele

(i)  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ,  $1 \leq p < \infty$ , also  $X = \{1, \dots, n\}$ ,  $\Sigma = \mathcal{P}(X)$ ,  $\mu = \text{Zählmaß}$ .

(ii)  $(\ell^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , also  $X = \mathbb{N}$ ,  $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ,  $\mu = \text{Zählmaß}$ . Dabei ist

$$\ell^p(\mathbb{N}) = \left\{ (a_n)_n \mid a_n \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{N}} |a_n|^p < \infty \right\}$$

für  $p < \infty$  bzw.  $\ell^p(\mathbb{N}) = \{\text{beschränkte Folgen}\}$  für  $p = \infty$ .

## 4.10. Proposition

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum und  $p, q > 1$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , bzw.  $p = 1$  und  $q = \infty$ . Die Abbildung  $\iota_p: L^p(\mu) \rightarrow L^q(\mu)^*$ , gegeben durch

$$\iota_p(f)(g) := \int f \cdot g \, d\mu$$

ist eine lineare Isometrie.

**Beweis**

$\iota_p(f): L^q(\mu) \rightarrow \mathbb{R}$  ist linear und wohldefiniert: Übung!

$\iota_p$  ist linear und wohldefiniert: Übung!

$\iota_p(f)$  ist beschränkt durch  $\|f\|_p$  nach Hölder (4.5), also ist  $\iota_p$  beschränkt durch 1. Noch zu zeigen: Zu  $f \in L^p(\mu)$  existiert  $g \in L^q(\mu)$  mit  $|\iota_p(f)(g)| = \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ , denn dann gilt  $\|\iota_p(f)\|_{L^q(\mu)^*} \geq \|f\|_p$ . Gegeben  $f \in L^p(\mu)$  setzen wir  $g := \text{sgn}(f) \cdot |f|^{p-1}$ . Dann ist  $|g|^q = |f|^p$ , also  $g \in L^q(\mu)$ . Weiter gilt dann

$$\int f \cdot g \, d\mu = \int |f| \cdot |f|^{p-1} \, d\mu = \int |f|^p \, d\mu = \left( \int |f|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \int |f|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

Für  $p = 1$  und  $q = \infty$  ist die Aussage eine Übungsaufgabe.

□

## 4.11. Satz von Riesz-Fischer

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum.  $L^p(\mu)$  ist vollständig für  $p \in [1, \infty]$ .

**Beweis**

Für  $p = \infty$  ist dies eine Übung (Blatt 7, Aufgabe 1). Sei also  $p < \infty$  und sei  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p(\mu)$  Cauchy.

**Behauptung:** Es gibt  $E_l \subset X, l \in \mathbb{N}$ , messbare Teilmenge mit  $\mu(E_l) < \infty$  und sodass für  $E := \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l$  gilt  $\chi_{X \setminus E} \cdot f_n = 0$  in  $L^p(\mu)$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Beweis: Übung (Blatt 7, Aufgabe 2, siehe Anhang A.3)

Wähle  $n_0 < n_1 < \dots$  mit  $\|f_n - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}$  für  $n > n_k, k \in \mathbb{N}$ . Für jedes  $l, k \in \mathbb{N}$  gilt  $|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \in L^p(\mu)$  und  $\chi_{E_l} \in L^q(\mu)$ , wobei  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Also ist nach Hölder (4.5) auch  $|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \cdot \chi_{E_l} \in L^1(\mu)$ . Weiter gilt für  $j \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^j \left\| |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \cdot \chi_{E_l} \right\|_1 \leq \sum_{k=0}^j \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \cdot \|\chi_{E_l}\|_q \leq \sum_{k=0}^j \frac{1}{2^k} \cdot \|\chi_{E_l}\|_q$$

$(\sum_{k=0}^j |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \cdot \chi_{E_l})_{j \in \mathbb{N}}$  ist eine aufsteigende Folge von integrierbaren Funktionen. Nach dem Satz von Lebesgue über monotone Konvergenz gilt:  $\sum_{k=0}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$  konvergiert auf  $E_l$  fast überall. Da abzählbare Vereinigungen von Nullmengen Nullmengen sind, folgt:  $\sum_{k=0}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$  konvergiert auf  $E$  fast überall. Also konvergiert  $\sum_{k=0}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$  auf  $X$  fast überall. Damit konvergiert auch  $\sum_{k=0}^{\infty} f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$  auf  $X$  fast überall. Nach Auflösen der Wechselsumme stellen wir fest, dass also auch  $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  auf  $X$  fast überall konvergiert. Setze

$$f(x) := \begin{cases} \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x), & \text{falls der Limes existiert} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$f$  ist als Limes messbarer Funktionen messbar. Weiter gilt  $|f_{n_k}|^p \rightarrow |f|^p$  fast überall. Noch zu zeigen:  $f \in L^p(\mu)$ . Die Folge  $(\|f_{n_k}\|_p^p)_k$  ist beschränkt, da  $(f_n)_n$  eine Cauchyfolge bezüglich  $\|\cdot\|_p$  ist. Es gilt

$$|f|^p \stackrel{\text{f.ü.}}{=} \liminf |f_{n_k}|^p$$

$$\int |f|^p d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int |f_{n_k}|^p d\mu < \infty$$


nach dem Lemma von Fatou<sup>10</sup>. Also gilt  $f \in L^p(\mu)$ . Noch zu zeigen:  $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$  bezüglich  $\|\cdot\|_p$ . Sei dazu  $j \in \mathbb{N}$ . Sei  $n \geq n_j$ . Für  $i > j$  gilt

$$\|f_n - f_{n_i}\|_p \leq \|f_n - f_{n_j}\|_p + \|f_{n_j} - f_{n_i}\|_p < 2 \cdot \frac{1}{2^j}$$

Weiter gilt  $|f_n - f_{n_i}|^p \xrightarrow{i \rightarrow \infty} |f_n - f|^p$  fast überall. Mit dem Lemma von Fatou folgt

$$\int |f_n - f|^p d\mu \leq \liminf_{i \rightarrow \infty} \int |f_n - f_{n_i}|^p d\mu \leq \left(2 \cdot \frac{1}{2^j}\right)^p$$

$\Rightarrow \|f_n - f\|_p \leq 2 \cdot \frac{1}{2^j}$ , falls  $n \geq n_j$ . Also gilt  $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . □

<sup>10</sup>siehe Analysis III. 9.23 oder [https://de.wikipedia.org/wiki/Lemma\\_von\\_Fatou](https://de.wikipedia.org/wiki/Lemma_von_Fatou) 

## 5. Schwache Topologien, Reflexivität

### 5.1. Definition

Sei  $X$  ein normierter  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Die **schwache Topologie**  $\mathcal{T}_X^w$  ist die grösste<sup>11</sup> Topologie auf  $X$ , sodass alle  $\varphi \in X^*$  stetig sind.

### 5.2. Bemerkung

(i) Jedes  $\varphi \in X^*$  ist – nach Definition von  $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$  – stetig bezüglich  $\mathcal{T}_X^{\|\cdot\|}$ , d.h.  $\mathcal{T}_X^w \subset \mathcal{T}_X^{\|\cdot\|}$ . Mit anderen Worten: Die Abbildung  $\text{id}_X: (X, \mathcal{T}_X^{\|\cdot\|}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_X^w)$  ist stetig.

(ii) Mengen der Form  $\varphi^{-1}(U)$  für  $U \subset \mathbb{K}$  offen,  $\varphi \in X^*$  bilden eine Subbasis für  $\mathcal{T}_X^w$ . Mengen der Form

$$\bigcap_{i=1}^n \varphi_i^{-1}(U_i) \quad , \quad U_i \subset \mathbb{K} \text{ offen, } \varphi_i \in X^*$$

bilden eine Basis für  $\mathcal{T}_X^w$ .

### 5.3. Proposition

Die schwache Topologie  $(X, \mathcal{T}_X^w)$  ist Hausdorffsch.

#### Beweis

Seien  $x \neq y \in X$ . Nach Hahn-Banach existiert  $\varphi \in X^*$  mit  $\varphi(x) \neq \varphi(y)$ . Setze  $\varepsilon := \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{2} > 0$ , dann sind  $\varphi^{-1}(B_{\mathbb{K}}(\varphi(x), \varepsilon))$  und  $\varphi^{-1}(B_{\mathbb{K}}(\varphi(y), \varepsilon))$  disjunkte offene Umgebungen von  $x$  bzw.  $y$ .  $\square$

### 5.4. Proposition

Sei  $X$  ein normierter Raum,  $x \in X$ ,  $(x_\lambda)_\Lambda \subset X$  ein Netz. Dann sind äquivalent:

(i)  $x_\lambda \xrightarrow{w} x$ , d.h.  $x_\lambda$  konvergiert gegen  $x$  in der schwachen Topologie  $\mathcal{T}_X^w$ .

(ii)  $\varphi(x_\lambda) \rightarrow \varphi(x)$  für alle  $\varphi \in X^*$ .

#### Beweis

(i)  $\Rightarrow$  (ii): Sei  $\varphi \in X^*$  und  $\varepsilon > 0$ . Es ist  $\varphi(x) \in B_{\mathbb{K}}(\varphi(x), \varepsilon) \subset \mathbb{K}$  offen und  $\varphi$  stetig bezüglich  $\mathcal{T}_X^w$ , also

$$x \in \varphi^{-1}\left(B_{\mathbb{K}}(\varphi(x), \varepsilon)\right) \underset{\text{w-offen}}{\subset} X$$

Da  $x_\lambda \xrightarrow{w} x$  existiert ein  $\bar{\lambda} \in \Lambda$  mit  $x_\lambda \in \varphi^{-1}(B_{\mathbb{K}}(\varphi(x), \varepsilon))$ , falls  $\lambda \geq \bar{\lambda}$ . Dann folgt  $\varphi(x_\lambda) \in B_{\mathbb{K}}(\varphi(x), \varepsilon)$  falls  $\lambda \geq \bar{\lambda}$ , also  $\varphi(x_\lambda) \rightarrow \varphi(x)$  in  $\mathbb{K}$ .

(ii)  $\Rightarrow$  (i): Sei  $x \in V \subset X$  w-offen. Nach 5.2(ii) existieren  $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in X^*$ ,  $U_1, \dots, U_m$  offen in  $\mathbb{K}$  mit

$$x \in \varphi_1^{-1}(U_1) \cap \dots \cap \varphi_m^{-1}(U_m) \subset V$$

Wegen (ii) existieren  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \Lambda$  mit  $\varphi_i(x_\lambda) \in U_i$ , falls  $\lambda \geq \lambda_i$ . Wähle  $\bar{\lambda} \in \Lambda$  mit  $\bar{\lambda} \geq \lambda_1, \dots, \lambda_m$ . Dann gilt  $\varphi_i(x_\lambda) \in U_i$ , falls  $\lambda \geq \bar{\lambda}$  für alle  $i$ . Damit ist dann auch  $x_\lambda \in \varphi_i^{-1}(U_i)$  für alle  $i$ , falls  $\lambda \geq \bar{\lambda}$ . Also gilt  $x_\lambda \in \bigcap_{i=1}^m \varphi_i^{-1}(U_i) \subset V$ , falls  $\lambda \geq \bar{\lambda}$ .  $\square$

<sup>11</sup>auch: „dollste“



## 5.5. Corollar

Wenn  $x_\lambda \xrightarrow{w} x$ , dann ist  $(x_\lambda)_\Lambda \subset X$  beschränkt.

### Beweis

Wir betrachten zunächst die folgende Menge

$$\{\iota_X(x_\lambda) \mid \lambda \in \Lambda\} \subset \mathcal{L}(X^*, \mathbb{K}) = X^{**}.$$

Wir wollen zeigen, dass diese punktweise gleichmäßig beschränkt ist. Sei dazu  $\varphi \in X^*$  beliebig. Da  $\varphi(x_\lambda)$  nach 5.4 konvergent und somit auch beschränkt ist, gibt es ein  $C_\varphi > 0$  mit

$$|\iota_X(x_\lambda)(\varphi)| = |\varphi(x_\lambda)| \leq C_\varphi.$$

Nach 3.1 ist  $X^*$  vollständig, also können wir nun das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit anwenden und erhalten ein  $C > 0$  mit  $\|\iota_X(x_\lambda)\| \leq C$  für alle  $\lambda \in \Lambda$ . Da  $\iota_X$  isometrisch ist, gilt also auch  $\|x_\lambda\| \leq C$  für alle  $\lambda \in \Lambda$ , also ist das Netz beschränkt.  $\square$

## 5.6. Beispiel

Im Allgemeinen gilt

$$x_\lambda \xrightarrow{\|\cdot\|} x \not\Rightarrow x_\lambda \xrightarrow{w} x$$

Betrachte  $X = \ell^2(\mathbb{N})$  mit  $\|\cdot\|_2$ . Sei  $e_n \in \ell^2(\mathbb{N})$  gegeben durch  $e_n(m) := \delta_{n,m}$ . Dann gilt  $e_n \not\rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$  in  $\mathcal{T}^{\|\cdot\|_2}$ , denn  $\|e_n - 0\|_2 = \|e_n\|_2 \equiv 1 \not\rightarrow 0$ . Aber  $e_n \xrightarrow{w} 0$  für  $n \rightarrow \infty$ , denn es ist – wie wir später sehen werden –  $\ell^2(\mathbb{N})^* \cong \ell^2(\mathbb{N})$  via  $\langle a \mid b \rangle = \sum \overline{a(k)} \cdot b(k)$ . Es gilt aber

*Kronecker-Delta*

$$\langle a \mid e_n \rangle = \sum \overline{a(k)} \cdot e_n(k) = \overline{a(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Also gilt  $e_n \xrightarrow{w} 0$  für  $n \rightarrow \infty$ .

Direktes Argument: Übung (Aufgabe 3 von Blatt 7)

## 5.7. Proposition

Seien  $X, Y$  normierte Räume,  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  ein beschränkter (d.h. normstetiger) linearer Operator. Dann ist  $T$  auch stetig bezüglich der schwachen Topologie auf  $X$  und  $Y$ .

### Beweis

Zu zeigen: Falls  $U \subset Y$  schwach-offen ist, so ist  $T^{-1}(U)$  schwach-offen in  $X$ . Wir können annehmen, dass  $U$  von der Form  $\varphi^{-1}(B_{\mathbb{K}}(\lambda, \varepsilon))$ ,  $\varphi \in Y^*$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $\varepsilon > 0$  ist, da diese Mengen eine Subbasis bilden. Es gilt nun

$$T^{-1}\left(\varphi^{-1}(B_{\mathbb{K}}(\lambda, \varepsilon))\right) = \left(\underbrace{\varphi \circ T}_{\in X^*}\right)^{-1}(B_{\mathbb{K}}(\lambda, \varepsilon)) \underset{\text{w-offen}}{\subset} X \quad \square$$

## 5.8. Definition

Sei  $X$  ein normierter Raum. Die **w\*-Topologie**  $\mathcal{T}^{w*}$  ist die grösste Topologie auf  $X^*$ , sodass alle  $\iota_X(x) \in X^{**}$  stetig sind.

## 5.9. Bemerkung

- (i) Es gilt  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*} \subset \mathcal{T}_{X^*}^w \subset \mathcal{T}_{X^*}^{\|\cdot\|}$ .
- (ii) Mengen der Form  $W(\varphi, x, \varepsilon) := \{\psi \in X^* \mid |\psi(x) - \varphi(x)| < \varepsilon\}$  bilden eine Subbasis für  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*}$ . Mengen der Form  $\{\psi \mid \psi(x) \in U\}$  für  $U \subseteq \mathbb{K}$  offen bilden ebenfalls eine Subbasis für  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*}$ .
- (iii) Ein Netz  $(\varphi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X^*$  konvergiert  $w^*$  gegen  $\varphi \in X^*$  genau dann, wenn

$$\iota_X(x)(\varphi_\lambda) = \varphi_\lambda(x) \xrightarrow{\lambda} \varphi(x) = \iota_X(x)(\varphi)$$

für jedes  $x \in X$ .

- (iv)  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*}$  ist Hausdorff.

### Beweis

Übung!

## 5.10. Satz (Banach-Alaoglu)

Sei  $X$  ein normierter Raum. Dann ist die abgeschlossene Einheitskugel in  $X^*$

$$\overline{B}_{X^*}(0, 1) = \{\varphi \in X^* \mid \|\varphi\|_{X^*} \leq 1\}$$

$w^*$ -kompakt.

### Beweis

Für  $x \in X$  setze  $F_x := \mathbb{K}$  und  $F := \prod_{x \in X} F_x$ . Wir versehen  $F$  mit der Produkttopologie  $\mathcal{T}_F^\Pi$ . Definiere eine Abbildung  $\kappa: X^* \rightarrow F$  durch  $\kappa(\varphi)_x := \varphi(x)$ ,  $x \in X$ . Dann ist  $\kappa$  injektiv (warum?) und  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*}$  stimmt überein mit der durch  $\kappa$  und  $\mathcal{T}_F^\Pi$  induzierten Topologie auf  $X^*$ . Diese besteht aus den Mengen  $\{\kappa^{-1}(U) \mid U \in \mathcal{T}_F^\Pi\}$ . Eine Basis für  $\mathcal{T}_F^\Pi$  sind Mengen der Form

$$\prod_{x \in X} U_x, \quad U_x \subset \mathbb{K} \text{ offen}$$

mit  $U_x = \mathbb{K}$  für alle bis auf endlich viele  $x \in X$ . Eine Basis, für die durch  $\kappa$  und  $\mathcal{T}_F^\Pi$  induzierte Topologie auf  $X^*$  sind Mengen der Form

$$\kappa^{-1}\left(\prod_{x \in X} U_x\right) = \underbrace{\bigcap_{i=1}^n \{\varphi \mid \varphi(x_i) \in U_{x_i}\}}_{\text{bilden Basis für } \mathcal{T}_{X^*}^{w*}, 5.9(\text{ii})}$$

mit  $U_x$  wie oben. Dabei erhalten wir die  $x_i$  durch  $\kappa^{-1}(\prod_{x \in X} V_x) = \{\varphi \mid \varphi(x_i) \in U_{x_i}\}$ , wobei

$$V_x = \begin{cases} \mathbb{K}, & \text{falls } x \neq x_i \\ U_{x_i}, & \text{falls } x = x_i \end{cases}$$

Falls  $\|\varphi\| \leq 1$ , so gilt  $|\varphi(x)| \leq \|x\|_X$ , also

$$\kappa(\overline{B}_{X^*}(0, 1)) \subset \underbrace{\prod_{x \in X} \overline{B}_{\mathbb{K}}(0, \|x\|)}_{\text{kompakt nach Tychonov}} \subset F$$

Bleibt zu zeigen:  $\kappa(\overline{B}_{X^*}(0, 1)) \subset F$  ist abgeschlossen. Sei  $f \in \overline{\kappa(\overline{B}_{X^*}(0, 1))}$ . Dies definiert eine Abbildung  $\varphi_f: X \rightarrow \mathbb{K}$  durch  $\varphi_f(x) := f_x$ . Falls nun  $\varphi_f$  linear und stetig ist mit  $\|\varphi_f\| \leq 1$ , so gilt  $\kappa(\varphi_f) = f$ , denn  $\kappa(\varphi_f)_x = \varphi_f(x) = f_x$ . Damit folgt  $f \in \kappa(\overline{B}_{X^*}(0, 1))$  und dann ist  $\overline{B}_{X^*}(0, 1)$  kompakt.

**Additivität:** Seien  $y, z \in X$ ,  $\varepsilon > 0$ . Dann ist

$$W_\varepsilon := \left\{ g \in \prod_{x \in X} \overline{B}_{\mathbb{K}}(0, \|x\|) \mid \begin{array}{l} |g_{y+z} - f_{y+z}| < \varepsilon \\ |g_y - f_y| < \varepsilon \\ |g_z - f_z| < \varepsilon \end{array} \right\} \subset \text{offen} \prod_{x \in X} \overline{B}_{\mathbb{K}}(0, \|x\|)$$

Da  $f \in \overline{\kappa(\overline{B}_{X^*}(0, 1))}$  existiert ein  $g \in W_\varepsilon \cap \kappa(\overline{B}_{X^*}(0, 1))$ . Sei  $g' \in \overline{B}_{X^*}(0, 1)$  mit  $\kappa(g') = g$ .  $g' \in X^*$  ist linear, also gilt auch  $g_{y+z} = g_y + g_z$  und daher

$$|f_{y+z} - (f_y + f_z)| < \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  war beliebig, also  $f_{y+z} = f_y + f_z$  und  $\varphi_f(y+z) = \varphi_f(y) + \varphi_f(z)$ . Also ist  $\varphi$  additiv.

**Skalarmultiplikation:** analog.

Es gilt  $|\varphi_f(x)| = |f_x| \leq \|x\|$ ,  $x \in X$ , also  $\|\varphi_f\|_{X^*} \leq 1$ . □

### 5.11. Erinnerung

(a) Ein topologischer Raum  $X$  heißt

(i) **separabel**, falls  $X$  eine abzählbare dichte Teilmenge enthält.

(ii) **1. abzählbar**, falls gilt: Jedes  $x \in X$  besitzt abzählbar viele Umgebungen  $U_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , sodass jede Umgebung  $V$  von  $x$  wenigstens ein  $U_i$  enthält.

(iii) **2. abzählbar**, falls gilt:  $\mathcal{T}_X$  besitzt eine abzählbare Basis, d.h. es gibt offene Mengen  $W_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , sodass für jedes  $V \subset X$  offen gilt:  $V = \bigcup_{W_i \subset V} W_i$ .

(b) 2. abzählbar  $\Rightarrow$  1. abzählbar und separabel.

(c) Ist  $X$  kompakt und 1. abzählbar, so besitzt jede Folge in  $X$  eine konvergente Teilfolge.

Beweisskizze:  $(x_n)_n \subset X$ , setze  $A_n := \overline{\{x_n, x_{n+1}, \dots\}}$ . Dann ist  $\bigcap_n A_n$  nichtleer wegen Kompaktheit, also hat  $(x_n)_n$  einen Häufungspunkt. Benutze nun 1. abzählbar.

genauer ausführen

(d) Sei  $X$  kompakt und Hausdorff. Dann ist  $X$  metrisierbar  $\iff X$  ist 2. abzählbar.

Die Hinrichtung ist eine einfache Übungsaufgabe (Blatt 10, Aufgabe 3). Die Rückrichtung benutzt Urysohn und Metrisierungssätze. Den Satz von Urysohn haben wir auch in „Grundlagen der Analysis, Topologie und Geometrie“ im letzten Semester bewiesen.

### 5.12. Satz

Sei  $X$  ein separabler normierter Raum. Dann ist  $\overline{B}_{X^*}(0, 1)$  bezüglich  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*}$  metrisierbar. Insbesondere ist  $\overline{B}_{X^*}(0, 1)$  bezüglich  $\mathcal{T}_{X^*}^{w*}$  2. abzählbar und kompakt, und jede Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

**Beweis**

Sei  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \overline{B}_X(0, 1)$  dicht.<sup>12</sup> Definiere eine Abbildung  $d: X^* \times X^* \rightarrow [0, \infty)$  durch

$$d(\varphi, \psi) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} \cdot |\varphi(x_n) - \psi(x_n)|$$

Konvergenz mit  
Abschätzung durch  
Operatornorm und  
 $\|x_n\| \leq 1$

Wir zeigen, dass  $d$  eine Metrik ist:  $d$  ist offensichtlich symmetrisch und erfüllt die Dreiecksungleichung. Noch zu zeigen:  $d$  ist definit. Wenn  $\varphi \neq \psi$ , dann existiert  $x \in \overline{B}_X(0, 1)$  mit  $\varphi(x) \neq \psi(x)$ . Da  $\varphi$  und  $\psi$  stetig sind und  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  dicht ist, existiert  $x_n$  mit  $\varphi(x_n) \neq \psi(x_n)$ . Dann ist  $d(\varphi, \psi) \neq 0$ .

<sup>12</sup>Im Allgemeinen sind Unterräume separabler topologischer Räume nicht separabel. Für metrische Räume allerdings schon.

Sei nun  $(\varphi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset \overline{B}_{X^*}(0, 1)$  ein Netz und  $\varphi \in \overline{B}_{X^*}(0, 1)$ . Es genügt zu zeigen

$$\varphi_\lambda \xrightarrow{w^*} \varphi \iff d(\varphi_\lambda, \varphi) \rightarrow 0$$

denn dann stimmen  $\mathcal{T}_{X^*}^{w^*}$  und  $\mathcal{T}_{X^*}^d$  überein. (siehe Nachtrag)

" $\Rightarrow$ ": Es gelte  $\varphi_\lambda \xrightarrow{w^*} \varphi$ , also  $\varphi_\lambda(x_n) \rightarrow \varphi(x_n)$  für  $n \in \mathbb{N}$  nach 5.9(iii). Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $\sum_{n \geq n_0} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{4}$  und  $\bar{\lambda} \in \Lambda$  mit  $|\varphi_\lambda(x_n) - \varphi(x_n)| < \frac{\varepsilon}{4}$  falls  $n < n_0$ ,  $\lambda \geq \bar{\lambda}$ . Dann gilt für  $\lambda \geq \bar{\lambda}$

$$\begin{aligned} d(\varphi_\lambda, \varphi) &\leq \sum_{n < n_0} \frac{1}{2^n} \cdot |\varphi_\lambda(x_n) - \varphi(x_n)| + \sum_{n \geq n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \underbrace{|\varphi_\lambda(x_n) - \varphi(x_n)|}_{\leq 2} \\ &< 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon \end{aligned}$$

" $\Leftarrow$ ": Da  $d(\varphi_\lambda, \varphi) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} \cdot |\varphi_\lambda(x_n) - \varphi(x_n)| \rightarrow 0$ , muss bereits  $|\varphi_\lambda(x_n) - \varphi(x_n)| \rightarrow 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  gelten, da alle Summanden positiv sind. Wir haben also  $\forall n : \varphi_\lambda(x_n) \rightarrow \varphi(x_n)$ . Sei nun  $x \in X$  und  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $N \in \mathbb{N}$  sodass  $\|x - x_N\| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Weiter finden wir  $\bar{\lambda} \in \Lambda$ , sodass  $|\varphi_\lambda(x_n) - \varphi(x_n)| < \frac{\varepsilon}{3}$  für  $\lambda \geq \bar{\lambda}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} |\varphi_\lambda(x) - \varphi(x)| &\leq |\varphi_\lambda(x) - \varphi_\lambda(x_N)| + \underbrace{|\varphi_\lambda(x_N) - \varphi(x_N)|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} + |\varphi(x_N) - \varphi(x)| \\ &\leq \underbrace{\|\varphi_\lambda\|}_{\leq 1} \cdot \underbrace{\|x - x_N\|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{|\varphi_\lambda(x_N) - \varphi(x_N)|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{\|\varphi\|}_{\leq 1} \cdot \underbrace{\|x_N - x\|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} = \varepsilon \end{aligned}$$

Damit haben wir  $\varphi_\lambda(x) \rightarrow \varphi(x)$  für alle  $x$  gezeigt. Mit 5.9(iii) folgt also  $\varphi_\lambda \xrightarrow{w^*} \varphi$ .  $\square$

#### Nachtrag

Topologien sind durch Konvergenz von Netzen bestimmt: Sei  $(X, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum.

$$\begin{aligned} U \subset X \text{ offen} &\iff \forall x \in U : \exists x \in V \subset U, V \in \mathcal{T} \\ U \subset X \text{ nicht offen} &\iff \exists x \in U : \text{für jedes } x \in V \subset X \text{ gilt } V \cap (X \setminus U) \neq \emptyset \\ &\iff \text{offen} \\ &\stackrel{(\#)}{\iff} \exists x \in U, \exists \text{ Netz } (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X \setminus U \text{ mit } x_\lambda \rightarrow x \end{aligned}$$

Die Implikation  $\stackrel{(\#)}{\Leftarrow}$  ist trivial. Für  $\stackrel{(\#)}{\Rightarrow}$  betrachten wir die Menge  $\Lambda := \{V \mid x \in V \subset X \text{ offen}\}$ . Diese ist gerichtet bezüglich " $\subset$ ". Zu jedem  $V \in \Lambda$  wählen wir  $x_V \in (X \setminus U) \cap V$ . Dann gilt  $(x_V)_{V \in \Lambda} \subset X \setminus U$  und  $x_V \rightarrow x$ .  $\square$

Auswahlaxiom  
wird benötigt!

### 5.13. Definition

Der normierte Raum  $X$  heißt **reflexiv**, falls die kanonische Abbildung  $\iota_X : X \rightarrow X^{**}$  ein Isomorphismus ist. ( $\iota_X$  ist ein Isomorphismus genau dann, wenn  $\iota_X$  surjektiv ist.)

### 5.14. Proposition

Sei  $X$  ein reflexiver Banachraum und  $Y \subset X$  ein abgeschlossener Teilraum. Dann ist  $Y$  reflexiv.

**Beweis**

Sei  $\kappa: Y \hookrightarrow X$  die Inklusion. Dann ist  $\kappa \in \mathcal{L}(Y, X)$  und nach 3.4 kommutiert das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\iota_Y} & Y^{**} \\ \kappa \downarrow & & \downarrow \kappa^{\text{tr tr}} \\ X & \xrightarrow[\cong]{\iota_X} & X^{**} \end{array}$$

Sei  $f \in Y^{**}$ , dann existiert  $x \in X$  mit  $\iota_X(x) = \kappa^{\text{tr tr}}(f)$ . Für  $\varphi \in X^*$  gilt dann also

$$\varphi(x) = \iota_X(x)(\varphi) = \kappa^{\text{tr tr}}(f)(\varphi).$$

Aber  $(\kappa^{\text{tr}})^{\text{tr}}(f) = f \circ \kappa^{\text{tr}}$  und  $\kappa^{\text{tr}}(\varphi) = \varphi \circ \kappa = \varphi|_Y$ , also gilt  $\varphi(x) = f(\varphi|_Y)$  für jedes  $\varphi \in X^*$ . Falls  $x \notin Y$ , so existiert nach Hahn-Banach ein  $\psi \in X^*$  mit  $\psi|_Y = 0$ ,  $\psi(x) \neq 0$ . Damit folgt

$$0 \neq \psi(x) = f(\psi|_Y) = 0 \quad \text{!}$$

Also gilt  $x \in Y$ . Weiter gilt  $\iota_Y(x) = f$ , denn  $\kappa^{\text{tr tr}}$  ist injektiv. Andernfalls existiert  $0 \neq g \in Y^{**}$  mit  $\kappa^{\text{tr tr}}(g) = 0$ . Da  $g \neq 0$ , existiert ein  $\sigma \in Y^*$  mit  $g(\sigma) \neq 0$ . Nach Hahn-Banach existiert eine Fortsetzung  $\rho \in X^*$  mit  $\rho|_Y = \sigma$ . Nun gilt

$$0 = \kappa^{\text{tr tr}}(g)(\rho) = g \circ \kappa^{\text{tr}}(\rho) = g(\rho|_Y) = g(\sigma) \neq 0 \quad \text{!}$$

Also ist  $\kappa^{\text{tr tr}}$  injektiv. □

**5.15. Proposition**

Für einen Banachraum  $X$  gilt:  $X$  reflexiv  $\iff X^*$  reflexiv.

**Beweis**

" $\Rightarrow$ ":  $\iota_X: X \xrightarrow{\cong} X^{**}$  ist ein isometrischer Isomorphismus. Nach Blatt 6, Aufgabe 2 ist  $\iota_X^{\text{tr}}: X^{***} \rightarrow X^*$  auch ein isometrischer Isomorphismus. Nach 3.4 gilt  $\iota_X^{\text{tr}} \circ \iota_{X^*} = \text{id}_{X^*}$ , also ist  $(\iota_X^{\text{tr}})^{-1} = \iota_{X^*}$  ebenfalls ein isometrischer Isomorphismus.

" $\Leftarrow$ ": Wenn  $X^*$  reflexiv ist, dann ist nach " $\Rightarrow$ " auch  $X^{**}$  reflexiv. Nun ist aber  $\iota_X(X) \subset X^{**}$  abgeschlossen (da  $\iota_X$  Isometrie und  $X$  vollständig ist). Mit 5.14 folgt dann, dass auch  $\iota_X(X) \cong X$  reflexiv ist. □

Alternativ:  $\iota_{X^*}$  ist ein isometrischer Isomorphismus und es gilt wieder  $\iota_X^{\text{tr}} \circ \iota_{X^*} = \text{id}_{X^*}$ . Also ist auch  $\iota_X^{\text{tr}}$  ein isometrischer Isomorphismus und mit der Übungsaufgabe folgt dann wieder, dass auch  $\iota_X$  ein isometrischer Isomorphismus ist. □

**5.16. Satz**

Sei  $X$  ein Banachraum. Dann gilt (unter der Inklusion  $\iota_X: X \hookrightarrow X^{**}$ )

$$\overline{B}_X(0, 1) \underset{\text{w}^*-\text{dicht}}{\subset} \overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$$

**Beweis**

Zu zeigen: Zu  $f \in \overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$  und  $\varepsilon > 0$ , sowie  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in X^*$ , existiert ein  $x \in \overline{B}_X(0, 1)$  mit  $|f(\varphi_i) - \varphi_i(x)| < \varepsilon$  für  $i = 1, \dots, n$ . Behauptung: Gegeben  $f$  und  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  gilt

$$\inf_{x \in \overline{B}_X(0, 1)} \sum_{i=1}^n |f(\varphi_i) - \varphi_i(x)|^2 = 0$$

Sei  $h(x) := \sum_{i=1}^n |f(\varphi_i) - \varphi_i(x)|^2$  und  $\inf_{x \in \overline{B}_X(0,1)} h(x) =: \mu \geq 0$ . Wähle  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \overline{B}_X(0,1)$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} h(x_k) = \mu$ . Nach Übergang zu einer Teilfolge dürfen wir annehmen, dass  $(\varphi_i(x_k))_{k \in \mathbb{N}}$  gegen  $\gamma_i \in \mathbb{K}$  konvergiert für  $i = 1, \dots, n$ . Setze  $\delta_i := f(\varphi_i) - \gamma_i$ , dann gilt  $\mu = \sum_{i=1}^n |\delta_i|^2$ . Für  $y \in \overline{B}_X(0,1)$  und  $t \in [0,1]$  gilt nun

$$\begin{aligned} \mu &\leq h\left(\underbrace{(1-t) \cdot x_k + t \cdot y}_{\in \overline{B}_X(0,1)}\right) = \sum_{i=1}^n \left| f(\varphi_i) - (1-t) \cdot \varphi_i(x_k) - t \cdot \varphi_i(y) \right|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left| (f(\varphi_i) - \varphi_i(x_k)) - t \cdot (\varphi_i(y) - \varphi_i(x_k)) \right|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n |f(\varphi_i) - \varphi_i(x_k)|^2 + t^2 \cdot \sum_{i=1}^n |\varphi_i(y) - \varphi_i(x_k)|^2 \\ &\quad - 2t \cdot \operatorname{Re} \left( \sum_{i=1}^n (\varphi_i(y) - \varphi_i(x_k)) \cdot \overline{(f(\varphi_i) - \varphi_i(x_k))} \right) \\ &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{i=1}^n |f(\varphi_i) - \gamma_i|^2}_{=\mu} + t^2 \cdot \sum_{i=1}^n |\varphi_i(y) - \gamma_i|^2 - 2t \cdot \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n (\varphi_i(y) - \gamma_i) \cdot \overline{\delta_i} \end{aligned}$$

Nach Abziehen von  $\mu$  folgt für  $t > 0$

$$\begin{aligned} 0 &\leq t \cdot \sum_{i=1}^n |\varphi_i(y) - \gamma_i|^2 - 2 \cdot \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n (\varphi_i(y) - \gamma_i) \cdot \overline{\delta_i} \\ &\xrightarrow{t \searrow 0} 2 \cdot \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n (\varphi_i(y) - \gamma_i) \cdot \overline{\delta_i} \leq 0 \text{ für alle } y \in \overline{B}_X(0,1) \end{aligned}$$

Definiere nun  $\varphi \in X^*$  durch  $\varphi := \sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot \varphi_i \in X^*$ . Dann gilt für  $y \in \overline{B}_X(0,1)$

$$\operatorname{Re} \varphi(y) \leq \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n \gamma_i \cdot \overline{\delta_i},$$

also ist  $\|\varphi\|_{X^*} \leq \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n \gamma_i \cdot \overline{\delta_i}$ . Dies folgt durch Einsetzen der Definition von  $\|\varphi\|$  und Multiplikation mit  $|\lambda|$  für ein geeignetes  $\lambda \in S^1 \subset \mathbb{C}$ . Andererseits gilt aber

$$\varphi(x_k) = \sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot \varphi_i(x_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot \gamma_i,$$

das heißt  $|\sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot \gamma_i| \leq \|\varphi\| \leq \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n \gamma_i \cdot \overline{\delta_i}$  und somit  $\sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot \gamma_i = \|\varphi\|_{X^*}$ . Wir erhalten

$$\mu = \sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot \delta_i = \sum_{i=1}^n \overline{\delta_i} \cdot (f(\varphi_i) - \gamma_i) = f(\varphi) - \|\varphi\|_{X^*} \stackrel{\|f\| \leq 1}{\leq} 0 \quad \square$$

## 5.17. Corollar

Sei  $X$  ein Banachraum,  $f \in \overline{B}_{X^{**}}(0,1)$  und  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in X^*$ . Falls  $\overline{B}_X(0,1)$  w-kompakt ist, so existiert  $x \in \overline{B}_X(0,1)$  mit  $f(\varphi_i) = \varphi_i(x)$  für  $i = 1, \dots, n$ .

### Beweis

Definiere  $h: X \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $h(x) := \sum_{i=1}^n |f(\varphi_i) - \varphi_i(x)|^2$  wie in Satz 5.16.  $h$  ist stetig auf  $X$  bezüglich  $\mathcal{T}_X^w$ , nimmt also auf  $\overline{B}_X(0,1)$  ihr Minimum an.  $\square$

### 5.18. Satz

Sei  $X$  ein Banachraum. Dann sind äquivalent:

- (i)  $X$  ist reflexiv.
- (ii)  $\overline{B}_X(0, 1)$  ist  $w$ -kompakt.
- (iii)  $\mathcal{T}_{X^*}^w = \mathcal{T}_{X^{**}}^w$ .

#### Beweis

(i) $\Rightarrow$ (ii):  $\overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$  ist  $w^*$ -kompakt nach 5.10. Nach 5.15 ist  $X^*$  reflexiv, daher stimmen auf  $X^{**}$  die  $w^*$ - und die  $w$ -Topologie überein. Damit ist  $\overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$   $w$ -kompakt. Aber unter  $X \cong X^{**}$  stimmen die jeweiligen  $w$ -Topologien überein; daher ist  $\overline{B}_X(0, 1) \cong \overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$   $w$ -kompakt.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Es gilt  $(X, \mathcal{T}_X^w) \subset (X^{**}, \mathcal{T}_{X^{**}}^w)$  in der Relativtopologie (warum?).  $\overline{B}_X(0, 1)$  ist  $w$ -kompakt, also ist  $\overline{B}_X(0, 1) \subset \overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$   $w^*$ -abgeschlossen. Nach 5.16 ist  $\overline{B}_X(0, 1)$  sogar  $w^*$ -dicht. Also folgt  $\overline{B}_X(0, 1) = \overline{B}_{X^{**}}(0, 1)$  und somit  $X \cong X^{**}$ .

(iii) $\Rightarrow$ (i):  $\overline{B}_{X^*}(0, 1)$  ist  $w^*$ -kompakt nach Banach-Alaoglu (5.10). Mit (iii) folgt, dass  $\overline{B}_{X^*}(0, 1)$   $w$ -kompakt ist. Da (ii) $\Rightarrow$ (i) folgt, dass  $X^*$  reflexiv ist und somit ist nach 5.15 auch  $X$  reflexiv.

(i) $\Rightarrow$ (iii): klar. □

### 5.19. Bemerkung

a) Sei  $X$  ein normierter Raum. Falls  $X^*$  separabel ist, so ist  $X$  separabel.

bzgl. der Normtopologie

b) Für einen Banachraum  $X$  gilt:  $X$  reflexiv  $\iff \overline{B}_X(0, 1)$  ist folgenkompakt bezüglich  $\mathcal{T}_X^w$ .

#### Beweis

a) Übung (Blatt 10, Aufgabe 2)

b) " $\Rightarrow$ ": leicht.

" $\Leftarrow$ ": nicht so leicht. □

## 6. Gleichmäßig konvexe Räume, noch einmal $L^p$

### 6.1. Definition und Proposition

Ein normierter Raum  $X$  heißt **gleichmäßig konvex**, falls eine der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist:

- (i) Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert  $\delta > 0$ , sodass für  $x, y \in X$  mit  $\|x\|, \|y\| \leq 1$  gilt:

$$\|x - y\| \geq \varepsilon \implies \left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| \leq 1 - \delta$$

- (ii) Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert  $\delta > 0$ , sodass für  $x, y \in X$  mit  $\|x\|, \|y\| = 1$  gilt:

$$\|x - y\| \geq \varepsilon \implies \left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| \leq 1 - \delta$$

- (iii) Für  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  mit  $\|x_n\| = \|y_n\| = 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2}(x_n + y_n) \right\| = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$$

- (iv) Für  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  mit  $\limsup_n \|x_n\|, \limsup_n \|y_n\| \leq 1$  gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2}(x_n + y_n) \right\| = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$$

#### Beweis

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii): trivial; für (ii) $\Rightarrow$ (iii) einfach Implikation umkehren und Aussagen negieren.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): Aus  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2}(x_n + y_n) \right\| = 1$  folgt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n + y_n\| = 2$ . Wir haben


$$2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n + y_n\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n + y_n\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (\|x_n\| + \|y_n\|)$$

Also stimmen Limes superior und Limes inferior jeweils überein und es folgt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n\| = 1$ , woraus mit (iii) dann wiederum die gewünschte Implikation folgt.

(iv) $\Rightarrow$ (i): Angenommen (i) gilt nicht, d.h.  $\exists \varepsilon > 0$  und für jedes  $\delta_n = \frac{1}{n+1}$  existieren  $x_n, y_n \in X$  mit  $\|x_n\|, \|y_n\| \leq 1$ ,  $\|x_n - y_n\| \geq \varepsilon$  und  $\left\| \frac{1}{2}(x_n + y_n) \right\| > 1 - \frac{1}{n+1}$ .  $\nrightarrow$  zu (iv).  $\square$


### 6.2. Beispiel

$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$  ist gleichmäßig konvex für  $1 < p < \infty$  aber nicht für  $p = 1, p = \infty$



**Abbildung 1:** Einheitskugeln der  $p$ -Norm auf  $\mathbb{R}^2$  für  $p = 2$ ,  $p = 1$  und  $p = \infty$ . Nur für  $p \notin \{1, \infty\}$  ist (ii) aus 6.1 erfüllt. Anschaulich gesprochen bedeutet dies, dass nur in gleichmäßig konvexen Räumen Bälle auch tatsächlich „rund“ oder zumindest „rundlich“ sind.





**Abbildung 2:** Zeichnung zum Beweis von 6.3. Die Tatsache, dass  $\|x\|$  und  $\|x'\|$  in dieser Zeichnung nicht gleich sind, weist schon darauf hin, dass diese Zeichnung in Wahrheit „degeneriert“.

### 6.3. Definition und Proposition

Ein gleichmäßig konvexer normierter  $\mathbb{R}$ -Vektorraum ist **strikt konvex**, d.h. für alle  $0 \neq x, y \in X$  mit  $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$  existiert  $\lambda > 0$  mit  $x = \lambda \cdot y$ .

#### Beweis

Seien  $x, y$  wie angegeben. Ohne Einschränkungen sei  $\|x\| = 1$ . Wir setzen nun  $x' := \frac{x+y}{\|x+y\|}$ ,  $a := \frac{x+x'}{2}$ ,  $\alpha := \|a\|$  und  $\beta := \|x + y - a\|$ . Es gilt dann

$$\|x + y - x'\| = \left(1 - \frac{1}{\|x+y\|}\right) \cdot \|x+y\| = \|x+y\| - 1 = 1 + \|y\| - 1 = \|y\|$$

Also ist  $\beta = \|x + y - a\| \leq \left\|\frac{x+y-x}{2}\right\| + \left\|\frac{x+y-x'}{2}\right\| = \frac{\|y\|}{2} + \frac{\|y\|}{2} = \|y\|$ . Weiter gilt  $\alpha = \|a\| \leq \frac{\|x\|}{2} + \frac{\|x'\|}{2} = 1$  und

$$1 + \|y\| = \|x + y\| \leq \|a\| + \|x + y - a\| \leq \alpha + \beta \leq 1 + \|y\|$$

also  $1 \leq \alpha \leq 1$ . Wegen  $\|x\| = 1$ ,  $\|x'\| = 1$  und  $\left\|\frac{1}{2}(x+x')\right\| = \|a\| = \alpha = 1 > 1 - \delta$  für jedes  $\delta > 0$  erhalten wir aus gleichmäßiger Konvexität  $\|x - x'\| \leq \varepsilon$  für jedes  $\varepsilon > 0$ , also  $x = x'$ . Es folgt nun

$$x = \frac{x+y}{\|x+y\|} \iff \|x\| \cdot x + \|y\| \cdot x = x + y \iff \|y\| \cdot x = y \quad \square$$

### 6.4. Proposition

Sei  $X$  ein normierter  $\mathbb{R}$ -Vektorraum,  $a \in X$ ,  $W \subset X$  konvex und abgeschlossen.

- (i) Ist  $W$  strikt konvex, so existiert höchstens ein  $x \in W$  mit  $\|a - x\| = \inf_{y \in W} \|a - y\|$ .
- (ii) Ist  $X$  vollständig und gleichmäßig konvex, so existiert genau ein  $x \in W$  mit  $\|a - x\| = \inf_{y \in W} \|a - y\|$

#### Beweis

Wir dürfen ohne Einschränkungen  $a \neq 0$  annehmen. Für  $a \in W$  ist nichts zu beweisen. Für  $a \notin W$  gilt  $\inf_{y \in W} \|a - y\| > 0$ , denn  $W$  ist abgeschlossen. Ohne Einschränkungen dürfen wir außerdem  $\inf_{y \in W} \|a - y\| = 1$  annehmen.

- (i) Sei  $x, x' \in W$  mit  $\|a - x\| = \|a - x'\| = \inf_{y \in W} \|a - y\|$ , also  $\|x\| = \|x'\| = 1$ . Dann gilt

$$1 = \inf_{y \in W} \|a - y\| \leq \left\| \frac{1}{2}(x+x') \right\| \leq \frac{1}{2}\|x\| + \frac{1}{2}\|x'\| = 1$$

Es folgt aus strikter Konvexität, dass  $x = \lambda \cdot x'$  für ein  $\lambda \geq 0$ . Wegen  $\|x\| = \|x'\| = 1$  folgt  $\lambda = 1$  und  $x = x'$ .

(ii) Wähle eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset W$  mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a - x_n\| = \inf_{y \in W} \|a - y\| = 1$$

Behauptung: Diese Folge ist Cauchy.  $W$  ist konvex, also folgt  $\frac{1}{2}(x_n + x_m) \in W$ . Es gilt dann

$$1 \leq \left\| \frac{1}{2}(x_n + x_m) \right\| \leq \frac{1}{2}(\|x_n\| + \|x_m\|) \quad \text{für } n, m \in \mathbb{N} \quad [\#]$$

Angenommen  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sei nicht Cauchy. Dann existiert  $\varepsilon > 0$ , so dass gilt: Für jedes  $N \in \mathbb{N}$  existieren  $n, m > N$  mit  $\|x_n + x_m\| > \varepsilon$ . Wir können daher Teilfolgen  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ ,  $(x_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$  bilden mit  $\liminf_k \|x_{n_k} - x_{m_k}\| \geq \varepsilon$ . Es gilt aber  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_{n_k}\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_{m_k}\| = 1$  und wegen  $[\#]$  gilt  $\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2}(x_{n_k} + x_{m_k}) \right\| = 1 \not\leq$  zu 6.1 (iv). Die Folge ist also Cauchy und konvergiert damit gegen ein  $x \in W$ , da  $W$  vollständig ist. Nach (i) ist  $x$  eindeutig.  $\square$

## 6.5. Bemerkung

Der Beweis von (ii) zeigt auch: Sei  $X$  gleichmäßig konvex und  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  eine Folge mit  $\limsup_n \|x_n\| \leq 1$  und  $\lim_{n, m \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2}(x_n + x_m) \right\| = 1$ . Dann gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = 1$  und  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist Cauchy.

## 6.6. Proposition: Jensensche Ungleichung

Für  $\alpha, \beta \geq 0$ ,  $p \geq r > 0$  gilt

$$(\alpha^p + \beta^p)^{\frac{1}{p}} \leq (\alpha^r + \beta^r)^{\frac{1}{r}}.$$

**Beweis**

Setze  $A := (\alpha^r + \beta^r)^{\frac{1}{r}}$ , wobei wir o.B.d.A. annehmen können, dass  $A \neq 0$  ist. Dann gilt

$$1 = \frac{1}{A^r} \cdot (\alpha^r + \beta^r) = \left( \frac{\alpha}{A} \right)^r + \left( \frac{\beta}{A} \right)^r \geq \left( \frac{\alpha}{A} \right)^p + \left( \frac{\beta}{A} \right)^p$$

Es folgt  $\left( \frac{1}{A^p} \cdot (\alpha^p + \beta^p) \right)^{\frac{1}{p}} \leq 1 = \left( \frac{1}{A^r} (\alpha^r + \beta^r) \right)^{\frac{1}{r}}$ . Kürzen von  $\frac{1}{A}$  liefert die Behauptung.  $\square$

## 6.7. Proposition

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum,  $1 < p, q < \infty$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  und  $f, g \in L^p(\mu)$ .

(i) Falls  $p \geq 2$ , so gilt  $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \leq 2^{p-1} (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ .

(ii) Falls  $p < 2$ , so gilt  $\|f + g\|_p^q + \|f - g\|_p^q \leq 2 \cdot (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)^{q-1}$ .

**Beweis**

(i) Nach der Jensenschen Ungleichung (6.6) gilt für  $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$

$$\left( |\gamma + \delta|^p + |\gamma - \delta|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( |\gamma + \delta|^2 + |\gamma - \delta|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \cdot (\gamma^2 + \delta^2)^{\frac{1}{2}} \quad [\star]$$

Wir betrachten nun zunächst den Fall  $p > 2$ . Setze  $r := \frac{p}{p-2}$ . Dann gilt  $\frac{1}{2} + \frac{1}{r} = 1$ . Die Höldersche Ungleichung (4.5) für  $\mathbb{R}^2$  liefert für  $(\gamma^2, \delta^2)$  und  $(1, 1)$

$$\gamma^2 \cdot 1 + \delta^2 \cdot 1 \leq \left( (\gamma^2)^{\frac{r}{2}} + (\delta^2)^{\frac{r}{2}} \right)^{\frac{2}{p}} \cdot (1^r + 1^r)^{\frac{1}{r}} = (|\gamma|^p + |\delta|^p)^{\frac{2}{p}} \cdot 2^{\frac{p-2}{p}}$$

Es folgt

$$\sqrt{2} \cdot (\gamma^2 + \delta^2)^{\frac{1}{2}} \leq 2^{\frac{1}{2}} \cdot (|\gamma|^p + |\delta|^p)^{\frac{1}{p}} \cdot 2^{\frac{p-2}{2p}} = 2^{\frac{p-1}{p}} \cdot (|\gamma|^p + |\delta|^p)^{\frac{1}{p}}$$

Mit [\*] folgt insgesamt  $|\gamma + \delta|^p + |\gamma - \delta|^p \leq 2^{p-1} \cdot (|\gamma|^p + |\delta|^p)$ . Integration liefert nun (i). Für  $p = 2$  gilt Gleichheit in [\*] und auch hier liefert Integration das gewünschte Ergebnis.

(ii) Übung!

□

## 6.8. Satz

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum und  $1 < p < \infty$ . Dann ist  $L^p(\mu)$  gleichmäßig konvex.

### Beweis

Seien  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, (g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p(\mu)$  Folgen mit  $\|f_n\|_p = \|g_n\|_p = 1$  für  $n \in \mathbb{N}$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2}(f_n + g_n) \right\|_p = 1$ .

Wir zeigen, dass 6.1(iii) gilt, also  $\|f_n - g_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . Nach 6.7 gilt

$$\underbrace{\|f_n + g_n\|_p^p + \|f_n - g_n\|_p^p}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2^p} \leq 2^p$$

falls  $p \geq 2$ . Für  $p < 2$  erhalten wir mit  $q > 0$ , sodass  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

$$\underbrace{\|f_n + g_n\|_p^q + \|f_n - g_n\|_p^q}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2^q} \leq 2^q$$

Also folgt  $\|f_n - g_n\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  bzw.  $\|f_n - g_n\|_p^q \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . Also gilt  $\|f_n - g_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ .

□

## 6.9. Satz

Sei  $X$  ein gleichmäßig konvexer Banachraum. Dann ist  $X$  reflexiv.

### Beweis

Sei  $f \in X^{**}$  mit  $\|f\|_{X^{**}} = 1$ . Zu zeigen:  $f \in \iota(X)$ . Wir wählen  $\varphi_n \in X^*$  mit  $\|\varphi_n\|_{X^*} = 1$  und  $f(\varphi_n) > 1 - \frac{1}{n+1}$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Nach dem Beweis von 5.16 gilt für  $n \in \mathbb{N}$

$$\inf_{x \in \overline{B}_X(0,1)} \sum_{i=0}^n |f(\varphi_i) - \varphi_i(x)|^2 = 0$$

Also gibt es eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ , sodass  $\|x_n\|_X = 1$  und für  $0 \leq m \leq n$

$$|f(\varphi_m) - \varphi_m(x_n)| < \frac{1}{2(n+1)} \quad \text{also auch} \quad 1 - \frac{3}{2(m+1)} \leq \varphi_m(x_n) \leq 1$$

Behauptung:  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist Cauchy. Es gilt für  $n \geq m$

$$\underbrace{1 - \frac{3}{2(m+1)} + 1 - \frac{3}{2(m+1)}}_{\xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 2} \leq \varphi_m(x_m) + \varphi_m(x_n) = \varphi_m(x_m + x_n) \leq \|\varphi_m\| \cdot \|x_m + x_n\|_X$$

$$\leq \|x_m\|_X + \|x_n\|_X = 2$$

Frag mich nicht,  
wie man auf die  
zweite Abschätzung  
kommt...

Also gilt  $\left\| \frac{1}{2}(x_m + x_n) \right\|_X \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 1$ . Mit Bemerkung 6.5 folgt nun, dass  $(x_n)_\mathbb{N}$  Cauchy ist. Sei  $\bar{x} := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . Es gilt  $\|\bar{x}\|_X = 1$ . Behauptung:  $\iota_X(\bar{x}) = f$ . Für  $n \geq m$  gilt

$$\left| f(\varphi_m) - \underbrace{\varphi_m(x_n)}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi_m(\bar{x})} \right| < \frac{1}{2(n+1)}$$

$\varphi_m$  ist stetig, also ist  $f(\varphi_m) = \varphi_m(\bar{x}) = \iota(\bar{x})(\varphi_m)$  für jedes  $m \in \mathbb{N}$ . Sei  $\tilde{x} \in X$  ein weiterer Punkt mit  $\|\tilde{x}\| = 1$  und  $f(\varphi_m) = \varphi_m(\tilde{x})$ ,  $m \in \mathbb{N}$ . Das obige Argument für die Folge  $(\bar{x}, \tilde{x}, \bar{x}, \tilde{x}, \dots)$  liefert:  $(\bar{x}, \tilde{x}, \bar{x}, \tilde{x}, \dots)$  ist Cauchy und somit  $\bar{x} = \tilde{x}$ .

Noch zu zeigen:  $f(\varphi) = \varphi(\bar{x})$  für alle  $\varphi \in X^*$ . Das obige Argument für  $(\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \dots)$  an Stelle von  $(\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots)$  liefert eine Folge  $(y_n)_\mathbb{N} \subset X$  mit  $\|y_n\| = 1$ ,  $(y_n)_\mathbb{N}$  ist Cauchy; Dann erfüllt  $\bar{y} := \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  die Gleichung  $f(\varphi_m) = \varphi_m(\bar{y})$  für alle  $m \in \mathbb{N}$ . Also gilt auch  $f(\varphi) = \varphi(\bar{y})$ . Die Eindeutigkeit von  $\bar{x}$  liefert  $\bar{y} = \bar{x}$ . Damit folgt  $\iota(\bar{x})(\varphi) = \varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y}) = f(\varphi)$  für jedes  $\varphi \in X^*$ , also ist  $\iota(\bar{x}) = f$ .  $\square$

## 6.10. Corollar

Für einen Maßraum  $(X, \Sigma, \mu)$  und  $1 < p < \infty$  ist  $L^p(\mu)$  reflexiv.

### Beweis

Kombiniere die Aussagen aus 6.8 und 6.9.  $\square$

## 6.11. Satz

Sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum und  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Dann ist die Abbildung  $\iota_p: L^p(\mu) \rightarrow L^q(\mu)^*$  gegeben durch

$$\iota_p(f)(g) := \int fg \, d\mu$$

ein isometrischer Isomorphismus.

### Beweis

$\iota_p$  ist eine lineare Isometrie nach Proposition 4.10, wir müssen also nur Surjektivität zeigen.  $\iota_p(L^p(\mu))$  ist vollständig, also abgeschlossen in  $L^q(\mu)^*$ . Falls  $\iota_p(L^p(\mu)) \subsetneq L^q(\mu)^*$ , so existiert nach Hahn-Banach ein  $0 \neq \psi \in L^q(\mu)^{**}$  mit  $\psi(\iota_p(L^p(\mu))) = 0$ .  $L^q(\mu)$  ist reflexiv nach 6.10, also existiert  $g \in L^q(\mu)$  mit  $\iota(g) = \psi$ , d.h.  $\varphi(g) = \iota(g)(\varphi) = \psi(\varphi)$  für alle  $\varphi \in L^q(\mu)^*$ . Für jedes  $f \in L^p(\mu)$  gilt dann

$$0 = \psi(\iota_p(f)) = \iota_p(f)(g) = \int fg \, d\mu \implies g = 0 \quad \nexists$$

Also kann ein solches  $\psi$  nicht existieren und es folgt die Surjektivität von  $\iota_p$ .  $\square$

## 6.12. Bemerkung

- Weiter kann man zeigen, dass die kanonische Abbildung

$$\iota_\infty: L^\infty(\mu) \rightarrow L^1(\mu)^*, \quad \iota_\infty(f)(g) = \int fg \, d\mu$$

ein isometrischer Isomorphismus ist.

(ohne Beweis)

- Die Isometrie  $\iota_1: L^1(\mu) \rightarrow L^\infty(\mu)^*$  ist jedoch nicht surjektiv! (Übung, Blatt 10, Aufgabe 1)

## 7. Hilberträume und selbstadjungierte Operatoren

### 7.1. Definition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Eine **hermitesche Form** auf  $X$  ist eine Abbildung  $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$  mit

$$\langle x, y + y' \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, y' \rangle$$

$$\langle x, \alpha \cdot y \rangle = \alpha \cdot \langle x, y \rangle$$

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad \text{für } x, y, y' \in X, \alpha \in \mathbb{K}$$

linear im zweiten  
Eintrag

$\langle \cdot, \cdot \rangle$  heißt **positiv semidefinit**, falls  $\langle x, x \rangle \geq 0$  für  $x \in X$  und **positiv definit**, falls  $\langle x, x \rangle > 0$  für  $0 \neq x \in X$ . In diesem Fall heißt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  auch **Skalarprodukt**.

### 7.2. Bemerkung

Für eine hermitesche Form  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  und  $x, x', y \in X, \alpha \in \mathbb{K}$  gilt

$$\langle x + x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle, \quad \langle \alpha \cdot x, y \rangle = \overline{\alpha} \cdot \langle x, y \rangle \quad \text{und} \quad \langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$$

konjugiert linear im  
ersten Eintrag

### 7.3. Beispiele

(i) Auf  $\mathbb{C}^n$  definiert  $\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle := \sum_{i=1}^n \overline{x_i} \cdot y_i$  ein Skalarprodukt.

(ii) Auf  $L^2(\mathbb{R})$  definiert  $\langle f, g \rangle := \int f \overline{g} d\lambda$  ein Skalarprodukt. Auf

$$L^2_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) := \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \text{Re } f \text{ und } \text{Im } f \text{ messbar, } \int \overline{f} f d\lambda < \infty \right\} / \mathcal{N}$$

definiert  $\langle f, g \rangle := \int \overline{f} g d\lambda$  ein Skalarprodukt.

(iii) Auf  $\ell^2_{\mathbb{C}}(\mathbb{N})$  definieren wir ein Skalarprodukt durch  $\langle (a_n), (b_n) \rangle := \sum_{n \in \mathbb{N}} \overline{a_n} b_n$ .

### 7.4. Proposition (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)

Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit einer positiv semidefiniten hermiteschen Form. Dann gilt für  $x, y \in X$

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

#### Beweis

Für  $\lambda \in \mathbb{K}, x, y \in X$  gilt:

$$0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \cdot \langle x, y \rangle + \overline{\lambda} \cdot \langle y, x \rangle + \lambda \cdot \overline{\lambda} \cdot \langle y, y \rangle$$

Falls  $\langle y, y \rangle \neq 0$ , so setze  $\lambda := -\frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle}$ . Es folgt

$$0 \leq \langle x, x \rangle - \frac{\langle y, x \rangle \cdot \langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} + \overline{\lambda} \cdot \left( \langle y, x \rangle - \frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, y \rangle \right) = \langle x, x \rangle - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle}$$

Falls  $\langle x, x \rangle \neq 0$ , so vertausche die Rollen von  $x$  und  $y$ . Falls  $\langle x, x \rangle = \langle y, y \rangle = 0$  gilt, so setzen wir  $\lambda := -\langle y, x \rangle$  und erhalten

$$0 \leq -\langle y, x \rangle \cdot \langle x, y \rangle - \overline{\langle y, x \rangle} \cdot \langle y, x \rangle = -2 \cdot |\langle x, y \rangle|^2$$

Also muss in diesem Fall bereits  $|\langle x, y \rangle|^2 = 0$  und somit die gewünschte (Un-)Gleichung gelten.  $\square$

## 7.5. Proposition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit Skalarprodukt. Dann definiert  $x \mapsto \|x\| := \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}}$  eine Norm auf  $X$ .

### Beweis

$\langle \cdot, \cdot \rangle$  ist positiv definit, also ist auch  $\|\cdot\|$  positiv definit. Weiter gilt

$$\|\lambda \cdot x\| = \langle \lambda \cdot x, \lambda \cdot x \rangle^{\frac{1}{2}} = (\overline{\lambda} \lambda \cdot \langle x, x \rangle)^{\frac{1}{2}} = |\lambda| \cdot \|x\|$$

Die Dreiecksungleichung gilt, da

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &\stackrel{\text{c.s.}}{\leq} \langle x, x \rangle + 2 \cdot (\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle)^{\frac{1}{2}} + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \cdot \|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

Durch Wurzelziehen folgt  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ . □

## 7.6. Bemerkung

(i) Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung schreibt sich auch als  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ .

(ii) Die Abbildung  $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$  ist stetig:

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x', y' \rangle| &= |\langle x, y \rangle - \langle x', y \rangle + \langle x', y \rangle - \langle x', y' \rangle| = |\langle x - x', y \rangle + \langle x', y' - y \rangle| \\ &\leq |\langle x - x', y \rangle| + |\langle x', y' - y \rangle| \\ &\stackrel{\text{c.s.}}{\leq} \|x - x'\| \cdot \|y\| + \|x'\| \cdot \|y' - y\| \end{aligned}$$

## 7.7. Proposition


Für einen normierten Raum  $X$  sind äquivalent:

(i) Es gilt das **Parallelogrammgesetz**:  $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$  für alle  $x, y \in X$ .

(ii)

$$\langle x, y \rangle := \begin{cases} \frac{1}{4} \left( \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \cdot \|i \cdot x + y\|^2 - i \cdot \|-i \cdot x + y\|^2 \right), & \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{C} \\ \frac{1}{4} \left( \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right), & \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{R} \end{cases}$$

definiert ein Skalarprodukt auf  $X$ . In diesem Fall gilt  $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$  für alle  $x \in X$ ; insbesondere ist  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  stetig auf  $X \times X$ .



**Abbildung 3:** Die Parallellogrammgleichung in  $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ . Die gestrichelten Linien sind zusammen genauso lang wie die durchgezogenen. In  $\mathbb{C}$  lässt sich die Gleichung sehr einfach mittels  $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$  beweisen. Ein andere einfache Möglichkeit ist der Kosinussatz aus der Schule; [Wikipedia-Link](#).

**Beweis**

(ii)⇒(i): Wie man leicht nachrechnet gilt  $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$  für  $x \in X$ . (i) folgt ebenfalls durch eine einfache Rechnung.

(i)⇒(ii):  $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{C}$  ist stetig (klar). Linearität (für  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ): Es gilt

$$\begin{aligned} \langle x, y + y' \rangle &= \frac{1}{4} \left( \|x + y + y'\|^2 - \|-x + y + y'\|^2 + i\|ix + y + y'\|^2 - i\|-ix + y + y'\|^2 \right) \quad [*] \\ \langle x, y \rangle + \langle x, y' \rangle &= \frac{1}{4} \left( \|x + y\|^2 - \|-x + y\|^2 + i\|ix + y\|^2 - i\|-ix + y\|^2 + \right. \\ &\quad \left. \|x + y'\|^2 - \|-x + y'\|^2 + i\|ix + y'\|^2 - i\|-ix + y'\|^2 \right) \quad [**] \end{aligned}$$

Vergleich der Imaginärteile: Es gilt nach (i) sowohl

$$\|x + y + y'\|^2 = -\|x + y - y'\|^2 + 2\|x + y\|^2 + 2\|y'\|^2$$

als auch

$$\|x + y + y'\|^2 = -\|x - y + y'\|^2 + 2\|x + y'\|^2 + 2\|y\|^2$$

Wir multiplizieren beide Gleichungen mit  $\frac{1}{2}$ , addieren diese und erhalten

$$\|x + y + y'\|^2 = -\frac{1}{2} \left( \|x + y - y'\|^2 + \|x - y + y'\|^2 \right) + \|x + y\|^2 + \|x + y'\|^2 + \|y'\|^2 + \|y\|^2$$

Wir substituieren  $x$  mit  $-x$  und ziehen die Gleichungen voneinander ab

$$\|x + y + y'\|^2 - \|-x + y + y'\|^2 = \|x + y\|^2 + \|x + y'\|^2 - \|-x + y\|^2 - \|-x + y'\|^2$$

Also stimmen die Realteile von [\*] und [\*\*] überein. Der Beweis für die Imaginärteile erfolgt analog. Es gilt also  $\langle x, y \rangle + \langle x, y' \rangle = \langle x, y + y' \rangle$ . Daraus folgt

$$\begin{aligned} \langle x, \alpha \cdot y \rangle &= \alpha \cdot \langle x, y \rangle && \text{für } \alpha \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \\ \implies \langle x, \alpha \cdot y \rangle &= \alpha \cdot \langle x, y \rangle && \text{für } \alpha \in \mathbb{Z} \text{ (} \langle x, 0 \rangle = 0 \text{ ist trivial)} \end{aligned}$$

Es gilt nun für  $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$

$$\langle x, \alpha \cdot y \rangle = \frac{n}{n} \cdot \left\langle x, \frac{m}{n} \cdot y \right\rangle = \frac{m}{n} \cdot \left\langle x, \frac{n}{n} \cdot y \right\rangle = \alpha \cdot \langle x, y \rangle$$

Mit der Stetigkeit von  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  folgt nun  $\langle x, \alpha \cdot y \rangle = \alpha \cdot \langle x, y \rangle$  auch für  $\alpha \in \mathbb{R}$ .  $\langle x, i \cdot y \rangle = i \cdot \langle x, y \rangle$  ist klar und damit ist  $\langle x, \alpha \cdot y \rangle = \alpha \cdot \langle x, y \rangle$  für  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Also ist  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  linear in der zweiten Variablen.  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$  ist trivial.  $\square$

**7.8. Bemerkung**

Ist  $X$  ein  $\mathbb{C}$ -Vektorraum und  $q: X \times X \rightarrow \mathbb{C}$  eine **Sesquilinearform** (d.h.  $q$  ist linear in der zweiten Variable und konjugiert linear in der ersten), dann ist  $q$  durch die Abbildung  $n_q: X \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $n_q(x) := q(x, x)$  eindeutig bestimmt durch die **Polarisierungsidentität**

$$q(x, y) = \frac{1}{4} \left( n_q(x + y) - n_q(-x + y) + i \cdot n_q(ix + y) - i \cdot n_q(-ix + y) \right).$$

**7.9. Definition**

Ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum  $\mathcal{H}$  heißt **Prä-Hilbertraum**, falls  $\mathcal{H}$  ein Skalarprodukt besitzt.  $\mathcal{H}$  heißt **Hilbertraum**, falls  $\mathcal{H}$  vollständig ist bezüglich der durch  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  induzierten Norm.

## 7.10. Proposition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Prä-Hilbertraum und  $\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}$  die Vervollständigung bezüglich  $\|x\| = \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}}$ . Dann ist  $\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}$  in kanonischer Weise ein Hilbertraum.

### Beweis

$(\mathcal{H}, \|\cdot\|) \hookrightarrow (\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}, \|\cdot\|_{\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}})$  ist isometrisch mit dichtem Bild nach Satz 1.5.  $\|\cdot\|$  erfüllt das Parallelogrammgesetz und daher auch  $\|\cdot\|_{\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}}$ . Mit 7.7 folgt, dass  $\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}$  ein Skalarprodukt besitzt, welches die Norm  $\|\cdot\|_{\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}}$  induziert und auf  $\mathcal{H}$  mit  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  übereinstimmt. Das Skalarprodukt auf  $\overline{\mathcal{H}}^{\|\cdot\|}$  ist wegen Stetigkeit hierdurch eindeutig bestimmt.  $\square$

## 7.11. Proposition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum und  $\kappa: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^*$  definiert durch  $\kappa(x)(y) := \langle x, y \rangle$ ,  $x, y \in \mathcal{H}$ . Dann gilt:

- (i)  $\kappa$  ist **konjugiert linear**, das heißt  $\kappa(\alpha x + \alpha' x') = \overline{\alpha} \kappa(x) + \overline{\alpha'} \kappa(x')$  mit  $x, x' \in \mathcal{H}$ ,  $\alpha, \alpha' \in \mathbb{K}$ .
- (ii)  $\kappa$  ist isometrisch, also insbesondere injektiv.
- (iii)  $\kappa$  ist surjektiv.

### Beweis

Es gilt  $\kappa(x) \in \mathcal{H}^*$ , da  $\kappa(x): \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{K}$  offensichtlich linear ist. Weiter ist  $\kappa(x)$  stetig, da

$$|\kappa(x)(y)| = |\langle x, y \rangle| \stackrel{\text{c.s.}}{\leq} \|x\| \cdot \|y\| \implies \|\kappa(x)\|_{\mathcal{H}^*} \leq \|x\|$$

(i) klar.

(ii) Es gilt  $\kappa(x)\left(\frac{1}{\|x\|}x\right) = \frac{1}{\|x\|}\langle x, x \rangle = \|x\|$ . Daraus folgt  $\|\kappa(x)\|_{\mathcal{H}^*} \geq \|x\|$ , also auch  $\|\kappa(x)\|_{\mathcal{H}^*} = \|x\|$ , da wir die andere Abschätzung eben gezeigt haben.

(iii) Sei  $\varphi \in \mathcal{H}^*$ . Ohne Einschränkungen gelte  $\|\varphi\|_{\mathcal{H}^*} = 1$ .

Behauptung: Es gibt  $\bar{x} \in \mathcal{H}$  mit  $\|\bar{x}\| = 1$  und  $\varphi(\bar{x}) = 1$ . Wähle  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}$  mit  $\|x_n\| = 1$  und  $0 \leq \varphi(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ . Zu  $1 > \varepsilon > 0$  existiert  $N \in \mathbb{N}$  mit  $\varphi(x_n) > 1 - \frac{\varepsilon}{8}$  für  $n \geq N$ , also  $\varphi(x_n + x_m) > 2 - \frac{\varepsilon}{4}$ . Aus dem Parallelogrammgesetz folgt für  $n, m \geq N$

$$\|x_n - x_m\|^2 = 2 \cdot \|x_n\|^2 + 2 \cdot \|x_m\|^2 - \|x_n + x_m\|^2 \leq 4 - \left(2 - \frac{\varepsilon}{4}\right)^2 \leq \varepsilon$$

Es folgt, dass  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Cauchyfolge ist.  $\bar{x} := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  erfüllt die Behauptung.

Behauptung:  $\varphi = \kappa(\bar{x})$ , d.h.  $\varphi(y) = \kappa(\bar{x})(y)$  für  $y \in \mathcal{H}$ . Sei  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Für  $\lambda > 0$  gilt wegen der Dreiecksungleichung und  $\|\varphi\|_{\mathcal{H}^*} \leq 1$

$$-\frac{1}{\lambda}(\|\bar{x} - \lambda \cdot y\| - \|\bar{x}\|) \leq -\frac{1}{\lambda}(\varphi(\bar{x} - \lambda \cdot y) - \varphi(\bar{x})) = \varphi(y)$$

und

$$\varphi(y) = \frac{1}{\lambda} \left( \varphi(\bar{x} + \lambda \cdot y) - \underbrace{\varphi(\bar{x})}_{=1} \right) \leq \frac{1}{\lambda} \cdot \left( \|\bar{x} + \lambda \cdot y\| - \underbrace{\|\bar{x}\|}_{=1} \right)$$

also insgesamt

$$\underbrace{-\frac{1}{\lambda}(\|\bar{x} - \lambda \cdot y\| - \|\bar{x}\|)}_{\xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \langle \bar{x}, y \rangle} \leq \varphi(y) \leq \underbrace{\frac{1}{\lambda}(\|\bar{x} + \lambda \cdot y\| - \|\bar{x}\|)}_{\xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \langle \bar{x}, y \rangle}$$



stimmt noch  
nicht so ganz,  
aber passt  
schon ...

nach l'Hospital. Im Detail:

$$\|\bar{x} + \lambda y\| - \|\bar{x}\| = \langle \bar{x} + \lambda y, \bar{x} + \lambda y \rangle^{\frac{1}{2}} - \|\bar{x}\| = (\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle + \langle \bar{x}, \lambda y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle)^{\frac{1}{2}} - \langle \bar{x}, \bar{x} \rangle^{\frac{1}{2}}$$

ist in  $\lambda = 0$  differenzierbar nach  $\lambda$  mit

$$\frac{d}{d\lambda}(\dots) = \left( 2\langle \bar{x}, y \rangle + 2\lambda \|y\|^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2}(\dots)^{-\frac{1}{2}} \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \langle \bar{x}, y \rangle$$

Wir erhalten  $\varphi(y) = \langle \bar{x}, y \rangle = \kappa(\bar{x})(y)$ , also  $\varphi = \kappa(\bar{x})$ .

Für  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ :  $\mathcal{H}$  ist reeller Vektorraum und  $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}} := \operatorname{Re}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$ . Es gilt dann  $\varphi(y) = \rho(y) - i \cdot \rho(y)$  mit  $\rho(\cdot) := \operatorname{Re}(\varphi(\cdot))$ . Es gilt nämlich

$$\operatorname{Im}(\varphi(y)) = -\operatorname{Re}(i \cdot \varphi(y)) = -\operatorname{Re}(\varphi(i \cdot y)) = -\rho(i \cdot y)$$

Es ist  $\rho(y) = \langle \bar{x}, y \rangle_{\mathbb{R}} = \operatorname{Re}(\langle \bar{x}, y \rangle)$  für ein  $\bar{x} \in \mathcal{H}$ . Also gilt  $\varphi(y) = \rho(y) - i \cdot \rho(i \cdot y) = \dots = \langle \bar{x}, y \rangle$ .  
 $\square$

## 7.12. Corollar

Hilberträume sind reflexiv.

**Beweis**

Das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H} & \xrightarrow{\iota_{\mathcal{H}}} & \mathcal{H}^{**} \\ \downarrow \kappa & & \downarrow \kappa^{\operatorname{tr}} \\ \mathcal{H}^* & \xrightarrow{\varphi \mapsto \overline{\varphi}} & \mathcal{H}^* \end{array}$$

kommutiert, da folgendes gilt:

$$\kappa^{\operatorname{tr}} \circ \iota_{\mathcal{H}}(x)(y) = \kappa^{\operatorname{tr}}(\iota_{\mathcal{H}}(x))(y) = \iota_{\mathcal{H}}(x) \circ \kappa(y) = \kappa(y)(x) = \langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle} = \overline{\kappa(x)(y)}$$

Die Abbildungen  $\kappa, \kappa^{\operatorname{tr}}$  und  $(\varphi \mapsto \overline{\varphi})$  sind surjektive Isometrien, also ist auch  $\iota_{\mathcal{H}}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^{**}$  eine surjektive Isometrie.  $\square$

$\kappa^{\operatorname{tr}}$  nach Aufgabe 2,  
Blatt 6

## 7.13. Definition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum.

- (i)  $x, y \in \mathcal{H}$  heißen **orthogonal**,  $x \perp y$ , falls  $\langle x, y \rangle = 0$ .
- (ii)  $A, B \subset \mathcal{H}$  heißen **orthogonal**, falls  $x \perp y$  für alle  $x \in A, y \in B$ .
- (iii) Für  $A \subset \mathcal{H}$  heißt  $A^{\perp} := \{x \in \mathcal{H} \mid \langle x, y \rangle = 0 \text{ für alle } y \in A\}$  **orthogonales Komplement** von  $A$ .
- (iv)  $\{x_i\}_I \subset \mathcal{H}$  heißt **Orthonormalsystem**, falls  $\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij}$  für  $i, j \in I$ .
- (v)  $\{x_i\}_I \subset \mathcal{H}$  heißt **Hilbertraumbasis** (bzw. Basis), falls es ein maximales Orthonormalsystem ist.

## 7.14. Bemerkung

- (i) Für  $x \perp y \in \mathcal{H}$  gilt der **Satz des Pythagoras**:  $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ .
- (ii) Wir werden sehen, dass jeder Hilbertraum eine Hilbertraumbasis besitzt.
- (iii) Im Allgemeinen ist eine Hilbertraumbasis *keine* Vektorraumbasis (**Hamelbasis**).

### 7.15. Proposition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum,  $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$  ein abgeschlossener Unterraum. Dann gilt  $\mathcal{H}_0 \cap \mathcal{H}_0^\perp = \{0\}$  und  $\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_0^\perp = \mathcal{H}$ . Wir schreiben in diesem Fall auch  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_0^\perp$ .

#### Beweis

$\mathcal{H}_0 \cap \mathcal{H}_0^\perp = \{0\}$  ist klar. Sei  $x \in \mathcal{H}$ . Dann ist  $\kappa(x) \in \mathcal{H}^*$  gegeben durch  $\kappa(x)(y) = \langle x, y \rangle$  und es ist  $\kappa(x)|_{\mathcal{H}_0} \in \mathcal{H}_0^*$ . Nun ist  $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$  abgeschlossen und somit selbst ein Hilbertraum. Sei  $\kappa_0: \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{H}_0^*$  der konjugiert lineare, isometrische Isomorphismus aus 7.11. Wegen der Surjektivität von  $\kappa_0$  existiert  $x_0 \in \mathcal{H}_0$  mit  $\kappa_0(x_0) = \kappa(x)|_{\mathcal{H}_0}$ . Das heißt für  $y \in \mathcal{H}_0$  gilt

$$\langle x_0, y \rangle = \kappa_0(x_0)(y) = \kappa(x)|_{\mathcal{H}_0}(y) = \kappa(x)(y) = \langle x, y \rangle$$

Daraus folgt  $\langle x - x_0, y \rangle = 0$  für jedes  $y \in \mathcal{H}_0$ , also ist  $x_1 := x - x_0 \in \mathcal{H}_0^\perp$  und  $x = x_0 + x_1$ .  $\square$

### 7.16. Definition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum. Eine Familie  $\{x_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{H}$  heißt **summierbar** zu  $x \in \mathcal{H}$ , falls gilt: Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert  $\bar{J} \subset \subset I$  endlich, sodass für alle  $\bar{J} \subset J \subset \subset I$  endlich gilt

$$\left\| \sum_{i \in J} x_i - x \right\| < \varepsilon.$$

Wir schreiben dann auch  $x = \sum_{i \in I} x_i$ . (Warum kann es höchstens ein solches  $x$  geben?) Formulierung mit Netzen:

$$\left( \sum_{i \in J} x_i \right)_{\{J \mid J \subset \subset I \text{ endlich}\}} \longrightarrow x \quad \text{oder} \quad \sum_{i \in J} x_i \xrightarrow{J \subset \subset I} x$$

Dabei ist  $\{J \mid J \subset \subset I \text{ endlich}\}$  gerichtet bezüglich Inklusion.

### 7.17. Proposition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum und  $\{x_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{H}$  eine Familie in  $\mathcal{H}$ .

- (i)  $\{x_i\}_{i \in I}$  ist genau dann summierbar, wenn gilt: Zu jedem  $\varepsilon > 0$  existiert  $\bar{J} \subset \subset I$  endlich, sodass  $\left\| \sum_{i \in J'} x_i \right\| < \varepsilon$  für jedes  $J' \subset \subset I$  endlich mit  $J' \cap \bar{J} = \emptyset$ .
- (ii)  $\{x_i\}_{i \in I}$  ist genau dann summierbar zu  $x \in \mathcal{H}$ , wenn gilt: Es sind höchstens abzählbar viele der  $x_i \neq 0$  und für jede Abzählung  $x_{i_0}, x_{i_1}, \dots$  dieser  $x_i$  gilt

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x_{i_k}.$$

#### Beweis

- (i) Angenommen  $\sum_{i \in I} x_i \in \mathcal{H}$  existiert. Sei  $\varepsilon > 0$ . Dann existiert  $\bar{J} \subset \subset I$ , sodass für  $\bar{J} \subset J \subset \subset I$  gilt  $\left\| \sum_{i \in J} x_i - \sum_{i \in I} x_i \right\| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Für  $J' \subset \subset I$  mit  $J' \cap \bar{J} = \emptyset$  gilt dann

$$\left\| \sum_{i \in J'} x_i \right\| = \left\| \sum_{i \in J' \cup \bar{J}} x_i - \sum_{i \in \bar{J}} x_i \right\| \leq \left\| \sum_{i \in J' \cup \bar{J}} x_i - \sum_{i \in I} x_i \right\| + \left\| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{i \in \bar{J}} x_i \right\| < \varepsilon$$

Zur Rückrichtung: Für  $n \in \mathbb{N}$  existiert  $J_n \subset\subset I$  endlich, sodass für  $J' \subset\subset I$  mit  $J' \cap J_n = \emptyset$  gilt  $\|\sum_{i \in J'} x_i\| < \frac{1}{n+1}$ . Aber dann ist

$$\left( \sum_{i \in J_0 \cup J_1 \cup \dots \cup J_n} x_i \right)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}$$

eine Cauchyfolge. Für den Limes  $x$  gilt  $x = \sum_{i \in I} x_i$ .

Sei dazu  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $n \in \mathbb{N}$ , sodass  $\frac{1}{n+1} < \frac{\varepsilon}{2}$  und außerdem  $\|x - \sum_{i \in J_0 \cup \dots \cup J_n} x_i\| < \frac{\varepsilon}{2}$  gilt. Setze nun  $\bar{J} := J_n$ . Dann gilt für  $\bar{J} \subset J \subset\subset I$

$$\left\| x - \sum_{i \in J} x_i \right\| \leq \left\| x - \sum_{i \in J_0 \cup \dots \cup J_n} x_i \right\| + \left\| \sum_{i \in J_0 \cup \dots \cup J_n} x_i - \sum_{i \in J} x_i \right\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{n+1} < \varepsilon$$

(ii) Angenommen  $\{x_i\}_{i \in I}$  ist summierbar. Seien die  $J_n$  wie oben. Dann ist  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$  abzählbar. Falls  $I \ni i \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$ , so gilt  $\|x_i\| < \frac{1}{n+1}$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$ , also  $x_i = 0$ .

Die Rückrichtung ist klar. (sonst noch einmal an Analysis I. erinnern ...)

□

### 7.18. Proposition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum,  $z \in \mathcal{H}$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ ,  $\{x_i\}_{i \in I}, \{y_i\}_{i \in I}$  summierbare Familien. Dann gilt

$$\alpha \cdot \sum_{i \in I} x_i + \beta \cdot \sum_{i \in I} y_i = \sum_{i \in I} (\alpha \cdot x_i + \beta \cdot y_i) \quad \text{und} \quad \left\langle \sum_{i \in I} x_i, z \right\rangle = \sum_{i \in I} \langle x_i, z \rangle$$

**Beweis**

Übung!

□

### 7.19. Proposition

Sei  $\{x_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{H}$  eine Familie paarweise orthogonaler Vektoren. Dann ist  $\{x_i\}_{i \in I}$  summierbar genau dann, wenn  $\sum_{i \in I} \|x_i\|^2$  endlich ist. In diesem Fall gilt

$$\left\| \sum_{i \in I} x_i \right\|^2 = \sum_{i \in I} \|x_i\|^2$$

**Beweis**

Falls  $\{x_i\}_{i \in I}$  summierbar ist, so gilt

$$\left\| \sum_{i \in I} x_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i \in I} x_i, \sum_{j \in I} x_j \right\rangle \stackrel{7.18}{=} \sum_{i \in I} \left\langle x_i, \sum_{j \in I} x_j \right\rangle \stackrel{7.18}{=} \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i \in I} \|x_i\|^2$$

Äquivalenz: Übung mit

$$\left\| \sum_{i \in I} x_i \right\|^2 \xleftarrow{J \subset\subset I} \left\| \sum_{i \in J} x_i \right\|^2 = \sum_{i \in J} \|x_i\|^2 \xrightarrow{J \subset\subset I} \sum_{i \in I} \|x_i\|^2$$

für  $J \subset\subset I$  endlich und 7.17.

□

## 7.20. Proposition

Sei  $\{x_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{H}$  ein Orthonormalsystem und  $x \in \mathcal{H}$ .

- (i) Es gilt  $\sum_{i \in I} |\langle x_i, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$  (**Besselsche Ungleichung**<sup>13</sup>).
- (ii) Es gilt  $\sum_{i \in I} |\langle x_i, x \rangle|^2 = \|x\|^2$  (**Parsevalsche Gleichung**<sup>14</sup>) genau dann, wenn

$$x = \sum_{i \in I} \langle x_i, x \rangle \cdot x_i.$$

### Beweis

- (i) Für  $J \subset \subset I$  endlich gilt

$$\begin{aligned} 0 \leq \left\| x - \sum_{i \in J} \langle x_i, x \rangle x_i \right\|^2 &= \langle x, x \rangle - \sum_{i \in J} \langle \langle x_i, x \rangle x_i, x \rangle - \sum_{i \in J} \langle x, \langle x_i, x \rangle x_i \rangle \\ &\quad + \sum_{i \in J} \sum_{j \in J} \langle \langle x_i, x \rangle x_i, \langle x_j, x \rangle x_j \rangle \\ &= \langle x, x \rangle - \sum_{i \in J} \overline{\langle x_i, x \rangle} \langle x_i, x \rangle - \sum_{i \in J} \langle x_i, x \rangle \overline{\langle x_i, x \rangle} + \sum_{i \in J} \overline{\langle x_i, x \rangle} \langle x_i, x \rangle \end{aligned}$$

Also  $\sum_{i \in J} |\langle x_i, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$  und somit folgt  $\sum_{i \in I} |\langle x_i, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ .

- (ii) Die Rechnung aus (i) zeigt auch:

$$\sum_{i \in J} |\langle x_i, x \rangle|^2 \xrightarrow{J \subset \subset I} \|x\|^2 \iff \sum_{i \in J} \langle x_i, x \rangle \cdot x_i \xrightarrow{J \subset \subset I} x \quad \square$$

## 7.21. Definition und Proposition

Seien  $\mathcal{H}_i$  für  $i \in I$  Hilberträume. Dann ist

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i := \left\{ (x_i)_{i \in I} \mid x_i \in \mathcal{H}_i, \sum_{i \in I} \|x_i\|_{\mathcal{H}_i}^2 < \infty \right\}$$

ein Hilbertraum mit  $\langle (x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I} \rangle := \sum_{i \in I} \langle x_i, y_i \rangle_{\mathcal{H}_i}$ .

### Beweis

Übung, Aufgabe 1 von Blatt 12 □

## 7.22. Satz

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum und  $\{x_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{H}$  ein Orthonormalsystem. Dann sind äquivalent:

- (i)  $\{x_i\}_{i \in I}$  ist eine Hilbertraumbasis.
- (ii) Falls  $x \perp x_i$  für alle  $i \in I$ , so gilt  $x = 0$ .
- (iii) Es gibt einen isometrischen Isomorphismus  $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i \cong \mathcal{H}$  gegeben durch  $(\lambda_i \cdot x_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot x_i$  wobei  $\mathcal{H}_i = \mathbb{K} \cdot x_i$  der von  $x_i$  erzeugte Unterhilbertraum ist.
- (iv) Für jedes  $x \in \mathcal{H}$  gilt  $x = \sum_{i \in I} \langle x_i, x \rangle \cdot x_i$ .
- (v) Für alle  $x, y \in \mathcal{H}$  gilt  $\langle x, y \rangle = \sum_{i \in I} \langle x, x_i \rangle \cdot \langle x_i, y \rangle$ .
- (vi) Für alle  $x \in \mathcal{H}$  gilt die Parsevalsche Gleichung  $\|x\|^2 = \sum |\langle x_i, x \rangle|^2$ .

<sup>13</sup>nach Friedrich Wilhelm Bessel, [http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich\\_Wilhelm\\_Bessel](http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Bessel)

<sup>14</sup>nach Marc-Antoine Parseval, [http://de.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine\\_Parseval](http://de.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Parseval)

**Beweis**

(i)⇒(ii): Falls  $0 \neq x \perp x_i$  für alle  $i \in I$ , so ist  $\{x_i\}_{i \in I} \cup \left\{ \frac{1}{\|x\|} \cdot x \right\}$  ein Orthonormalsystem.  $\nLeftarrow$

(ii)⇒(iii):  $\gamma: \bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{H}$  gegeben durch  $(\lambda_i \cdot x_i)_I \mapsto \sum \lambda_i \cdot x_i$  ist eine wohldefinierte lineare Isometrie nach 7.18, 7.19 und 7.21. Außerdem erhält  $\gamma$  das Skalarprodukt.  $\gamma(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i)$  ist vollständig,<sup>15</sup> also abgeschlossen in  $\mathcal{H}$ . Falls  $\gamma(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i) \neq \mathcal{H}$ , so ist nach 7.15  $\gamma(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i)^\perp \neq \{0\}$ .  $\nLeftarrow$  zu (ii).

(iii)⇒(iv): Für  $x \in \mathcal{H}$  existieren  $\lambda_i \in \mathbb{K}$ , sodass  $x = \gamma((\lambda_i \cdot x_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot x_i$  gilt. Es gilt

$$\langle x_j, x \rangle = \left\langle x_j, \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot x_i \right\rangle = \sum_{i \in I} \langle x_j, \lambda_i \cdot x_i \rangle = \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot \delta_{ij} = \lambda_j$$

Damit folgt (iv).

(iv)⇒(v): Es gilt

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i \in I} \langle x_i, x \rangle x_i, \sum_{j \in I} \langle x_j, y \rangle x_j \right\rangle = \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} \overline{\langle x_i, x \rangle} \langle x_j, y \rangle \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i \in I} \langle x, x_i \rangle \langle x_i, y \rangle$$

(v)⇒(vi): Klar.

(vi)⇒(i): Falls  $x \perp x_i$  für alle  $i \in I$ , so gilt  $\|x\|^2 = \sum_{i \in I} |\langle x_i, x \rangle|^2 = 0$ . Also ist  $x = 0$  und damit ist das Orthonormalsystem maximal.  $\square$

**7.23. Bemerkung**

- (i) Jeder Hilbertraum besitzt eine Basis (Lemma von Zorn).
- (ii) Wegen 7.22 (iii) ist ein Hilbertraum bis auf isometrischen Isomorphismus durch die Mächtigkeit seiner Basis eindeutig bestimmt.
- (iii) Jeder separable Hilbertraum ist isometrisch isomorph zu  $\mathbb{K}^n$  für ein  $n \in \mathbb{N}$  oder zu  $\ell^2(\mathbb{N})$ .  
Dies folgt mit Aufgabe 2 von Blatt 12: Jeder separable Hilbertraum hat eine höchstens abzählbare Hilbertbasis.

**7.24. Beispiele**

- (i)  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  bzw.  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{Z}}$  bilden Basen von  $\ell^2(\mathbb{N})$  bzw.  $\ell^2(\mathbb{Z})$ , wobei  $e_i(j) = \delta_{ij}$  ist.
- (ii)  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , wobei  $e_n(t) = \exp(2\pi i n t)$  ist, definiert eine Basis von  $L^2([0, 1])$ .

**7.25. Definition und Proposition**

Seien  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  Hilberträume und  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ . Dann existiert genau ein Operator  $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_2, \mathcal{H}_1)$ , sodass für alle  $x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2$  gilt

$$\langle T^* y, x \rangle_{\mathcal{H}_1} = \langle y, T x \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad [\#]$$

Die Abbildung  $*$ :  $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_2, \mathcal{H}_1)$  ist konjugiert linear und isometrisch. Weiter gilt  $T^{**} = T$ . Ist  $\mathcal{H}_3$  ein weiterer Hilbertraum und  $S \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3)$ , so gilt

$$(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$$

$T^*$  heißt der zu  $T$  **adjungierte Operator**.

<sup>15</sup>Das Bild eines vollständigen Raumes unter eine stetigen Abbildung  $f: (X, d) \rightarrow (X', d')$  mit  $d(x, y) \leq d'(f(x), f(y))$  ist vollständig.

### Beweis

Sei  $\kappa_i: \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{H}_i^*$  wie in 7.11. Wir haben

$$\begin{aligned}
 \langle T^*y, x \rangle_{\mathcal{H}_1} &= \langle y, Tx \rangle_{\mathcal{H}_2} & [\#] \\
 \iff \kappa_1(T^*y)(x) &= \kappa_2(y)(Tx) & \text{für } x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2 \\
 \iff \kappa_1(T^*y) &= \kappa_2(y) \circ T & \text{für } y \in \mathcal{H}_2 \\
 \iff \kappa_1(T^*y) &= T^{\text{tr}} \circ \kappa_2(y) & \text{für } y \in \mathcal{H}_2 \\
 \iff T^*y &= \kappa_1^{-1} \circ T^{\text{tr}} \circ \kappa_2(y) & \text{für } y \in \mathcal{H}_2
 \end{aligned}$$

Also definieren wir  $T^* := \kappa_1^{-1} \circ T^{\text{tr}} \circ \kappa_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_2, \mathcal{H}_1)$ . Durch [#] ist  $T^*$  eindeutig bestimmt.  $\kappa_1^{-1}$  und  $\kappa_2$  sind Isometrien; da außerdem  $\|T^{\text{tr}}\| = \|T\|$ , gilt  $\|T^*\| = \|T\|$  und somit ist  $T \mapsto T^*$  isometrisch.  $\kappa_1^{-1}$  ist konjugiert linear, also auch  $T \mapsto T^*$ . Weiter gilt

$$(ST)^* = \kappa_1^{-1}(ST)^{\text{tr}}\kappa_3 = \kappa_1^{-1}T^{\text{tr}}S^{\text{tr}}\kappa_3 = \kappa_1^{-1}T^{\text{tr}}\kappa_2\kappa_2^{-1}S^{\text{tr}}\kappa_3 = T^*S^*$$

Des Weiteren erfüllt  $T^{**} = (T^*)^* \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  für alle  $x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2$  die Gleichung

$$\langle T^{**}x, y \rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}_1}$$

Ebenso gilt  $\langle Tx, y \rangle_{\mathcal{H}_2} = \overline{\langle y, Tx \rangle_{\mathcal{H}_2}} = \overline{\langle T^*y, x \rangle_{\mathcal{H}_1}} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}_1}$  für alle  $x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2$ . Folglich muss  $T^{**}x = Tx$  gelten.  $\square$

### 7.26. Proposition

Für  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  gilt:

$$\begin{aligned}
 \|T\| &= \inf \left\{ \lambda \in \mathbb{R} \mid |\langle y, Tx \rangle_{\mathcal{H}_2}| \leq \lambda \cdot \|y\| \cdot \|x\| \forall x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2 \right\} \\
 &= \sup \left\{ |\langle y, Tx \rangle_{\mathcal{H}_2}| \mid x \in \overline{B}_{\mathcal{H}_1}(0, 1), y \in \overline{B}_{\mathcal{H}_2}(0, 1) \right\}
 \end{aligned}$$

### Beweis

Sei  $\gamma$  die rechte Seite der oberen Gleichung. Es gilt  $|\langle y, Tx \rangle_{\mathcal{H}_2}| \leq \|T\| \cdot \|y\| \cdot \|x\|$  für  $x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2$ , also ist  $\gamma \leq \|T\|$ . Weiter gilt

$$\|Tx\|^2 = |\langle Tx, Tx \rangle| \leq \gamma \cdot \|Tx\| \cdot \|x\| \leq \gamma \cdot \|T\| \cdot \|x\|^2$$

also ist  $\|Tx\| \leq \sqrt{\gamma} \cdot \sqrt{\|T\|} \cdot \|x\|$  für  $x \in \mathcal{H}_1$  und es folgt  $\|T\| \leq \sqrt{\gamma} \cdot \sqrt{\|T\|}$ . Also gilt  $\sqrt{\|T\|} \leq \sqrt{\gamma}$ , woraus  $\|T\| \leq \gamma$  folgt und somit insgesamt  $\gamma = \|T\|$ . Die zweite Gleichheit ist klar.  $\square$

### 7.27. Proposition

Sei  $\mathcal{H}$  ein  $\mathbb{K}$ -Hilbertraum,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$  und  $\beta \geq 0$ . Falls  $|\langle x, Tx \rangle| \leq \beta \|x\|^2$  für alle  $x \in \mathcal{H}$ , so gilt für  $x, y \in \mathcal{H}$

$$|\langle y, Tx \rangle| + |\langle Ty, x \rangle| \leq 2\beta \cdot \|x\| \cdot \|y\|$$

Falls  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  ist, gilt sogar

$$|\langle y, Tx \rangle| + |\langle Ty, x \rangle| \leq 2\beta \cdot \|x\| \cdot \|y\|$$

In diesem Fall gilt also  $T = 0 \iff \langle x, Tx \rangle = 0$  für alle  $x \in \mathcal{H}$ .

**Beweis**

Für alle  $x, y \in \mathcal{H} \setminus \{0\}$  gilt (für 0 ist die Ungleichung trivial)

$$\begin{aligned} 2|\langle y, Tx \rangle + \langle Ty, x \rangle| &= |\langle x+y, T(x+y) \rangle - \langle x-y, T(x-y) \rangle| \leq \beta \|x+y\|^2 + \beta \|x-y\|^2 \\ &\leq 2\beta (\|x\|^2 + \|y\|^2) \end{aligned}$$

Ersetze  $x$  durch  $\left(\frac{\|y\|}{\|x\|}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot x$  und  $y$  durch  $\left(\frac{\|x\|}{\|y\|}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot y$ . Dann folgt

$$2 \cdot |\langle y, Tx \rangle + \langle Ty, x \rangle| \leq 2 \cdot \beta \cdot (\|x\| \cdot \|y\| + \|x\| \cdot \|y\|) = 2 \cdot 2 \cdot \beta \cdot \|x\| \cdot \|y\| \quad [*]$$

Damit ist die Aussage für  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  gezeigt. Falls  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  ist, so finden wir  $\rho, \sigma \in \mathbb{R}_+$ , sodass

$$\begin{aligned} |\langle y, Tx \rangle| + |\langle Ty, x \rangle| &= |e^{i(\rho+\sigma)} \cdot \langle y, Tx \rangle + e^{i(\rho-\sigma)} \cdot \langle x, Ty \rangle| \\ &= |e^{i\rho} \cdot (\langle y, T(e^{i\sigma} \cdot x) \rangle + \langle e^{i\sigma} \cdot x, Ty \rangle)| \\ &= |\langle y, T(e^{i\sigma} \cdot x) \rangle + \overline{\langle Ty, e^{i\sigma} \cdot x \rangle}| \\ &\stackrel{[*]}{\leq} 2 \cdot \beta \cdot \|x\| \cdot \|y\| \end{aligned}$$

□

Das stimmt noch nicht so ganz. man bräuhete noch  $e^{-i\sigma} \langle x, Ty \rangle \in \mathbb{R}$  oder Ähnliches, um die Konjugation loszuwerden. Solche  $\rho, \sigma$  muss es aber nicht unbedingt geben ...

**7.28. Definition**

$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$  heißt **selbstadjungiert**, falls  $T = T^*$ . Wir setzen

$$\mathcal{L}(\mathcal{H})_{\text{s.a.}} := \{T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}) \mid T \text{ selbstadjungiert}\}$$

**7.29. Bemerkung**

Für  $T$  selbstadjungiert gilt

$$\|T\| = \inf \left\{ \lambda \in \mathbb{R} \mid |\langle x, Tx \rangle| \leq \lambda \|x\|^2 \text{ für alle } x \in \mathcal{H} \right\}$$

**Beweis**

Sei  $\beta$  das Infimum auf der rechten Seite. Dann gilt für  $x, y \in \mathcal{H}$

$$2 \cdot |\langle y, Tx \rangle| = |\langle y, Tx \rangle + \langle Ty, x \rangle| \stackrel{7.27}{\leq} 2 \cdot \beta \cdot \|x\| \cdot \|y\|$$

Nach 7.26 folgt nun  $\|T\| \leq \beta \leq \|T\|$ . □

**7.30. Proposition**

Falls  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  und  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ , so gilt

$$T \text{ selbstadjungiert} \iff \langle x, Tx \rangle \in \mathbb{R} \text{ für alle } x \in \mathcal{H}$$

**Beweis**

Die Hinrichtung folgt aus  $\langle x, Tx \rangle = \langle Tx, x \rangle = \overline{\langle x, Tx \rangle}$  für  $x \in \mathcal{H}$ . Für die Rückrichtung betrachte  $\langle x, Tx \rangle = \langle Tx, x \rangle = \langle x, T^*x \rangle$ . Dann ist  $\langle x, (T - T^*)x \rangle = 0$  für  $x \in \mathcal{H}$ . Es folgt dann  $T - T^* = 0$ . □

### 7.31. Definition und Proposition

Seien  $R, S, T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$  selbstadjungiert. Wir schreiben

- $T \geq 0$ , falls  $\langle x, Tx \rangle \geq 0$  für alle  $x \in \mathcal{H}$  gilt.
- $T \geq S$ , falls  $T - S \geq 0$

„ $\geq$ “ ist eine partielle Ordnung auf  $\mathcal{L}(\mathcal{H})_{\text{s.a.}}$ . Das heißt

folgt mit 7.29

$$T \geq T \quad T \geq S, S \geq T \implies S = T \quad T \geq S, S \geq R \implies T \geq R$$

Es gilt  $-\|T\| \cdot \text{id}_{\mathcal{H}} \leq T \leq \|T\| \cdot \text{id}_{\mathcal{H}}$ . Falls  $T \geq 0$  ist, so gilt

$$|\langle y, Tx \rangle|^2 \leq \langle x, Tx \rangle \cdot \langle y, Ty \rangle$$

insbesondere gilt  $\langle x, Tx \rangle = 0 \iff Tx = 0$

#### Beweis

Übung, siehe Anhang A.4. □

### 7.32. Satz

Sei  $(T_j)_{j \in I} \subset \mathcal{L}(\mathcal{H})_{\text{s.a.}}$  ein monoton wachsendes und beschränktes Netz selbstadjungierter Operatoren. Dann konvergiert  $(T_j)_{j \in I}$  punktweise gegen ein  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})_{\text{s.a.}}$ , das heißt  $T_j x$  konvergiert gegen  $Tx$  in Norm für jedes  $x \in \mathcal{H}$ .

Wir schreiben auch  $T_j \xrightarrow{\text{s.o.}} T$ , d.h.  $(T_j)_{j \in I}$  konvergiert gegen  $T$  in der **starken Operatortopologie**.

#### Beweis

Nach Polarisierung (vergleiche Bemerkung 7.8) gilt für  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$$\langle x, T_j y \rangle = \frac{1}{4} \left( \langle x+y, T_j(x+y) \rangle + \langle x-y, T_j(x-y) \rangle + i \langle ix+y, T_j(ix+y) \rangle - i \langle ix-y, T_j(ix-y) \rangle \right)$$

Die rechte Seite konvergiert (warum?), also auch die linke Seite.  $\Rightarrow$  Für jedes  $x \in \mathcal{H}$  konvergiert  $\langle x, T_j(\cdot) \rangle: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$  gegen ein  $\varphi_x: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ . Aber  $\varphi_x \in \mathcal{H}^*$  (warum?). Es gilt

$$\|\varphi_x\|_{\mathcal{H}^*} \leq \limsup_j \|T_j\| \cdot \|x\| < \infty.$$

Die Abbildung  $x \mapsto \kappa^{-1}(\varphi_x)$  ist linear (warum?). Definiere  $T: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  durch  $T(x) := \kappa^{-1}(\varphi_x)$ . Es gilt  $\|T(x)\| = \|\varphi_x\|$ , also  $\|T\| \leq \limsup_j \|T_j\| \leq \infty$ . Damit ist  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ . Außerdem gilt für  $x, y \in \mathcal{H}$

$$\begin{aligned} \langle Tx, y \rangle &= \kappa(Tx)(y) = \varphi_x(y) = \lim_j \langle x, T_j y \rangle = \lim_j \langle T_j x, y \rangle = \overline{\lim_j \langle y, T_j x \rangle} = \overline{\varphi_y(x)} = \overline{\langle Ty, x \rangle} \\ &= \langle x, Ty \rangle \end{aligned}$$

Also ist  $T$  auch selbstadjungiert. Es gilt für  $\lim_j \langle x, T_j y \rangle = \langle x, Ty \rangle$  für  $x, y \in \mathcal{H}$ , das heißt  $T_j \xrightarrow{\text{w.o.}} T$  ( $T_j \rightarrow T$  in der schwachen Operatortopologie). Für  $j \geq j'$  gilt  $T_j - T_{j'} \geq 0$ , also nach 7.31 für  $x \in \mathcal{H}$

$$\begin{aligned} \langle (T_j - T_{j'})(x), (T_j - T_{j'})(x) \rangle &\leq \langle x, (T_j - T_{j'})(x) \rangle \cdot \langle (T_j - T_{j'})(x), (T_j - T_{j'})^2(x) \rangle \\ &\leq \langle x, (T_j - T_{j'})(x) \rangle \cdot \left( 2 \cdot \limsup_j \|T_j\| \right)^3 \cdot \|x\|^2 < \varepsilon \end{aligned}$$

falls  $j'$  groß genug ist. Also  $\|T_j(x) - T_{j'}(x)\| < \varepsilon$  falls  $j \geq j'$  groß. Damit folgt dann  $T_j(x) \rightarrow T(x)$  in Norm (warum?). □



## 8. Kompakte Operatoren und ein Spektralsatz

### 8.1. Definition

Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Banachraum und  $T \in \mathcal{L}(X)$ . Wir definieren das **Spektrum** von  $T$  als

$$\sigma(T) := \{\lambda \in \mathbb{K} \mid T - \lambda \cdot \text{id}_X \text{ ist nicht invertierbar}\} \subset \mathbb{K}$$

auch  $\text{spec}(T)$

Die **Resolventenmenge** ist  $\text{res}(T) := \rho(T) := \mathbb{K} \setminus \sigma(T)$ . Wir schreiben  $R(T, \lambda) := (T - \lambda \cdot \text{id}_X)^{-1}$  für die **Resolvente** von  $T$  in  $\lambda \in \rho(T)$ .

### 8.2. Bemerkung

- (i) Jeder Eigenwert von  $T$  ist ein Spektralwert.
- (ii) Für  $X$  endlichdimensional gilt auch die Umkehrung, für beliebige  $X$  jedoch nicht: Sei  $X = \ell^2(\mathbb{N})$ , dann ist  $S \in \mathcal{L}(\ell^2(\mathbb{N}))$  gegeben durch  $S(x_0, x_1, \dots) := (0, x_0, x_1, \dots)$  (**unilateraler Shift**) linear, stetig und sogar isometrisch, aber *nicht* surjektiv. Dann ist  $0 \in \sigma(S)$ , aber 0 ist kein Eigenwert, da  $S$  injektiv ist.

### 8.3. Proposition

Seien  $X, Y$  Banachräume und  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  bijektiv (also injektiv). Falls für  $S \in \mathcal{L}(X, Y)$  gilt

$$\|T - S\|_{\mathcal{L}(X, Y)} < \|T^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y, X)}^{-1},$$

so ist auch  $S$  bijektiv.

#### Beweis

Es gilt  $S = T(\text{id}_X - T^{-1}(T - S))$ . Setze  $C := \|T^{-1}\| \cdot \|T - S\| < 1$ . Für  $k \leq l$  gilt dann

$$\left\| \sum_{n=k}^l (T^{-1}(T - S))^n \right\| \leq \sum_{n=k}^l \|(T^{-1}(T - S))^n\| \leq \sum_{n=k}^l \|T^{-1}\|^n \cdot \|T - S\|^n = \sum_{n=k}^l C^n$$

also ist  $\sum_{n=0}^{\infty} (T^{-1}(T - S))^n$  konvergent in  $\mathcal{L}(X, X)$ . Weiter ist  $(\sum_{n=0}^{\infty} (T^{-1}(T - S))^n) T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$  das Inverse von  $S$  (warum?).  $\square$

Ausführlicher Beweis im Anhang A.5

### 8.4. Corollar

Für  $T \in \mathcal{L}(X)$  ist die Resolventenmenge offen in  $\mathbb{K}$ .

### 8.5. Satz

Sei  $X$  ein Banachraum und  $T \in \mathcal{L}(X)$ . Dann ist die **Resolventenabbildung**  $R(T, \cdot): \rho(T) \rightarrow \mathcal{L}(X)$ ,  $\lambda \mapsto R(T, \lambda)$  lokal durch eine Potenzreihe mit Koeffizienten in  $\mathcal{L}(X)$  gegeben. Mit anderen Worten  $R(T, \cdot)$  ist lokal analytisch.

#### Beweis

Sei  $\lambda_0 \in \rho(T)$ . Setze  $S_0 := T - \lambda_0 \cdot \text{id}_X$  und  $S_\lambda := T - \lambda \cdot \text{id}_X$  für  $\lambda \in \rho(T)$ . Sei  $\lambda \in \rho(T)$  mit

$$\|S_0 - S_\lambda\| = |\lambda - \lambda_0| < \|S_0^{-1}\|^{-1}$$

Nach Proposition 8.3 ist  $S_\lambda$  invertierbar und es gilt

$$R(T, \lambda) = S_\lambda^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (S_0^{-1}(S_0 - S_\lambda))^n S_0^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n \cdot S_0^{-(n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R(T, \lambda_0)^{n+1}$$

Durch Abschätzung mit der geometrischen Reihe folgt die Beschränktheit.  $\square$

## 8.6. Satz

Sei  $X$  ein  $\mathbb{C}$ -Banachraum und  $T \in \mathcal{L}(X)$ . Dann ist  $\sigma(T)$  nichtleer, kompakt und es gilt

$$\sigma(T) \subset \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq \|T\|\}$$

### Beweis

Wir wissen bereits, dass  $\sigma(T)$  abgeschlossen in  $\mathbb{C}$  ist. Für  $\lambda \neq 0$  ist  $S_\lambda := -\lambda \cdot \text{id}_X$  invertierbar und es gilt  $\|S_\lambda^{-1}\|^{-1} = |\lambda|$ . Falls  $\|S_\lambda - (T - \lambda \cdot \text{id}_X)\| = \|T\| < |\lambda| = \|S_\lambda^{-1}\|^{-1}$ , so ist nach 8.3  $T - \lambda \cdot \text{id}_X$  invertierbar, also ist  $\lambda \notin \sigma(T)$ . Damit folgt  $\sigma(T) \subset \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq \|T\|\}$  und die Kompaktheit von  $\sigma(T)$ .

Angenommen  $\sigma(T) = \emptyset$ .  $R(T, \lambda)$  ist stetig auf  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 2 \cdot \|T\|\}$ , also beschränkt. Weiter gilt für  $|\lambda| \geq 2 \cdot \|T\|$

$$R(T, \lambda) = (T - \lambda \cdot \text{id}_X)^{-1} = -\lambda^{-1} \cdot \left(-\frac{T}{\lambda} + \text{id}_X\right)^{-1} = -\lambda^{-1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{T}{\lambda}\right)^n$$

also  $\|R(T, \lambda)\| \leq |\lambda|^{-1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left\|\frac{T}{\lambda}\right\|^n \leq \frac{1}{2\|T\|} \cdot 2 = \frac{1}{\|T\|}$ . Damit ist  $R(T, \lambda)$  auf  $\mathbb{C}$  beschränkt. Für  $x \in X$  und  $\varphi \in X^*$  gilt:

$$\lambda \mapsto \varphi(R(T, \lambda)(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n \underbrace{\varphi(R(T, \lambda_0)^{n+1}(x))}_{\in \mathbb{C}}$$

ist lokal analytisch (auf ganz  $\mathbb{C}$ ), also ganz und beschränkt. Nach dem Satz von Liouville<sup>16</sup> folgt

$$\varphi(R(T, \lambda)(x)) \equiv \varphi(R(T, 0)(x))$$

$\implies$

$$R(T, \lambda)(x) \equiv R(T, 0)(x) \quad , x \in X$$

$\implies$

$$(T - \lambda \cdot \text{id}_X)^{-1} = R(T, \lambda) \equiv R(T, 0) = T^{-1} \not\downarrow \quad \square$$

## 8.7. Definition und Proposition

Sei  $X$  ein Banachraum.  $T \in \mathcal{L}(X)$  heißt **kompakt**, falls eine der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist:

- (i) Das Bild jeder beschränkten Menge  $M$  unter  $T$  ist relativ kompakt, d.h.  $\overline{T(M)} \subset X$  kompakt.
- (ii)  $\overline{T(B_X(0, 1))}$  ist kompakt.
- (iii) Ist  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  beschränkt, so enthält  $(T(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  eine konvergente Teilfolge.

Wir schreiben  $\mathcal{K}(X)$  für die Menge der kompakten Operatoren auf  $X$ .

### Beweis

(i)  $\Leftrightarrow$  (ii): Klar, da  $T$  linear ist.


(i)  $\Leftrightarrow$  (iii): Für metrische Räume ist kompakt äquivalent zu folgenkompakt.  $\square$

## 8.8. Bemerkung

- (i) Sei  $X$  ein Banachraum. Dann gilt (Übung!)

$$\overline{B_X}(0, 1) \text{ ist kompakt} \iff \text{id}_X \text{ ist kompakt} \iff X \text{ ist endlichdimensional}$$

- (ii) Entsprechend kann man  $\mathcal{K}(X, Y)$  definieren.

<sup>16</sup>  $f$  ganz  $\leadsto f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n$  mit  $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \stackrel{\text{Cauchy}}{=} \frac{1}{2\pi i} \cdot \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}} d\zeta$ , wobei  $C_r$  der Kreis mit Radius  $r$  ist. Dann folgt  $|f(z)| \leq M$ , also  $|a_k| \leq \frac{1}{r^k}$ ,  $r > 0$ ,  $k \geq 1 \Rightarrow a_k = 0$ ,  $k \geq 1$ . Siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Satz\\_von\\_Liouville\\_\(Funktionentheorie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Liouville_(Funktionentheorie)) 

## 8.9. Proposition

Sei  $X$  ein Banachraum. Dann ist  $\mathcal{K}(X) \triangleleft \mathcal{L}(X)$  ein abgeschlossenes Ideal.

### Beweis

$\mathcal{K}(X) \subset \mathcal{L}(X)$  ist ein linearer Unterraum:  $T, T' \in \mathcal{K}(X)$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}$ .  $\alpha \cdot T \in \mathcal{K}(X)$  ist klar. Wir müssen nur  $T + T' \in \mathcal{K}(X)$  zeigen: Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  beschränkt. Da  $T$  kompakt ist, existiert eine Teilfolge  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ , sodass  $(Tx_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  konvergiert. Da  $T'$  kompakt ist, gibt es wiederum eine Teilfolge  $(x_{n_{k_l}})_{l \in \mathbb{N}}$ , sodass  $(Tx_{n_{k_l}})_{l \in \mathbb{N}}$  konvergiert. Dann muss auch  $((T + T')(x_{n_{k_l}}))_{l \in \mathbb{N}}$  konvergieren.

$\mathcal{K}(X)$  ist Ideal: Sei  $T \in \mathcal{K}(X)$ ,  $S \in \mathcal{L}(X)$ . Dann gilt auch  $TS, ST \in \mathcal{K}(X)$ , wie man sich leicht überlegt. (Stetige Abbildungen bilden Kompakta auf Kompakta ab)

$\mathcal{K}(X)$  ist abgeschlossen: Zu  $T \in \overline{\mathcal{K}(X)}$  existiert eine Folge  $(T_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{K}(X)$  mit  $\|T - T_k\| \rightarrow 0$ . Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  beschränkt. Wähle eine Teilfolge  $(x_n^{(0)})_{n \in \mathbb{N}}$ , sodass  $(T_0 x_n^{(0)})_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert und in einem  $\frac{1}{1}$ -Ball liegt. Wähle nun wiederum eine Teilfolge  $(x_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$  von  $(x_n^{(0)})_{n \in \mathbb{N}}$  mit:  $(T_1 x_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert und liegt in einem  $\frac{1}{2}$ -Ball. Induktiv folgt, dass für  $(x_n^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  gilt:  $(x_n^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  ist Teilfolge von  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $(T x_n^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  konvergiert.  $\square$

## 8.10. Satz

Sei  $T \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$  ein selbstadjungierter, kompakter Operator auf dem Hilbertraum  $\mathcal{H}$ . Dann ist  $T$  diagonalisierbar. Genauer gilt:

- (i)  $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$  ist abzählbar und der einzige mögliche Häufungspunkt ist 0.
- (ii) Jedes  $\lambda \in \sigma(T)$  ist ein Eigenwert. Die Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
- (iii) Seien  $\tilde{\lambda}_0, \tilde{\lambda}_1, \dots$  die unterschiedlichen Spektralwerte (d.h. Eigenwerte ohne Vielfachheiten) und  $\tilde{X}_0, \tilde{X}_1, \dots$  die zugehörigen Eigenräume. Dann ist  $\tilde{X}_i$  für jedes  $\tilde{\lambda}_i \neq 0$  endlichdimensional und es gilt  $\mathcal{H} = \bigoplus_i \tilde{X}_i$ .
- (iv) Seien  $\lambda_0, \lambda_1, \dots$  die nichtverschwindenden Eigenwerte, gezählt mit Vielfachheiten. Dann existiert ein Orthonormalsystem  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  von zugehörigen Eigenvektoren und für jedes solche Orthonormalsystem gilt für  $x \in \mathcal{H}$

Letzteres gilt allgemein für selbstadjungierte Operatoren

$$Tx = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda_i \cdot \langle e_i, x \rangle \cdot e_i$$

Falls  $T \geq 0$ , kann man die  $\lambda_i$  absteigend wählen und es gilt  $\lambda_i \rightarrow 0$  (falls es unendlich viele  $\lambda_i \neq 0$  gibt).

### Beweis (für $T \geq 0$ )

Für  $x \in \mathcal{H}$  setze  $\mu(x) := \frac{\langle x, Tx \rangle}{\langle x, x \rangle} \geq 0$  und

Beweis durchsehen ...

$$\bar{\mu} := \sup_{x \in \mathcal{H}} \mu(x) = \sup_{x \in \overline{B}(0,1)} \langle x, Tx \rangle \leq \|T\|$$

Wir nehmen  $\mu > 0$  an, denn andernfalls ist  $T = 0$  nach Bemerkung 7.29. Wähle  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}$  mit  $\|x_k\| = 1$  und  $\mu(x_k) = \langle x_k, Tx_k \rangle \rightarrow \bar{\mu}$ . Da  $T$  kompakt ist, dürfen wir (eventuell nach Übergang zu einer Teilfolge) annehmen, dass  $Tx_k \rightarrow \bar{y}$  für ein  $\bar{y} \in \mathcal{H}$ . Nach 5.10 ist  $\overline{B}_{\mathcal{H}^*}(0, 1)$   $w^*$ -kompakt, also gilt (wieder eventuell nach Übergang zu einer Teilfolge)

$$\kappa(x_k) \xrightarrow{w^*} \bar{\varphi} \in \mathcal{H}^*$$

Setze nun  $\bar{x} := \kappa^{-1}(\bar{\varphi})$ . Für jedes  $x \in \mathcal{H}$  gilt  $\langle x_k, Tx \rangle = \kappa(x_k)(Tx) \rightarrow \bar{\varphi}(Tx) = \langle \bar{x}, Tx \rangle$ . Also insbesondere

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_k - \bar{x}, Tx \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle Tx_k - T\bar{x}, x \rangle = \left\langle \lim_{k \rightarrow \infty} Tx_k - T\bar{x}, x \right\rangle = \langle \bar{y} - T\bar{x}, x \rangle$$

Damit folgt  $\bar{y} = T\bar{x}$ . Es gilt  $\|\bar{x}\| = 1$  und<sup>17</sup>

$$\bar{\mu} = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_k, Tx_k \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_k, \bar{y} \rangle = \langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \langle \bar{x}, T\bar{x} \rangle = \mu(\bar{x})$$

das heißt  $\bar{\mu}$  ist das Maximum von  $\mu: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ . Für  $z \in \mathcal{H}$  definiere  $f_z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f_z(t) := \mu(\bar{x} + t \cdot z)$ . Dann ist  $f_z$  in  $t = 0$  differenzierbar und es gilt

$$0 = f'_z(0) = \frac{2 \cdot \langle z, T\bar{x} \rangle \cdot \|\bar{x}\|^2 - 2 \cdot \langle \bar{x}, T\bar{x} \rangle \cdot \langle z, \bar{x} \rangle}{\|\bar{x}\|^4}$$

Also ist  $\langle z, T\bar{x} - \bar{\mu} \cdot \bar{x} \rangle = 0$  für alle  $z \in \mathcal{H}$ . Es folgt  $T\bar{x} = \bar{\mu} \cdot \bar{x}$ . Setze nun  $\lambda_0 := \bar{\mu}$ ,  $e_0 := \bar{x}$ . Definiere  $\mathcal{H}_1 := \{e_0\}^\perp$ . Dann ist  $\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}$  ein Untervektorraum. Für  $x \in \mathcal{H}_1$  gilt  $\langle e_0, Tx \rangle = \langle Te_0, x \rangle = \lambda_0 \cdot \langle e_0, x \rangle = 0$ . Also ist  $Tx \in \mathcal{H}_1$ . Wir können also

$$T_1 := T|_{\mathcal{H}_1} \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_1)$$

definieren. Tatsächlich gilt  $0 \leq T_1 = T_1^* \in \mathcal{K}(\mathcal{H}_1)$ . Induktion liefert Eigenwerte  $\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots > 0$  zu normierten Eigenvektoren  $e_0, e_1, e_2, \dots$  (Die Folge ist endlich falls ein  $\lambda_i = 0$  oder  $\dim \mathcal{H} < \infty$ ). Die Eigenvektoren sind paarweise orthogonal und für jedes  $X_k := \text{span}\{e_0, \dots, e_k\}$  und  $x \in X_k^\perp$  gilt  $\mu(x) \leq \lambda_k$ .

(Noch zu zeigen:  $\lambda_k \rightarrow 0$ )

Für  $\tilde{\mathcal{H}} := \bigcup_{k=0}^{\infty} X_k$  und  $x \in \tilde{\mathcal{H}}^\perp$  gilt  $\mu(x) \leq \lambda_k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , also  $\mu(x) = 0$ . Damit folgt  $\langle x, Tx \rangle = 0$  und wegen  $T|_{\tilde{\mathcal{H}}^\perp} \in \mathcal{K}(\tilde{\mathcal{H}}^\perp)$  selbstadjungiert gilt nach Bemerkung 7.29  $T|_{\tilde{\mathcal{H}}^\perp} = 0$ , das heißt  $\tilde{\mathcal{H}}^\perp \subset \ker T$ .

Die  $e_k$  bilden eine Orthonormalbasis von  $\tilde{\mathcal{H}}$ : Für  $x \in \mathcal{H}$  existieren  $\tilde{x} \in \tilde{\mathcal{H}}$  und  $\tilde{x}^\perp \in \tilde{\mathcal{H}}^\perp$  mit  $x = \tilde{x} + \tilde{x}^\perp$ . Es gilt dann

$$Tx = T\tilde{x} + T(\tilde{x}^\perp) = T\tilde{x} = T\left(\sum_{k=0}^{\infty} \langle e_k, \tilde{x} \rangle \cdot e_k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \langle e_k, x \rangle Te_k = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k \langle e_k, x \rangle \cdot e_k$$

Also gilt (iv). Damit folgt auch (ii). (i) folgt aus (iv) und (ii). Da  $T$  kompakt ist, existiert eine konvergente Teilfolge  $(Te_{k_l})_{l \in \mathbb{N}}$ . Es gilt

$$0 = \lim_{l, m \rightarrow \infty} \|Te_{k_l} - Te_{k_m}\| = \lim_{l, m \rightarrow \infty} \|\lambda_{k_l} \cdot e_{k_l} - \lambda_{k_m} e_{k_m}\| = \lim_{l, m \rightarrow \infty} \sqrt{\lambda_{k_l}^2 + \lambda_{k_m}^2}$$

Damit folgt  $\lambda_{k_l} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0$ . Damit müssen wegen der Absteigenden Folge auch  $\lambda_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ . □

## 8.11. Corollar

(i)  $\mathcal{K}(\mathcal{H}) = \overline{\mathcal{F}(\mathcal{H})}^{\|\cdot\|}$ , wobei  $\mathcal{F}(\mathcal{H}) := \{T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}) \mid T(\mathcal{H}) \text{ endlichdimensional}\}$ .

(ii)  $\mathcal{K}(\mathcal{H})$  ist selbstadjungiert, das heißt  $T \in \mathcal{K}(\mathcal{H}) \iff T^* \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$ .

### Beweis

Übung! (Blatt 14) □

<sup>17</sup> „teilweiser Limes“ mit:  $|\langle x_k, Tx_k \rangle - \langle x_k, \bar{y} \rangle| = |\langle x_k, Tx_k - \bar{y} \rangle| \leq \|x_k\| \cdot \|Tx_k - \bar{y}\| \rightarrow 0$

## 9. Fredholm-Operatoren. Ein Index

### 9.1. Definition

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum. Ein Operator  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$  heißt **Fredholm-Operator**<sup>18</sup>, falls gilt:

- (i)  $\ker T$  ist endlichdimensional.
- (ii)  $\operatorname{Im} T \subset \mathcal{H}$  ist abgeschlossen.
- (iii)  $\mathcal{H}/\operatorname{Im} T$  ist endlichdimensional (endliche Kodimension).

In diesem Fall definieren wir den **Fredholm-Index** von  $T$  als

$$\operatorname{ind}(T) := \dim(\ker T) - \dim(\mathcal{H}/\operatorname{Im} T) \in \mathbb{Z}$$

Wir schreiben  $\operatorname{Fred}(\mathcal{H}) := \{T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}) \mid T \text{ ist Fredholm}\}$ .

RevChap9

### 9.2. Satz (Fredholm-Riesz)

Sei  $\mathcal{H}$  ein Hilbertraum und  $S \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$ . Dann ist  $T := \operatorname{id}_{\mathcal{H}} - S$  Fredholm.

**Beweis**

- (i)  $\ker T \subset \mathcal{H}$  ist abgeschlossen, also ein Unterhilbertraum. Sei  $P := \operatorname{proj}_{\ker T}$  die orthogonale Projektion auf  $\ker T$ , das heißt für  $\mathcal{H} \ni x = x_0 + x_1$  mit  $x_0 \in \ker T$  und  $x_1 \in (\ker T)^\perp$  ist  $P(x) = x_0$ . Es ist  $P \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$  (warum?). Dann ist

$$P = \operatorname{id}_{\mathcal{H}} \circ P \stackrel{T \circ P = 0}{=} S \circ P \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$$

Also ist  $P|_{\ker T} = \operatorname{id}_{\ker T} \in \mathcal{K}(\ker T)$ . Damit ist  $\ker T$  endlichdimensional.

- (ii) Es ist  $T|_{(\ker T)^\perp} : (\ker T)^\perp \rightarrow \operatorname{Im} T$  ist bijektiv und stetig. Zu zeigen ist, dass  $(T|_{(\ker T)^\perp})^{-1}$  stetig ist, denn dann ist  $\operatorname{Im} T$  vollständig, also auch abgeschlossen.

Falls  $(T|_{(\ker T)^\perp})^{-1}$  nicht stetig ist, so existiert eine Folge  $(x_n)_n \subset (\ker T)^\perp$  mit  $\|x_n\| = 1$  und  $Tx_n \rightarrow 0$ . Nach Übergang zu einer Teilfolge dürfen wir  $Sx_n \rightarrow \bar{y}$  für ein  $\bar{y} \in \mathcal{H}$  annehmen. Da  $Tx_n \rightarrow 0$ , folgt  $x_n = \operatorname{id}_x x_n \rightarrow \bar{y}$ . Aber dann ist auch  $\bar{y} \in (\ker T)^\perp$ ,  $\|\bar{y}\| = 1$  und  $\bar{y} \in \ker T$ .  $\nmid$


- (iii) Es ist

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}/\operatorname{Im} T)^* &\cong ((\operatorname{Im} T)^\perp)^* = \kappa((\operatorname{Im} T)^\perp) = \{\langle y, \cdot \rangle \mid \langle y, Tx \rangle = 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{H}\} \\ &= \{\langle y, \cdot \rangle \mid \langle T^*y, x \rangle = 0 \text{ für alle } x \in \mathcal{H}\} \\ &= \{\langle y, \cdot \rangle \mid y \in \ker T^*\} \\ &= \kappa(\ker T^*) \cong \ker T^* = \ker(\operatorname{id}_{\mathcal{H}} - S^*) \end{aligned}$$

Dies ist endlichdimensional nach (i), da  $S^* \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$  nach 8.11. □

### 9.3. Satz

$\operatorname{Fred}(\mathcal{H}) \subset \mathcal{L}(\mathcal{H})$  ist offen bezüglich der Normtopologie. Die Abbildung  $\operatorname{ind}: \operatorname{Fred}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{Z}$  ist stetig.

<sup>18</sup>nach Erik Ivar Fredholm, siehe [https://de.wikipedia.org/wiki/Erik\\_Ivar\\_Fredholm](https://de.wikipedia.org/wiki/Erik_Ivar_Fredholm) 

### Beweis

Sei  $T \in \text{Fred}(\mathcal{H})$ . Wir haben  $\ker T \oplus (\ker T)^\perp = \mathcal{H} = \text{Im } T \oplus (\text{Im } T)^\perp$  abgeschlossen.

- (i) Für  $S \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$  definiere  $\tilde{S}: \tilde{\mathcal{H}} := (\ker T)^\perp \oplus (\text{Im } T)^\perp \rightarrow \mathcal{H}$  durch  $\tilde{S}(v, w) := S(v) + w$ . Dann ist  $\tilde{S}$  stetig und die Abbildung

$$\tilde{\cdot}: \mathcal{L}(\mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{H}}, \mathcal{H}), \quad S \longmapsto \tilde{S}$$

stetig.  $\tilde{T}$  ist bijektiv und stetig. Nach dem Satz von Inversen Operator ist  $\tilde{T}$  also ein Homöomorphismus. Mit 8.3 folgt, dass  $\tilde{T}$  eine Umgebung von Homöomorphismen  $\tilde{U} \subset \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{H}}, \mathcal{H})$  besitzt. Also besitzt  $T$  eine Umgebung  $U \subset \mathcal{L}(\mathcal{H})$ , sodass für alle  $S \in U$  der Operator  $\tilde{S}$  ein Homöomorphismus ist. Für jedes  $S \in U$  gilt:

- 1)  $S((\ker T)^\perp) \subset \mathcal{H}$  ist abgeschlossen, denn  $\tilde{S}((\ker T)^\perp) = (\tilde{S}^{-1})^{-1}((\ker T)^\perp)$ ,  $(\ker T)^\perp$  ist abgeschlossen und  $\tilde{S}((\ker T)^\perp) = \tilde{S}((\ker T)^\perp)$
- 2) Es gilt

$$\dim \mathcal{H}/S((\ker T)^\perp) = \dim \mathcal{H}/\tilde{S}((\ker T)^\perp) = \dim \tilde{\mathcal{H}}/(\ker T)^\perp = \dim(\text{Im } T)^\perp$$

- 3) Es gilt  $(\ker S) \cap (\ker T)^\perp = \{0\}$ : Es ist  $S|_{(\ker T)^\perp} = \tilde{S}|_{(\ker T)^\perp}$ , aber  $\tilde{S}$  ist injektiv, da  $S \in U$ . Insbesondere  $\dim(\ker S) \leq \dim(\ker T) < \infty$ .
- 4)  $\text{Im } S \subset \mathcal{H}$  ist abgeschlossen:  $S((\ker T)^\perp) \subset S(\mathcal{H}) = \text{Im } S$ . Nach 1) ist  $S((\ker T)^\perp) \subset \mathcal{H}$  abgeschlossen. Es gilt

$$\dim(S(\mathcal{H})/S((\ker T)^\perp)) \leq \dim(\mathcal{H}/S((\ker T)^\perp)) = \dim(\text{Im } T)^\perp < \infty$$

Also ist  $S(\mathcal{H}) = S((\ker T)^\perp) + V$  für ein  $V \subset \mathcal{H}$  endlichdimensional und damit ist  $S(\mathcal{H}) \subset \mathcal{H}$  abgeschlossen.

- 5) Es ist  $\dim \mathcal{H}/S(\mathcal{H}) \leq \dim \mathcal{H}/S((\ker T)^\perp) < \infty$ .

Aus 3), 4) und 5) folgt nun, dass  $S \in U$  ein Fredholm-Operator ist.

- (ii) Sei  $S \in U$ . Dann ist  $(\ker S) \cap (\ker T)^\perp \stackrel{3)}{=} \{0\}$ , also  $\ker S \times (\ker T)^\perp \times Z \cong \mathcal{H}$  als Vektorräume für ein  $Z \subset \mathcal{H}$  endlichdimensional. Dann gilt

$$\dim(\ker S) + \dim Z = \dim(\ker T)$$

Wir wissen bereits, dass  $\dim(\mathcal{H}/S((\ker T)^\perp)) = \dim(\text{Im } T)^\perp = \dim(\mathcal{H}/\text{Im } T)$  gilt. Es ist  $\text{Im } S \cong S((\ker T)^\perp) \times S(Z)$ , also

$$\dim(\mathcal{H}/\text{Im } S) = \dim(\mathcal{H}/S((\ker T)^\perp)) - \dim(S(Z)) = \underbrace{\dim(\mathcal{H}/\text{Im } T) - \dim(\ker T)}_{=\text{ind } T} + \dim(\ker S)$$

Also ist  $\text{ind } S = \text{ind } T$ . □

### 9.4. Corollar

Sei  $K \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$ . Dann gilt  $\text{ind}(\text{id}_{\mathcal{H}} - K) = 0$ .

#### Beweis

Die Abbildung  $t \mapsto \text{id}_{\mathcal{H}} - t \cdot K$  ist stetig, also ist  $\text{ind}(\text{id}_{\mathcal{H}} - t \cdot K) = \text{ind } \text{id}_{\mathcal{H}} = 0$ . □

## 9.5. Beispiele

(i) Sei  $S \in \mathcal{L}(\ell^2(\mathbb{N}))$  der unilaterale Shift, d.h.  $S((\alpha_i)_i) = (0, \alpha_0, \alpha_1, \dots)$ .  $S$  ist offensichtlich isometrisch, also auch injektiv und somit ist  $\dim(\ker S) = 0$ . Weiter ist  $\dim(\ell^2(\mathbb{N})/\operatorname{Im} S) = 1$ . Damit ist  $S$  ein Fredholm-Operator mit  $\operatorname{ind} S = -1$ .

(ii) Für  $k \in C([0, 1] \times [0, 1])$  sei  $K \in \mathcal{L}(L^2([0, 1]))$  gegeben durch

$$K(f)(t) := \int_{[0,1]} k(s, t) \cdot f(s) ds$$

Es ist  $K \in \mathcal{K}(L^2([0, 1]))$ . Dann ist  $\ker(\operatorname{id} - K)$  der Lösungsraum der Integralgleichung  $f(t) = \int k(s, t) \cdot f(s) ds$ .

(iii) Sei  $M$  ein  $C^\infty$ -Mannigfaltigkeit,  $\mu$  ein verträgliches Borelmaß. Dann ist  $C^\infty(M) \subset L^2(M)$  dicht. Sei  $D: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$  ein geeigneter Differentialoperator.  $D$  ist im Allgemeinen nicht beschränkt. Aber dann ist der Operator

$$\tilde{D} := \frac{D}{\sqrt{1 + D^*D}}$$

beschränkt und dicht definiert und lässt sich auf ganz  $L^2(M)$  fortsetzen. Unter geeigneten Bedingungen ist  $\tilde{D}$  Fredholm.  $\ker \tilde{D}$  bzw.  $\operatorname{coker} \tilde{D}$  entsprechen Lösungsräumen von partielle Differentialgleichungen.

## 10. Ausblick

### 10.1. Frage

Sei  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ . Existiert ein nicht trivialer Unterraum  $X \subset \mathcal{H}$  mit  $T(X) \subset X$ ? Das gilt nicht für Operatoren auf Banachräumen (Per Enflo, [https://de.wikipedia.org/wiki/Per\\_Enflo](https://de.wikipedia.org/wiki/Per_Enflo)).

### 10.2. Beispiel

- (i) Sei  $G$  eine abzählbare diskrete Gruppe. Sei  $u: G \rightarrow \mathcal{L}(\ell^2(G))$  gegeben durch  $u_g(f)(h) := f(g^{-1}h)$  für  $g \in G, f \in \ell^2(G), h \in G$ . Betrachte

$$C_r^*(G) := \overline{\text{Alg}(u_g : g \in G)}^{\|\cdot\|} \subset \mathcal{L}(\ell^2(G))$$

$$\text{VN}(G) := \overline{\text{Alg}(u_g : g \in G)}^{\text{w.o.t.}} \subset \mathcal{L}(\ell^2(\mathbb{N}))$$

Was ist die Struktur dieser Algebra? Existiert  $\text{VN}(\mathbb{F}_m) \cong \text{VN}(\mathbb{F}_n)$ ?

- (ii) Sei  $\Omega$  ein kompakter Hausdorffraum,  $\alpha: \Omega \rightarrow \Omega$  ein Homöomorphismus.  $\sim$  Wirkung von  $\mathbb{Z}$  auf  $C(\Omega)$ .  $(\Omega, \alpha)$  heißt dynamisches System.  $\sim C(\Omega) \rtimes \mathbb{Z}$ . Zum Beispiel  $\Omega = S^1$ ,  $\alpha$  Rotation um  $2\pi\theta$ . Nun ist interessant, ob  $\theta \in \mathbb{Q}$  oder  $\theta \notin \mathbb{Q}$ . Damit ergibt sich die Rotationsalgebra  $A_\theta$ , die sich den Winkel  $\theta$  „merkt“.



## A. Anhang

### A.1. Vierecksungleichung

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $x, y, u, v \in X$ . Dann gilt

$$|d(x, y) - d(u, v)| \leq d(x, u) + d(y, v)$$

#### Beweis

Einerseits gilt nach der Dreiecksungleichung

$$d(x, y) \leq d(x, u) + d(u, v) + d(v, y) \implies d(x, y) - d(u, v) \leq d(x, u) + d(y, v)$$

Andererseits aber auch

$$d(u, v) \leq d(u, x) + d(x, y) + d(y, v) \implies d(u, v) - d(x, y) \leq d(x, u) + d(y, v)$$

Insgesamt folgt also die Behauptung.  $\square$

### A.2. Abschluss einer konvexen Menge ist konvex

Sei  $X$  ein topologischer Vektorraum, von dem wir der Einfachheit halber annehmen, dass die Topologie von einer Norm induziert wird. Sei  $M \subset X$  konvex. Dann ist auch  $\overline{M}$  konvex.

#### Beweis

Seien  $a, b \in \overline{M}$ ,  $\lambda \in [0, 1]$ . Dann existieren für jedes  $\varepsilon > 0$  Elemente  $a', b' \in M$  mit  $\|a - a'\| < \varepsilon$  und  $\|b - b'\| < \varepsilon$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \|((1 - \lambda) \cdot a + \lambda \cdot b) - ((1 - \lambda) \cdot a' + \lambda \cdot b')\| &= \|(1 - \lambda) \cdot (a - a') + \lambda \cdot (b - b')\| \\ &\leq |1 - \lambda| \cdot \|a - a'\| + |\lambda| \cdot \|b - b'\| \\ &\leq |1 - \lambda + \lambda| \cdot \varepsilon = \varepsilon \end{aligned}$$

Da  $\varepsilon > 0$  beliebig war, folgt somit  $(1 - \lambda) \cdot a + \lambda \cdot b \in \overline{M}$ .  $\square$

### A.3. Beweis von Aufgabe 2 von Blatt 7

Dies ist eine Teilaussage im Beweis des Satzes von Riesz-Fischer (4.11).

Es sei  $(X, \Sigma, \mu)$  ein Maßraum,  $p \in [1, \infty)$  und  $(f_n)_n \subset \mathcal{L}^p(\mu)$  eine Folge  $p$ -integrierbarer Funktionen.

#### Behauptung

Es existieren messbare Mengen  $E_l \subset X$  mit  $\mu(E_l) < \infty$ ,  $l \in \mathbb{N}$ , sodass für  $E := \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l$  gilt  $\chi_E \cdot f_n = f_n$  fast überall für  $n \in \mathbb{N}$ .

#### Beweis

Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Für  $l \in \mathbb{N}$  definieren wir  $E_{l,n} := f_n^{-1}\left((-\infty, -\frac{1}{l}) \cup (\frac{1}{l}, \infty)\right)$ . Da  $(-\infty, -\frac{1}{l})$  und  $(\frac{1}{l}, \infty)$  Borelmengen sind und  $f_n$  messbar ist, ist  $E_{l,n} \subset X$  messbar, also  $E_{l,n} \in \Sigma$ . Wir zeigen, dass  $\mu(E_{l,n}) < \infty$  gilt: Für  $x \in E_{l,n}$  gilt  $|f_n(x)| > \frac{1}{l} \Rightarrow |f_n(x)|^p > \frac{1}{l^p}$ . Es folgt mit der Monotonie des Integrals

$$\int_{E_{l,n}} \frac{1}{l^p} d\mu < \int_{E_{l,n}} |f_n|^p d\mu < \infty$$

da  $f_n \in \mathcal{L}^p(\mu)$ . Da  $\frac{1}{l^p} < \infty$ , folgt also  $\mu(E_{l,n}) < \infty$ . Setze nun  $E := \bigcup_{l,n} E_{l,n}$ . Dies ist eine abzählbare Vereinigung. Es bleibt  $\chi_E \cdot f_n = f_n$  fast überall zu zeigen. Sei also  $x \in X$  beliebig. Wenn  $f_n(x) = 0$ , dann gilt die Gleichung trivialerweise. Andernfalls existiert ein  $l \in \mathbb{N}$  mit  $|f_n(x)| > \frac{1}{l}$ , also  $x \in E_{l,n} \subset E$ . Wenn wir für  $f_n$  den Wert  $\infty$  zulassen, dann gilt die Gleichung auf der Nullmenge  $\{x \in X \mid f_n(x) = \infty\}$  nicht. Also gilt die Gleichung fast überall.  $\square$

#### A.4. Beweis der Aussagen aus 7.31

Wir zeigen zunächst  $T \leq \|T\| \cdot \text{id}_{\mathcal{H}}$

$$\langle x, \|T\| \cdot x - Tx \rangle = \|T\| \cdot \langle x, x \rangle - \langle x, Tx \rangle \stackrel{7.29}{\geq} \|T\| \cdot \|x\|^2 - \|T\| \cdot \|x\|^2 = 0$$

Genauso folgt  $-\|T\| \cdot \text{id}_{\mathcal{H}} \leq T$  aus der Abschätzung  $|\langle x, Tx \rangle| \leq \|T\| \cdot \|x\|^2$  (7.29)

$$\langle x, Tx - (-\|T\| \cdot x) \rangle = \langle x, Tx \rangle + \|T\| \cdot \langle x, x \rangle \geq 0$$

Die Abbildung  $\langle \cdot, \cdot \rangle_T: (y, x) \mapsto \langle y, Tx \rangle$  ist positiv-semidefinit hermitesch, da  $T$  selbstadjungiert ist und  $T \geq 0$  gilt. Also können wir die Cauchy-Schwarz-Ungleichung anwenden:

$$|\langle y, Tx \rangle|^2 = |\langle y, x \rangle_T|^2 \leq \langle y, y \rangle_T \cdot \langle x, x \rangle_T = \langle y, Ty \rangle \cdot \langle x, Tx \rangle$$

Damit ist auch die letzte Aussage bewiesen.  $\square$

#### A.5. Ausführlicher Beweis zu 8.3 mit Neumann-Reihen (Aufgabe 2 von Blatt 5)

Seien  $X, Y$  Banachräume und  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  bijektiv (also injektiv). Falls für  $S \in \mathcal{L}(X, Y)$  gilt

$$\|T - S\|_{\mathcal{L}(X, Y)} < \|T^{-1}\|_{\mathcal{L}(Y, X)}^{-1},$$

so ist auch  $S$  bijektiv.

##### Über Neumann-Reihen

Für  $T \in \mathcal{L}(X, X)$  ist die **Neumann-Reihe** definiert als

$$\sum_{n=0}^{\infty} T^n$$

Sie hat unter anderem die folgenden wichtigen Eigenschaften<sup>19</sup>

- (i) Wenn  $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$  bezüglich  $\|\cdot\|$  konvergiert, so ist  $\text{id}_X - T$  invertierbar mit  $(\text{id}_X - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$
- (ii) Die Reihe konvergiert, falls  $(X, \|\cdot\|)$  ein Banachraum ist und  $\|T\| < 1$  gilt.

Ersteres sieht man leicht, denn wenn die Summe konvergiert, dann gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\text{id}_X - T) \left( \sum_{n=0}^k T^n \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \sum_{n=0}^k T^n - \sum_{n=0}^k T^{n+1} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\text{id}_X - T^{k+1}) = \text{id}_X$$

Für die zweite Aussage zeigt man, dass  $\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\|$  konvergiert:

$$\sum_{n=0}^k \|T^n\| \leq \sum_{n=0}^k \|T\|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|T\|^n \stackrel{\|T\| < 1}{=} \frac{1}{1 - \|T\|} < \infty$$

Jetzt muss man nur noch zeigen, dass in Banachräumen aus absoluter Konvergenz normale Konvergenz folgt, um das Argument abzuschließen.

##### Beweis der der eigentlichen Aussage


Es gilt  $S = T - (T - S) = T(\text{id}_X - T^{-1}(T - S))$ . Wir erhalten nun

$$\|T^{-1}(T - S)\| = \sup_{x \in X} \|T^{-1}(Tx - Sx)\|_X \leq \sup_{x \in X} \|T^{-1}\| \cdot \|Tx - Sx\|_Y = \|T^{-1}\| \cdot \|T - S\| < 1$$

Also ist  $\text{id}_X - T^{-1}(T - S)$  nach den obigen Eigenschaften der Neumann-Reihe invertierbar. Da  $T$  invertierbar ist, ist  $S = T(\text{id}_X - T^{-1}(T - S))$  als Komposition invertierbarer Abbildungen auch invertierbar mit  $S^{-1} = (\sum_{n=0}^{\infty} (T^{-1}(T - S))^n) T^{-1}$ .  $\square$

<sup>19</sup>siehe auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Neumann-Reihe>  $\square$

## Index

Die **Seitenzahlen** sind mit *Hyperlinks* zu den entsprechenden Seiten versehen, also anklickbar 

- 1. abzählbar, 29
- 2. abzählbar, 29
- abgeschlossen, 1
- Abschluss, 1
- adjungierter Operator, 47
- Algebra, 8
- analytisch, 51
- Banachalgebra, 11
- Banachraum, 11
- Besselsche Ungleichung, 46
- Cauchy-Folge, 1
- Cauchy-Schwarz-Ungleichung, 39
- Distanz  $\text{dist}$ , 15
- Dualraum, 8
- einfach, 21
- erweiterte Metrik, 4
- Fredholm-Index, 55
- Fredholm-Operator, 55
- Funktionale, 8
- gleichmäßig konvex, 34
- gleichmäßig stetig, 1
- Hamelbasis, 43
- hermitesche Form, 39
  - positiv definit, 39
  - positiv semidefinit, 39
- Hilbertraum, 41
- Hilbertraumbasis, 43
- Homöomorphismus, 20
- Hölder-Ungleichung, 22
- induktiv geordnet, 12
- Isometrie, 1
- isometrischer Isomorphismus, 1
- Jensen-Ungleichung, 36
- kanonische Inklusion, 17
- kompakter Operator, 52
- konjugiert linear, 42
- konvex, 14
- konvexe Hülle, 14
- Lebesgue-Maß, 21
- lokalkompakt, 6
- Maßraum, 21
- messbar, 21
- metrischer Raum, 1
- Minkowski-Ungleichung, 23
- normierte  $\mathbb{K}$ -Algebra, 9
- offen, 1
- Operator
  - beschränkter Operator, 8
- Operatoren, 8
- Operatornorm, 8
- orthogonal, 43
- orthogonales Komplement, 43
- Orthonormalsystem, 43
- Parallelogrammgesetz, 40
- Parselvalsche Gleichung, 46
- Polarisierungsidentität, 41
- Prä-Hilbertraum, 41
- punktwise gleichmäßig beschränkt, 6, 18
- reflexiv, 30
- Resolvente, 51
- Resolventenabbildung, 51
- Resolventenmenge, 51
- Riesz-Fischer, 24
- Satz des Pythagoras, 43
- schwache Konvergenz, 26
- schwache Topologie, 26
- selbstadjungiert, 49
- separabel, 6, 29
- Sesquilinearform, 41
- Skalarprodukt, 39
- Spektrum, 51
- starke Operatortopologie, 50
- stetig, 1, 7
- strikt konvex, 35
- sublinear, 11
- summierbar, 44
- topologischer Vektorraum, 7
- transponierte Abbildung, 17
- unilateral Shift, 51, 57

unital, 9

Vervollständigung, 2

vollständig, 1

$w^*$ -Topologie, 27

Young-Ungleichung, 22

Zählmaß, 21

## Abbildungsverzeichnis

1. Einheitskugeln der $p$ -Norm auf $\mathbb{R}^2$ für $p = 2$ , $p = 1$ und $p = \infty$	34
2. Zeichnung zum Beweis von 6.3	35
3. Die Parallelogrammgleichung in $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$	40

## To-do's und andere Baustellen

genauer ausführen	29
Beweis vervollständigen	42
stimmt noch nicht so ganz, aber passt schon ...	43
Das stimmt noch nicht so ganz. man bräuchte noch $e^{-i\sigma} \langle x, Ty \rangle \in \mathbb{R}$ oder Ähnliches, um die Konjugation loszuwerden. Solche $\rho, \sigma$ muss es aber nicht unbedingt geben ...	49
Beweis vervollständigen/korrigieren	50
Beweis durchsehen ...	53
RevChap9	55