## جبر خطی

دانشكده مهندسي كامپيوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی بهار ۱۴۰۳



تمرین تئوری چهارم تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تبدیل خطی، تغییر پایه، دایمنشن و رنک

- ۱. پرسشهای خود درمورد این تمرین را در سامانه کوئرا مطرح کنید.
- ۲. سیاست ارسال با تاخیر: شما در مجموع در طول نیمسال می توانید از ۱۶ روز تاخیر استفاده کنید. این مقدار برای تمارین تئوری و عملی به صورت جداگانه
  حساب می شود. تاخیرها با مقیاس ساعت محاسبه شده و به بالا گرد می شوند.
- ۳. سیاست مشارکت دانشجویان در حل کردن تمارین: دانشجویان میتوانند در حل تمارین برای رفع ابهام و یا بهدست آوردن ایده ی کلی با یک دیگر مشورت و همفکری کنند. این کار مورد تایید و تشویق تیم ارائه ی درس می باشد؛ چرا که همفکری و کار گروهی می تواند موجب تقویت یادگیری شود. اما به دست آوردن جزئیات راه حل و نگارش پاسخ باید تماما توسط خود دانشجو انجام شود. حتما در انتهای پاسخ های ارسالی خود نام افرادی که با آن ها همفکری کردید را ذکر کنید.

**پرسش ۱** (۲۰ نمره)

الف) ثابت كنيد:

 $Nullity\{ABC\} \leq Nullity\{A\} + Nullity\{B\} + Nullity\{C\}$ 

ب) ثابت كنيد:

 $Rank\{ABC\} \leq min\{Rank\{A\}, Rank\{B\}, Rank\{C\}\}$ 

ی) با فرض  $\bullet = ABC$  ثابت کنید:

$$Rank\{CBA\} \leq \lfloor \frac{\mathrm{Y}n}{\mathrm{Y}} \rfloor$$

ت) اگر A یک ماتریس n در n باشد، ثابت کنید عبارات زیر همارز هستند:

$$N(A) = N(A^{\mathsf{Y}})$$

$$R(A) = R(A^{\mathsf{Y}})$$

$$R(A) \cap N(A) = \{ \cdot \}$$

**یرسش ۲** (۲۰ نمره)

الف) فرض کنید  $\varphi \in (V, F)$ . با فرض اینکه  $u \in V$  در  $\varphi$  نباشد، ثابت کنید

 $V=\varphi\oplus\{au:a\in F\}.$ 

ب) فرض کنید A یک ماتریس m در n با شرط  $\bullet \neq A$  باشد.

 $j=1,\dots,m$  ثابت کنید رنک A برابر ۱ است اگر و تنها اگر  $(c_1,\dots,c_m)\in F^m$  و  $(c_1,\dots,c_m)\in F^m$  برای هر  $(c_1,\dots,c_m)\in F^m$  برای

**پرسش ۳** (۲۵ نمره)

الف) ماتریس تبدیل پایه 
$$P$$
 از پایه  $\beta = \{ \mathsf{T} x^\mathsf{T} + \mathsf{T} x + \mathsf{I}, \mathsf{T} x^\mathsf{T} + \mathsf{T} x + \mathsf{I}, -x^\mathsf{T} - \mathsf{T} \}$  به  $\alpha = \{ x^\mathsf{T} + x + \mathsf{I}, x^\mathsf{T} + \mathsf{I}, x - \mathsf{I} \}$  را بیابید.

ب) از نتیجه ی بخش الف برای محاسبه ی ماتریس تبدیل پایه  $\beta$  به  $\alpha$  استفاده کنید.

ج) فرض کنید تابع چند جملهای درجه ۲ 
$$p(x)$$
 دارای مختصات  $p(x)$  دارای مختصات به پایه  $p(x)$  دارای مختصات به  $p(x)$  دارای دارا

پرسش T (۱۵ نمره) فرض کنید V ابعاد محدودی داشته باشد و داشته باشیم  $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V, W)$ . ثابت کنید رنج  $T_1$  با رنج  $T_2$  برابر است اگر و تنها اگر عمکوس پذیر  $S \in \mathcal{L}(V)$  وجود داشته باشد به گونه ای که  $T_1 = T_1 S$ 

**یرسش ۵** (۲۰ نمره) فرض کنید

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ \cdot & -1 & \cdot \\ 1 & 7 & -7 \end{bmatrix}$$

آیا ماتریس A با درایههای صحیح وجود دارد بهگونهای که برابری زیر برقرار باشد؟

$$A^{\Upsilon} = AB + \Upsilon I$$