

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضان
پاییز ۱۴۰۲



قضایای اسلاید هفتم

مثال ۱

کدام یک یکتا است؟

(آ) نشان دادن یک بردار بر اساس یک پایه خاص.

(ب) پایه برای \mathbb{R}^2 .

(ج) پایه‌های یکه برای مورد قبل.

(آ) یکتا نبودن این مورد با استقلال خطی پایه در تضاد است.

(ب) به طور کلی پایه‌ها یکتا نیستند. به طور مثال

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \right\}$$

(ج) مثال قبلی در این مورد را هم نقض می‌کند.

(آ) پایه استاندارد برای $P_n(\mathbb{R})$ چیست؟

(ب) آیا 1 و $x - 1$ و $x + 1$ و x^2 یک پایه برای $P_2(\mathbb{R})$ هستند؟

(آ) پایه استاندارد برای $P_n(\mathbb{R})$ برابر است با

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

(ب) اول باید نشان دهیم که این ۳ تابع هر تابعی به فرم $ax^2 + bx + c$ را میسازند. کافی است قرار دهیم

$$\alpha_1 = a, \alpha_2 = \frac{b+c}{2}, \alpha_3 = \frac{b-c}{2}$$

انگاه خواهیم داشت

$$\alpha_1 x^2 + \alpha_2 (x+1) + \alpha_3 (x-1) = ax^2 + bx + c$$

حال که نشان دادیم همه توابع را می سازند باید استقلال آنها را نشان دهیم.

$$\alpha_1 x^2 + \alpha_2 (x+1) + \alpha_3 (x-1) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = 0, \alpha_2 + \alpha_3 = 0, \alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0$$

فرض کنید x_1, \dots, x_m یک پایه برای یک فضای برداری باشد. آنگاه هر مجموعه از بردارهای مستقل خطی V تعدادش بیشتر از m نیست.

در ابتدا فرض می‌کنیم که تعداد اعضای مجموعه V از m بیشتر باشد. حال چون X یک پایه می‌باشد می‌توانیم هر کدام از v_i ها را می‌توانیم بر اساس x_1, \dots, x_m بنویسیم.

$$v_i = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} x_j$$

حال با توجه به اینکه v_i ها مستقل هستند تنها جواب معادله

$$\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0$$

باید برابر با 0 باشد اما داریم

$$\sum_{i=1}^n \beta_i \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} x_j = \sum_{j=1}^m x_j \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_{ij} = 0$$

با توجه به اینکه X یک پایه است پس یک مجموعه مستقل خطی است پس داریم.

$$\forall_j \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_{ij} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

حال اگر بخواهیم این معادله را با عملیات‌های سطری حل کنیم، با توجه به اینکه تعداد معادلات از تعداد متغیرها از تعداد معادلات بیشتر هستند، حداقل یک free variable خواهیم داشت. بنابراین این معادله برای β ها جواب غیربدهی دارد و این با استقلال خطی v_i ها در تضاد است.

اگر V یک فضایی با بعد متناهی باشد، آنگاه هر دو مجموعه پایه برای این فضا تعداد برابری اعضا دارند.

فرض کنید V_1 و V_2 با تعداد اعضای n_1 و n_2 باشند. آنگاه طبق قضیه ۱ داریم

$$n_1 \leq n_2, \quad n_2 \leq n_1$$

$$\implies n_1 = n_2$$

بعد و پایه استاندارد را برای هر مورد مشخص کنید.
 \mathbb{R}^n (آ)

(ب) P_n

(ج) $M_{m,n}$

(د) P , all polynomials

(ه) F , all functions

(و) C , all continuous functions

(آ) پایه استاندارد برابر است با

$$e_1, \dots, e_n$$

و بعد آن هم برابر با تعداد آن‌ها n است.

(ب) پایه استاندارد برابر است با

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

و بعد برابر با تعداد آن‌ها $n + 1$ است.

(ج) پایه استاندارد برای آن‌ها برابر است با

$$E_{11}, \dots, E_{mn}$$

که هر کدام از آن‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$[E_{mn}]_{ij} = \begin{cases} 1 & i = m, j = n \\ 0 & \text{OW} \end{cases}$$

بعد آن برابر با mn است.

(د) این فضا با بعد نامتناهی می‌باشد و پایه‌های آن برابر است با

$$1, x, \dots$$

(ه) این مورد بعد نامتناهی دارد و یکی از پایه‌های آن برابر است با

$$e^{jw}, w \in \mathbb{R}$$

(و) مانند مورد قبلی.

فرض کنید که مجموعه $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ یک مجموعه مستقل خطی باشد که u در span آن‌ها قرار نداشته باشد. آنگاه مجموعه $\{x_1, \dots, x_n, u\}$ هم یک مجموعه مستقل خطی است.

فرض کنید اینطور نباشد. یعنی ضرایب $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$ وجود دارند که همه آن‌ها صفر نیستند و به ازای آن‌ها داریم

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{n+1} u = 0$$

حال اگر داشته باشیم $\alpha_{n+1} = 0$ آنگاه

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \implies \forall_i \alpha_i = 0$$

که تناقض است. اگر داشته باشیم $\alpha_{n+1} \neq 0$ آنگاه

$$u = \frac{1}{\alpha_{n+1}} \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$$

که باز هم خلاف فرض است. بنابراین چنین ضرایبی وجود ندارند.

فرض کنید W زیرفضایی از V باشد بنابراین هر زیرمجموعه مستقل خطی از W بخشی از یک پایه برای W می باشد.

در ابتدا فرض کنید که این مجموعه مستقل خطی X را بنامیم. اگر این مجموعه W را به طور کامل span کند حکم ثابت شده است. در غیر اینصورت یک عضو از W که در این span قرار ندارد را به آن اضافه می کنیم. این کار را تا جایی ادامه می دهیم که $\text{span } W$ شود. دقت کنید که طبق قضیه ۳ استقلال خطی مجموعه هیچگاه دستخوش تغییر نمی شود بنابراین طبق قضیه ۱ تعداد اعضا این مجموعه همواره کوچکتر یا مساوی $\dim(W)$ است.

فرض کنید W یک زیرفضای سره از V با بعد متناهی باشد. آنگاه داریم $\dim(W) < \dim(V)$.

پایه W را در نظر بگیرید. طبق صورت سوال می‌دانیم حداقل یک عضو u در V وجود دارد که توسط پایه W ساخته نمی‌شود. فرض کنید این پایه $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ باشد که داریم $n = \dim(W)$. بنابراین مجموعه زیر خود مستقل خطی است.

$$\{x_1, \dots, x_n, u\}$$

که تعداد آن‌ها $\dim(W) + 1$ است و طبق قضیه ۱ داریم

$$\dim(W) + 1 \leq \dim(V)$$

$$\implies \dim(W) < \dim(V)$$

فرض کنید W_1, W_2 دو زیرفضا باشند. ثابت کنید که داریم

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2)$$

فرض کنید که $\{u_1, \dots, u_k\}$ پایه‌ای برای $W_1 \cap W_2$ باشد. با توجه به اینکه داریم

$$W_1 \cap W_2 \subseteq W_1, \quad W_1 \cap W_2 \subseteq W_2$$

انگاه این مجموعه را می‌توان به صورت $\{u_1, \dots, u_k, x_1, \dots, x_m\}$ گسترش داد که W_1 و به صورت $\{u_1, \dots, u_k, y_1, \dots, y_n\}$ گسترش داد که W_2 را span کند. حال دقت کنید که $\{u_1, \dots, u_k, x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n\}$ مستقل خطی می‌باشد. اگر اینطور نباشد بعد $W_1 \cap W_2$ از k بیشتر خواهد شد. حال نشان اگر نشان دهیم که $\{u_1, \dots, u_k, x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n\}$ که فضای $W_1 + W_2$ را span می‌کند.

$$x \in W_1 + W_2 \implies x = x_1 + x_2, \quad x_1 \in W_1, x_2 \in W_2$$

$$x_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i, \quad x_2 = \sum_{i=1}^k \gamma_i u_i + \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i$$

$$x = \sum_{i=1}^k (\alpha_i + \gamma_i) u_i + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i + \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i$$

پس داریم

$$\dim(W_1) = k + m, \dim(W_2) = k + n, \dim(W_1 \cap W_2) = k, \dim(W_1 + W_2) = k + m + n$$

بردار $4 - x + 3x^2$ را بر روی پایه‌های $1, x, x^2$ تصویر کنید.

داریم

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

فرض کنید که $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ یک مجموعه مستقل آفین باشد. و p در span آفین این مجموعه باشد. آنگاه p به صورت یکتا توسط S ساخته می‌شود.

می‌دانیم که مجموعه $\{[v_1, 1], \dots, [v_k, 1]\}$ مستقل خطی می‌باشد. حال می‌خواهیم از S بردار p را بسازیم. حال فرض کنید که به دور روش مختلف می‌توان آن را ساخت.

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = p, \quad \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1 \implies \sum_{i=1}^k \alpha_i [v_i, 1] = [p, 1]$$

$$\sum_{i=1}^k \beta_i v_i = p, \quad \sum_{i=1}^k \beta_i = 1 \implies \sum_{i=1}^k \beta_i [v_i, 1] = [p, 1]$$

از تفاضل این دو داریم

$$\implies \sum_{i=1}^k (\alpha_i - \beta_i) [v_i, 1] = 0$$

با توجه به استقلال خطی داریم

$$\forall_i \alpha_i = \beta_i$$

پس یکتا می‌باشد.

بردار $p = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ را بر اساس ترکیب آفین $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$ و $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ و $c = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix}$ بنویسید.

باید ضرایب زیر را پیدا کنیم.

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

داریم

$$x_1 = \frac{5}{12}, \quad x_2 = \frac{1}{3}, \quad x_3 = \frac{1}{4}$$