

# Multizestaw zadań

Robert Fidytek

## 1 Wikieł/Z5.37m

1. Zadanie z Wikieł Z 5.37 m) moja wersja nr [nrWersji]

Wyznaczyć współrzędne punktów przegięcia wykresu podanej funkcji.

$$y = \frac{[a] \ln[c]x}{[b]x}$$

**Rozwiązanie (autor Natalia Danieluk , recenzent ):**

Dziedzina funkcji:  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+$ .

Postępujemy według schematu:

1. Obliczamy pochodne:

$$f'(x) = \frac{([a] \ln[c]x)'[b]x - ([b]x)'[a] \ln[c]x}{([b]x)^2} = \frac{[a](1 - \ln[c]x)}{[b]x^2},$$

$$f''(x) = \frac{[a](1 - \ln[c]x)'[b]x^2 - ([b]x^2)'[a](1 - \ln[c]x)}{([b]x^2)^2} = \frac{[a](-3 + 2 \ln[c]x)}{[b]x^3}$$

i określamy ich dziedziny:  $\mathcal{D}_{f'} = \mathcal{D}_{f''} = \mathbb{R}_+$ .

2. Znajdujemy miejsca zerowe  $f''$ :

Zauważmy, że dla każdego  $x \in \mathcal{D}_f$  mamy  $\frac{[a]}{[b]x^3} > 0$ .

Wystarczy zatem zbadać znak czynnika  $(-3 + 2 \ln[c]x)$ .

$$(-3 + 2 \ln[c]x) = 0 \Leftrightarrow \ln[c]x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}}$$

3. Badamy znak  $f''$  po obu stronach miejsc zerowych.

$$(a) \quad f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(\frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}}, \infty\right)$$

$$(b) \quad f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, \frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}})$$

Tym samym w sąsiedztwie punktów  $x = \frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}}$  druga pochodna zmienia znak, a więc wykres funkcji ma punkty przegięcia w punktach o współrzędnych  $(x_0, f(x_0)) = (\frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}}, \frac{[g]}{[h]}e^{-\frac{3}{2}})$ .

**Odpowiedź:**

Współrzędne punktów przegięcia to:  $(\frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}}, \frac{[g]}{[h]}e^{-\frac{3}{2}})$ .

**Test:**

A. Funkcja nie ma punktów przegięcia. B. Współrzędne punktów przegięcia to:  $(0, 0)$ . C. Współrzędne punktów przegięcia to:  $(e^{\frac{3}{2}}, \frac{[h]}{[g]}e^{-\frac{3}{2}})$ . D. Współrzędne punktów przegięcia to:  $(\frac{1}{[c]}e^{\frac{3}{2}}, \frac{[g]}{[h]}e^{-\frac{3}{2}})$ .

**Test poprawna odpowiedź:**

D