



# 数学专业考研笔记

## 数分高代-结论与真题

作者：谈欣

组织：湖北第二师范学院数学与统计学院

时间：2022/12/31

版本：1.0

自定义：信息



本书参考李扬老师的早期训练营、张祖锦老师的真题，仅供学习用途！

# 目录

<b>第一章 数分重要命题与结论</b>	<b>1</b>
1.1 几个很有用的不等式	2
1.2 基本极限	3
1.3 两个求分式数列极限的杀招	4
1.4 一个易错的命题	4
1.5 三角函数的求和结论	5
1.6 关于欧拉常数	5
1.7 数列递推的两个重要命题	6
1.8 实数系的基本定理	7
1.9 数列的上下极限	8
1.10 数分中的双曲函数	9
1.11 求极限时变量替换的陷阱	10
1.12 函数间的比较关系	10
1.13 等价量的替换	11
1.14 归结原则	12
1.15 连续函数基础	13
1.16 闭区间上连续函数的性质	13
1.17 函数的一致收敛	14
1.18 震撼的反例	15
1.19 原函数与导函数的奇偶性与周期性	15
1.20 乘积的高阶导函数	16
1.21 三大微分中值定理	17
1.22 函数极限的杀招：洛必达法则	18
1.23 泰勒公式	18
1.24 凸性的定义与性质	19
<b>第二章 高代重要命题与结论</b>	<b>20</b>
<b>第三章 数学分析解题总结</b>	<b>21</b>
<b>第四章 高等代数解题总结</b>	<b>22</b>
<b>第五章 数学分析真题集</b>	<b>23</b>
<b>第六章 高等代数真题集</b>	<b>24</b>

# 第一章 数分重要命题与结论

## 1.1 几个很有用的不等式

### 命题 1.1 (Bernoulli 不等式)

设  $h > -1, n \in N_+$ , 则有不等式:

$$(1+h)^n \geq 1+nh, \quad (1.1)$$

成立, 其中  $n > 1$  时等号成立的充要条件是  $h = 0$ .

### 推论 1.1 (对 Bernoulli 不等式的补充)

设  $h > -1, n \in N_+$ , 则有不等式:

$$(1+h)^n \geq 1 + \frac{n(n-1)h^2}{2}, \quad (1.2)$$

成立, 其中  $n > 1$  时等号成立的充要条件是  $h = 0$ .

这个命题以及推论在求数列极限中是有非常大的作用的, 均可由二项式公式轻松推得, 杀伤力极强!

### 命题 1.2 (均值不等式)

设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为  $n$  个非负实数, 则有不等式:

$$\frac{1}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}, \quad (1.3)$$

成立, 其中等号成立的充要条件时  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

均值不等式链的作用是不言而喻的, 在高中就已经接触到的最基本的不等式, 在数分高代中依然屡见不鲜!

### 命题 1.3 (Cauchy-Schwarz 不等式)

对实数  $a_1, a_2, \dots, a_n$  和  $b_1, b_2, \dots, b_n$  有不等式:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \quad (1.4)$$

### 推论 1.2 (柯西不等式积分形式)

假设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 则有不等式:

$$\left( \int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \cdot \int_a^b g(x)^2 dx, \quad (1.5)$$

成立. 其中  $f(x)$  和  $g(x)$  是定义在  $[a, b]$  上的可积函数.

两种形式的柯西不等式, 分别对应求和和积分两种情况——这也让我们有了初步的对求和和积分之间建立桥梁的意识, 二者在做题时在不同情况下有非常好的效果!

**命题 1.4**

如果  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ , 则有不等式:

$$\sin x < x < \tan x. \quad (1.6)$$

$\forall x \geq 0$  有不等式:

$$\sin x \leq x. \quad (1.7)$$

$\forall x \in \mathbb{R}$  有不等式:

$$|\sin x| \leq |x|. \quad (1.8)$$

## 1.2 基本极限

**命题 1.5 (基本极限)**

在求极限时有一些常见的极限, 称之为基本极限:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0, \forall \alpha > 0.$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, \forall |q| < 1.$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \forall a > 0.$
4.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \forall a > 0.$
5.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$

**命题 1.6 (重要极限)**

两个重要极限也是非常重要的:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$
2.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

从此以后遇到的我认为有意义、值得记忆的极限我都会记录在这里, 随时更新!

## 1.3 两个求分式数列极限的杀招

### 命题 1.7 (Cauchy 命题)

设数列  $\{x_n\}$  收敛于  $a$ , 则有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a. \quad (1.9)$$

成立, 其中  $a$  可以是有限数, 也可以是  $+\infty$  或  $-\infty$ , 但不能是  $\infty$ .

### 命题 1.8 (Stolz 定理)

设  $\{b_n\}$  是严格单调递增且趋于  $+\infty$  的数列, 如果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A,$$

则有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A. \quad (1.10)$$

成立, 其中  $A$  可以是有限数, 也可以是  $+\infty$  或  $-\infty$ , 但不能是  $\infty$ .

这两个结论相当的重要, 都没有在课本上出现, 但却是求数列极限的杀招, 尤其是针对分式型数列。

## 1.4 一个易错的命题

### 命题 1.9

对任意的  $p \in \mathbb{N}^+$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = 0,$$

但数列  $\{a_n\}$  未必收敛.

**例题 1.1** 我们在这里可以给出反例来说明本命题的正确: 设  $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ . 由柯西收敛准则知:  $\{a_n\}$  是发散数列. 又对  $\forall p \in \mathbb{N}^+$  有:

$$a_{n+p} - a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \leq \frac{p}{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

故命题证毕.

接下来补充一个命题, 这是华东师大课本上的一道课后习题, 大家可以比较一下这两道题目, 同时思考一下二者的关系, 以及命题 1.1.9 中原数列不收敛的原因

### 命题 1.10

已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = a$ , 则对任意的  $k \in \mathbb{N}^+$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a. \quad (1.11)$$



## 1.5 三角函数的求和结论

### 命题 1.11

$\forall x \neq 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$  时有等式:

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos (n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \quad (1.12)$$

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin (n + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \quad (1.13)$$

这个命题经常在使用狄利克雷判别法时发挥极强的作用!

## 1.6 关于欧拉常数

### 命题 1.12

关于欧拉常数, 有以下两个结论:

1. 对  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ , 有不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (1.14)$$

成立, 且左侧数列单调递增趋于  $e$  而右侧数列单调递减趋于  $e$ .

2. 数列  $\left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right\}$  收敛于欧拉常数  $\phi$ .

## 1.7 数列递推的两个重要命题

### 命题 1.13 (不动点的定义)

设数列  $\{x_n\}$  满足递推公式:

$$a_{n+1} = f(x_n), n \in N^+, \quad (1.15)$$

且有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \quad (1.16)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0), \quad (1.17)$$

则极限  $x_0$  为方程  $f(x) = x$  的根, 此时称  $x_0$  为方程的不动点.

### 命题 1.14 (递推数列推出单调性)

设数列  $\{x_n\}$  满足递推公式:

$$a_{n+1} = f(x_n), n \in N^+, \quad (1.18)$$

其中函数  $f(x)$  与数列  $\{x_n\}$  的每一项均在  $I$  上, 则关于数列  $\{x_n\}$  仅有两种可能:

1. 若  $f(x)$  为单调递增函数, 则数列  $\{x_n\}$  为单调数列.
2. 若  $f(x)$  为单调递减函数, 则数列  $\{x_n\}$  的两个子列  $\{x_{2n}\}$  与  $\{x_{2n-1}\}$  均为单调数列, 但单调性相反.

这两个命题拿出了对待递推公式的数列的应有的礼仪, 一般可以解决问题.

### 命题 1.15 (压缩映射原理)

设  $f(x)$  定义在区间  $[a, b]$  上且有  $f([a, b]) \subset [a, b]$ 。若有  $k \in (0, 1)$  使  $\forall x, y \in [a, b]$  都有不等式:

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \quad (1.19)$$

成立, 则有:

1.  $f(x)$  在  $[a, b]$  上存在唯一的不动点  $\zeta = f(\zeta)$
2. 对于满足  $a_{n+1} = f(a_n)$  的数列  $\{a_n\}$  必有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \zeta. \quad (1.20)$$

压缩映射原理基本上是处理递推数列的最后杀招了, 简而言之最重要的就是要有能力找到压缩系数  $k$ ,



## 1.8 实数系的基本定理

下面的定理为实数系基本定理，以任意的一个为已知条件可以推出另外五个，请务必注意理解这六个定理：

### 定理 1.1 (确界存在定理)

在实数集中，有上界的数集一定有上确界，有下界的数集一定有下确界.



### 定理 1.2 (单调有界定理)

单调有界数列一定收敛.



### 定理 1.3 (Cauchy 收敛准则)

数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是：对于  $\forall \epsilon > 0$ ，存在  $N \in \mathbb{N}^+$ ，使得  $\forall m, n > N$  都有不等式：

$$|a_m - a_n| < \epsilon \quad (1.21)$$

成立.



### 定理 1.4 (闭区间套定理)

设有闭区间序列  $\{[a_n, b_n]\}$  满足条件：

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n, n \in \mathbb{N}^+, \quad (1.22)$$

则存在  $\zeta$  使得  $a_n \leq \zeta \leq b_n, n \in \mathbb{N}^+$ . 若有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n - a_n| = 0, \quad (1.23)$$

则  $\zeta$  唯一，且数列  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  从  $\zeta$  的两侧单调收敛于  $\zeta$ .



### 定理 1.5 (聚点定理)

有界数列必有收敛子集.



### 定理 1.6 (有限覆盖定理)

设  $[a, b] \subset \bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$ ，其中每个  $O_{\alpha}$  都是开区间（此时我们称  $O_{\alpha}$  为  $[a, b]$  上的开覆盖），则存在  $\{O_{\alpha}\}$  的有限子集  $\{O_1, O_2, \dots, O_n\}$  是区间的开覆盖，即：

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n O_i. \quad (1.24)$$



这 6 条定理给我背得死死的，彻底理解清楚！

## 1.9 数列的上下极限

数列的上下极限有两种定义方式，二者是等价的，这里逐个介绍：

### 定义 1.1 (极限点)

数列的极限点是数列的收敛子列的极限。特别地，若存在正（负）无穷大量的子列，亦将  $+\infty(-\infty)$  作为该数列的极限点。

### 定义 1.2 (第一定义)

数列的上极限是该数列最大的极限点，记为  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ；数列的下极限是该数列最小的极限点，记为  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

从上下极限的第一定义可以看出：

1. 如果一个数列收敛，则其上下极限都存在且都等于极限值。
2. 对于  $\forall \{x_n\}$  有  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

### 定义 1.3 (第二定义)

每个数列都有上下极限，且有：

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}. \quad (1.25)$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}. \quad (1.26)$$

## 1.10 数分中的双曲函数

### 命题 1.16

函数：

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \quad (1.27)$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦，则有：

1.  $\cosh x$  是偶函数， $\sinh x$  是奇函数.
2.  $\sinh x$  的反函数为  $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ， $\cosh x$  的反函数为  $y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ .
3.  $(\sinh x)' = \cosh x$ ， $(\cosh x)' = \sinh x$ .

### 命题 1.17 (补充结论)

两个双曲函数还有以下性质，注意补充：

1.  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, x \in \mathbb{R}$ .
2.  $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x, \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ .
3.  $\cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cosh x + 1}{2}, \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cosh x - 1}{2}$ .

这些性质在积分还原的时候有非常好的效果，需要注意！

## 1.11 求极限时变量替换的陷阱

### 命题 1.18 (变量替换的充分条件)

设  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$ ,  $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$  成立, 且在点  $a$  的某个领域上有  $g(x) = y$ , 如果满足下面三个条件之一:

1. 存在点  $a$  的一个空心邻域  $O_\delta\{a\} - \{a\}$ , 在其中  $g(x) \neq A$ .
2.  $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = f(A)$ .
3.  $A = \infty$  且  $\lim_{y \rightarrow A} f(y)$

则有:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow A} f(y) = B. \quad (1.28)$$

注意: 在使用变量替换求函数极限的时候要注意条件. 具体来说就是在求极限  $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$  时, 如果有  $F(x) = f(g(x))$ , 又有  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$ ,  $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$ , 能否推出  $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = B$ ?

不能! 可以给出反例: 设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  分别为:

$$f(y) = \begin{cases} 1 & y = 0 \\ 0 & y \neq 0 \end{cases} \quad (1.29)$$

$$g(x) \equiv 0. \quad (1.30)$$

则有  $f(g(x)) \equiv 1$ , 但  $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$ .

## 1.12 函数间的比较关系

这个问题比较拗口, 所以在此归纳一下:

### 定义 1.4

设  $f(x)$  和  $g(x)$  都是在  $a$  的某个去心邻域  $U(a)$  上有定义的无穷小量, 且有  $g(x) \neq 0$ , 那么就有:

1.  $f(x) = o(g(x))(x \rightarrow a)$  的定义是:  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)/g(x)) = 0$ . 此时也称  $f(x)$  是  $g(x)$  的高阶无穷小量. 那么  $f(x) = o(1)(x \rightarrow a)$  就可以自然地表示为  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ .
2.  $f(x) = O(g(x))(x \rightarrow a)$  的定义是: 存在  $M > 0$  使得  $|\frac{f(x)}{g(x)}| \leq M$  在  $a$  的某去心邻域成立, 也即  $|f(x)| \leq M|g(x)|$ . 那么  $f(x) = O(1)(x \rightarrow a)$  就可以表示为  $f(x)$  在  $a$  的去心邻域上有界. 但是这并不是同阶无穷小量!!!
3. 如果有  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$ , 称  $f(x)$  与  $g(x)$  为同阶无穷小量.
4.  $f(x) \sim g(x)(x \rightarrow a)$  的定义是:  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ . 此时称  $f(x)$  与  $g(x)$  为等价无穷小量.

## 1.13 等价量的替换

### 定理 1.7 (等价量的替换)

设  $f(x), g(x)$  和  $h(x)$  在  $U^o(x_0)$  有定义, 且有:

$$f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0), \quad (1.31)$$

则有:

1. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)h(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)h(x) = A$ .
2. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = B$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)} = B$ .



务必注意这种替换只能在乘法与除法中实现!!!

### 命题 1.19

1.  $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$
2.  $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3} (x \rightarrow 0)$
3.  $x - \sin x \sim \tan x (x \rightarrow 0)$
4.  $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$
5.  $\sin x \sim x (x \rightarrow 0)$
6.  $a^x - 1 \sim x \ln a (x \rightarrow 0)$
7.  $(1+x)^\alpha - 1 \sim ax (x \rightarrow 0)$
8.  $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} (x \rightarrow 0)$



## 1.14 归结原则

### 定理 1.8 (归结原则)

设  $x_0, A \in \mathbb{R}$ , 存在极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  的充要条件是:  $\forall \{x_n\} (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0)$  且  $x_n \neq x_0 (\forall n \in \mathbb{N})$  都有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A. \quad (1.32)$$

设  $A \in \mathbb{R}$ , 存在极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$  的充要条件是:  $\forall \{x_n\} (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty)$  都有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A. \quad (1.33)$$



归结原则要求这个数列每一项都不为  $x_0$ , 因为函数的极限过程仅与  $x_0$  的去心邻域中的点有关, 而与  $x_0$  处的取值无关; 归结原则的条件还可以强化以应对各种情景的函数极限:

### 推论 1.3 (归结原则的强化)

一般通过给定数列的单调性来实现强化

1. 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某空心右邻域  $U_+^o(x_0)$  有定义,  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$  的充要条件是: 对任给的以  $x_0$  为极限的递减数列  $\{x_n\} \subset U_+^o(x_0)$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ .
2. 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某空心左邻域  $U_-^o(x_0)$  有定义,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$  的充要条件是: 对任给的以  $x_0$  为极限的递增数列  $\{x_n\} \subset U_-^o(x_0)$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ .
3. 设函数  $f(x)$  在点  $+\infty$  的某空心邻域  $U^o(+\infty)$  有定义,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  的充要条件是: 对任给的以  $+\infty$  为极限的递减数列  $\{x_n\} \subset U^o(+\infty)$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ .
4. 设函数  $f(x)$  在点  $-\infty$  的某空心邻域  $U^o(-\infty)$  有定义,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$  的充要条件是: 对任给的以  $-\infty$  为极限的递增数列  $\{x_n\} \subset U^o(-\infty)$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ .



## 1.15 连续函数基础

### 定义 1.5

如果有  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$  成立, 则称  $f(x)$  在点  $x = a$  处连续; 如果函数  $f(x)$  在区间  $I$  上的每个点上连续, 则称  $f(x)$  在区间  $I$  上连续.



如果一个函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处不连续, 那么则称  $x = x_0$  是  $f(x)$  的间断点, 对于间断点类别的判定有下面的结论:

### 命题 1.20 (间断点的判定)

1. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ , 则称  $x_0$  为  $f(x)$  的可去间断点.
2. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ , 则称  $x_0$  为  $f(x)$  的跳跃间断点.
3. 若  $f(x)$  在  $x_0$  处的左极限或右极限不存在, 则称  $x_0$  为  $f(x)$  的第二类间断点.

PS: 可去间断点和跳跃间断点统称为第一类间断点.



## 1.16 闭区间上连续函数的性质

闭区间上的连续函数有很多很好的性质, 本部分逐个介绍:

### 定理 1.9 (最大值最小值定理)

设  $f$  为闭区间  $[a, b]$  上的连续函数, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有最大值、最小值.



### 推论 1.4 (有界性定理)

设  $f$  为闭区间  $[a, b]$  上的连续函数, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界.



### 定理 1.10 (介值性定理)

设  $f$  为闭区间  $[a, b]$  上的连续函数, 且有  $f(a) \neq f(b)$ , 若  $\mu$  为介于  $f(a)$  与  $f(b)$  的常数, 则至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$  使得:

$$f(x_0) = \mu. \quad (1.34)$$



### 推论 1.5 (根的存在性定理)

设  $f$  为闭区间  $[a, b]$  上的连续函数, 且  $f(a)$  与  $f(b)$  异号 ( $f(a)f(b) < 0$ ), 则至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$  使得:

$$f(x_0) = 0. \quad (1.35)$$

即  $f(x)$  在  $(a, b)$  至少存在一个根.





## 1.17 函数的一致收敛

函数的连续性是函数的局部性质，而一致连续则是函数的全局性质——这是二者最大的区别!!! 一定要好好地理解。

### 定义 1.6

设  $f(x)$  是定义在区间  $I$  上的函数, 若任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使得  $\forall x', x'' \in I (|x' - x''| < \delta)$  有不等式:

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon \quad (1.36)$$

成立, 则称  $f(x)$  在区间  $I$  上一致连续.

### 定理 1.11 (Cantor 定理)

设  $f(x)$  为定义在闭区间  $[a, b]$  上的连续函数, 则  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上一致连续.

### 推论 1.6

设  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上一致连续, 则  $f(x)$  在闭区间  $[c, d] \subset [a, b]$  上一致连续.

### 命题 1.21

有界开区间  $(a, b)$  上的连续函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续的充要条件是:  $f(x)$  在  $x = a$  处的右极限和  $x = b$  处的左极限均存在且有限.

### 推论 1.7

开区间上的一致连续函数一定在开区间上有界.

### 命题 1.22

$f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上一致连续, 则存在正实数  $a, b$  使得:

$$|f(x)| \leq a|x| + b. \quad (1.37)$$

## 1.18 震撼的反例

### 命题 1.23

存在函数  $f(x)$ , 在任意的  $x_0$  的邻域  $U(x_0)$  内都是无界的, 但当  $x \rightarrow x_0$  时  $f(x)$  并不趋于无穷大.



**例题 1.2** 设  $f(x) = \frac{\cos \frac{1}{x}}{x}$ .  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ , 取  $x_n = \frac{1}{n\pi}$ , 则有:

$$|f(x_n)| = \left| \frac{\cos n\pi}{\frac{1}{n\pi}} \right| = n\pi \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty. \quad (1.38)$$

这说明  $f(x)$  在  $x=0$  的任一邻域无界. 若取  $\{y_n\} = \frac{1}{(n + \frac{1}{2})\pi}$ , 则有:

$$|f(y_n)| = 0. \quad (1.39)$$

这说明  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \infty$ .

## 1.19 原函数与导函数的奇偶性与周期性

### 命题 1.24

1. 若  $f(x)$  为可导的周期函数, 则  $f'(x)$  也是周期函数; 反之不成立.
2. 若  $f(x)$  为可导的奇函数, 则  $f'(x)$  为偶函数; 反之不成立.
3. 若  $f(x)$  为可导的偶函数, 则  $f'(x)$  为奇函数; 反之不成立.
4. 若  $f'(x)$  为区间上连续的奇函数, 则  $f(x)$  是偶函数.



## 1.20 乘积的高阶导函数

### 定理 1.12 (Leibniz 公式)

对于两个函数乘积的高阶导数, 有如下公式:

$$\begin{aligned}(uv)^{(n)} &= u^{(n)}v^0 + \binom{n}{1}u^{(n-1)}v^{(1)} + \binom{n}{2}u^{(n-2)}v^{(2)} + \cdots + u^{(0)}v^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}.\end{aligned}\tag{1.40}$$



有一些常见的  $n$  阶导函数是需要记忆的, 如下:

### 推论 1.8

1.  $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2}), (\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}).$
2.  $((1+x)^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$
3.  $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}, ((1+x)^{-1})^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}, ((1-x)^{-1})^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$
4.  $(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}, (\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$
5.  $(\ln(1-x))^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}.$



## 1.21 三大微分中值定理

### 定理 1.13 (罗尔中值定理)

若函数  $f$  同时满足如下三个条件：

1. 在闭区间  $[a, b]$  连续；
2. 在开区间  $(a, b)$  可导；
3.  $f(a) = f(b)$ .

则在  $(a, b)$  上至少存在一点  $\zeta$  使得：

$$f'(\zeta) = 0. \quad (1.41)$$

### 定理 1.14 (拉格朗日中值定理)

若函数  $f$  同时满足如下两个条件：

1. 在闭区间  $[a, b]$  连续；
2. 在开区间  $(a, b)$  可导；

则在  $(a, b)$  上至少存在一点  $\zeta$  使得：

$$f'(\zeta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (1.42)$$

### 定理 1.15 (柯西中值定理)

若函数  $f$  与  $g$  同时满足如下四个条件：

1. 在闭区间  $[a, b]$  连续；
2. 在开区间  $(a, b)$  可导；
3.  $\forall x \in [a, b]$  有  $f'(x) \neq g'(x)$ .
4.  $g(a) \neq g(b)$ .

则在  $(a, b)$  上至少存在一点  $\zeta$  使得：

$$\frac{f'(\zeta)}{g'(\zeta)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \quad (1.43)$$

## 1.22 函数极限的杀招：洛必达法则

### 定理 1.16 (洛必达法则)

设函数  $f$  和  $g$  满足：

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . 或  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ .
2. 在点  $x = x_0$  的某空心邻域  $U^o(x_0)$  上可导，且有  $g'(x) \neq 0$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ .

则有：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A. \quad (1.44)$$

此处  $A$  可以是实数，也可以是  $+\infty, -\infty, \infty$ .

一定要注意：洛必达法则要求两个函数在点的空心邻域可导，而不是单点可导。

## 1.23 泰勒公式

### 定理 1.17 (泰勒公式)

设函数  $f$  在  $(a, b)$  上存在公式中出现的各阶导数，对于任意固定的  $x_0 \in (a, b)$  有：

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + \frac{1}{1!} f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + R_n(x), x \in (a, b). \end{aligned} \quad (1.45)$$

其中  $R_n$  为泰勒公式的余项，通常有四种可供选择：

1. 佩亚诺型余项：

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n, x \rightarrow x_0). \quad (1.46)$$

2. 拉格朗日型余项：

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (1.47)$$

其中， $\zeta$  是介于  $x$  与  $x_0$  之间的值。

3. 柯西型余项：

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{n!} (x - \zeta)^n (x - x_0), \quad (1.48)$$

其中， $\zeta$  是介于  $x$  与  $x_0$  之间的值。

4. 积分型余项：

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt \quad (1.49)$$

这里要求  $f$  在  $(a, b)$  有连续的  $n+1$  阶导数。

## 1.24 凸性的定义与性质

### 定义 1.7

设  $f$  为区间  $I$  上的函数, 如果对于任给的  $x, y \in I$ , 以及  $\lambda \in [0, 1]$  都有:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y). \quad (1.50)$$

则称  $f$  为  $I$  上的凸函数.



### 定理 1.18

对于凸函数有以下等价的论断:

1.  $f(x)$  在  $I$  上为凸函数.
2. 若  $f$  在  $I$  上可微,  $f'(x)$  为  $I$  上的增函数.
3. 若  $f$  在  $I$  上二阶可微,  $f''(x) \geq 0, x \in I$ .
4.  $\forall x_1, x_2 \in I$  有不等式:

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1). \quad (1.51)$$

5.  $\forall x_1 < x_2 < x_3$  有:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \quad (1.52)$$



## 第二章 高代重要命题与结论



## 第三章 数学分析解题总结

## 第四章 高等代数解题总结

## 第五章 数学分析真题集

## 第六章 高等代数真题集