

VARIANTES DEL TEOREMA DE KURATOWSKI DE LOS 14 CONJUNTOS

JACK FREDDY ANDRES SOLANO GELVEZ

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:

MATEMÁTICO

Dr. Carlos Enrique Uzcátegui Aylwin

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE MATEMÁTICAS

BUCARAMANGA

2026

Página de aceptación

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del director

Agradecimientos

Es para mí un profundo honor dedicar este trabajo a ustedes. Abuelita, porque sin tus incesantes muestras de apoyo a lo largo de mis estudios, no habría estado en capacidad de entregarme plenamente a mi mayor pasión: el estudio de las matemáticas. Madre, por enseñarme, con tu ejemplo, la disciplina, la perseverancia y la fortaleza necesarias para no desfallecer ante las dificultades. Padre, porque ha sido vuestra generosidad la que me ha permitido liberarme de otras preocupaciones, consagrar largos años a la contemplación y al estudio fructífero, y finalmente brindarme la oportunidad de plasmar en este volumen algunos de los resultados de mis investigaciones.

Resumen

En este trabajo se estudian diversas variantes del problema de Kuratowski desde un enfoque algebraico. En particular, se analizan monoides, semirretículos y retículos generados por operadores topológicos como la cerradura, el complemento y el interior, así como sus combinaciones mediante las operaciones binarias, union e interseccion.

Se introducen los números de Sherman $s(L)$ y $s_n(L)$, que miden el número máximo de conjuntos distintos que pueden generarse a partir de uno o varios subconjuntos iniciales. Se presentan resultados conocidos en la literatura y se construyen explícitamente conjuntos testigo que alcanzan dichas cotas en diferentes estructuras.

Finalmente, se muestran ejemplos en espacios topológicos concretos, destacando el caso de $\mathbb{R}$ con la topología usual, donde se logra alcanzar la máxima complejidad combinatoria en ciertos semirretículos.

Palabras clave: teorema de Kuratowski de los 14 conjuntos, teorema clausura complemento, variantes del teorema del teorema 14 conjuntos, cerradura, interior, complemento, monoides, semirretículos, retículos.

Índice general

Resumen	3
1. Introducción	5
2. Preliminares	7
2.1. Operadores unarios y binarios	7
2.2. Conjuntos ordenados	10
2.3. Estructuras abstractas	10
2.3.1. Monoides	11
2.3.2. Retículos	11
3. El Teorema de los 14 conjuntos y sus variantes	14
3.1. El teorema original	14
3.2. Monoides de Kuratowski	17
3.2.1. El monoide $\langle k, c \rangle$ y sus sub-monoides $\langle k, i \rangle, c\langle k, i \rangle$	17
3.2.2. Otros monoides de interés	20
3.3. Semirretículos y retículos de operadores	21
3.3.1. Los semirretículos $\langle k, i, \vee \rangle$ y $\langle k, i, \wedge \rangle$	21
3.3.2. El retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$	24
3.3.3. El semirretículo $\langle k, c, \wedge \rangle$	26
3.4. Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales	27
4. Conclusiones	30
Referencias	30
A. Conjuntos Testigo	32
B. Familias testigo	40

1. Introducción

En la década de 1920, Kuratowski [3] demostró que, dado un espacio topológico X y un subconjunto $A \subseteq X$, al aplicar repetidamente los operadores de cerradura (k) y complemento (c) se obtienen a lo sumo 14 conjuntos distintos. Este resultado, conocido como el **teorema de los 14 conjuntos**, fue posteriormente reformulado en términos algebraicos por McKinsey y Tarski [4]. Exposiciones modernas pueden encontrarse en Gardner [1], mientras que diversas variantes han sido estudiadas por Yu [8] y, de manera sistemática, por Sherman [6]. En esta monografía seguiremos explícitamente el enfoque desarrollado en [6].

Para ello fijamos X un conjunto tal que $|X| \geq |\mathbb{R}|$ y consideremos $\text{End}(\mathcal{P}(X))$, dotado de la composición y del orden puntual inducido por la inclusión. Fijado un conjunto de operadores $\mathcal{O} \subseteq \text{End}(\mathcal{P}(X))$ (en particular, $\mathcal{O} \subseteq \{I, k, c, i\}$, con $i = ckc$), denotamos por $\langle \mathcal{O} \rangle$ el monoide generado por $\mathcal{O}$, es decir, su cerradura bajo composición. Sobre $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ consideramos además las operaciones binarias $\wedge$ y $\vee$, definidas puntualmente a partir de la intersección y la unión en $\mathcal{P}(X)$. A partir de estas operaciones, los semirretículos $\langle \mathcal{O}, \wedge \rangle$ y $\langle \mathcal{O}, \vee \rangle$, así como el retículo $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$, se obtienen como las cerraduras del monoide $\langle \mathcal{O} \rangle$ bajo $\wedge$, $\vee$ o ambas operaciones, respectivamente.

Este marco permite estudiar de manera unificada diversas variantes del problema de Kuratowski, ya sea modificando el conjunto de operadores generadores, enriqueciendo la estructura algebraica o considerando múltiples conjuntos iniciales. Para cada una de estas estructuras L , se define el **número de Sherman** $s(L)$ como el máximo número de conjuntos distintos que pueden obtenerse a partir de un único subconjunto inicial, variando la topología. De manera análoga, $s_n(L)$ denota la extensión al caso de $n \geq 2$ conjuntos iniciales.

La Tabla 1.1 resume los valores conocidos de estos invariantes, combinando la información de [6] en un formato unificado. La primera columna corresponde al caso de monoides (sin operaciones binarias), mientras que las columnas $\{\wedge\}$, $\{\vee\}$ y $\{\wedge, \vee\}$ corresponden a semirretículos de ínfimos, de supremos y retículos, respectivamente. Las filas indican el conjunto de operadores generadores. Se observa que algunos casos que son finitos para $n = 1$ se vuelven infinitos al considerar $n \geq 2$, mientras que en otros casos el crecimiento depende explícitamente de n .

Operadores	Estructura algebraica			
	$\{I\}$	$\{\wedge\}$	$\{\vee\}$	$\{\wedge, \vee\}$
$\{I\}$	1 (n)	1 ($2^n - 1$)	1 ($2^n - 1$)	1 (D_n)
$\{i\}$	2 ($2n$)	2 ($3^n - 1$)	2 (∞)	2 (∞)
$\{k\}$	2 ($2n$)	2 (∞)	2 ($3^n - 1$)	2 (∞)
$\{c\}$	2 ($2n$)	4 (2^{2^n})	4 (2^{2^n})	4 (2^{2^n})
$\{i, k\}$	7 ($7n$)	13 (∞)	13 (∞)	35 (∞)
$\{i, c\} = \{k, c\} = \{i, k, c\}$	14 ($14n$)	∞ (∞)	∞ (∞)	∞ (∞)

Tabla 1.1: Número de Sherman para cada estructura. Para $n = 1$ se muestra $s(L)$; entre paréntesis, la cota superior para $s_n(L)$ cuando $n \geq 2$. D_n denota el número de elementos del retículo libre de orden n (véase [2]).

Un artículo relevante en esta temática es el de Yu [8], publicado en *The American Mathematical Monthly* en 1978, donde se construye un conjunto T que alcanza el número de Sherman para el semirretículo $\langle k, i, \vee \rangle$. Posteriormente, Sherman [6] y Gardner y Jackson [1] presentan ejemplos para estructuras con número de Sherman finito.

Por su parte, Shum [7] construye un conjunto que distingue todos los operadores en ciertos monoides infinitos. En un contexto más general, McKinsey y Tarski [4] ya habían demostrado que en espacios métricos densos en sí mismos existen conjuntos con propiedades de este tipo. En el Apéndice A presentamos algunas construcciones inspiradas en estos trabajos.

2. Preliminares

En este capítulo se establecen las definiciones básicas y la notación que se utilizarán de manera consistente a lo largo de toda la monografía. Puesto que el trabajo se sitúa en la intersección de la topología y el álgebra universal, resulta indispensable fijar con precisión el significado de los términos y símbolos que aparecerán frecuentemente.

2.1 Operadores unarios y binarios

Definición 2.1. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{P}(X)$ su conjunto potencia. Un **endomorfismo** sobre $\mathcal{P}(X)$ es una función $f : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Denotamos por $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ el conjunto de todos los endomorfismos sobre $\mathcal{P}(X)$.

Definición 2.2. Sean $\varphi, \psi \in \text{End}(\mathcal{P}(X))$. Decimos que φ y ψ son **idénticamente iguales**, y lo denotamos como $\varphi = \psi$, si para todo $A \subseteq X$ se cumple que

$$\varphi(A) = \psi(A).$$

En caso contrario, decimos que φ y ψ son **distintos**, y lo denotamos como $\varphi \neq \psi$, lo que significa que existe al menos un conjunto $A \subseteq X$ tal que $\varphi(A) \neq \psi(A)$.

Definición 2.3. Un endomorfismo sobre $\mathcal{P}(X)$ es un **operador de clausura** k , si cumple con las siguientes propiedades:

1. $k(\emptyset) = \emptyset$ (preserva el vacío),
2. $k(k(A)) = k(A)$ para todo $A \subseteq X$ (idempotencia),
3. $A \subseteq k(A)$ para todo $A \subseteq X$ (extensividad),
4. $k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$ para todo $A, B \subseteq X$ (preserva uniones finitas).

Definición 2.4. El **operador complemento** es el endomorfismo c definido por $c(A) = X \setminus A$ para todo $A \subseteq X$.

Definición 2.5 (Interior). El **operador interior** i asociado a un operador de clausura k se define como $i = c \circ k \circ c$, donde c es el operador complemento.

A continuación se enuncian una serie de lemas elementales cuyas demostraciones se omiten, por cuanto se siguen de manera inmediata a partir de las definiciones correspondientes. En lo que sigue, X denotará un conjunto no vacío y $A, B \subseteq X$ subconjuntos arbitrarios del mismo.

Lema 2.6. Sea k un operador de clausura. Entonces la familia

$$\mathcal{C} = \{F \subseteq X : k(F) = F\}$$

es la familia de cerrados de una topología sobre X .

Lema 2.7. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Defínase $k : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ por

$$k(A) = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ es cerrado en } \mathcal{T} \text{ y } A \subseteq F\}.$$

Entonces k satisface la Definición 2.3 y es el operador de clausura asociado a la topología.

Lema 2.8 (Antimonotonía de c). Si $A \subseteq B$, entonces $c(B) \subseteq c(A)$.

Lema 2.9 (Involución de c). El operador c cumple $c(c(Y)) = Y$ para todo $Y \subseteq X$.

Lema 2.10 (Monotonía de k). Si $A \subseteq B$, entonces $k(A) \subseteq k(B)$.

Lema 2.11 (Idempotencia de i). Para todo $A \subseteq X$, se tiene $i(i(A)) = i(A)$.

Lema 2.12 (Monotonía de i). Si $A \subseteq B$, entonces $i(A) \subseteq i(B)$.

Lema 2.13 (Intensividad de i). Para todo $Y \subseteq X$, se cumple que $i(Y) \subseteq Y$.

Lema 2.14 (Preservación de intersecciones de i). Para todo $Y, Z \subseteq X$,

$$i(Y \cap Z) = i(Y) \cap i(Z).$$

Lema 2.15 (Imagen del vacío bajo i). El operador interior i satisface $i(\emptyset) = \emptyset$.

Una de las variantes del teorema de los 14 conjuntos de Kuratowski incorpora la unión y la intersección como operadores binarios. Esta inclusión no es trivial: transforma el problema clásico (basado en un operador unario) en uno de carácter algebraico más rico, gobernado por una estructura de monoide con dos operaciones asociativas adicionales. Precisamente por

ello, resulta indispensable fijar desde los preliminares la notación y las propiedades básicas de estas operaciones binarias, así como su interacción con el orden parcial de inclusión, para evitar ambigüedades en las manipulaciones posteriores.

Definición 2.16 (Operador binario). Un **operador binario** sobre un conjunto A es una función $\star : A \times A \rightarrow A$. Si $a, b \in A$, escribimos $a \star b$ en lugar de $\star(a, b)$.

Definición 2.17. Sean $\phi, \psi \in \text{End}(\mathcal{P}(X))$. Definimos las operaciones binarias $\wedge$ (ínfimo) y $\vee$ (supremo) puntualmente: para todo $A \subseteq X$,

$$(\phi \wedge \psi)(A) := \phi(A) \cap \psi(A), \quad (\phi \vee \psi)(A) := \phi(A) \cup \psi(A).$$

De esta forma, $\wedge, \vee : \text{End}(\mathcal{P}(X)) \times \text{End}(\mathcal{P}(X)) \rightarrow \text{End}(\mathcal{P}(X))$ son operaciones binarias sobre $\text{End}(\mathcal{P}(X))$.

Definición 2.18. Definimos los siguientes operadores constantes en $\text{End}(\mathcal{P}(X))$:

- $\mathbf{v} : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ dado por $\mathbf{v}(A) = \emptyset$ para todo $A \subseteq X$,
- $\mathbf{T} : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ dado por $\mathbf{T}(A) = X$ para todo $A \subseteq X$.

Lema 2.19. Los operadores binarios $\wedge$ y $\vee$ definidos sobre $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ cumplen, para todo $\phi, \psi, \theta \in \text{End}(\mathcal{P}(X))$, las siguientes propiedades heredadas de $\cap$ y $\cup$ en $\mathcal{P}(X)$ [5]:

- **Conmutatividad:** $\phi \wedge \psi = \psi \wedge \phi, \quad \phi \vee \psi = \psi \vee \phi.$
- **Asociatividad:** $\phi \wedge (\psi \wedge \theta) = (\phi \wedge \psi) \wedge \theta, \quad \phi \vee (\psi \vee \theta) = (\phi \vee \psi) \vee \theta.$
- **Idempotencia:** $\phi \wedge \phi = \phi, \quad \phi \vee \phi = \phi.$
- **Absorción:** $\phi \wedge (\phi \vee \psi) = \phi, \quad \phi \vee (\phi \wedge \psi) = \phi.$
- **Distributividad:** $\phi \wedge (\psi \vee \theta) = (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \theta), \quad \phi \vee (\psi \wedge \theta) = (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \theta).$

Con los operadores constantes $\mathbf{v}$ y $\mathbf{T}$ de la Definición 2.18, se satisfacen las **leyes de identidad**:

$$\phi \wedge \mathbf{T} = \phi, \quad \phi \vee \mathbf{v} = \phi, \quad \phi \wedge \mathbf{v} = \mathbf{v}, \quad \phi \vee \mathbf{T} = \mathbf{T}.$$

2.2 Conjuntos ordenados

En esta sección, establecemos las nociones básicas de orden en los conjuntos. Particularmente, como ordenar los endomorfismos, lo que es importante para el estudio abstracto de las variantes del Teorema de Kuratowski

Definición 2.20. Sea P un conjunto. Una **relación de orden parcial** sobre P es una relación $\preceq$ que satisface:

- **Reflexividad:** $x \preceq x$ para todo $x \in P$,
- **Anti-simetría:** si $x \preceq y$ e $y \preceq x$ entonces $x = y$,
- **Transitividad:** si $x \preceq y$ e $y \preceq z$ entonces $x \preceq z$.

Definición 2.21. Un **conjunto parcialmente ordenado** (poset) es un par $(P, \preceq)$ donde P es un conjunto y $\preceq$ es una relación de orden parcial sobre P .

Para trabajar adecuadamente con las intersecciones y/o uniones entre los operadores previamente definidos (y otros que se puedan construir), es necesario ordenar el universo $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ sobre el que trabajaremos.

Definición 2.22. En $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ se introduce el **orden puntual** dado por la inclusión en $\mathcal{P}(X)$: para $\phi, \psi \in \text{End}(\mathcal{P}(X))$,

$$\phi \leq \psi \iff \phi(A) \subseteq \psi(A) \text{ para todo } A \subseteq X.$$

Ello confiere a $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ la estructura de conjunto parcialmente ordenado.

Sea $\mathcal{O} \subseteq \text{End}(\mathcal{P}(X))$ un subconjunto, al que llamaremos **conjunto de operadores**; habitualmente k, i y c estarán en $\mathcal{O}$. Entonces podemos heredar el orden puntual sobre $\mathcal{O}$.

2.3 Estructuras abstractas

Las variantes del Teorema de los 14 conjuntos, al igual que el resultado original, consisten en estudiar si existe o no una cota superior para el número de conjuntos distintos que pueden obtenerse al aplicar repetidamente ciertos operadores a un conjunto inicial. Presentamos las estructuras de **monoide** y **retículo** que serán de utilidad.

Definición 2.23 (Cerradura algebraica). Dado un conjunto X y una operación binaria $\star$ sobre X , definimos la **cerradura algebraica** de un subconjunto $Y \subseteq X$ bajo $\star$ como:

$$C_0 = Y, \quad C_{n+1} = C_n \cup \{\phi \star \psi : \phi, \psi \in C_n\}, \quad \langle Y, \star \rangle = \bigcup_{n \geq 0} C_n.$$

2.3.1. Monoides

Algunas variantes del Teorema de Kuratowski, así como su versión original, solo utilizan algunos operadores de una variable (endomorfismos). Estos operadores forman un monoide (véase la Definición 2.25) cuando se considera la operación binaria $\circ$ composición sobre $\text{End}(\mathcal{P}(X))$.

Definición 2.24. Un **monoide** es una terna $(M, \circ, e)$ donde M es un conjunto no vacío, equipado con una operación binaria asociativa $\circ : M \times M \rightarrow M$ que posee un elemento neutro $e \in M$ tal que $a \circ e = e \circ a = a$ para todo $a \in M$.

Definición 2.25. Sea $\mathcal{O} \subseteq \text{End}(\mathcal{P}(X))$ un conjunto de operadores (por ejemplo k, i, c). El **monoide generado por $\mathcal{O}$** , denotado $\langle \mathcal{O} \rangle$, es el submonoide de $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ con la composición como operación, donde el operador identidad $I(A) = A$ es el elemento neutro. Equivalentemente, $\langle \mathcal{O} \rangle$ es la cerradura de $\mathcal{O}$ bajo composición (véase Definición 2.23).

2.3.2. Retículos

Los retículos son necesarios para las variantes del Teorema de Kuratowski, debido a que precisamente existe un paralelismo entre el ínfimo y el supremo en un retículo, y la intersección y unión en el conjunto $\mathcal{P}(X)$. Esto nos permite estudiar ordenadamente aquellas variantes que introducen intersección y unión.

Lema 2.26. Para cualquier subconjunto $\mathcal{O} \subseteq \text{End}(\mathcal{P}(X))$, el par $(\langle \mathcal{O} \rangle, \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado (poset) con el orden de operadores definido en la Definición 2.22.

Definición 2.27 (Retículo). Un **retículo** es un conjunto ordenado $(L, \leq)$ (véase Definición 2.21) en el que para todo par de elementos $x, y \in L$ existen:

- el **supremo**, denotado $x \vee y$, que es la menor cota superior de $\{x, y\}$;
- el **ínfimo**, denotado $x \wedge y$, que es la mayor cota inferior de $\{x, y\}$.

Un retículo se llama **distributivo** si se cumplen las siguientes leyes distributivas:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z), \quad x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z). \quad \text{para todo } x, y, z \in L$$

Lema 2.28. Sean $\{\wedge, \vee\}$ operaciones binarias sobre $\text{End}(\mathcal{P}(X))$ (véase la Definición 2.17). Considérese $(M, \leq)$ poset donde $M \subseteq \text{End}(\mathcal{P}(X))$ es un monoide (véase el Lema 2.26), podemos considerar las siguientes cerraduras algebraicas (Definición 2.23):

- $\langle M, \wedge \rangle$: la cerradura de M bajo $\wedge$; es un **semirretículo de ínfimos**.
- $\langle M, \vee \rangle$: la cerradura de M bajo $\vee$; es un **semirretículo de supremos**.
- $\langle M, \wedge, \vee \rangle$: la cerradura de M bajo $\wedge$ y $\vee$; es un **retículo distributivo de operadores** esto porque $\{\wedge, \vee\}$ cumplen las leyes distributivas (véase 2.19).

Observación 2.1 (Notación). Por abuso de notación escribiremos $\langle \mathcal{O}, \wedge \rangle$ para denotar $\langle \langle \mathcal{O} \rangle, \wedge \rangle$. Análogamente se define $\langle \mathcal{O}, \vee \rangle$ y $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$. Si $\mathcal{O} = \{\phi_i\}_{i < n}$, escribiremos $\langle \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n, \wedge, \vee \rangle$ según corresponda. Esta simplificación evita una notación excesivamente cargada en secciones posteriores.

Definición 2.29. Una **retículo booleano** es un retículo distributivo $(B, \wedge, \vee)$ con:

- un elemento mínimo 0 tal que $0 \wedge x = 0$ y $0 \vee x = x$ para todo $x \in B$;
- un elemento máximo 1 tal que $1 \wedge x = x$ y $1 \vee x = 1$ para todo $x \in B$;
- para cada $x \in B$, un **complemento** $\neg x \in B$ que satisface

$$x \wedge \neg x = 0, \quad x \vee \neg x = 1.$$

Lema 2.30. Sea $\mathcal{O} \subseteq \text{End}(\mathcal{P}(X))$ un conjunto de operadores tal que $c, \mathbf{v}, \mathbf{T} \in \mathcal{O}$. Entonces $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$ es un retículo booleano.

Demostración. Por el Lema 2.19, $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$ es un retículo distributivo con mínimo $\mathbf{v}$ y máximo $\mathbf{T}$ por el orden de los operadores de la Definición 2.22. Para cada $\phi \in \langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$, el operador $c \circ \phi$ pertenece a la estructura pues $c \in \mathcal{O}$ y la cerradura bajo $\wedge, \vee$ contiene al monoide generado. Además, $\phi \wedge (c \circ \phi) = \mathbf{v}$ y $\phi \vee (c \circ \phi) = \mathbf{T}$ por el mismo lema. Luego $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$ es un retículo booleano. $\square$

Los siguientes lemas se presentan con el fin de proporcionar una mejor comprensión de la interacción entre los operadores k e i y las operaciones binarias $\wedge$ y $\vee$, respectivamente.

Lema 2.31. [6] *Sea k el operador de clausura. En el orden puntual de operadores definido en la Definición 2.22, se cumple*

$$k(\phi \wedge \psi) \leq k\phi \wedge k\psi$$

para cualesquiera operadores $\phi, \psi \in \text{End}(\mathcal{P}(X))$.

Demostración. Nótese que $\phi \wedge \psi \leq \phi$ y $\phi \wedge \psi \leq \psi$, por intersección (Definición 2.17), por la monotonía de k (Lema 2.10) se tiene $k(\phi \wedge \psi) \leq k\phi$, $k(\phi \wedge \psi) \leq k\psi$. Por lo tanto, se deduce que :

$$k(\phi \wedge \psi) \leq k\phi \wedge k\psi.$$

□

Lema 2.32. [6] *En el orden de operadores de la Definición 2.22 se cumple*

$$i(\phi \vee \psi) \geq i\phi \vee i\psi.$$

Demostración. Nótese que, $\phi \leq \phi \vee \psi$, $\psi \leq \phi \vee \psi$ por unión. (Definición 2.17), luego por la monotonía de i (véase el Lema 2.12) se tiene $i\phi \leq i(\phi \vee \psi)$, $i\psi \leq i(\phi \vee \psi)$. Por lo tanto,

$$i\phi \vee i\psi \leq i(\phi \vee \psi).$$

□

Corolario 2.33 (Propiedades del complemento). *El operador complemento c satisface las siguientes propiedades, como consecuencia directa del Lema 2.19:*

■ **Leyes de De Morgan:**

$$c(\phi \wedge \psi) = c\phi \vee c\psi, \quad c(\phi \vee \psi) = c\phi \wedge c\psi.$$

■ **Complemento en el retículo:**

$$\phi \wedge c\phi = \mathbf{v}, \quad \phi \vee c\phi = \mathbf{T}.$$

3. El Teorema de los 14 conjuntos y sus variantes

En este capítulo presentamos el resultado clásico que da origen a este trabajo: el teorema de Kuratowski de los 14 conjuntos. Primero mostraremos la prueba original; luego, mostraremos cómo este problema puede reformularse en términos de monoides de operadores. Después consideraremos semirretículos y retículos de operadores, para a obtener nuevos resultados como los teoremas de Sherman (13 y 35 operadores) y el caso infinito de $\langle k, c, \wedge \rangle$.

Finalmente, las variantes que consideran dos o más conjuntos iniciales enriquecen notablemente el problema. En particular, cuando se parte de una familia finita de n subconjuntos y se consideran únicamente las operaciones de unión e intersección (sin incluir operadores unarios), determinar una fórmula cerrada para el número de subconjuntos generados resulta un problema no trivial [2].

3.1 El teorema original

Este teorema fue formulado por primera vez por Kazimierz Kuratowski en 1922, en su artículo *Sur l'opération A de l'Analysis Situs* [3]. Dicho trabajo constituye la primera parte de su tesis doctoral. En este artículo, Kuratowski propone una axiomatización abstracta de la topología basada en un operador de clausura (véase la Definición 2.3)

Teorema 3.1 (Kuratowski, 1922). [3]. *Sea X un espacio topológico y sea $E \subseteq X$. Entonces, el número máximo de conjuntos distintos que pueden obtenerse a partir de E mediante la aplicación sucesiva de los operadores de clausura k y complemento c es 14.*

Además, existe un subconjunto de $\mathbb{R}$ para el cual este máximo se alcanza.

Demostración. Sea X un espacio topológico y sean k y c los operadores de clausura y complemento, respectivamente (véanse las Definiciones 2.3 y 2.4). Fijado $A \subseteq X$, consideramos los subconjuntos que se obtienen a partir de A mediante composiciones finitas de k y c .

Como k es idempotente y c es involutivo (Lema 2.9), basta considerar composiciones alternadas. Estas quedan determinadas por el operador inicial y se estabilizan tras un número finito de pasos; comenzamos con la secuencia de composiciones que inicia con k .

Primeras inclusiones. Comenzamos con las siguientes relaciones:

- $ck(A) \subseteq kck(A)$: por la extensividad de k (Definición 2.3) aplicada a $ck(A)$.
- $ckck(A) \subseteq k(A)$: dado que c es anti monótono e involutivo (Lema 2.8 y 2.9).
- $kckck(A) \subseteq k(A)$: por monotonía de k (Lema 2.10) sobre $ckck(A) \subseteq k(A)$.
- $ck(A) \subseteq ckckck(A)$: por anti monotonía de c (Lema 2.8) sobre $kck(A) \subseteq k(A)$.
- $kck(A) \subseteq kckckck(A)$: por monotonía de k (Lema 2.10) sobre $ck(A) \subseteq ckckck(A)$.

Segundas inclusiones. De manera similar, obtenemos:

- $ckck(A) \subseteq kckck(A)$: por extensividad de k (Definición 2.3) sobre $ckck(A)$.
- $ckckck(A) \subseteq kck(A)$: por ser c anti monótono e involutivo (Lemas 2.8 y 2.9).
- $kckckck(A) \subseteq kck(A)$: por monotonía de k (Lema 2.10) sobre lo anterior.

De las inclusiones anteriores se deduce la igualdad

$$kckckck(A) = kck(A). \quad (1)$$

Por lo tanto, las composiciones que comienzan con k generan a lo sumo los siguientes siete conjuntos:

$$A, k(A), ck(A), kck(A), ckck(A), kckck(A), ckckck(A).$$

Las composiciones que comienzan con c generan otros siete:

$$c(A), kc(A), ckc(A), kckc(A), ckckc(A), kckckc(A), ckckckc(A).$$

Ambas sucesiones se estabilizan por la igualdad (1), totalizando a lo sumo 14 conjuntos. □

Consideremos el espacio topológico $\mathbb{R}$ con la topología usual. Si tomamos el subconjunto $E = \left((0, 2) \setminus \{1\} \right) \cup \{3\} \cup \left([4, 5] \cap \mathbb{Q} \right)$ alcanzamos los 14 conjuntos (véase el Apéndice A).

En honor a Gardner [1] y a Sherman [6], introducimos la siguiente definición con el fin de sistematizar la notación y facilitar el estudio de estos conceptos.

Definición 3.2. Sea X un conjunto fijo de cardinalidad al menos la del continuo. Cada topología τ sobre X induce operadores concretos de clausura k e interior i (véase el Lema 2.7 y la Definición 2.5). Sea $\emptyset \neq \mathcal{O} \subseteq \{I, k, i, c\}$ y sea L una de las siguientes estructuras: un monoide $\langle \mathcal{O} \rangle$, un semirretículo $\langle \mathcal{O}, \wedge \rangle$ o $\langle \mathcal{O}, \vee \rangle$, o un retículo $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$ (véanse 2.25 y 2.30). Entonces definimos ciertos números asociados a L y a τ , manteniendo fijo el conjunto X .

Número de Gardner de un conjunto: dado $A \subseteq X$, se define

$$g(L, \tau, A) = |\text{Orb}_L(A)| = |\{\varphi(A) : \varphi \in L\}|.$$

Número de Gardner del espacio topológico: se define

$$g(L, \tau) = \begin{cases} \text{máx}\{g(L, \tau, A) : A \subseteq X\}, & \text{si el máximo existe,} \\ \infty, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Número de Sherman de L : se define

$$s(L) = \sup\{g(L, \tau) : \tau \text{ es una topología sobre } X\}.$$

Nótese que $s(L)$ está bien definido, pues $\{\tau : \tau \text{ es una topología sobre } X\} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$. La siguiente definición identifica aquellos subconjuntos del espacio X que logran alcanzar la cota superior y, en el caso infinito, distinguir todos los operadores.

Definición 3.3 (Conjunto testigo). Sea X un conjunto fijo de cardinalidad al menos la del continuo y sea L una estructura de operadores como en la Definición 3.2. Un subconjunto $T \subseteq X$ se dice un **conjunto testigo** para L si existe una topología τ^* sobre X tal que

$$g(L, \tau^*, T) = s(L),$$

y además, para cualesquiera $\varphi, \psi \in L$,

$$\varphi(T) = \psi(T) \implies \varphi = \psi$$

idénticamente iguales como operadores según la Definición 2.22.

3.2 Monoides de Kuratowski

La demostración anterior revela que el problema de Kuratowski es un problema sobre el cardinal del monoide generado por los operadores de clausura y complemento. Gardner y Jackson [1] se refieren al monoide $\langle k, c \rangle$ como el **Monoide de Kuratowski** y así mismo, a sus elementos como **operadores de Kuratowski**.

3.2.1. El monoide $\langle k, c \rangle$ y sus sub-monoides $\langle k, i \rangle, c\langle k, i \rangle$

Con estos submonoides veremos la primera variante del teorema original, ¿Cuántos subconjuntos diferentes se alcanzan solo aplicando clausura e interior, sin el complemento?

Lema 3.4. [6] *El monoide $\langle k, i \rangle$ tiene numero de Sherman 7:*

$$\langle k, i \rangle = \{I, i, k, ik, ki, iki, kik\}.$$

Demostración. Por la Definición 2.3, k es idempotente ($k^2 = k$) y se tiene que i también es idempotente por el Lema 2.11. Además, $k \geq I$ y $i \leq I$ (véase la Definición 2.3 y Lema 2.13). Componiendo $k \geq I$ por la izquierda y la derecha con i obtenemos $iki \geq i$ y de igual forma con $i \leq I$ obtenemos $kik \leq k$. Usamos ambas relaciones para calcular:

$$(i)k \leq (iki)k = i(kik) \leq i(k) \Rightarrow ik = ikik,$$

$$k(i) \leq k(iki) = (kik)i \leq (k)i \Rightarrow ki = kiki.$$

De las igualdades $ik = ikik$ y $ki = kiki$ se deduce que ik y ki son idempotentes. Por lo tanto, la cerradura de $\{k, i\}$ bajo composición (Definición 2.23) genera exactamente los siete elementos listados, pues las idempotencias impiden la aparición de nuevos operadores. $\square$

Para terminar si consideramos el espacio $\mathbb{R}$ con la topología usual, y el mismo conjunto testigo T dado en el Teorema 3.1, veremos que el número de Gardner de T coincide con el número de Sherman de $\langle k, i \rangle$ (véase Apéndice A)

Definición 3.5 (Monoide dual). Sea M un monoide de operadores. Definimos su **monoide dual** como el conjunto

$$cM = \{c \circ \phi : \phi \in M\},$$

donde $c \circ \phi$ denota la composición del operador complemento c con ϕ .

Lema 3.6. [6] El dual del monoide $\langle k, i \rangle$ es:

$$c\langle k, i \rangle = \{cI, ci, ck, cik, cki, ciki, ckik\}.$$

El siguiente teorema, enunciado y demostrado por Sherman en [6], es equivalente al teorema original de los 14 conjuntos de Kuratowski [3]. Este resultado pone de manifiesto que la incorporación de estos nuevos conceptos no solo preserva la esencia del problema clásico, sino que también amplía su alcance y ofrece una perspectiva más general.

Teorema 3.7. [6] El monoide de Kuratowski $\langle k, c \rangle = \langle k, i \rangle \sqcup c\langle k, i \rangle$,

Demostración. Demostraremos la inclusión $\subseteq$ por inducción sobre n la longitud de $\phi \in \langle k, c \rangle$

Caso base: ($n = 0$) El operador I tiene longitud 0, según la Definición 2.25 e $I \in \langle k, i \rangle$

Hipótesis inductiva: Todo operador $\phi \in \langle k, c \rangle$ de longitud $m \leq n$ está en $\langle k, i \rangle \cup c\langle k, i \rangle$.

Paso inductivo: Sea $\phi \in \langle k, c \rangle$ de longitud $n + 1$. Entonces $\phi = k\psi$ o $\phi = c\psi$ para algun operador ψ de longitud n . Por hipótesis, $\psi \in \langle k, i \rangle \cup c\langle k, i \rangle$.

Si $\phi = k\psi$, entonces $\phi \in \langle k, i \rangle$ cuando $\psi \in \langle k, i \rangle$, y $\phi = k(cw) = c(iw)$, por como se define el operador interior $i = ckc$ (véase la Definición 2.5) se tiene $ci = kc$ por la involución de c (vease la Definición 2.9), luego $\phi = k\psi \in c\langle k, i \rangle$ cuando $\psi = cw \in c\langle k, i \rangle$.

Si $\phi = c\psi$, entonces $\phi \in c\langle k, i \rangle$ cuando $\psi \in \langle k, i \rangle$, y $\phi \in \langle k, i \rangle$ cuando $\psi = cw \in c\langle k, i \rangle$. En todos los casos, ϕ pertenece a $\langle k, i \rangle \cup c\langle k, i \rangle$. Esto completa la inducción, probando que $\langle k, c \rangle \subseteq \langle k, i \rangle \cup c\langle k, i \rangle$.

La inclusiones $\langle k, i \rangle \subseteq \langle k, c \rangle$ y $c\langle k, i \rangle \subseteq \langle k, c \rangle$ es inmediata porque $i = ckc$, por Definición 2.5. Además, los submonoides son disjuntos; esto es porque, si no lo fueran $\exists \phi : i \leq \phi \leq ci$, contradicción, porque un conjunto y su complemento no son comparables. Además se tiene,

$$s(\langle k, c \rangle) = 7 + 7 = 14.$$

por el lema 3.4 y el lema 3.6. Una prueba mas del Teorema 3.1 □

Una pregunta interesante es: Dado un conjunto fijo X de cardinalidad a lo menos la del continuo y una estructura L (como el monoide de Kuratowski), ¿qué propiedades debe cumplir la topología τ sobre X para que el número de Gardner cumpla: $g(L, \tau) < s(L)$?

La respuesta a la pregunta fue dada por Gardner y Jackson [1], quienes realizaron un estudio detallado del monoide de Kuratowski $L = \langle k, c \rangle$ para distintos espacios topológicos, caracterizando cuándo $g(L, \tau)$ es igual a 2, 4, 8, 10 o 14. Primero definimos algunos espacios.

Definición 3.8. Sea (X, k) un espacio con un operador de clausura k . Un conjunto $A \subseteq X$ se dice **denso** si $k(A) = X$.

Definición 3.9. Un espacio es **extremadamente desconexo** si la cerradura de cualquier conjunto abierto es abierta.

Definición 3.10. Un espacio es **resoluble** si contiene un conjunto denso con interior vacío.

Definición 3.11. Un espacio es un **espacio abiertamente irresoluble** (OU) si ningún subespacio abierto es resoluble.

Definición 3.12. Un espacio es un **espacio de partición** si sus conjuntos abiertos forman un retículo booleano (véase la Definición 2.29).

Definición 3.13. Un espacio es un **espacio puerta** si todo $Y \subseteq X$ es abierto o cerrado.

Para que el número de Gardner $g(L, \tau)$ sea menor que el número de Sherman $s(L)$, algunos operadores de L deben ser idénticamente iguales según la Definición 2.2. Los siguientes teoremas caracterizan las topologías sobre X donde algunos operadores coinciden.

Teorema 3.14 (Teorema 2.3, [1]). *Sea X un conjunto fijo de cardinalidad al menos la del continuo y sea τ una topología sobre X . Entonces (X, τ) satisface:*

- (i) $iki = ki$ si y solo si (X, τ) es extremadamente desconexo.
- (ii) $iki = ik$ si y solo si (X, τ) es un espacio-OU, es decir, cada conjunto denso tiene interior denso.
- (iii) $ik = ki$ si y solo si (X, τ) es un espacio-OU extremadamente desconexo.
- (iv) $ik = k$ si y solo si (X, τ) es un espacio de partición, es decir, sus abiertos son cerrados.
- (v) $i = k$ si y solo si (X, τ) es discreto.

Teorema 3.15 (Teorema 2.6, [1]). *Sea X un conjunto fijo de cardinalidad al menos la del continuo y sea $L = \langle k, c \rangle$ el monoide de Kuratowski. Para cada topología τ sobre X tal que (X, τ) sea al menos Hausdorff, sea $n = g(L, \tau)$ el número de Gardner asociado a L y τ . Entonces se cumplen las siguientes condiciones:*

- (i) $n = 2$ si y solo si (X, τ) es discreto.
- (ii) $n = 4$ si y solo si (X, τ) es un espacio puerta no discreto.

-
- (iii) $n = 8$ si (X, τ) es un espacio-OU extremadamente desconexo, pero no espacio puerta.
 - (iv) $n = 10$ solo si (X, τ) es extremadamente desconexo o espacio-OU, pero no ambas.
 - (v) $n = 14$ si y solo si (X, τ) no es ni extremadamente desconexo ni espacio-OU.
 - (vi) $n \neq 6, 12$.

El trabajo de Gardner y Jackson [1] caracteriza, mediante condiciones necesarias y suficientes sobre la topología τ de X , los posibles valores del número de Gardner $g(L, \tau)$ para $L = \langle k, c \rangle$ el monoide de Kuratowski. Además, se distingue entre la existencia de un conjunto testigo T (que distingue todos los operadores del monoide) y la existencia de un conjunto E tal que se cumple $g(L, \tau, E) = g(L, \tau)$. Esta distinción se analiza con mayor detalle cuando el número de Sherman es infinito (véase Sección 3.3.3).

3.2.2. Otros monoides de interés

Si consideramos las operaciones binarias $\wedge$ (intersección) y $\vee$ (unión), es posible construir nuevos operadores unarios en términos de los operadores previamente definidos (véase las Definiciones 2.3, 2.4, 2.5), tales como:

Definición 3.16. Sea X un conjunto y $A \subseteq X$. Se definen los siguientes operadores:

- **Operador side** (s): $s(A) = k(A) \cap c(A)$
- **Operador rim** (r): $r(A) = A \cap k(c(A))$
- **Operador frontera** (∂): $\partial(A) = k(A) \cap k(c(A)) = k(A) \cap kc(A)$

Observación 3.1. Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología usual y $A = (0, 1]$. Entonces los operadores definidos en la Definición 3.16 toman los siguientes valores:

$$s(A) = \{0\}, \quad r(A) = \{1\}, \quad \partial(A) = \{0, 1\}.$$

Por lo tanto, los operadores s, r, ∂ son distintos según la Definición 2.2.

En su artículo, Shum [7] define estos operadores y estudia precisamente los monoides $\langle k, c, \partial \rangle$ y $\langle s \rangle$. Más adelante retomaremos el operador *side* y su relación con la existencia de infinitos operadores en el semirretículo $\langle k, c, \wedge \rangle$ (véase Sección 3.3.3).

3.3 Semirretículos y retículos de operadores

Para responder a la pregunta: ¿cuántos conjuntos pueden obtenerse aplicando repetidamente los operadores de clausura, interior, unión y/o intersección?

Veremos además qué sucede al añadir el operador complemento c a las estructuras anteriores. Para ello, utilizaremos los semirretículos y retículos de operadores (véase el Lema 2.28). La estructura de conjunto ordenado será de gran utilidad, ya que nos proporcionará una guía clara para generar nuevos elementos al operar entre operadores no comparables.

3.3.1. Los semirretículos $\langle k, i, \vee \rangle$ y $\langle k, i, \wedge \rangle$

Estos semirretículos corresponden a las variantes del Teorema de los 14 conjuntos donde cambiamos complemento por interior, y añadimos uniones ó intersecciones.

Teorema 3.17 (Yu [8], 1978). *Sea $M = \langle k, i \rangle$ submonoide de Kuratowski, si $\langle M, \vee \rangle$ es semirretículo de supremos (véase el lema 2.28), entonces su numero de Sherman es 13.*

Demostración. Sea $M = \langle k, i \rangle = \{I, i, k, ik, ki, iki, kik\}$ y definimos

$$N = \{I \vee ik, I \vee ki, I \vee iki, I \vee kik, ik \vee ki, (I \vee ik) \vee ki\}.$$

Nótese que en N están las uniones entre elementos de M que no son comparables según el orden puntual (véase la Definición 2.22) y que $M \cup N$ es cerrado bajo $\vee$ (véase la Definición 2.23). Es claro que $M \cup N \subseteq \langle k, i, \vee \rangle$. Para demostrar la igualdad, basta probar que $M \cup N$ es cerrado bajo los operadores k e i .

Caso $k\phi$: Distinguimos dos situaciones:

- Si ϕ contiene a I como componente, por la distributividad de k sobre $\vee$ (véase definición 2.3) tenemos que $k\phi = k$.
- Si $\phi = ik \vee ki$, entonces $k\phi = k(ik \vee ki) = k(ik) \vee k(ki) = kik \vee ki = kik$, donde la última igualdad se debe a que $kik \geq ki$ en el orden de operadores.

Caso $i\phi$: Analizamos según la forma de ϕ :

- Sea $\phi \in \{ik \vee ki, I \vee kik, I \vee ik, I \vee ik \vee ki\}$, notese que $\phi \leq k$ por la monotonía de i (vease el Lema 2.12) $i\phi \leq ik$. Además por el lema 2.32 tenemos que $i(\phi \vee \psi) \geq i\phi \vee i\psi$ entonces para todo ϕ se cumple que $i\phi \geq ik$. Por lo tanto $i\phi = ik$.

- Si $\phi = I \vee ki$. Probaremos que $i\phi = iki$: Sea (X, τ) un espacio topológico, entonces se genera un operador clausura k (véase el Lema 2.7) y podemos definir un operador interior i (véase definición 2.5) fijemos $A \subseteq X$ arbitrario. Debemos probar que

$$i(A \cup k(i(A))) = i(k(i(A))).$$

Inclusión $\subseteq$: Sea $x \in i(A \cup k(i(A)))$. Existe un entorno abierto $U \subseteq X$ de x tal que $U \subseteq A \cup k(i(A))$. Si $x \notin k(i(A))$, entonces existe otro entorno abierto V de x con $V \cap i(A) = \emptyset$. Tomando $W = U \cap V$, obtenemos un entorno abierto de x que cumple $W \subseteq A$ y $W \cap i(A) = \emptyset$. Esto implica $W \subseteq A \setminus i(A)$, lo cual es imposible porque $A \setminus i(A)$ no tiene puntos interiores. Por tanto, $x \in k(i(A))$. Como x es interior a $A \cup k(i(A))$ y $k(i(A))$ es cerrado, concluimos que x es interior a $k(i(A))$; es decir, $x \in i(k(i(A)))$.

Inclusión $\supseteq$: Es trivial pues, $ki \leq I \vee ki$ y el interior es i monótono (véase el Lema 2.12).

Por tanto se tiene la igualdad $i(I \vee ki) = iki$ (véase definición 2.2).

- Si $\phi = I \vee iki$. Veamos que $i\phi = iki$:

Por la propiedad de supraditividad de i tenemos que $i(I \vee iki) \geq iki$. Por otro lado, como $I \vee iki \leq I \vee ki$, la monotonía de i da $i(I \vee iki) \leq i(I \vee ki) = iki$, donde la última igualdad se probó anteriormente. Combinando ambas inclusiones, se obtiene la igualdad $i(I \vee iki) = iki$.

En todos los casos, $i\phi, k\phi \in M \cup N$. Hemos demostrado que $M \cup N$ es cerrado bajo k e i . Luego $\langle k, i, \vee \rangle = M \cup N$. Por lo tanto, tenemos que si $L = \langle k, i, \vee \rangle$ entonces $s(L) = 13$, en efecto considérese $\mathbb{R}$ con la topología usual:

$$T = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup (\mathbb{I} \cap (2, 3)) \cup ((3, 5) \setminus \{4\})$$

es claro que T es conjunto testigo para $\langle k, i, \vee \rangle$ (véase apéndice A).

□

Teorema 3.18. (Sherman [6], 2010) Sea $M = \langle k, i \rangle$ submonoide de Kuratowski. Si $\langle M, \wedge \rangle$ es semirretículo de infimos (véase el Lema 2.28) entonces su numero de Sherman es 13.

Demostración. Sea $L = \{ ik \wedge ki, I \wedge ik, I \wedge ki, I \wedge iki, I \wedge kik, I \wedge (ik \wedge ki) \}$ las intersecciones entre elementos no comparables de M , por lo anterior $M \cup L$ es cerrado bajo la

operación binaria $\wedge$ (véase la Definición 2.23). Claramente $M \cup L \subseteq \langle k, i, \wedge \rangle$. Para demostrar la igualdad basta ver que $M \cup L$ es cerrado bajo los operadores k e i .

Caso $i\phi$: Si $\phi \in L$ contiene a I como una componente, entonces por distributividad de i sobre $\wedge$ se tiene $i\phi = i$ (pues i es el mínimo del poset). Si $\phi = ik \wedge ki$, entonces $i(ik \wedge ki) = i(ik) \wedge i(ki) = ik \wedge iki = iki \in M$.

Caso $k\phi$: Por sub-casos: (1) $\phi \in P = \{ik \wedge ki, I \wedge iki, I \wedge (ik \wedge ki), I \wedge ki\}$ ó (2) $\phi = I \wedge ik$ ó (3) $\phi = I \wedge kik$

1. Se cumple $\phi \geq i$, luego $k\phi \geq ki$, por monotonía de k (véase 2.10). Luego para cada $\psi \in P$ por $k(\phi \wedge \psi) \leq k\phi \wedge k\psi$ (véase 2.31), se obtiene $k\phi \leq ki$. Luego $k\phi = ki \in P$
2. Veamos que $k(I \wedge ik) = kik$. Primero, por $k(\psi_1 \wedge \psi_2) \leq k\psi_1 \wedge k\psi_2$, [véase 2.31] tenemos $k(I \wedge ik) \leq kI \wedge k(ik) = k \wedge kik = kik$ por el orden de los operadores [véase 2.22].

$$(2.1) \quad k(I \wedge ik) \leq kik$$

Para la desigualdad contraria, usamos el siguiente cálculo algebraico (véase [6, 118]).

$$\begin{aligned} ik &= ik \wedge k(I) = ik \wedge k[(I \wedge ik) \vee (I \wedge cik)] \\ &= ik \wedge [k(I \wedge ik) \vee k(I \wedge cik)] = [ik \wedge k(I \wedge ik)] \vee [ik \wedge k(I \wedge cik)]. \end{aligned}$$

El segundo término satisface $ik \wedge k(I \wedge cik) \leq ik \wedge k(cik) = ik \wedge cik = \mathbf{v}$, donde $\mathbf{v}$ denota el operador vacío. Por tanto, $ik = ik \wedge k(I \wedge ik)$, lo que implica $ik \leq k(I \wedge ik)$. Aplicando k a ambos lados y usando la idempotencia $kik = k(ik)$, obtenemos

$$(2.2) \quad kik \leq k(I \wedge ik).$$

Juntando 2.1 y 2.2 concluimos $k(I \wedge ik) = kik \in M$.

3. Veamos que $k(I \wedge kik) = kik$. Primero, por la desigualdad $k(\psi_1 \wedge \psi_2) \leq k\psi_1 \wedge k\psi_2$, tenemos

$$(3.1) \quad k(I \wedge kik) \leq kik.$$

Para la desigualdad contraria, observamos que $ik \leq kik$, luego $I \wedge ik \leq I \wedge kik$. Aplicando el operador monótono k obtenemos $k(I \wedge ik) \leq k(I \wedge kik)$. Pero ya probamos que $k(I \wedge ik) = kik$, por tanto

$$(3.2) \quad kik \leq k(I \wedge kik).$$

Juntando **3.1** y **3.2** se tiene, $k(I \wedge kik) = kik \in M$.

En todos los casos, $i\phi, k\phi \in M \cup L$. Hemos demostrado que $M \cup L$ es cerrado bajo k e i . Luego $\langle k, i, \wedge \rangle = M \cup L$. Por lo tanto, tenemos que $s(\langle k, i, \wedge \rangle) = 13$, en efecto considérese $\mathbb{R}$ con la topología usual, entonces tómese

$$T = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup E_2 \cup E_3 \cup [5, \infty), \text{ donde:}$$

$$E_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right), \quad E_2 = \mathbb{Q} \cap (2, 3), \quad E_3 = \{3, 4\}.$$

es claro que T es conjunto testigo para $\langle k, i, \wedge \rangle$ (véase apéndice A). □

3.3.2. El retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$

Este retículo constituye una variante del Teorema de los 14 conjuntos de Kuratowski. Esta variante, reemplaza el operador de complemento por el operador de interior i , y permite la combinación de conjuntos mediante las operaciones de unión ($\vee$) e intersección ($\wedge$).

Teorema 3.19 (Sherman [6], 2010). *Sea $M = \langle k, i \rangle$ submonoide de Kuratowski. Si $\langle M, \wedge, \vee \rangle$ es un retículo (véase el Lema 2.30). Entonces su numero de Sherman es 35.*

Demostración. Sea $H = \langle k, i, \wedge \rangle = M \cup L$ el semirretículo de infimos, donde

$$M = \{I, i, k, ik, ki, iki, kik\}, \quad L = \{ik \wedge ki, I \wedge ik, I \wedge ki, I \wedge iki, I \wedge kik, I \wedge (ik \wedge ki)\}.$$

Por el Teorema 3.18, sabemos que $s(H) = 13$. Añadimos a H los dos operadores obtenidos por uniones irredundantes que no estaban previamente: $ik \vee ki$ y $(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik)$.

$$J = H \cup \{ik \vee ki, (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik)\},$$

Para organizar el análisis, particionamos J en cuatro clases:

- (1) i, k ;
- (2) I ;
- (3) $iki, ki \wedge ik, ik, ki, \boxed{ki \vee ik}, kik$;
- (4) $I \wedge iki, I \wedge ki \wedge ik, I \wedge ik, I \wedge ki, \boxed{(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik)}, I \wedge kik$.

Los elementos de la clase (1) son los extremos del retículo (i es el mínimo, k es el máximo) y no participan en la generación de nuevos operadores mediante uniones. La identidad I (clase 2) puede unirse de manera no trivial con los elementos de la clase (3), lo que produce 6 nuevos operadores:

$$\begin{aligned} I \vee iki, \quad I \vee (ki \wedge ik), \quad I \vee ik, \\ I \vee ki, \quad I \vee (ki \vee ik), \quad I \vee kik. \end{aligned}$$

Finalmente, consideramos todas las uniones posibles entre un elemento de la clase (3) y uno de la clase (4) obtenemos exactamente 14 operadores nuevos:

$$\begin{aligned} (I \wedge kik) \vee ki \vee ik & \quad (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) \vee iki & \quad (I \wedge kik) \vee ik \\ (I \wedge ki) \vee (ki \wedge ik) & \quad (I \wedge kik) \vee iki & \quad (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) \vee (ki \wedge ik) \\ (I \wedge kik) \vee ki & \quad (I \wedge ik) \vee ki & \quad (I \wedge kik) \vee (ki \wedge ik) \\ (I \wedge ik) \vee iki & \quad (I \wedge ki) \vee ik & \quad (I \wedge ik) \vee (ki \wedge ik) \\ (I \wedge ki) \vee iki & \quad (I \wedge ki \wedge ik) \vee iki & \end{aligned}$$

La cerradura del retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ bajo las operaciones binarias $\wedge$ y $\vee$ es consecuencia de haber incluido todas las uniones e intersecciones posibles a partir de las cuatro clases.

La cerradura del retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ bajo el operador clausura k , se debe a que H es cerrado bajo k y además k distribuye respecto a $\vee$ (véase la Definición 2.3). La cerradura bajo el operador interior i , se debe a que H es cerrado bajo i y por lo probado en el Teorema 3.17. Por tanto, se tiene que :

$$s(\langle k, i, \wedge, \vee \rangle) = \underbrace{13}_{s(H)} + \underbrace{2}_{\text{uniones añadidas}} + \underbrace{6}_{I \vee (\text{clase 3})} + \underbrace{14}_{\text{uniones clases 3-4}} = 35.$$

□

Considérese $\mathbb{R}$ con la topología usual y el conjunto

$$T = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \cup F_4, \text{ donde}$$

$$\begin{aligned} F_1 &= \{1/n : n \in \mathbb{N}\}, & F_2 &= [2, 4] \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\}, \\ F_3 &= (5, 7] \cap \mathbb{Q}, & F_4 &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]. \end{aligned}$$

El conjunto T , presentado por Sherman en [6], constituye un conjunto testigo para el

retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$ (véase el Apéndice A).

3.3.3. El semirretículo $\langle k, c, \wedge \rangle$

En particular, la variante $L = \langle k, c, \wedge \rangle$ muestra la diferencia entre un conjunto $E \subseteq X$ que alcanza $g(L, \tau, E) = s(L)$ y un conjunto testigo T , que además distingue todos los operadores $\varphi, \psi \in L$ (véase a Definición 3.3). Para ilustrar esta diferencia, usaremos el operador *side* s definido en la Definición 3.16 y estudiado por Shum, que permite ver que, de hecho, el monoide generado por s es infinito.

Teorema 3.20. [7] *El monoide $\langle s \rangle$ tiene, número de Sherman infinito y un conjunto testigo.*

Demostración. Sea $X = \mathbb{N}^*$, definase el operador de clausura k como sigue :

$$k(A) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } A = \emptyset, \\ [\min A, \infty) & \text{si } A \neq \emptyset, \end{cases}$$

Entonces k genera sobre X una *topología* τ (véase el Lema 2.6), esta topología es llamada *Topología de Alexandroff*. Consideremos el operador *side* (s) de la definición 3.16 construyase $\langle s \rangle$ el monoide generado por s (véase la Definición 2.25) entonces un conjunto testigo para el monoide es: $T = \{2, 4, 6, 8, \dots\} \subset X$. (véase el Apéndice A)

□

El teorema es relevante porque muestra que el monoide generado por el operador *side* s tiene número de Sherman infinito y admite un conjunto testigo, mientras que en el retículo $L = \langle k, c, \wedge \rangle$ no es trivial dar un conjunto testigo.

Teorema 3.21. [6] *Sea $M = \langle k, c \rangle$ el monoide de Kuratowski entonces el semirretículo $\langle M, \wedge \rangle$ tiene número de Sherman infinito.*

Demostración. Nótese que el operador *side* s puede expresarse en términos de los operadores de clausura k , complemento c y la operación binaria $\wedge$. En consecuencia, se tiene que $\langle s \rangle \subseteq \langle M, \wedge \rangle$. Dado que las iteraciones de s generan una familia infinita de operadores distintos, se concluye que $\langle M, \wedge \rangle$ posee número de Sherman infinito.

□

Nótese que en el espacio $\mathbb{N}^*$ con la topología de Alexandroff, definida en la prueba del Teorema 3.20, el conjunto T es testigo para $\langle s \rangle$, pero no lo es para $\langle k, c, \wedge \rangle$. En efecto, se tiene que $i(T) = ik(T) = \emptyset$, mientras que $i(\{1\}) = \{1\} \neq ik(\{1\}) = \mathbb{N}$.

Lema 3.22. *Se cumple que : $\langle k, c, \wedge \rangle = \langle i, c, \wedge \rangle = \langle k, c, \vee \rangle = \langle i, c, \vee \rangle = \langle k, c, \wedge, \vee \rangle$.*

Demostración. Se tiene que $k = cic$, $i = ckc$, $a \vee b = c(ca \wedge cb)$ y $a \wedge b = c(ca \vee cb)$ (véase definición 2.5 y lema 2.33). $\square$

La Tabla 3.1 resume los números de Sherman para las distintas estructuras algebraicas que se generan a partir de los operadores indicados en las filas y las operaciones binarias especificadas en las columnas.

Operaciones	$\{I\}$	$\{\wedge\}$	$\{\vee\}$	$\{\wedge, \vee\}$
$\{I\}$	1	1	1	1
$\{i\}$	2	2	2	2
$\{k\}$	2	2	2	2
$\{c\}$	2	4	4	4
$\{i, k\}$	7	13	13	35
$\{k, c\}$	14	∞	∞	∞

Tabla 3.1: Número de Sherman para diferentes variantes, según Sherman [6].

En particular, la columna $\{I\}$ corresponde a los monoides de operadores (esto es, estructuras cerradas únicamente bajo composición), mientras que las columnas $\{\wedge\}$, $\{\vee\}$ y $\{\wedge, \vee\}$ representan, respectivamente, los semirretículos de ínfimos, los semirretículos de supremos y los retículos generados por dichos operadores. Por el lema 3.22 no es necesario revisar las variantes correspondientes a las siguientes estructuras $\langle i, c, \wedge \rangle = \langle k, c, \vee \rangle = \langle i, c, \vee \rangle = \langle k, c, \wedge, \vee \rangle$.

En el presente trabajo no fue posible encontrar un conjunto testigo para estructuras que tengan número de Sherman infinito, además del presentado por Shum [7] para el monoide *side*. Sin embargo, el **Teorema 5.10** de McKinsey y Tarski [4] establece que, para todo espacio topológico X normal, denso en sí mismo y con una base σ -numerable, existe un conjunto testigo $T \subseteq X$ para el retículo $\langle k, c, \wedge, \vee \rangle$.

3.4 Variantes con $n \geq 2$ conjuntos iniciales

En esta sección extendemos el problema de Kuratowski al caso en que se parte de una **familia finita de conjuntos iniciales** de tamaño $n \geq 2$. Esta generalización permite estudiar cómo crece el número de subconjuntos distintos generados cuando no se parte de un único conjunto, sino de varios, y cómo se comportan las estructuras algebraicas bajo composiciones de operadores y operaciones binarias. Las variantes presentadas en la sección anterior corresponden al caso particular $n = 1$.

Definición 3.23 (Números de Gardner y Sherman para familias). Sea (X, τ) un espacio topológico fijo, que induce operadores de clausura k e interior i . Sea además $\emptyset \neq \mathcal{O} \subseteq \{I, k, i, c\}$ y sea L una de las estructuras generadas por $\mathcal{O}$: un monoide $\langle \mathcal{O} \rangle$, un semirretículo $\langle \mathcal{O}, \wedge \rangle$ o $\langle \mathcal{O}, \vee \rangle$, o un retículo $\langle \mathcal{O}, \wedge, \vee \rangle$.

Sea $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia finita de subconjuntos de tamaño $n \geq 1$. Definimos:

Número de Gardner de la familia:

$$g(L, \tau, \mathcal{E}) = |\text{Orb}_L(\mathcal{E})| = |\{\varphi(A) : \varphi \in L, A \in \mathcal{E}\}|.$$

Número de Gardner para familias de tamaño n :

$$g_n(L, \tau) = \max\{g(L, \tau, \mathcal{E}) : |\mathcal{E}| = n\}.$$

Número de Sherman para familias de tamaño n :

$$s_n(L) = \sup\{g_n(L, \tau) : \tau \text{ es una topología sobre } X\}.$$

La Tabla 3.2 resume los valores de $s_n(L)$ para diferentes estructuras algebraicas generadas por operadores de la primera columna y operaciones binarias de la primera fila. En particular:

- La columna $\{I\}$ corresponde a monoides generados únicamente por los operadores indicados en cada fila.
- Las columnas $\{\wedge\}$ y $\{\vee\}$ representan semirretículos de ínfimos y de supremos, respectivamente.
- La columna $\{\wedge, \vee\}$ corresponde a retículos completos, donde se permiten tanto uniones como intersecciones.

Cada entrada indica el máximo número de subconjuntos distintos que se pueden obtener al aplicar los operadores indicados a todos los conjuntos de una familia de tamaño n , cerrando bajo las operaciones binarias correspondientes. Esto generaliza directamente el problema clásico de Kuratowski para un conjunto único, mostrando cómo crece rápidamente la complejidad combinatoria al aumentar el número de conjuntos iniciales y al introducir operaciones de unión e intersección.

Operaciones	$\{I\}$	$\{\wedge\}$	$\{\vee\}$	$\{\wedge, \vee\}$
$\{I\}$	n	$2^n - 1$	$2^n - 1$	D_n
$\{i\}$	$2n$	$3^n - 1$	∞	∞
$\{k\}$	$2n$	∞	$3^n - 1$	∞
$\{c\}$	$2n$	2^{2^n}	2^{2^n}	2^{2^n}
$\{i, k\}$	$7n$	∞	∞	∞
$\{i, c\} = \{k, c\} = \{i, k, c\}$	$14n$	∞	∞	∞

Tabla 3.2: Número de Sherman $s_n(L)$ para familias de tamaño $n \geq 2$, según operadores y operaciones binarias.

Los resultados de la Tabla 3.2, así como las construcciones explícitas de familias que alcanzan estas cotas máximas, se desarrollan en detalle en el Apéndice B. Esto permite ilustrar de manera constructiva cómo varía el número de conjuntos distintos según la estructura algebraica elegida y el tamaño de la familia inicial de conjuntos.

4. Conclusiones

El teorema de Kuratowski de los 14 conjuntos se pregunta por la cantidad máxima de conjuntos distintos que pueden obtenerse al aplicar las operaciones de clausura y complemento a un mismo conjunto inicial en un espacio topológico dado.

En este trabajo hemos estudiado distintas variantes de este problema. Por un lado, consideramos variaciones en los operadores empleados: clausura, interior, complemento, así como las operaciones binarias de unión e intersección. Por otro lado, analizamos también variantes en función del número de conjuntos iniciales.

Operadores	Estructura algebraica			
	$\{I\}$	$\{\wedge\}$	$\{\vee\}$	$\{\wedge, \vee\}$
$\{I\}$	1 (n)	1 ($2^n - 1$)	1 ($2^n - 1$)	1 (D_n)
$\{i\}$	2 ($2n$)	2 ($3^n - 1$)	2 (∞)	2 (∞)
$\{k\}$	2 ($2n$)	2 (∞)	2 ($3^n - 1$)	2 (∞)
$\{c\}$	2 ($2n$)	4 (2^{2^n})	4 (2^{2^n})	4 (2^{2^n})
$\{i, k\}$	7 ($7n$)	13 (∞)	13 (∞)	35 (∞)
$\{i, c\} = \{k, c\} = \{i, k, c\}$	14 ($14n$)	∞ (∞)	∞ (∞)	∞ (∞)

Tabla 4.1: Tabla de operadores y estructuras algebraicas

La tabla 4.1 presenta un resumen de las variantes estudiadas y puede interpretarse como la combinación de las tablas 3.1 y 3.2.

En la parte superior se muestran las operaciones binarias consideradas (unión, intersección, ambas o ninguna), mientras que en la primera columna se listan los operadores empleados (clausura, interior, complemento, identidad o combinaciones de estos).

Bibliografía

- [1] Gardner, B. J., & Jackson, M. (2008). The Kuratowski closure-complement theorem. *New Zealand Journal of Mathematics*, 38, 9–38.
- [2] A. D. Korshunov, I. Shmulevich, On the distribution of the number of monotone Boolean functions relative to the number of lower units, *Discrete Mathematics*, 257(2–3):463–479, 2002.
- [3] Kuratowski, K. (1922). Sur l'opération $\overline{A}$ de l'analysis situs. *Fundamenta Mathematicae*, 3, 182–199.
- [4] McKinsey, J. C. C., & Tarski, A. (1944). The algebra of topology. *Annals of Mathematics*, 45(2), 141–191.
- [5] Carlos Enrique Uzcátegui Aylwin, *Fundamentos de la Matemática*. Escuela de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, 23 de septiembre de 2024.
- [6] Sherman, D. (2010). Variations on Kuratowski's 14-set theorem. *The American Mathematical Monthly*, 117(2), 113–123.
- [7] Shum, K. P. (2017). A note on Kuratowski's theorem and its related topics. *Advances in Pure Mathematics*, 7(8), 381–404.
- [8] Yu, C. Y. (1978). Solution to problem 5996. *The American Mathematical Monthly*, 85(4), 283–284.

A. Conjuntos Testigo

Presentaremos los conjuntos testigos para algunos monoides, semirretículos y retículos. A menos que se diga lo contrario, el espacio es $\mathbb{R}$ con la topología usual.

Del teorema original de Kuratowski

El conjunto testigo para el monoide de Kuratowski es: $A = \left((0, 2) \setminus \{1\} \right) \cup \{3\} \cup \left([4, 5] \cap \mathbb{Q} \right)$

Secuencia iniciada con k
$A = (0, 2) \setminus \{1\} \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$
$kA = [0, 2] \cup \{3\} \cup [4, 5]$
$ckA = (-\infty, 0) \cup (2, 4) \setminus \{3\} \cup (5, \infty)$
$kckA = (-\infty, 0] \cup [2, 4] \cup [5, \infty)$
$ckckA = (0, 2) \cup (4, 5)$
$kckckA = [0, 2] \cup [4, 5]$
$ckckckA = (-\infty, 0) \cup (2, 4) \cup (5, \infty)$

Tabla A.1: Secuencia iniciada con k en el teorema de Kuratowski

Secuencia iniciada con c
$cA = (-\infty, 0] \cup \{1\} \cup [2, 4) \setminus \{3\} \cup ((4, 5) \setminus \mathbb{Q}) \cup (5, \infty)$
$kckA = (-\infty, 0] \cup \{1\} \cup [2, \infty)$
$ckckA = (0, 2) \setminus \{1\}$
$kckckA = [0, 2]$
$ckckckA = (-\infty, 0) \cup (2, \infty)$
$kckckckA = (-\infty, 0] \cup [2, \infty)$
$ckckckckA = (0, 2)$

Tabla A.2: Secuencia iniciada con c en el teorema de Kuratowski

Del submonoide $\langle k, i \rangle$ y su dual $c\langle k, i \rangle$

El conjunto testigo es $A = \left((0, 2) \setminus \{1\} \right) \cup \{3\} \cup \left([4, 5] \cap \mathbb{Q} \right)$

Operadores en $\langle k, i \rangle$	Operadores en $c\langle k, i \rangle$
$I(A) = A$	$cI(A) = cA$
$k(A) = kA$	$ck(A) = ckA$
$i(A) = ck c(A)$	$ci(A) = kc(A)$
$ik(A) = ckck(A)$	$cik(A) = kck(A)$
$ki(A) = kckc(A)$	$cki(A) = ckckc(A)$
$kik(A) = kckck(A)$	$ckik(A) = ckckck(A)$
$iki(A) = ckckckc(A)$	$ciki(A) = kckckc(A)$

Tabla A.3: Sub-monoides de Kuratowski, $\langle k, i \rangle$ y su dual $c\langle k, i \rangle$, aplicados al conjunto A .

Del semirretículo de supremos $\langle k, i, \vee \rangle$

El conjunto testigo tomado de Yu [8] es $T = D_1 \cup D_2 \cup ((3, 5) \setminus \{4\})$, donde:

$D_1 = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $D_2 = \mathbb{I} \cap (2, 3)$, no se incluye $I(T)$ en la tabla para ahorrar espacio.

Sub monoide $\langle k, i \rangle$	Uniones no triviales $\vee$
$i = (3, 4) \cup (4, 5)$	$I \vee ik = D_1 \cup (2, 5)$
$k = \{0\} \cup D_1 \cup [2, 5]$	$I \vee ki = D_1 \cup D_2 \cup [3, 5]$
$ik = (2, 5)$	$I \vee iki = D_1 \cup D_2 \cup (3, 5)$
$ki = [3, 5]$	$I \vee kik = D_1 \cup [2, 5]$
$iki = (3, 5)$	$ik \vee ki = (2, 5]$
$kik = [2, 5]$	$(I \vee ik) \vee ki = D_1 \cup (2, 5]$

Tabla A.4: Semirretículo de supremos $\langle k, i, \vee \rangle$ aplicado al conjunto T .

Del semirretículo de ínfimos $\langle k, i, \wedge \rangle$

El Conjunto Testigo es: $T = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup E_2 \cup E_3 \cup [5, \infty)$, donde:

$$E_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right), \quad E_2 = \mathbb{Q} \cap (2, 3), \quad E_3 = \{3, 4\}.$$

Sub-monoide $\langle k, i \rangle$	Intersecciones no triviales $\wedge$
$i = (-\infty, 0) \cup E_1 \cup (1, 2) \cup (5, \infty)$	$I \wedge ki = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup [5, \infty)$
$k = (-\infty, 3] \cup \{4\} \cup [5, \infty)$	$I \wedge ik = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup E_2 \cup (5, \infty)$
$ik = (-\infty, 3) \cup (5, \infty)$	$I \wedge kik = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup E_2 \cup \{3\} \cup [5, \infty)$
$ki = (-\infty, 2] \cup [5, \infty)$	$I \wedge iki = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2) \cup (5, \infty)$
$kik = (-\infty, 3] \cup [5, \infty)$	$ki \wedge ik = (-\infty, 2] \cup (5, \infty)$
$iki = (-\infty, 2) \cup (5, \infty)$	$I \wedge ki \wedge ik = (-\infty, 0] \cup E_1 \cup (1, 2] \cup (5, \infty)$

Tabla A.5: Semirretículo de ínfimos $\langle k, i, \wedge \rangle$ aplicado al conjunto T .

Observación A.1. El conjunto testigo para el semirretículo de ínfimos $\langle k, i, \wedge \rangle$ es el complemento del conjunto testigo para el semirretículo de supremos $\langle k, i, \vee \rangle$. Esto debido a que la operación binaria $\wedge$ es dual con respecto a la operación binaria $\vee$, mediante la expresión : $a \wedge b = c(ca \vee cb)$ (véase corolario 2.33)

Del retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$

El Conjunto testigo, tomado de [6], es: $T = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \cup F_4$, donde:

$$F_1 = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}, \quad F_2 = [2, 4] \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\},$$

$$F_3 = (5, 7] \cap \mathbb{Q}, \quad F_4 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right].$$

Observación A.2. El conjunto testigo del retículo $\langle k, i, \wedge, \vee \rangle$, tambien es conjunto testigo para los semireticulos; de ínfimos $\langle k, i, \wedge \rangle$, de supremos $\langle k, i, \vee \rangle$.

Para listar apropiadamente los conjuntos de este retículo veamos las siguientes clases :

1. i, k ;
2. I ;
3. $iki, ki \wedge ik, ik, ki, ki \vee ik, kik$;
4. $I \wedge iki, I \wedge ki \wedge ik, I \wedge ik, I \wedge ki, (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik), I \wedge kik$.

Empezaremos listando los elementos del semirretículo $\langle k, i, \wedge \rangle$

1. $I = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \cup F_4$
2. $k = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \cup [2, 4] \cup [5, 7]$

$$3. i = ((2, 4) \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right)$$

$$4. ki = [2, 4] \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]\right) \cup \{6\}$$

$$5. iki = (2, 4) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right)$$

$$6. ik = (2, 4) \cup (5, 7)$$

$$7. kik = [2, 4] \cup [5, 7]$$

Listaremos la uniones entre elementos no comparables en el semirretículo $\langle k, i, \vee \rangle$

$$8. ik \wedge ki = (2, 4) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right] \cup \{6\}$$

$$9. I \wedge ik = ((2, 4) \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\}) \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$$

$$10. I \wedge ki = ([2, 4] \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right] \cup \{6\}$$

$$11. I \wedge iki = (2, 4) \setminus \{3 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right)$$

$$12. I \wedge kik = ([2, 4] \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\}) \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$$

$$13. I \wedge (ik \wedge ki) = (2, 4) \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right] \cup \{6\}$$

Ahora listaremos las uniones añadidas $\{ik \vee ki, (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik)\}$:

$$14. ik \vee ki = [2, 4] \cup (5, 7)$$

$$15. (I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) = [2, 4] \setminus \{3 + 1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$$

Listaremos las uniones de I con la clase 3)

-
16. $I \vee iki = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup [2, 4) \cup ((5, 7] \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
 17. $I \vee (ki \wedge ik) = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup [2, 4) \cup ((5, 7] \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
 18. $I \vee ki = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup [2, 4) \cup ((5, 7] \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
 19. $I \vee ik = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup [2, 4) \cup (5, 7)$
 20. $I \vee (ki \vee ik) = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup [2, 4] \cup (5, 7)$
 21. $I \vee kik = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\} \cup [2, 4] \cup [5, 7]$

Listaremos las uniones entre las clases 3) y 4)

22. $(I \wedge kik) \vee ki \vee ik = [2, 4] \cup (5, 7]$
23. $(I \wedge kik) \vee ik = (2, 4) \cup (5, 7]$
24. $(I \wedge kik) \vee iki = [2, 4) \cup ((5, 7] \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
25. $(I \wedge kik) \vee ki = [2, 4] \cup ((5, 7] \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
26. $(I \wedge kik) \vee (ki \wedge ik) = [2, 4) \cup ((5, 7] \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
27. $(I \wedge ki) \vee ik = [2, 4) \cup (5, 7)$
28. $(I \wedge ki) \vee iki = [2, 4) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right] \cup \{6\}$
29. $(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) \vee iki = [2, 4) \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$
30. $(I \wedge ki) \vee (ki \wedge ik) = [2, 4) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right] \cup \{6\}$
31. $(I \wedge ki) \vee (I \wedge ik) \vee (ki \wedge ik) = [2, 4) \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi}\right]$

-
32. $(I \wedge ik) \vee ki = [2, 4] \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi} \right]$
33. $(I \wedge ik) \vee iki = (2, 4) \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi} \right)$
34. $(I \wedge ik) \vee (ki \wedge ik) = (2, 4) \cup ((5, 7) \cap \mathbb{Q}) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi} \right]$
35. $(I \wedge ki \wedge ik) \vee iki = [2, 4) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(6 + \frac{1}{2n\pi}, 6 + \frac{1}{(2n-1)\pi} \right) \cup \{6\}$

Del monoide *side* $\langle s \rangle$.

El operador *side* introducido en la Definición 3.16 se define por

$$s = k \wedge c,$$

donde k es un operador de clausura sobre el conjunto base X .

En el caso particular considerado, sea $X = \mathbb{N}^*$. Se define el operador de clausura k sobre $\mathcal{P}(X)$ por

$$k(A) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } A = \emptyset, \\ [\text{mín } A, \infty) & \text{si } A \neq \emptyset, \end{cases}$$

donde $[\text{mín } A, \infty) = \{x \in \mathbb{N}^* : x \geq \text{mín } A\}$.

Nota. La construcción anterior no depende esencialmente de trabajar en $\mathbb{N}^*$. En efecto, si X es un conjunto fijo de cardinalidad al menos la del continuo, entonces puede dotarse de un buen orden tal que contenga un subconjunto ordenado isomorfo a $\mathbb{N}^*$. En consecuencia, es posible definir un operador de clausura análogo restringiéndose a dicho subconjunto, lo que permite extender esta construcción sin pérdida de las propiedades relevantes.

Aplicando reiteradamente el operador s al conjunto inicial T , donde

$$T = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

es el conjunto de los números naturales pares, se obtiene:

$$s(T) = k(T) \cap c(T) = [2, \infty) \cap \{1, 3, 5, \dots\} = \{3, 5, 7, \dots\},$$

$$s^2(T) = k(s(T)) \cap c(s(T)) = [3, \infty) \cap \{1, 2, 4, 6, 8, \dots\} = \{4, 6, 8, 10, \dots\},$$

$$s^3(T) = k(s^2(T)) \cap c(s^2(T)) = [4, \infty) \cap \{1, 2, 3, 5, 7, 9, \dots\} = \{5, 7, 9, 11, \dots\}.$$

A partir de estos primeros casos se observa un patrón claro: en cada iteración, el conjunto resultante está formado por números naturales mayores o iguales que un cierto umbral, y cuya paridad alterna en cada paso. Más precisamente, se obtiene por inducción que

$$s^n(T) = \{x \in \mathbb{N} : x \geq n + 2 \text{ y } x \equiv n \pmod{2}\}.$$

Esta expresión describe completamente la estructura de las iteraciones: el umbral mínimo crece linealmente con n , mientras que la condición de paridad depende de si n es par o impar.

De esta caracterización se deduce que las iteraciones se organizan en dos cadenas estrictamente descendentes respecto a la inclusión:

$$s(T) \supset s^3(T) \supset s^5(T) \supset \dots,$$

$$s^2(T) \supset s^4(T) \supset s^6(T) \supset \dots.$$

En efecto, si n es fijo, entonces todos los conjuntos $s^{n+2k}(T)$ (con $k \geq 0$) tienen la misma paridad, pero su cota inferior aumenta estrictamente.

Sea ahora $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$s^n(T) \supset s^{n+2}(T),$$

ya que ambos conjuntos contienen elementos de la misma paridad, pero el segundo exige la condición más restrictiva $x \geq n + 4$.

Además, la inclusión es estricta. En efecto, el elemento $n + 2$ pertenece a $s^n(T)$, pues

$$n + 2 \geq n + 2 \quad \text{y} \quad n + 2 \equiv n \pmod{2},$$

mientras que $n + 2 \notin s^{n+2}(T)$, ya que no satisface $x \geq n + 4$. Por lo tanto,

$$s^n(T) \supsetneq s^{n+2}(T).$$

Como consecuencia, para todo $m \neq n$ se tiene

$$s^n(T) \neq s^m(T).$$

En efecto, si m y n tienen la misma paridad, pertenecen a la misma cadena estrictamente descendente; si tienen distinta paridad, los conjuntos contienen números de distinta paridad y no pueden coincidir.

En conclusión, todos los operadores s^n son distintos entre sí (véase la definición 2.2). Además, dado que T distingue las imágenes de cualquier par de operadores distintos del monoide $\langle s \rangle$, se sigue que T es un conjunto testigo (véase definición 3.3).

B. Familias testigo

Monoides generados por un solo operador

Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología usual y $n \geq 1$. Consideremos una familia $\mathcal{E} = \{E_j : 1 \leq j \leq n\}$ de intervalos dos a dos disjuntos. Para cada operador $f \in \{i, k, c\}$, definimos:

$$E_j = \begin{cases} [j, j+1) & \text{si } f = i, \\ (j, j+1] & \text{si } f = k, \\ (j, j+1) & \text{si } f = c. \end{cases}$$

Entonces, en cada caso,

$$f(E_j) \neq E_j \quad \text{y} \quad f(E_j) \neq f(E_{j'}) \text{ si } j \neq j'.$$

Además, los E_j son distintos entre sí por construcción. Por lo tanto, todos los conjuntos

$$E_1, \dots, E_n, f(E_1), \dots, f(E_n)$$

son distintos, y se obtiene

$$g(\mathcal{E}) = 2n.$$

La construcción es claramente extensible por inducción en n , añadiendo en cada paso un nuevo intervalo disjunto, lo que incrementa en dos el número de conjuntos distintos.

Semirretículo ínfimo–interior

Teorema B.1. *Sea $L = \langle i, \wedge \rangle$ el semirretículo generado por un operador interior i y la operación de encuentro $\wedge$. Para todo $n \geq 1$ se cumple*

$$s_n(L) = 3^n - 1.$$

Demostración. Procedemos a demostrar que la cota superior es alcanzable. Para ello fijamos el conjunto base

$$X = \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}}.$$

Para cada $n \geq 1$ consideramos sobre X la topología τ_n generada por la subbase

$$\mathcal{S}_n = \{\{x \in X : x_k = 2\} : 1 \leq k \leq n\}.$$

Definimos la familia $\mathcal{E}_n = \{E_1, \dots, E_n\}$ mediante

$$E_k = \{x \in X : x_k \in \{1, 2\}\}, \quad k = 1, \dots, n.$$

De acuerdo con la definición de la topología, el interior de cada conjunto es precisamente

$$i(E_k) = \{x \in X : x_k = 2\}.$$

A continuación describimos la órbita generada por $\mathcal{E}_n$ bajo las operaciones del semirretículo. Para cada vector $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1, 2\}^n$ formamos el conjunto

$$F_\varepsilon = \bigcap_{k=1}^n A_k(\varepsilon_k),$$

donde

$$A_k(0) = i(E_k), \quad A_k(1) = E_k, \quad A_k(2) = X.$$

No vacuidad de F_ε . Para cada ε construimos explícitamente un punto $x^{(\varepsilon)} \in X$ definiendo sus coordenadas como sigue:

$$x_k^{(\varepsilon)} = \begin{cases} 2, & \text{si } \varepsilon_k = 0, \\ 1, & \text{si } \varepsilon_k = 1, \\ 0, & \text{si } \varepsilon_k = 2. \end{cases}$$

Se verifica inmediatamente que $x^{(\varepsilon)}$ satisface todas las restricciones impuestas por los factores $A_k(\varepsilon_k)$:

- Si $\varepsilon_k = 0$, $x_k^{(\varepsilon)} = 2 \in i(E_k) = A_k(0)$.
- Si $\varepsilon_k = 1$, $x_k^{(\varepsilon)} = 1 \in E_k = A_k(1)$.
- Si $\varepsilon_k = 2$, no hay restricción alguna, pues $A_k(2) = X$.

Por tanto, $x^{(\varepsilon)} \in F_\varepsilon$ y $F_\varepsilon \neq \emptyset$.

Distinción de los conjuntos. Sean $\varepsilon, \delta \in \{0, 1, 2\}^n$ con $\varepsilon \neq \delta$. Existe al menos un índice k tal que $\varepsilon_k \neq \delta_k$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\varepsilon_k = 0$ y $\delta_k = 1$ (los restantes casos son análogos). Todo elemento de F_ε debe tener su k -ésima coordenada igual a 2 porque $\varepsilon_k = 0$ exige pertenencia a $i(E_k)$. Por otro lado, los elementos de F_δ solo requieren que la coordenada k esté en $\{1, 2\}$, ya que $\delta_k = 1$ impone la restricción E_k . El punto $x^{(\delta)}$ construido anteriormente (véase **No vacuidad de F_ε**) cumple $x_k^{(\delta)} = 1$, por lo que pertenece a F_δ pero no a F_ε . En consecuencia, $F_\varepsilon \neq F_\delta$.

De lo anterior se deduce que los 3^n conjuntos F_ε son no vacíos y dos a dos distintos. Nótese que el caso particular $\varepsilon = (2, \dots, 2)$ produce $F_\varepsilon = X$, el cual no se considera dentro de la órbita estricta generada por $\mathcal{E}_n$. Por consiguiente tenemos que:

$$|\text{Orb}_L(\mathcal{E}_n)| = 3^n - 1.$$

De esto se sigue que

$$g(L, \tau_n, \mathcal{E}_n) = 3^n - 1,$$

y, por definición de $s_n(L)$, concluimos que

$$s_n(L) = 3^n - 1.$$

Comentario. En esta construcción el conjunto base X permanece fijo, mientras que la maximización de $g(L, \tau, \mathcal{E}_n)$ se logra variando únicamente la topología τ_n . La riqueza combinatoria de la órbita proviene de la elección de la subbase, que permite codificar de manera independiente las decisiones en cada coordenada. $\square$

A continuación crearemos, para cada $n \geq 1$, una familia finita $\mathcal{E}_n = \{E_1, \dots, E_n\}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$ con la topología usual que satisface dicha igualdad. La construcción se mantiene íntegramente dentro del compacto $[-1/9, 1]$ y no requiere modificar la topología.

Teorema B.2. *Para todo $n \geq 1$ existe una familia $\mathcal{E}_n = \{E_1, \dots, E_n\}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$ tal que*

$$g(\langle i, \wedge \rangle, \tau_{\text{usual}}, \mathcal{E}_n) = 3^n - 1.$$

Construcción de $\mathcal{E}_n$. Para cada nivel $m \in \{1, \dots, n\}$ consideremos el conjunto de Cantor de

nivel m , dado por la unión disjunta de 2^m intervalos cerrados de longitud 3^{-m} :

$$C_m = \bigcup_{k=0}^{2^m-1} [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}] \subseteq [0, 1].$$

Fijemos una sucesión estrictamente decreciente $(r_m)_{m \geq 1}$ de números reales positivos y menores que $1/9$; por ejemplo,

$$r_m = \frac{1}{9} \left(1 - \frac{1}{10^m} \right).$$

Definimos entonces, para cada $j = 1, \dots, n$,

$$E_j = \bigcup_{k=0}^{2^j-1} [a_k^{(j)} - r_j, b_k^{(j)} - r_j], \quad \text{int}(E_j) = \bigcup_{k=0}^{2^j-1} (a_k^{(j)} - r_j, b_k^{(j)} - r_j)$$

Todos los intervalos involucrados están contenidos en $[-1/9, 1]$.

Para $i > j$ los 2^i intervalos de E_i se agrupan en 2^j bloques de 2^{i-j} intervalos. En cada bloque, el primer intervalo *no* está contenido en el intervalo correspondiente de E_j ; los $2^{i-j} - 1$ restantes *sí* lo están.

Por tanto las operaciones i (interior) e $\wedge$ (intersección) actúan independientemente en cada nivel, generando $3^n - 1$ conjuntos distintos.

Comentario. Este resultado pone de manifiesto que, si bien la cota $3^n - 1$ se obtiene en abstracto variando la topología sobre un conjunto fijo, también puede alcanzarse en un espacio clásico como $\mathbb{R}$ con su topología usual. En consecuencia, la complejidad combinatoria del semirretículo $\langle i, \wedge \rangle$ no es un mero artefacto de construcciones abstractas, sino que está presente de manera natural en contextos topológicos estándar.

Retículo complemento

Sea $X = \{0, 1\}^n$ con la topología producto. Para todo $i \in \mathbb{N}^*$ tal que $1 \leq i \leq n$, definimos

el conjunto $E_i := \{x \in X : x_i = 1\}$, la familia $\mathcal{E} := \{E_i : 1 \leq i \leq n\}$.

Para todo $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$, definimos

$$A_\varepsilon := \bigcap_{1 \leq i \leq n} E_i^{\varepsilon_i}, \quad \text{donde } E_i^1 = E_i, \ E_i^0 = X \setminus E_i.$$

Entonces $A_\varepsilon = \{(1 - \varepsilon_1, \dots, 1 - \varepsilon_n)\}$, por lo que $\{A_\varepsilon : \varepsilon \in \{0, 1\}^n\}$ es la familia de todos los subconjuntos unitarios de X . Además, para todo $S \subseteq X$,

$$S = \bigcup_{\varepsilon \in T} A_\varepsilon, \quad \text{donde } T = \{\varepsilon \in \{0, 1\}^n : (1 - \varepsilon_1, \dots, 1 - \varepsilon_n) \in S\}.$$

Por tanto, el retículo $(\langle c \rangle(\mathcal{E}), \cup, \cap)$ coincide con el retículo $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ que tiene por cardinal $2^{|X|}$, siendo $X = \{0, 1\}^n$ tenemos el cardinal es 2^{2^n} .

Retículo de Dedekind

El retículo n -generado $(\langle I \rangle[\mathcal{E}], \vee, \wedge)$ está relacionado con la cantidad de funciones booleanas monótonas con n entradas.

A continuación se listan algunos casos.

Caso $n = 2$ Las funciones booleanas monótonas en dos variables x_1, x_2 son:

$$\begin{aligned} f_1 &= 0 \\ f_2 &= x_1 \wedge x_2 \\ f_3 &= x_1 \\ f_4 &= x_2 \\ f_5 &= x_1 \vee x_2 \\ f_6 &= 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $D_2 = 6$.

Caso $n = 3$ Las funciones booleanas monótonas en tres variables x_1, x_2, x_3 son:

$$\begin{aligned}
f_1 &= 0 \\
f_2 &= 1 \\
f_3 &= x_1 \\
f_4 &= x_2 \\
f_5 &= x_3 \\
f_6 &= x_1 \wedge x_2 \\
f_7 &= x_1 \wedge x_3 \\
f_8 &= x_2 \wedge x_3 \\
f_9 &= x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \\
f_{10} &= x_1 \vee x_2 \\
f_{11} &= x_1 \vee x_3 \\
f_{12} &= x_2 \vee x_3 \\
f_{13} &= x_1 \vee (x_2 \wedge x_3) \\
f_{14} &= x_2 \vee (x_1 \wedge x_3) \\
f_{15} &= x_3 \vee (x_1 \wedge x_2) \\
f_{16} &= (x_1 \vee x_2) \wedge x_3 \\
f_{17} &= (x_1 \vee x_3) \wedge x_2 \\
f_{18} &= (x_2 \vee x_3) \wedge x_1 \\
f_{19} &= (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_3) \vee (x_2 \wedge x_3) \\
f_{20} &= x_1 \vee x_2 \vee x_3
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $D_3 = 20$.

Semirretículo clausura-ínfimo

Consideremos el monoide generado por las operaciones de clausura k (respecto de una topología τ) e intersección $\wedge$. Dado un espacio topológico (X, τ) y una familia finita $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, denotamos por $g(\langle k, \wedge \rangle, \tau, \mathcal{F})$ el cardinal del conjunto de todos los subconjuntos de X que pueden obtenerse a partir de $\mathcal{F}$ mediante aplicaciones sucesivas de k e $\wedge$.

Proposición. Para todo $n \geq 2$ no existe una cota superior finita para $g(\langle k, \wedge \rangle, \tau, \mathcal{F})$ cuando

$\mathcal{F}$ recorre todas las familias de n subconjuntos en espacios topológicos adecuados.

Justificación mediante un ejemplo con dos conjuntos. Basta exhibir un espacio topológico y una familia de exactamente dos conjuntos que genere infinitos elementos. Sea $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ dotado de la topología cuyos cerrados son los conjuntos k -cerrados para el operador de clausura

$$k(A) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } A = \emptyset, \\ [\min A, \infty) & \text{si } A \neq \emptyset. \end{cases}$$

Sean

$$E_0 = \{2, 4, 6, \dots\} \quad (\text{números pares}), \quad O = \{1, 3, 5, \dots\} \quad (\text{números impares}).$$

Definimos recursivamente para $j \geq 1$:

$$E_j = E_{j-1} \cap k(k(E_{j-1}) \cap O).$$

Una inducción directa muestra que

$$E_j = E_0 \cap [2j + 2, \infty) = \{2j + 2, 2j + 4, 2j + 6, \dots\},$$

y por tanto todos los E_j son distintos. En consecuencia

$$g(\langle k, \wedge \rangle, \tau, \{E_0, O\}) = \infty.$$

Si $n \geq 2$, podemos añadir $n - 2$ conjuntos arbitrarios a la familia sin reducir el número de combinaciones generadas (por ejemplo, réplicas de E_0 u O). Así, para cada $n \geq 2$ existe una familia de tamaño n que produce infinitos conjuntos.

Replicabilidad en espacios homeomorfos y familias más grandes. Si un espacio topológico (Y, τ') contiene un subespacio homeomorfo a $(\mathbb{N}^*, \tau)$, entonces la construcción anterior puede trasladarse a Y . Basta tomar dos subconjuntos de Y que bajo el homeomorfismo se correspondan con E_0 y O , y definir inductivamente los análogos de los E_j usando el operador clausura de Y . Por tanto, cualquier familia $\mathcal{F}$ que contenga dos conjuntos con una disposición homeomorfa a $\{E_0, O\}$ generará también infinitos elementos distintos bajo $\langle k, \wedge \rangle$.

Esta observación muestra que el fenómeno de infinitud no es una patología exclusiva de $\mathbb{N}^*$, sino que aparece en una amplia clase de espacios topológicos, incluyendo aquellos de cardinalidad al menos la del continuo que admitan un subconjunto bien ordenado isomorfo a

N^* .