110/8/5 COVID-19 疫苗接種後不良反應事件通報

疫苗接種後不良事件之通報,為接種疫苗之後任何時間,通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關之任何事件。這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後,但不表示為接種疫苗所致。本不良事件通報表格,爲醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類,需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判,事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

表一、COVID-19疫苗接種後不良事件通報

(通報資料截止點: 110/8/5 16:00)

(运报 京 行								
疫苗廠牌		疫苗接種	疫苗接	疫苗接種	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
		量(劑)	種後不	後非嚴重	小計	死亡	疑似嚴	其他疑似
			良事件	不良事件			重過敏	嚴重不良
				a			反應 b	事件°
總計	新增	256,777	100	47	53	14	2	37
	累計	8,875,048	4,723 ^f	2,621	2,102 ^f	578°	19	1,505
AstraZeneca	新增	247,085	81	39	42	9 ^d	2	31
	累計	5,824,943	3,903	2,271	1,632	486	14	1,132
Moderna	新增	9,692	19	8	11	5 ^d	0	6
	累計	3,050,105	820	350	470	92	5	373

a 通報症狀主要包含發燒、肌肉痛、頭痛、發寒、接種部位紅腫痛、疲倦、嘔吐、皮膚紅疹等。b 疑似嚴重過敏反應,由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(量針)不同,可參考「區別疫苗接種後的立即不適一過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(http://at.cdc.tw/1gC9J8)。根據全國藥物不良反應通報中心之「COVID-19 疫苗不良事件通報摘要報告」(統計截至7月28日),符合過敏性反應之定義共計17件,但其中1例通報為死亡不良事件且亦為疑似嚴重過敏反應,於此表中已計算至死亡不良事件內。

c 請留意,此摘要非臨床完整資訊,亦非臨床審查,僅以通報之有限資訊摘要如下:2021年08月05日新增33例(16女17男)AstraZeneca疫苗接種後發生疑似其他嚴重不良事件,為扣除死亡與扣除疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件或具重要臨床意義通報數,年齡為18歲至91歲間,為接種疫苗後當日至51日間發生,包含疑似癲癇、腦中風、腦中風與血小板低下、心肌梗塞、上腸系膜靜脈栓塞併腸壞死、肝門靜脈栓塞、消化道出血與低血容性休克、顏面神經麻痺、心律不整、肺炎、出血性腸炎、過敏反應(免疫球蛋白E指數偏高、全身紅疹與搔癢、頭皮與四肢末梢發麻及噁心感)、接種後常見之全身不適,及診斷未明之發燒與四肢瘀斑、耳鳴、味覺異常、

呼吸喘與胸悶、胸痛、腹瀉與腰酸背痛、多處瘀斑、瘀斑與斑丘疹、下肢無力等。同期間新增 6 例(4 女 2 男)Moderna 疫苗接種後發生疑似其他嚴重不良事件,年齡為 65 歲至 89 歲間,為接種疫苗後 1 日至 14 日間發生,包含疑似腦中風、顏面神經麻痺、外展神經麻痺,及診斷未明之心包膜積液等。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」,https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137)。

- d 2021年08月05日新增9例(3女6男)AstraZeneca疫苗接種後發生死亡之不良事件,年齡為43歲至96歲間,為接種疫苗後2日至46日間發生;同期間新增5例(2女3男)Moderna疫苗接種後發生死亡之不良事件,年齡為45歲至90歲間,為接種疫苗後1日至32日間發生。
- °目前累計 578 例(267 女 311 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件,年齡為 2 個月至 101 歲間(其中 388 人為 75 歲以上長者),疫苗接種後當日至 68 日間發生,其中有 486 例為接種 AstraZeneca,有 92 例為接種 Moderna。
- f累計共4,723例,其中2,102例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。累計2,102不良事件通報中,另有1例為原通報接種AstraZeneca,經通報者審視確認後應為接種Moderna,故予以修正。COVID-19疫苗不良事件通報摘要報告,請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」,https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571)。



