

“嘉信” 紅黴素 膠囊

Erythromycin Estolate capsules“C.S.P.”

衛署藥製字第 013660 號

紅黴素(Erythromycin estolate)屬巨環類抗生素，於 1952 年美國禮來公司從 *Streptomyces erythreus* 菌株依生物合成法製成，為紅絲菌素之月桂硫酸丙酯，其特點為對酸安定，適於口服。

〔作用〕

- (1)對酸安定，口服迅速吸收；本品被吸收後，廣泛分布於組織及體液中，食物不妨害本劑之吸收，故投藥不受進食時間之限制，空腹時服用 250mg，二小時後達 0.4mg/ml 至 1.3mg/ml 之血中濃度。
- (2)同時具殺菌及制菌作用，其抗菌範圍類似青黴素，對 G(+)，某些 G(-)菌(腦膜炎菌，流行性感菌，螺旋體屬，某些立克次體屬，及大型病毒具強的抗菌作用，對葡萄球菌，溶血性鏈球菌，棒狀桿菌，肺炎球菌(包括有青黴素抗藥性者)感受性極強)。
- (3)本品除與其他巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性外，與其他抗生素間無交叉抗藥性產生。
- (4)對可能發生青黴素過敏反應之病人，本劑為極恰當之代用藥物。

〔成分〕每膠囊含：

主成分：

Erythromycin estolate.....250mg(力價)

賦形劑: Corn starch、Magnesium Stearate

膠囊殼成分: Gelatin、Titanium Dioxide、Glycerine、Sodium Lauryl Sulfate、Purified water

〔適應症〕

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

〔效能〕

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌、淋菌、腦膜炎菌、棒狀桿菌、螺旋體屬、立克次體屬、大型病毒等具有感受性病原菌所引起之感染症：肺炎、大葉性肺炎、敗血症、心內膜炎、肺膿瘍、膿胸、產褥熱、髓膜炎、胸膜炎、骨髓炎、關節炎、腎盂炎、乳線炎、癰、疔、癰、耳下腺炎、中耳炎、副鼻竇炎、膿痂疹、眼化膿症、皮膚感染症、丹毒、猩紅熱、扁桃腺炎、淋巴腺炎、蜂窩組織炎、乳樣突桿炎、匐行性角膜炎潰瘍、尿道炎、性器淋疾、結膜炎、百日咳、恙蟲病、梅毒、赤痢、單核球增多性李司忒氏菌(*Listeria monocytogenes*)引起之感染症。

〔用法用量〕

- (1)通常成人一次 250mg(力價)一日 4 次，小兒一次 6~10mg/kg 一日 4 次服用。
- (2)淋病一次 500mg，一日 4 次服用，須連續治療 5 天以上。
- (3)梅毒一次 250mg，一日 4 次服用，須連續 15 天以上。
- (4)重症感染患者，可酌增劑量。

〔注意〕

- (1)長期連用患者，偶有肝機能障礙現象發生，但停藥後即可恢復正常。
- (2)有肝機能異常之患者，如認為有必要服用本劑，應在嚴密醫師督導下才可投與本劑，且須定期作肝機能檢查，發現藥肝機能變化即予停藥。

〔包裝〕

4'sx25 鋁箔裝、100's, 200's, 500's, 1000's 瓶裝。



嘉信藥品股份有限公司
嘉義市劉富街 60 號
TEL:(052)279819 · 225119