

1. (2 points) Let $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - y$. Find the directions \vec{u} and the values of $D_{\vec{u}}f(1, -1)$ for which

- a. $D_{\vec{u}}f(1, -1)$ is largest
 b. $D_{\vec{u}}f(1, -1)$ is smallest
 c. $D_{\vec{u}}f(1, -1) = 0$
 d. $D_{\vec{u}}f(1, -1) = 4$
 e. $D_{\vec{u}}f(1, -1) = -3$

Solution:

$$\nabla f(x, y) = (2x - y)\vec{i} + (-x + 2y - 1)\vec{j}$$

$$(a) \nabla f(1, -1) = 3\vec{i} - 4\vec{j} \Rightarrow |\nabla f(1, -1)| = 5 \Rightarrow \vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}$$

$$(b) -\nabla f(1, -1) = -3\vec{i} + 4\vec{j} \Rightarrow |-\nabla f(1, -1)| = 5 \Rightarrow \vec{u} = -\frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}$$

$$(c) u = \frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j} \text{ or } u = -\frac{4}{5}\vec{i} - \frac{3}{5}\vec{j}$$

$$(d) \text{ Assume that } \vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$$

$$\text{We have } \begin{cases} |u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1 \\ D_{\vec{u}}f(1, -1) = \nabla f(1, -1) \cdot \vec{u} = 3u_1 - 4u_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow u_1^2 + (\frac{3}{4}u_1 - 1)^2 = 1$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{24}{25}, u_2 = \frac{7}{25} \text{ or } u_1 = 0, u_2 = -1 \Rightarrow \vec{u} = \frac{24}{25}\vec{i} - \frac{7}{25}\vec{j} \text{ or } \vec{u} = -\vec{j}$$

$$(e) \begin{cases} \vec{u} \cdot \nabla f = \frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j} \\ \vec{u} \cdot \nabla f = |\nabla f| \cos \theta = -3 \end{cases} \Rightarrow \cos \theta = -\frac{3}{5} \Rightarrow \vec{u} = \cos(\theta_{\nabla f} \pm \theta)\vec{i} + \sin(\theta_{\nabla f} \pm \theta)\vec{j}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos(\theta_{\nabla f} \pm \theta) = \cos(\theta_{\nabla f}) \cos(\theta) \mp \sin(\theta_{\nabla f}) \sin(\theta) = -\frac{3}{5} \frac{3}{5} \mp (-\frac{4}{5} \frac{4}{5}) = \frac{7}{25} \text{ or } -1 \\ \sin(\theta_{\nabla f} \pm \theta) = \sin(\theta_{\nabla f}) \cos(\theta) \pm \cos(\theta_{\nabla f}) \sin(\theta) = \frac{12}{25} \pm (\frac{12}{25}) = \frac{24}{25} \text{ or } 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \frac{7}{25}\vec{i} + \frac{24}{25}\vec{j} \text{ or } \vec{u} = -\vec{i}$$

2. (2 points) Find equations for the

- (a) tangent plane and
 (b) normal line at the point P_0 on the given surface.

$$x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad P_0(1, -1, 3)$$

Solution:

$$(a) \nabla f = (2x + 2y)\vec{i} + (2x - 2y)\vec{j} + 2z\vec{k} \Rightarrow \nabla f(1, -1, 3) = 4\vec{j} + 6\vec{k}$$

$$\Rightarrow \text{Tangent plane: } 4(y + 1) + 6(z - 3) = 0 \Rightarrow 2y + 3z = 7$$

$$(b) \text{ Normal line: } x = 1, y = -1 + 4t, z = 3 + 6t$$

3. (2 points) Find the linearization $L(x, y, z)$ of the function $f(x, y, z)$ at P_0 . Then find an upper bound for the magnitude of the error E in the approximation $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$ over the region R .

$$f(x, y, z) = xz - 3yz + 2 \text{ at } P_0(1, 1, 2)$$

$$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$$

Solution:

$$f(1, 1, 2) = -2, f_x = z, f_y = -3z, f_z = x - 3y$$

$$\Rightarrow L(x, y, z) = -2 + 2(x - 1) - 6(y - 1) - 2(z - 2) = 2x - 6y - 2z + 6$$

$$f_{xx} = 0, f_{yy} = 0, f_{zz} = 0, f_{xy} = 0, f_{xz} = 1, f_{yz} = -3$$

$$\Rightarrow M = 3, \text{ thus, } |E(x, y, z)| \leq (\frac{1}{2})(3)(0.01 + 0.01 + 0.02)^2 = 0.0024$$

4. (2 points) Find all the local maximam, local minima, and saddle points of the function

$$f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$$

Solution:

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 3x^2 + 3y = 0 \\ f_y(x, y) = 3x + 3y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y^2 \\ y^4 + y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = -1 \end{cases} \text{ or } \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

The critical points are $(0, 0)$ and $(-1, -1)$.

$$f_{xx} = 6x, f_{xy} = 3, f_{yy} = 6y \Rightarrow f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 36xy - 9$$

For $(0, 0)$, $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -9 < 0 \Rightarrow$ saddle point.

For $(-1, -1)$, $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 27 > 0$, $f_{xx} = -6 < 0 \Rightarrow$ local maximum.

5. (2 points) Find the absolute maxima and minima of the functions on the given domains.
 $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ on the rectangular plate $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

Solution:

(i) When $x = 0, 0 \leq y \leq 1$, $f(x, y) = f(0, y) = -24y^2$

$f'(0, y) = -48y \leq 0 \Rightarrow$ the critical points are $f(0, 0) = 0, f(0, 1) = -24$.

(ii) When $x = 1, 0 \leq y \leq 1$, $f(x, y) = f(1, y) = 48y - 32 - 24y^2$

$f'(1, y) = 48 - 48y \geq 0 \Rightarrow$ the critical points are $f(1, 0) = -32, f(1, 1) = -8$.

(iii) When $0 \leq x \leq 1, y = 0$, $f(x, y) = f(x, 0) = -32x^3$

$f'(x, 0) = -96x^2 \leq 0 \Rightarrow$ the critical points are $f(0, 0) = 0, f(1, 0) = -32$.

(iv) When $0 \leq x \leq 1, y = 1$, $f(x, y) = f(x, 1) = 48x - 32x^3 - 24$

$f'(x, 1) = 48 - 96x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}} \in (0, 1)$

\Rightarrow the critical points are $f(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1) = 16\sqrt{2} - 24, f(0, 1) = -24, f(1, 1) = -8$.

(v) For interior points, $\begin{cases} f_x(x, y) = 48y - 96x^2 = 0 \\ f_y(x, y) = 48x - 48y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x - 2x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 0 \text{ or } x = y = \frac{1}{2}$

the critical points is $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 2$

Therefore the absolute maximum is 2 at $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, the absolute minimum is -32 at $(1, 0)$.