

线性代数期中试卷

(2019.11.16)

一. 简答与计算题(本题共5小题, 每小题8分, 共40分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

分块对角阵

降阶法

(因式分解意识)

与A只差部分符号, 而根据A

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 $B = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{21} & M_{31} \\ M_{12} & M_{22} & M_{32} \\ M_{13} & M_{23} & M_{33} \end{pmatrix}$, 其中 M_{ij} 为行列式 $|A|$ 的 ij 元素的余子式.

↓
|A| 与 |A| 易求

↑
往条件靠

$= (|A|(|A|^{-1} + E))^{-1} = (|A|^{-1} + E)^{-1} |A|$

与 |A| 易求

3. 已知 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \end{pmatrix}$, 求 $(E + A)^{-1}$.

$(|A|^{-1} + E, |A|^{-1})$ 行变换 $(E, (|A|^{-1} + E)^{-1} |A|)$

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (-3\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, -2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3), |B| = 16$, 求 $|A + B|$.

熟悉结论: $r(|A|, |A|^{-1}) = r(|A|)$

5. 设矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 证明 $r(AA^T + BB^T) = r(A, B)$.

因式分解意识 $\leftarrow r(|A|, |B|) = r(|A|, |B|)$

$B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = |A| \cdot C$

高斯消元法

二. (15分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -2 & 1 & -3 \\ -1 & -7 & 9 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 3 \\ s \\ 2.4 \end{pmatrix}$, 其中 s 为参数.

(1) 解方程组 $Ax = \beta$;

(2) 令 $B = \begin{pmatrix} A & \beta \\ \gamma^T & 3 \end{pmatrix}$, 解方程组 $Bx = \theta$.

利用伴随矩阵的性质

三. (10分) 设 n 阶矩阵 A 满足 $(A^*)^* = O$, 其中 $(A^*)^*$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的伴随矩阵, 证明 $|A| = 0$.

四. (15分) 设两个向量组 $A: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 和 $B: \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ 12 \\ 5 \end{pmatrix}$.

(1) 分别求向量组 A 的一个极大无关组和向量组 B 的一个极大无关组;

(2) 找一个向量 γ 使得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma$ 等价, 给出理由.

利用行简化梯阵

五. (10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -5 & 5 & 10 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 计算行列式 $|3E + A^*|$.

它们都等价于 $|A| \cup |B| \leftarrow$ 第1问

整体考虑 $(|A|, |B|)$

与 $(|B|, |A|)$

六. (10分) 设 n 阶实矩阵 $A \sim D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}, d_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n, f(\lambda) = |\lambda E - A|$.

(1) 证明 $f(d_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$;

(2) 证明 $f(A) = O$.

代入