




الغدة النخامية

الصف : الثاني أكاديمي
المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية



هرمونات الغدة النخامية الأمامية (Anterior Pituitary)

ذُكرت في سياق تنظيم الجهاز التناسلي وإدرار الحليب:

(1) الهرمون المنبّه للحوصلة (FSH):

- في الأنثى: يحفز المبيض لنضج الحوصلة وتطورها .
- في الذكر: يحفز إنتاج الطائع المنوية في الأنبيبات المنوية بالخصية .

(2) الهرمون المنبّه للجسم الأصفر (LH):

- في الأنثى: يعمل على إتمام نضج الحوصلة وانفجارها (عملية الإباضة) وتكوين الجسم الأصفر .
- في الذكر: يحفز الخلايا البينية (خلايا اليدج) في الخصية على إفراز هرمون التستوستيرون .

(3) هرمون البرولاكتين (Prolactin):

يُفرز في أثناء الحمل، وهو المسؤول عن إنتاج (إدرار) الحليب في غدد الثدي .

هرمونات الغدة النخامية الخلفية (Posterior Pituitary)

ذُكرت في سياق التنظيم الأسموزي وعمليات الولادة والرضاعة:

(1) الهرمون المانع لإدرار البول (ADH):

يُفرز عند ارتفاع الضغط الأسموزي للدم؛ لزيادة نفاذية الأنبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعة للماء، مما يؤدي لإعادة امتصاص الماء نحو الدم وتقليل حجم البول.

(2) هرمون الأوكسيتوسين (Oxytocin):

- في الولادة: يزيد من انقباضات العضلات الملساء في جدار الرحم لدفع الجنين نحو الخارج .
- في الرضاعة: يحث على خروج الحليب من القنوات الحليبية في الثدي استجابة لعملية الرضاعة .