

**80% VAN DE HONDEN OUDER DAN 3 JAAR
HEEFT LAST VAN PARODONTITIS.**




**"ONDERZOEK HEEFT AANGETOOND DAT 80% VAN DE HONDEN OUDER DAN DRIE JAAR
IN MEER OF MINDERE MATE LAST HEEFT VAN PARODONTITIS.
DIT IS EEN AANDOENING VAN DE STEUNWEEFSELS VAN DE TANDEN EN KIEZEN."**

**HIER VINDT U ALLE
INFORMATIE OVER
PRODONTITIS
&
HOE U HET KUNT HERKENNEN
EN VOORKOMEN**



WAT MOET U DOEN OM BIJ DE 20% TE HOREN?



Tandplak en tandsteen bij de honden

Bij honden komt tandplak en tandsteen zeer veel voor. Met name kleine hondenrassen, zoals de Yorkshire Terriër of de Chihuahua, hebben hier zeer vaak en zeer snel last van. Een eigenaar heeft beginnende problemen met tandplak vaak niet in de gaten, maar gevorderde tandplak en tandsteen kunnen leiden tot pijn aan het gebit, stinken uit de bek en uiteindelijk ook tot verlies van tanden en kiezen en ontstekingen elders in het lichaam, zoals een ontsteking van de hartklep (endocarditis) of afwijkingen aan het nier weefsel.

Tandplak en tandsteen kunnen voorkomen worden door een goede gebitsverzorging en door het geven van gebitsverzorgende voeding en kauwproducten. Toch moeten in veel gevallen ernstige problemen met het gebit behandeld worden door de dierenarts, door bijvoorbeeld een volledige gebitsreiniging van de hond.

Hoe ontstaat tandplak en tandsteen bij de hond?

Tandplak ontstaat door groei van bacteriën in voedselresten die op het gebit achterblijven. Veel voorkomende bacteriën zijn: *Porphyromonas* spp., *Peptostreptococcus* spp., *Fusobacterium nucleatum* en spirochetes. Tandplak kan onder invloed van speeksel mineraliseren en vormt dan tandsteen.

Wat is het risico van tandplak en tandsteen bij de hond?

Tandsteen kan irritatie geven aan het tandvlees. Door de irritatie van het tandvlees en ophoping van bacteriën ontstaan er ontstekingen in het tandvlees (gingivitis). Deze ontstekingen kunnen zich uitbreiden onder het tandvlees naar de gebitsondersteunende weefsels (parodontitis). Hierbij gaat de spleet tussen de tand en het tandvlees (sulcus gingivalis) verloren. Het tandvlees zal zich gaan terugtrekken en het alveolaire bot (bot waarin de tand zit) en de parodontale ligamenten (ophangbandjes van de tand) zullen kapot gaan. Hierdoor komt de tand of kies los te zitten. Bovendien kunnen de bacteriën van het tandplak bij een ontsteking van het tandvlees via de bloedbaan naar bijvoorbeeld het hart en de nieren gaan. De bacteriën van het gebit kunnen hierdoor een ontsteking van de hartklep (endocarditis) of afwijkingen in de nieren veroorzaken.

Hoe herkent u tandplak en tandsteen bij de hond?



Beginnend tandplak is met het blote oog nauwelijks zichtbaar, uw hond heeft hier zelf ook geen last van en zal nog geen klachten vertonen.



Beginnende tandvleesontsteking (gingivitis) als gevolg van tandsteen en tandplak zal met name een slechte adem veroorzaken.



Gevorderde tandsteen en tandplak veroorzaken een geel-bruine aanslag op het oppervlak van de tanden en kiezen. Deze geel-bruine aanslag is goed te herkennen. De slechte adem zal in ernst toenemen.




Gevorderde tandvleesontsteking (gingivitis) is te herkennen aan rood tandvlees welke bij aanraking snel bloed. Door de ontsteking kan het tandvlees zich terug gaan trekken en komen de wortels bloot te liggen. De gevorderde tandvleesontsteking zie je vaak in combinatie met veel tandsteen en zeer slechte adem.




Bij ver gevorderde tandvleesontsteking met uitbreiding naar gebitsondersteunende weefsels (paradontitis) zie je gevorderde tandvleesontsteking, veel tandsteen, zeer slechte adem en kunnen kiezen of tanden los gaan zitten. Nu kan u ook opvallen dat uw hond een verminderde eetlust heeft en geen hard voedsel meer wil eten. Ook kan het gedrag van de hond veranderen en kan uw hond meer agressief reageren bij aanraken van de kop of bek.

Parodontitis bij de hond


Fase 1: Gingivitis




Fase 2: Beginnende Parodontitis



Fase 3 Ware (matig) Parodontitis



Fase 4: Ernstige (gevorderde) Parodontitis



Hoe kunt u dit voorkomen?

Een deel van de parodontitis kan worden voorkomen. Bot wat verloren is gegaan wordt echter niet meer teruggevormd. Als de ontsteking van het slijmvlies daarentegen stopt en onder controle gehouden wordt, zal het proces niet verder gaan.

Hoe sneller dus ontdekt wordt dat een hond een gebitsprobleem heeft of ontwikkelt, hoe meer kans er is dat hij of zij de tanden en kiezen niet kwijt hoeft te raken.




Het belangrijkste in de preventie van parodontitis is het voorkomen van het ontstaan van tandplak. Dit kan het beste door mechanische reiniging: **tanden poetsen**. Het kost bij een hond uiteraard een hoop tijd en aandacht voordat het poetsen goed gaat, maar de ervaring is dat de meeste dieren uiteindelijk het poetsen van de tanden zullen toestaan.

Jong geleerd is oud gedaan!

Het aanleren van tandenpoetsen bij pups is een stuk eenvoudiger en aangezien zoveel dieren op latere leeftijd problemen met het gebit krijgen, is het daarom verstandig om al bij de pup te beginnen met tanden te poetsen.

Daarnaast bestaan speciale brokken die groter en steviger zijn dan normale brokken, waardoor de reiniging van het gebit verbeterd wordt. Daarnaast bevat deze voeding enzymen die voorkomen dat tandplak tandsteen wordt. Een andere goede optie is de Bucco-fresh. Dit zijn algen in poedervorm die dagelijks over de voeding gegeven worden. Het voorkomt de aanhechting van tandplak op de tand en maakt bestaand tandsteen zachter zodat het makkelijker verwijderd kan worden, bijvoorbeeld door middel van poetsen.

LET OP DE BEGINNENDE KENMERKEN!





Wat ziet de dierenarts?



Wat ziet de röntgen?



Hoe zit dat precies?




Advies van de dierenarts

1 STADIUM



Gezond gebit. Tandvles is roze en zit vast aan de tanden en kiezen. Geen slechte adem.



Normale aansluiting van het bot rondom de kieswortels.




Geen aanslag of lichte opbouw van tandplak.


Perfect, het gebit van uw hond of kat is schoon en gezond!

Met regelmatige aandacht voor het gebit thuis en regelmatige gebitscontroles door de dierenarts houdt u het gebit van uw huisdier gezond.

2 STADIUM



Gezond tandvles, vorming van tandplak op de kiezen.



Geen verandering op de röntgenfoto van het gebit.



Lichte aanslag boven de rand van het tandvles.


U bent er vroeg genoeg bij om dit probleem op te lossen.

Met een professionele gebitsreiniging onder narcose, ziet het gebit er weer perfect uit.

3 STADIUM



Beginnende tandvlesontsteking met tandsteen-vorming. Bacteriële infectie veroorzaakt een slechte adem.



Lichte botoplossing rondom de wortels als gevolg van botontsteking.




Tandsteen en tandplak vorming onder de rand van het tandvles. Begin van botoplossing.


Het is nooit te laat!

In dit stadium zal een professionele gebitsreiniging onder narcose de bacteriële infectie bestrijden. Daarmee verhoogt u de kans op het behoud van zoveel mogelijk tanden en kiezen.

4 STADIUM



Uitgebreide ontsteking van het tandvles en losse gebits elementen. Slechte adem.



10 - 30% botoplossing rondom de kieswortels veroorzaakt loszittende kiezen.



Uitgebreide loslating van het tandvles en de kies. Uitbreiding van de botoplossing.

Uw huisdier kan u niet vertellen hoe pijnlijk dit is!

Kieswortelontsteking is een pijnlijke aangelegenheid. Onmiddellijke behandeling is nodig om de pijn weg te nemen en het risico op orgaanschade te verminderen.

5 STADIUM



Zeer uitgebreide tandvles- en botontsteking. Veel losse kiezen (pijnlijk). Ernstig stinkende adem door bacteriële infectie.



Meer dan 30% botverlies rondom de wortels van de kiezen.



Ernstige tandvles- en botontsteking veroorzaakt zeer losse kiezen.

Wacht niet, onmiddelijk behandelen!

Behalve zeer pijnlijk, loopt uw huisdier risico op complicaties als gevolg van infectie. Complicaties zijn o.a. kaakfracturen, hartklepontsteking en nierfalen.