

Sindromi Affettive e Sindromi Ansiose

— Schema

Salute Mentale · Sessione 06

Emozioni

- **Emozione** → reazione affettiva acuta, breve, da evento stimolo (Galimberti, 1999)
- **Umore** → disposizione affettiva di fondo, persistente, oscillante tra piacere e dolore (Delay, 1946)
- **Funzioni** → adattamento all'ambiente + comunicazione con l'altro

Emozioni di base

Teoria	Autori	Numero	Emozioni
Emozioni di base	Ekman & Friesen (1971)	6	Gioia, tristezza, paura, disgusto, rabbia, sorpresa
Modello multidimensionale	Plutchik (2017)	8 primarie	+ emozioni secondarie da combinazione

Plutchik — fiore: - Centro del petalo → emozione si **intensifica** (tristezza → angoscia) - Estremità del petalo → emozione si **attenua** (tristezza → pensierosità) - Tra i petali → **emozioni secondarie** (es. rabbia + disgusto = disprezzo)

Le depressioni

Nucleo semiologico comune (Melanie Klein)

- **Umore depresso** → abbassamento del tono timico

- **Rallentamento psicomotorio** → gesti, andatura, voce, elaborazione cognitiva
- **Anedonia depressiva** → assenza di piacere per attività abituali (sintomo soggettivo)
- **Rallentamento psichico** → attenzione, memoria, concentrazione rallentati
- **Apatia** → assenza di motivazione ($\neq$ anedonia)
- **Alfa privativo** → "a-" = quella cosa non c'è (a-nedonia, a-patia, a-bulia...)

Classificazione Lalli (2002)

- **Primarie** → originate dal carattere depressivo
 - Carattere depressivo: bassa autostima → dipendenza da figure idealizzate → ambivalenza → rabbia repressa
 - Tipi: reattiva, nevrotica, maggiore, mascherata, esistenziale
- **Secondarie** → origine organica
 - Malattie somatiche, neurologiche, farmaci, fase depressiva del bipolare

Tre gruppi clinici

Gruppo	Causa	Paziente	Stimolazione
Psicogene	Comprensibile (lutto, trauma)	Si sente vittima ; reattivo all'ambiente	Funziona
Endogene	Non identificabile (da dentro)	Si sente colpevole ; non reattivo	Può essere controproducente
Somatiche	Organica	—	Dipende dalla causa

Disturbi depressivi (DSM-5-TR)

- **Disturbo depressivo maggiore** → episodi distinti $\geq$ 2 settimane; remissioni possibili; **non sospendere terapia all'eutimia**
- **Disturbo depressivo persistente** → abbassamento cronico $\geq$ 2 anni; no ritorno a eutimia

- **Depressione mascherata** → malessere depressivo espresso solo via sintomi somatici (≠ ipocondria = ansia per la salute)
-

Disturbi bipolari

- **Pendolo timico** → oscillazione repentina tra depressione e mania; eutimia al centro
- **Caratteristica** → mutamento repentino + passaggio da estremo patologico a estremo patologico

Episodio maniacale

- Euforia eccessiva prolungata
- Insonnia senza stanchezza → calo di peso (iperattività brucia calorie)
- Agitazione psicomotoria, logorrea
- **Fuga di idee**, deliri di grandezza
- Disinibizione sociale e sessuale
- **Perdita di contatto con la realtà** (elemento cruciale)
- ⚠ **Non trattare la fase depressiva con antidepressivi** → rischio di scatenare la mania

Episodio depressivo nel bipolare

- Simile al disturbo depressivo maggiore
- Sintomi di agitazione possono coesistere
- In anamnesi: episodi ipomaniacali/maniacali precedenti

Tipi di disturbo bipolare

Tipo	Alternanza	Nota
Bipolare I	Depressione ↔ Mania	—
Bipolare II	Depressione ↔ Ipomania	Non più lieve del tipo I
Ciclotimico		

Tipo	Alternanza	Nota
	Fluttuazione continua ≥ 2 anni	Senza raggiungere i criteri pieni di nessun polo

Terapia e gestione

- **Stabilizzatori dell'umore** → sali di litio o anticonvulsivi
- **Litio** → monitoraggio ematico regolare (tossico a dosi eccessive)
- **Psicoeducazione al paziente e ai familiari** → riconoscere segnali precoci

Sindromi ansiose

Paura vs. Ansia

	Paura	Ansia
Stimolo	Concreto, presente	Indefinito, futuro, ipotetico
Risposta	Emergenza (lotta/fuga)	Ipervigilanza, evitamento
Carattere	Episodico	Vigilanza sostenuta

Rimuginio ansioso vs. Ruminazione depressiva

	Rimuginio ansioso	Ruminazione depressiva
Orientamento	Futuro	Passato
Temi	Anticipazione minacce	Perdita, cause, rappresentazione di sé
Effetto paradosso	Alimenta l'ansia	Prolunga lo stato depressivo

- **Rimuginio** → caratteristica principale del **DAG**

Sintomi dell'ansia

- **Cognitivi** → ipervigilanza, distraibilità, paura di morire/perdere controllo
- **Affettivi** → irritabilità, inquietudine, oppressione
- **Fisiologici** → tachicardia, iperventilazione, tremori, nausea, tensione muscolare
- **Comportamentali** → evitamento, agitazione, **ricerca di rassicurazione (web → controproducente)**

Ansia di stato vs. ansia di tratto (Sims & Snaith, 1988)

- **Stato** → episodica, legata a situazione specifica
- **Tratto** → modalità stabile, costante; **spesso legata a disturbi di personalità**

Disturbi d'ansia (DSM-5-TR)

- **DAG** → ansia su molti ambiti; rimuginio come elemento centrale
- **Ansia sociale** → timore del giudizio negativo; emozione centrale: vergogna
- **Disturbo di panico** → attacchi ricorrenti inaspettati; picco in pochi minuti; ≥ 4 sintomi
- **Agorafobia** → evitamento situazioni in cui la fuga è difficile
- **Fobia specifica** → paura irrazionale di oggetto/situazione
- **Ansia da separazione** → paura eccessiva della separazione
- **Mutismo selettivo** → incapacità di parlare in certi contesti sociali
- **⚠️ DOC e PTSD** → **non nei disturbi d'ansia; capitoli propri nel DSM-5-TR**

Attacco di panico

- **Paura intensissima + sintomi fisici marcati + convinzione di morire**
 - Picco in pochi minuti; ≥ 4 dei 13 sintomi fisici/cognitivi
 - **Non si muore dall'attacco in sé; risposta impulsiva può creare rischi**
 - **Accoglienza senza giudizio = strumento principale**
-

Autori / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Ekman & Friesen	6 emozioni di base universali	1971
Plutchik	Modello multidimensionale delle emozioni (fiore)	2017
Galimberti	Definizione di emozione	1999
Delay	Definizione di umore	1946
Luminet & Grynberg	Prospettiva universale + culturale sulle emozioni	2021
Melanie Klein	Nucleo semiologico comune delle depressioni	—
Lalli	Depressioni primarie vs. secondarie	2002
Borkovev et al. (in Caselli et al.)	Definizione di rimuginio ansioso	1998 / 2017
Sims & Snaith	Ansia di stato vs. ansia di tratto	1988
APA	DSM-5-TR	2023
OMS	ICD-11 (ed. italiana)	2025

Parole chiave

emozione · umore · eutimia · anedonia · apatia · alfa privativo · pendolo timico · carattere depressivo · depressione mascherata · depressione psicogena · depressione endogena · disturbo depressivo maggiore · disturbo depressivo persistente · bipolare I · bipolare II · ciclotimico · ipomania · logorrea · fuga di idee · paura · ansia · rimuginio · ruminazione · evitamento · ipervigilanza · DAG · ansia sociale · disturbo di panico · attacco di panico · stabilizzatori dell'umore · litio